

BULLETIN DE LA S. M. F.

AÏSSA WADE

Modèles locaux de structures de Poisson singulières en dimension 3

Bulletin de la S. M. F., tome 125, n° 4 (1997), p. 573-618

http://www.numdam.org/item?id=BSMF_1997__125_4_573_0

© Bulletin de la S. M. F., 1997, tous droits réservés.

L'accès aux archives de la revue « Bulletin de la S. M. F. » (<http://smf.emath.fr/Publications/Bulletin/Presentation.html>) implique l'accord avec les conditions générales d'utilisation (<http://www.numdam.org/conditions>). Toute utilisation commerciale ou impression systématique est constitutive d'une infraction pénale. Toute copie ou impression de ce fichier doit contenir la présente mention de copyright.

NUMDAM

Article numérisé dans le cadre du programme
Numérisation de documents anciens mathématiques

<http://www.numdam.org/>

MODÈLES LOCAUX DE STRUCTURES DE POISSON SINGULIÈRES EN DIMENSION 3

PAR

AÏSSA WADE (*)

RÉSUMÉ. — On étudie la classification des structures de Poisson différentiables de classe C^∞ qui ont un 1-jet nul en un point. On montre qu'en dimension 3, dans la famille des structures de Poisson ayant un 2-jet quadratique « diagonalisable », il y a quatre importantes classes. Ensuite, on déduit de cette classification celle des 1-formes différentielles intégrables singulières.

ABSTRACT. — Classification of smooth Poisson structures with zero 1-jet at a point, is studied. In dimension 3, we show that the family of Poisson structures with quadratic and « diagonalizable » 2-jet, admits four important class. This classification is applied to obtain the classification of singular integrable 1-forms.

Introduction

Une *structure de Poisson* sur une variété différentiable M est la donnée sur l'espace $C^\infty(M, \mathbb{R})$ des fonctions différentiables, d'une loi de composition interne $\{, \}$ appelée *crochet de Poisson*, qui en fait une algèbre de Lie et qui vérifie l'identité de Leibniz

$$\{fg, h\} = \{f, h\}g + f\{g, h\},$$

quels que soient f, g et $h \in C^\infty(M, \mathbb{R})$. On dit alors que $(M, \{, \})$ est une variété de Poisson. La donnée d'un crochet de Poisson équivaut à celle d'un champ de tenseurs antisymétriques deux fois contravariants Π appelé *tenseur de Poisson* qui vérifie

$$[\Pi, \Pi] = 0,$$

(*) Texte reçu le 13 mai 1997, révisé et accepté le 22 octobre 1997.

A. WADE, Département de Mathématiques, c.c. 051, Université Montpellier II, Place Eugène Bataillon, 34095 Montpellier CEDEX 05 (France).

Email : wade@darboux.math.univ-montp2.fr.

Mots clés : Structures de Poisson, singularités, formes intégrables, modèles locaux.

Classification AMS : 58F36, 53B99, 58F14.

où le crochet $[,]$ est celui de Schouten. Le tenseur de Poisson s'obtient par la relation

$$\Pi(x)(df(x), dg(x)) = \{f, g\}(x).$$

On appelle rang de la structure de Poisson en un point x , le rang de la forme bilinéaire antisymétrique $\Pi(x)$ sur T_x^*M .

Il est connu que localement, toute variété de Poisson est le produit d'une variété symplectique par une variété de Poisson de rang nul en un point (voir [We1]). Donc, l'étude des formes normales de structures de Poisson n'est intéressante que pour les structures de Poisson de rang nul en un point.

Rappelons le problème des formes normales de structures de Poisson qui peut se formuler comme suit : étant donné une variété de Poisson $(M, \{, \})$ et m_0 un point de M , on cherche des coordonnées locales (x_1, \dots, x_n) définies au voisinage de m_0 telles que l'écriture des crochets $\{x_i, x_j\}$ soit la plus simple possible.

D'une manière générale, si (x_1, \dots, x_n) sont des coordonnées locales définies sur un ouvert U , alors les $\{x_i, x_j\}$ déterminent le crochet de Poisson sur U . Dans cet ouvert, le tenseur de Poisson s'écrit

$$\Pi = \sum_{i < j} \{x_i, x_j\} \frac{\partial}{\partial x_i} \wedge \frac{\partial}{\partial x_j}.$$

On s'intéresse ici à l'existence de formes normales polynomiales. En dimension 2, cette question a été étudiée dans la référence [A], où l'on trouve une liste de modèles locaux de structures de Poisson sur \mathbb{R}^2 . Par ailleurs, le problème qui a été beaucoup étudié, c'est celui de la linéarisation d'une structure de Poisson (en dimension quelconque) de rang nul en un point m_0 . La linéarisation consiste à trouver des coordonnées (x_1, \dots, x_n) nulles en m_0 dans lesquelles

$$\{x_i, x_j\} = \sum c_{ij}^k x_k.$$

En fait, les c_{ij}^k sont des constantes de structure d'une algèbre de Lie \mathcal{G} intrinsèquement liée au crochet de Poisson qui est appelée *linéarisée* de la structure de Poisson en m_0 . On montre dans [We1] que lorsque \mathcal{G} est semi-simple, la structure de Poisson est formellement linéarisable. Ce résultat a été complété par J. Conn (voir [C1], [C2]) qui montre qu'il reste valable en analytique (en classe C^∞ aussi si l'on suppose de plus que \mathcal{G} est de type compacte). La linéarisation est également traitée dans [D], [D-M]. On donne des formes normales formelles en dimension quelconque dans [H], [D-W] et [Wa1].

On connaît peu de chose sur le problème général de l'existence d'une forme normale polynomiale en classe C^∞ pour une structure de Poisson de rang nul en un point, exceptés les résultats de linéarisation et ceux de «quadratisation» obtenus dans [H] et [D-W]. Il est important de noter que les singularités de tenseur de Poisson avec 1-jet nul sont en général stables en ce sens que de façon générique, si un tenseur de Poisson Π admet un 1-jet nul en un point m_0 , alors tout autre tenseur de Poisson qui est C^2 -proche de Π possède un 1-jet nul en un point voisin de m_0 .

Les tenseurs de Poisson étudiés ici ont un 1-jet nul en un point; nous étudierons le cas particulier de la dimension 3, cela permet d'obtenir des formes normales polynomiales en classe C^∞ . Travaillant localement, on supposera que $(M, m_0) = (\mathbb{R}^3, 0)$. Par la contraction avec une forme volume Ω , on associe à tout tenseur de Poisson Π une 1-forme différentielle intégrable $\omega = i_\Pi \Omega$. Cette correspondance définit un isomorphisme entre l'espace des tenseurs de Poisson sur \mathbb{R}^3 et celui des 1-formes intégrables. Les singularités des 1-formes différentielles intégrables sur \mathbb{C}^n (ou \mathbb{R}^n) ont fait l'objet de nombreuses études notamment celles de C. Camacho, D. Cerveau, R. Moussu, A. Lins Neto, etc.

Si ω et ω' sont deux 1-formes intégrables conjuguées, c'est-à-dire qu'il existe un difféomorphisme φ tel que $\omega' = \varphi^* \omega$, alors les tenseurs de Poisson Π et Π' associés respectivement à ω et ω' sont liés par

$$\Pi' = J\varphi \varphi_* \Pi,$$

où $J\varphi$ est le Jacobien de φ . En d'autres termes, Π est isomorphe à Π' , à multiplication par une fonction non nulle près. Mais en général pour se ramener à un modèle local, on se sert de théorèmes généraux qui ne permettent pas d'avoir une expression explicite des isomorphismes φ , donc on ne maîtrise pas le facteur $J\varphi$. Comme le produit d'un tenseur de Poisson sur \mathbb{R}^3 par une fonction est toujours un tenseur de Poisson (ceci n'est pas valable en dimension supérieure ou égale à 4), on peut dire que la connaissance des modèles locaux des 1-formes intégrables ne donne pas des renseignements sur celle des modèles locaux de tenseurs de Poisson. Par contre, nous montrons dans le paragraphe 5 qu'en partant des résultats sur les tenseurs de Poisson, on trouve aisément les modèles locaux des 1-formes différentielles intégrables.

Nous verrons plus loin que deux 1-formes intégrables conjuguées peuvent correspondre à deux structures de Poisson non isomorphes. En revanche, à chaque modèle de tenseur de Poisson, est associé un unique modèle de 1-forme intégrable.

Dans la classification des structures de Poisson quadratiques en dimension 3 faite dans [D-H], on trouve deux grandes classes.

La première classe correspond aux formes intégrables exactes, ce sont les structures de Poisson du type

$$(*) \quad \Pi^2 = \frac{\partial P}{\partial x_3} \frac{\partial}{\partial x_1} \wedge \frac{\partial}{\partial x_2} + \frac{\partial P}{\partial x_1} \frac{\partial}{\partial x_2} \wedge \frac{\partial}{\partial x_3} + \frac{\partial P}{\partial x_2} \frac{\partial}{\partial x_3} \wedge \frac{\partial}{\partial x_1},$$

où $P(x_1, x_2, x_3)$ est un polynôme homogène de degré 3.

La seconde classe est formée des structures de Poisson isomorphes à une structure de Poisson du type

$$(**) \quad \Pi^2 = cx_1x_2 \frac{\partial}{\partial x_1} \wedge \frac{\partial}{\partial x_2} + ax_2x_3 \frac{\partial}{\partial x_2} \wedge \frac{\partial}{\partial x_3} + bx_3x_1 \frac{\partial}{\partial x_3} \wedge \frac{\partial}{\partial x_1},$$

avec a, b et c deux à deux distincts. Ces dernières sont dites quadratiques diagonalisables; elles correspondent aux 1-formes intégrables du type

$$\omega_2 = ax_2x_3 dx_1 + bx_1x_3 dx_2 + cx_1x_2 dx_3.$$

Une telle forme différentielle ω_2 est dite tangente à une action commutative linéaire de \mathbb{R}^2 , c'est-à-dire qu'il existe deux champs de vecteurs linéaires commutants X, Y tels que $\{X_x, Y_x\}$ soit libre pour tout x élément d'un ouvert dense et tels que

$$\omega_2 = i_X i_Y dx_1 \wedge dx_2 \wedge dx_3.$$

L'intégration des champs de vecteurs de l'algèbre commutative de dimension 2 engendrée par X et Y , donne un groupe G de germes de difféomorphismes qui agit naturellement sur $(\mathbb{R}^3, 0)$.

D'après [Ce-LN], toute 1-forme intégrable sur \mathbb{R}^3 dont le 2-jet à l'origine est égal à ω_2 (avec a, b, c non nuls et deux à deux distincts), est tangente à une action commutative. Nous précisons ce résultat en montrant que les modèles locaux de telles 1-formes sont presque toujours tangentes à une action commutative *polynomiale* de \mathbb{R}^2 que l'on sait déterminer. Nous prouvons d'abord le théorème qui suit.

THÉORÈME. — *Soit Π une structure de Poisson sur \mathbb{R}^3 dont le jet d'ordre 1 est nul à l'origine. On suppose qu'il existe des coordonnées (x_1, x_2, x_3) nulles en 0 telles le 2-jet de Π en 0 s'écrit sous la forme (**), les coefficients a, b et c étant deux à deux distincts. On suppose également que si l'un des réels a, b ou c est nul, les deux autres sont de signe contraire. Alors Π est isomorphe en classe C^∞ à l'un des modèles locaux suivants*

$$M_0 = cxy \frac{\partial}{\partial x} \wedge \frac{\partial}{\partial y} + ayz \frac{\partial}{\partial y} \wedge \frac{\partial}{\partial z} + bzx \frac{\partial}{\partial z} \wedge \frac{\partial}{\partial x};$$

$$M_1 = M_0 + y^{m_1} z^{m_2} \frac{\partial}{\partial x} \wedge \left(\alpha y \frac{\partial}{\partial y} + z \frac{\partial}{\partial z} \right),$$

avec $(m_1, m_2) \in \mathbb{N}^2$, $m_1 + m_2 \geq 2$ et $\alpha \in \mathbb{R}$;

$$M_2 = (1 \pm \varrho^p)M_0,$$

où ϱ est un polynôme homogène en x, y, z et $p \in \mathbb{N}^*$;

$$M_3 = P_{q-1}(\varrho)M_0 + \varrho^q \tilde{\Pi}_2,$$

où P_{q-1} est un polynôme en ϱ de degré $(q - 1)$, avec $q \in \mathbb{N}^*$ et $\tilde{\Pi}_2$ est un tenseur de Poisson d'ordre 2 en 0.

En se servant de ce résultat, nous établissons le théorème :

THÉORÈME. — Soit ω une 1-forme intégrable de classe C^∞ au voisinage de l'origine $0 \in \mathbb{R}^3$ ayant pour 2-jet en ce point

$$\omega_2 = ayz dx + bzx dy + cxy dz,$$

avec $(a-b)(b-c)(c-a) \neq 0$. Supposons que si l'un des coefficients a, b ou c est nul, les deux autres sont de signe contraire. Alors ω est C^∞ -conjuguée à l'un des modèles suivants :

$$\mathcal{F}_0 = \omega_2,$$

$$\mathcal{F}_1 = \omega_2 + y^{m_1} z^{m_2} (\alpha y dz - z dy),$$

$$\mathcal{F}_2 = \omega_2 + \varrho^q \tilde{\omega}_2,$$

où ϱ est un polynôme homogène en x, y, z et $\tilde{\omega}_2 = \tilde{a}yz dx + \tilde{b}zx dy + \tilde{c}xy dz$, le triplet $(\tilde{a}, \tilde{b}, \tilde{c})$ n'étant pas colinéaire à (a, b, c) .

Ce travail comporte cinq paragraphes. Dans le premier, nous rappelons quelques définitions de base. Les paragraphes 2, 3 et 4 sont consacrés à la démonstration du premier théorème. Dans le dernier paragraphe, nous montrons le second théorème.

1. Rappels sur les structures de Poisson

Considérons un crochet de Poisson sur une variété M , c'est-à-dire une application bilinéaire, antisymétrique

$$\{, \} : C^\infty(M, \mathbb{R}) \times C^\infty(M, \mathbb{R}) \longrightarrow C^\infty(M, \mathbb{R})$$

qui vérifient les identités de Jacobi et Leibniz

$$(J) \quad \{f, \{g, h\}\} + \{g, \{h, f\}\} + \{h, \{f, g\}\} = 0,$$

$$(L) \quad \{fg, h\} = \{f, h\}g + f\{g, h\},$$

quels que soient f, g et $h \in C^\infty(M, \mathbb{R})$.

À ce crochet de Poisson, il correspond un unique champ de tenseurs antisymétriques deux fois contravariants Π défini par

$$\Pi(df, dg) = \{f, g\},$$

il est appelé *tenseur de Poisson*. Plus précisément, la donnée d'un crochet de Poisson sur M équivaut à celle d'un champ de tenseurs antisymétriques deux fois contravariants Π qui satisfait la relation

$$[\Pi, \Pi] = 0,$$

où le crochet $[\cdot, \cdot]$ est celui de Schouten. Cette relation permet d'avoir l'identité de Jacobi.

Il résulte de l'identité de Leibniz que pour toute fonction différentiable h fixée, l'application

$$\text{ad}_h = \{ \cdot, h \}$$

est une dérivation de la structure d'algèbre associative définie par le produit usuel des fonctions différentiables : il existe un unique champ de vecteurs différentiable X_h sur M tel que $\text{ad}_h = X_h$.

On dit que X_h est la *champ de vecteurs hamiltonien* de h . Lorsque X_h est nul, on dit que h est une *fonction de Casimir* pour la structure de Poisson.

L'ensemble des champs de vecteurs hamiltoniens est un espace vectoriel réel stable par le crochet de Lie. On a l'égalité :

$$[X_f, X_g] = X_{\{f, g\}}$$

pour tous f et $g \in C^\infty(M)$. Toute structure de Poisson donne lieu à un feuilletage singulier ou «de Stefan» qui est engendré par les champs de vecteurs hamiltoniens et dont chacune des feuilles est munie d'une structure de variété symplectique.

DÉFINITION. — Une application $\varphi : (M_1, \Pi_1) \rightarrow (M_2, \Pi_2)$ entre deux variétés de Poisson, est appelée *morphisme de Poisson* si quels que soient $f, g \in C^\infty(M_2, \mathbb{R})$ on a la relation

$$\{f, g\}_2 \circ \varphi = \{f \circ \varphi, g \circ \varphi\}_1,$$

où $\{ \cdot, \cdot \}_1$ et $\{ \cdot, \cdot \}_2$ sont respectivement les crochets de Poisson associés à Π_1 et Π_2 . Cela revient à dire qu'on a la relation

$$\varphi_* \Pi_1 = \Pi_2.$$

Si de plus, φ est un difféomorphisme de classe C^∞ (resp. analytique,

formel), on dit que φ est un isomorphisme de Poisson de classe C^∞ (resp. analytique, formel).

DÉFINITION. — On dira qu'une structure de Poisson Π différentiable (resp. analytique, formelle) est *diagonale* dans les coordonnées (x_1, \dots, x_n) si elle s'écrit

$$\Pi = \sum_{i < j} \bar{\Pi}_{ij} x_i x_j \frac{\partial}{\partial x_i} \wedge \frac{\partial}{\partial x_j},$$

les $\bar{\Pi}_{ij}$ étant des fonctions différentiables (resp. des fonctions analytiques, des séries formelles).

2. Modèles locaux formels

Fixons d'abord les notations que nous utiliserons par la suite.

NOTATIONS. — Soient (x_1, x_2, x_3) des coordonnées locales autour de 0. Si f est une série formelle, nous écrivons :

$$f = \sum_{I \in \mathbb{N}^3} f^I x^I \quad \text{avec} \quad x^I = x_1^{I_1} x_2^{I_2} x_3^{I_3} \quad \text{et} \quad f^I \in \mathbb{R}.$$

Un champ de vecteurs formel X s'écrit :

$$X = \sum_{i=1}^3 \sum_{I \in \mathbb{N}^3} a_i^I x^I \frac{\partial}{\partial x_i} \quad \text{avec} \quad a_i^I \in \mathbb{R}.$$

Posons $x^J = x^I/x_i$, c'est-à-dire que $J_\ell = I_\ell$, pour tout ℓ différent de i et $J_i = I_i - 1$. Nous obtenons l'écriture

$$(1) \quad X = \sum_{i=1}^3 \sum_J \eta_i^J x^J \frac{\partial}{\partial x_i}.$$

Les triplets J sont dans $(\mathbb{N} \cup \{-1\})^3$; ils possèdent au plus une composante égale à -1 . Nous conviendrons que si l'une des composantes J_r est égale à -1 , alors η_i^J est nul pour tout i différent de r .

Un champ de bivecteurs formel P s'écrit

$$P = \sum_{i < j} \sum_{I \in \mathbb{N}^3} P_{ij}^I x^I \frac{\partial}{\partial x_i} \wedge \frac{\partial}{\partial x_j} \quad \text{avec} \quad P_{ij}^I \in \mathbb{R}.$$

Remplaçons x^I par $x^K/x_i x_j$, avec $K_r = I_r$ pour tout r différent de i et j , $K_i = I_i - 1$ et $K_j = I_j - 1$. Il vient :

$$(2) \quad P = \sum_{i < j} \sum_K \alpha_{ij}^K x^K x_i x_j \frac{\partial}{\partial x_i} \wedge \frac{\partial}{\partial x_j}.$$

Les triplets K sont dans $(\mathbb{N} \cup \{-1\})^3$, ils contiennent au plus deux composantes égales à -1 . De plus,

- si K contient une composante négative $K_k = -1$ alors α_{ij}^K est nul à chaque fois que i et j sont différents de k ;
- si K contient deux composantes négatives $K_r = K_s = -1$, les α_{ij}^K sont tous nuls sauf peut-être pour $\{i, j\} = \{r, s\}$.

Dans la suite, nous emploierons surtout les notations (1) et (2), elles permettent d'alléger les calculs. Pour obtenir les modèles locaux formels, nous utilisons un résultat de forme normale formelle valable en toutes dimensions qui a été établi dans [D-W]. En dimension 3, il peut s'énoncer comme suit.

PROPOSITION 2.1. — Soit Π une structure de Poisson sur \mathbb{R}^3 . On suppose qu'il existe des coordonnées (x_1, x_2, x_3) nulles en 0 dans lesquelles le 2-jet de Π en 0 s'écrit

$$\Pi^2(x) = cx_1 x_2 \frac{\partial}{\partial x_1} \wedge \frac{\partial}{\partial x_2} + ax_2 x_3 \frac{\partial}{\partial x_2} \wedge \frac{\partial}{\partial x_3} + bx_3 x_1 \frac{\partial}{\partial x_3} \wedge \frac{\partial}{\partial x_1},$$

où les réels a, b et c sont deux à deux distincts. Alors il existe un changement de coordonnées formel $\varphi : (x_1, x_2, x_3) \mapsto (y_1, y_2, y_3)$ vérifiant

$$\varphi_* \Pi = \Pi^2(y) + \sum_{J \parallel (a,b,c)} \alpha_{ij}^J y^J y_i y_j \frac{\partial}{\partial y_i} \wedge \frac{\partial}{\partial y_j}.$$

La notation $J \parallel (a, b, c)$ signifie que J est colinéaire à (a, b, c) .

Preuve. — Nous construisons par récurrence des coordonnées formelles qui satisfont la proposition. Supposons que (x_1, x_2, x_3) sont des coordonnées nulles en 0 telles qu'on ait :

$$\{x_i, x_j\} = \sum_{\ell \geq 2} \Pi_{ij}^\ell = a_{ij} x_i x_j + \sum_{\substack{J \parallel (a,b,c) \\ 1 \leq |J| \leq p-2}} \alpha_{ij}^J x^J x_i x_j + \Pi_{ij}^{p+1} + \dots,$$

où Π_{ij}^ℓ désigne le terme homogène de degré ℓ , $a = a_{23}$, $b = a_{31}$ et $c = a_{12}$.

Remarquons d'abord que pour tout $\ell \leq p$ et pour tout i différent de j , le terme Π_{ij}^ℓ ne contient pas de monôme du type x_k^ℓ , avec $k \neq i, j$. Puisque, sinon on aurait un triplet non nul J colinéaire à (a, b, c) avec $J_i = J_j = -1$; ce qui contredit le fait que a, b et c sont deux à deux distincts. En utilisant l'identité de Jacobi, nous montrons que Π_{ij}^{p+1} ne comporte pas non plus de tels monômes. En effet, nous pouvons écrire

$$\Pi_{ij}^{p+1} = \sum_{|J|=p-1} \alpha_{ij}^J x^J x_i x_j,$$

où les $x^J x_i x_j$ sont homogènes de degré $p + 1$, avec $p \geq 2$.

Dire que Π_{ij}^{p+1} comporte un monôme non nul en x_k^{p+1} (avec $k \neq i, j$) revient à dire que α_{ij}^J est non nul si $J_i = J_j = -1$ et $J_k = p + 1$. Or, en considérant uniquement les termes en x_k^{p+2} dans l'identité de Jacobi

$$\{\{x_i, x_j\}, x_k\} + \{\{x_j, x_k\}, x_i\} + \{\{x_k, x_i\}, x_j\} = 0,$$

où $\{i, j, k\} = \{1, 2, 3\}$, nous obtenons

$$(a_{jk} + a_{ik})\alpha_{ij}^J x_k^{p+2} = 0.$$

Comme $\{a, b, c\} = \{a_{ij}, a_{jk}, a_{ki}\}$, et les réels a, b et c sont deux à deux distincts, donc on a nécessairement $\alpha_{ij}^J = 0$. Par conséquent, Π_{ij}^{p+1} ne contient pas de tels monômes.

Maintenant, fixons un triplet $J = I$ qui intervient dans l'écriture de Π_{ij}^{p+1} et qui n'est pas colinéaire à (a, b, c) . Nous allons montrer qu'il existe un changement de coordonnées $\psi : (x_1, x_2, x_3) \mapsto (z_1, z_2, z_3)$ qui élimine le terme en $x^I x_i x_j$, c'est-à-dire qu'on a

$$(3) \quad \{z_r, z_s\} = a_{rs} z_r z_s + \sum_{\substack{J \parallel (a,b,c) \\ 1 \leq |J| \leq p-2}} \alpha_{rs}^J z^J z_r z_s + \sum_{\substack{|J|=p-1 \\ J \neq I}} \beta_{rs}^J z^J z_r z_s + \Pi_{ij}^{p+2} + \dots$$

Premier cas : supposons que I est dans \mathbb{N}^3 . — Pour tout $r = 1, \dots, n$, posons :

$$z_r = x_r \theta_r \quad \text{avec} \quad \theta_r = 1 + \varphi_r x^I, \quad \varphi_r \in \mathbb{R}.$$

Il s'agit donc de déterminer les réels φ_r de façon que (3) soit vérifié. Nous avons

$$\{z_r, z_s\} = \theta_r \theta_s \{x_r, x_s\} + x_s \theta_r \{x_r, \theta_s\} + x_r \theta_s \{\theta_r, x_s\},$$

ou encore

$$\{z_r, z_s\} = \theta_r \theta_s \{x_r, x_s\} + x_s \theta_r \sum_{\ell} \frac{\partial \theta_s}{\partial x_{\ell}} \{x_r, x_{\ell}\} - x_r \theta_s \sum_{\ell} \frac{\partial \theta_r}{\partial x_{\ell}} \{x_s, x_{\ell}\}.$$

En posant

$$\Lambda_{rs}(x) = \sum_{\substack{1 \leq |J| \leq p-1 \\ J \neq I}} x^J \alpha_{rs}^J \quad \text{et} \quad A_r \cdot I = \sum_s a_{rs} I_s,$$

nous pouvons écrire

$$\{z_r, z_s\} = \theta_r \theta_s x_r x_s (a_{rs} + \Lambda_{rs}(x) + x^I (\alpha_{rs}^I + A_r \cdot I \varphi_s - A_s \cdot I \varphi_r)) + O(\|x\|^{p+1}).$$

Si le système d'équations qui suit

$$(4) \quad \alpha_{rs}^I = A_s \cdot I \varphi_r - A_r \cdot I \varphi_s,$$

admet une solution alors compte tenu du fait que le changement de coordonnées réciproque de φ est donnée par

$$x_r = z_r (1 - \varphi_r^I z^I) + O(\|z\|^{p-1}),$$

nous obtenons la relation (3). Il suffit donc de montrer qu'il existe des φ_r qui vérifient (4). Or, avec les notations

$$\begin{aligned} A \cdot I &= \sum_r A_r \cdot I x_r \frac{\partial}{\partial x_r}, \\ \Pi^I &= \sum_{r < s} \alpha_{rs}^I x_s x_r \frac{\partial}{\partial x_r} \wedge \frac{\partial}{\partial x_s}, \\ Z &= \sum_r \varphi_r x_r \frac{\partial}{\partial x_r}, \end{aligned}$$

les équations (4) deviennent

$$(5) \quad \Pi^I = Z \wedge A \cdot I.$$

Mais, $A \cdot I \wedge \Pi^I = 0$ (à cause de l'identité de Jacobi) et $A \cdot I$ est non nul car sinon I serait colinéaire à (a, b, c) ; donc il existe un champ de vecteurs Z qui satisfait (5). Par conséquent, si I est dans \mathbb{N}^3 , on peut trouver un changement de coordonnées qui satisfait (3).

Deuxième cas : supposons que $I_i = -1$, les autres composantes de I étant dans \mathbb{N} . — Posons

$$z_r = x_r \quad \text{pour } r \neq i,$$

$$z_i = x_i \theta_i, \quad \text{avec } \theta_i = 1 + \varphi_i x^I.$$

Des calculs identiques à ceux faits dans le premier cas montrent que l'on peut trouver φ_i tel que (3) soit réalisé.

Par itération, on élimine au moyen d'un changement de coordonnées tous les termes homogènes de degré $p + 1$ correspondant à un triplet I qui n'est pas colinéaire à (a, b, c) . Ainsi, on aboutit au résultat souhaité de proche en proche. \square

Considérons la structure de Poisson formelle

$$\varphi_* \Pi = \Pi^2(y) + \sum_{J \parallel (a,b,c)} \alpha_{ij}^J y^J y_i y_j \frac{\partial}{\partial y_i} \wedge \frac{\partial}{\partial y_j}.$$

De deux choses l'une :

- Ou bien (a, b, c) n'est colinéaire à aucun triplet de $(\mathbb{N} \cup \{-1\})^3$; dans ce cas $\varphi_* \Pi = \Pi^2$. Donc, Π est formellement isomorphe à son 2-jet en 0.
- Ou bien (a, b, c) est colinéaire à un triplet de $(\mathbb{N} \cup \{-1\})^3$. Comme tout multiple réel de Π^2 (en particulier son opposé) possède les mêmes propriétés que Π^2 , on peut restreindre l'étude aux deux cas suivants : $a < 0 \leq b < c$ et $0 \leq a < b < c$.

(i) Supposons que $a < 0 \leq b < c$; on a :

$$(a, b, c) = -a \left(-1, -\frac{b}{a}, -\frac{c}{a} \right) = -a(-1, m_1, m_2).$$

Le vecteur $J = (-1, m_1, m_2)$ est l'unique triplet de $(\mathbb{N} \cup \{-1\})^3$ qui soit colinéaire à (a, b, c) . On en déduit qu'il existe deux constantes α et β telles que l'on ait formellement

$$\varphi_* \Pi = \Pi^2(y) + y_2^{m_1} y_3^{m_2} \frac{\partial}{\partial y_1} \wedge \left(\alpha y_2 \frac{\partial}{\partial y_2} + \beta y_3 \frac{\partial}{\partial y_3} \right).$$

Nous verrons plus loin que l'on peut supposer que $\beta = 1$.

(ii) Supposons maintenant que $0 \leq a < b < c$. Alors, les J colinéaires au vecteur (a, b, c) sont dans \mathbb{N}^3 .

NOTATIONS. — Désignons par $I_0 = (n_1, n_2, n_3)$ le plus petit triplet de \mathbb{N}^3 qui soit colinéaire à (a, b, c) , en ce sens que tout autre triplet de \mathbb{N}^3 colinéaire à (a, b, c) est un multiple entier de I_0 . Notons

$$\varrho(y_1, y_2, y_3) = y_1^{n_1} y_2^{n_2} y_3^{n_3}.$$

Nous obtenons

$$(6) \quad \varphi_* \Pi = \sum_{i < j} f_{ij}(\varrho) y_i y_j \frac{\partial}{\partial y_i} \wedge \frac{\partial}{\partial y_j}.$$

Nous avons la classification formelle suivante.

THÉORÈME 2.1. — *Si $(a - b)(b - c)(c - a) \neq 0$ alors toute structure de Poisson sur \mathbb{R}^3 , ayant Π^2 pour 2-jet à l'origine, est formellement isomorphe à l'un des modèles suivants*

$$\begin{aligned} M_0 &= cxy \frac{\partial}{\partial x} \wedge \frac{\partial}{\partial y} + ayz \frac{\partial}{\partial y} \wedge \frac{\partial}{\partial z} + bzx \frac{\partial}{\partial z} \wedge \frac{\partial}{\partial x}, \\ M_1 &= M_0 + y^{m_1} z^{m_2} \frac{\partial}{\partial x} \wedge \left(\alpha y \frac{\partial}{\partial y} + z \frac{\partial}{\partial z} \right), \end{aligned}$$

avec $(m_1, m_2) \in \mathbb{N}^2$, $m_1 + m_2 \geq 2$ et $\alpha \in \mathbb{R}$,

$$M_2 = (1 \pm \varrho^p) M_0,$$

où ϱ est un polynôme homogène en x, y, z et $p \in \mathbb{N}^*$,

$$M_3 = (1 + \alpha_1 \varrho + \cdots + \alpha_{q-1} \varrho^{q-1}) \Pi^2 + \varrho^q \tilde{\Pi}^2,$$

où les α_i sont des réels et $\tilde{\Pi}^2$ est un tenseur de Poisson d'ordre 2 en 0 qui n'est pas un multiple de Π^2 .

En vertu du raisonnement tenu plus haut, pour prouver ce théorème, il suffit de montrer que la structure de Poisson donnée par (6) est formellement isomorphe à l'un des modèles M_2 ou M_3 . Pour cela, nous emploierons les quatre lemmes qui suivent (ils sont valables en toutes dimensions).

Soit $I_0 = (n_1, \dots, n_m) \in \mathbb{N}^m$ fixé. On pose

$$\varrho(y_1, \dots, y_m) = y_1^{n_1} \times \cdots \times y_m^{n_m}.$$

La structure de Poisson formelle considérée est définie sur \mathbb{R}^m par :

$$\Pi' = \sum_{i < j} f_{ij}(\varrho) y_i y_j \frac{\partial}{\partial y_i} \wedge \frac{\partial}{\partial y_j}.$$

On désigne par $F(\varrho)$, la matrice antisymétrique de coefficients $f_{ij}(\varrho)$ et on note

$$F_i(\varrho) \cdot I_0 = \sum_{j=1}^m f_{ij}(\varrho) n_j.$$

Alors, le produit de cette matrice par I_0 est donnée par :

$$F(\varrho) \cdot I_0 = (F_1(\varrho) \cdot I_0, \dots, F_m(\varrho) \cdot I_0).$$

Par la suite, pour simplifier l'écriture, on notera F_i au lieu de $F_i(\varrho) \cdot I_0$.

REMARQUE. — Les fonctions F_i déterminent le champ de vecteurs hamiltonien de la fonction ϱ . En effet, on a :

$$X_\varrho = \sum_{1 \leq i, \ell \leq m} \frac{\partial \varrho}{\partial y_\ell} \{y_i, y_\ell\} \frac{\partial}{\partial y_i} = \varrho \sum_{1 \leq i, \ell \leq m} f_{i\ell}(\varrho) n_\ell y_i \frac{\partial}{\partial y_i} = \varrho \sum_{i=1}^m F_i y_i \frac{\partial}{\partial y_i}.$$

LEMME 2.1. — On a les relations

$$(7) \quad f'_{ij} F_k + f'_{jk} F_i + f'_{ki} F_j = 0.$$

Preuve. — Il suffit d'écrire l'identité de Jacobi $[\varphi_* \Pi, \varphi_* \Pi] = 0$ en partant de l'écriture (6) et en utilisant la relation

$$[X \wedge Y, Z \wedge T] = [X, Z] \wedge Y \wedge T - [X, T] \wedge Y \wedge Z - [Y, Z] \wedge X \wedge T + [Y, T] \wedge X \wedge Z,$$

quels que soient les champs de vecteurs X, Y, Z et T . \square

LEMME 2.2. — Il existe un entier positif q , des réels μ_1, \dots, μ_m et une fonction G tels que

$$F_i = \mu_i \varrho^q G \quad \text{avec} \quad G(0) = 1.$$

Preuve. — Lorsque les F_i sont toutes nulles (c'est-à-dire que ϱ est une fonction de Casimir pour Π'), il suffit de prendre les μ_i tous nuls; alors n'importe quelle fonction G telle que $G(0) = 1$ convient.

Supposons que les fonctions F_i ne sont pas toutes nulles au voisinage de zéro. Multiplions (7) par n_k et faisons la somme terme à terme lorsque k varie de 1 à m . Comme, la somme des $F_k n_k$ est nulle (à cause de l'antisymétrie de la matrice des f_{ij}), on obtient :

$$(8) \quad F'_j F_i - F'_i F_j = 0.$$

Il existe un indice i et un entier ℓ tels que la dérivée d'ordre ℓ de F_i ne s'annule pas en zéro. Soit q le plus petit de tels entiers. Posons $F_i = \varrho^q G_i$; alors le système (8) donne

$$(9) \quad G'_j G_i - G'_i G_j = 0.$$

Quitte à changer l'ordre des indices, on peut toujours supposer que la dérivée d'ordre q de F_1 en zéro est non nulle. Des relations (9), il résulte alors que les fonctions G_i/G_1 sont constantes. Il suffit donc de prendre

$$\mu_i = \frac{G_i}{G_1} G_1(0) \quad \text{et} \quad G = \frac{G_1}{G_1(0)}.$$

Ce qui achève la démonstration. \square

LEMME 2.3. — *Il existe des constantes c_{ijk} telles que*

$$f_{ij}\mu_k + f_{jk}\mu_i + f_{ki}\mu_j = c_{ijk}.$$

Preuve. — En remplaçant dans les relations (7) du lemme 2.1, F_ℓ par $\mu_\ell \varrho^\ell G$ et en tenant compte du fait que G ne s'annule pas au voisinage de zéro, nous obtenons

$$f'_{ij}\mu_k + f'_{jk}\mu_i + f'_{ki}\mu_j = 0.$$

Ce qui signifie que les fonctions $f_{ij}\mu_k + f_{jk}\mu_i + f_{ki}\mu_j$ sont constantes. D'où le lemme. \square

NOTATION. — Pour toute fonction H définie sur \mathbb{R} et pour tout $p \in \mathbb{N}^*$, on note $H^{[p]}$ le jet d'ordre p de H en zéro.

LEMME 2.4. — *Si ϱ n'est pas une fonction de Casimir pour la structure de Poisson Π' alors il existe m fonctions $\theta_1(\varrho), \dots, \theta_m(\varrho)$ telles qu'on ait :*

$$\{y_i \theta_i, y_j \theta_j\} = y_i y_j \theta_i \theta_j f_{ij}^{[q]}(\varrho) \quad \text{avec} \quad \theta_i(0) = 1.$$

On rappelle que l'entier q est donné par le lemme 2.2.

Preuve. — On a :

$$\{y_i \theta_i, y_j \theta_j\} = \theta_i \theta_j \{y_i, y_j\} + \theta_i y_j \{y_i, \theta_j\} + \theta_j y_i \{\theta_i, y_j\}.$$

ou encore

$$\{y_i \theta_i, y_j \theta_j\} = y_i y_j \theta_i \theta_j \left(f_{ij} + \varrho \left(\frac{\theta'_j}{\theta_j} F_i - \frac{\theta'_i}{\theta_i} F_j \right) \right).$$

En vertu du lemme 2.2, il vient :

$$\{y_i \theta_i, y_j \theta_j\} = y_i y_j \theta_i \theta_j \left(f_{ij} + \varrho^{q+1} G \left(\frac{\theta'_j}{\theta_j} \mu_i - \frac{\theta'_i}{\theta_i} \mu_j \right) \right).$$

Donc les fonctions θ_i cherchées doivent vérifier le système

$$(10) \quad f_{ij} - f_{ij}^{[q]} = \varrho^{q+1} G \left(\frac{\theta'_i}{\theta_i} \mu_j - \frac{\theta'_j}{\theta_j} \mu_i \right).$$

Or, le lemme 2.3 permet d'écrire

$$(f_{ij} - f_{ij}^{[q]}) \mu_k + (f_{jk} - f_{jk}^{[q]}) \mu_i + (f_{ki} - f_{ki}^{[q]}) \mu_j = 0.$$

Donc, le système (10) est résoluble. Il suffit de prendre

$$\frac{\theta'_i}{\theta_i} = - \frac{f_{1i} - f_{1i}^{[q]}}{\mu_1 \varrho^{q+1} G}.$$

D'où le lemme. \square

Revenons dans le cas de la dimension 3, on a la proposition suivante :

PROPOSITION 2.2. — *Il existe un changement de coordonnées*

$$\psi : (y_1, y_2, y_3) \longmapsto (z_1, z_2, z_3)$$

fixant 0 et vérifiant la relation :

$$\psi_* \Pi' = f(\varrho) \Pi^2 + h(\varrho) \bar{\Pi}_2,$$

où f est une fonction qui vaut 1 en zéro, h une fonction dont le $(q-1)$ -jet est nul en zéro et

$$\bar{\Pi}_2 = \frac{1}{n_3} \left(\mu_2 z_2 z_2 \frac{\partial}{\partial z_2} \wedge \frac{\partial}{\partial z_2} - \mu_1 z_3 z_1 \frac{\partial}{\partial z_3} \wedge \frac{\partial}{\partial z_1} \right).$$

Preuve. — Le résultat est immédiat si les fonctions F_i sont nulles. En effet, dire qu'elles sont nulles équivaut à dire que le produit de la matrice antisymétrique (f_{ij}) par I_0 est nul. En d'autres termes, le produit vectoriel de I_0 par le vecteur $(f_{23}(\varrho), f_{31}(\varrho), f_{12}(\varrho))$ est nul. Par conséquent, ce dernier est soit nul, soit colinéaire à I_0 . Il existe une fonction $\tilde{f}(\varrho)$ telle qu'on ait :

$$(f_{23}(\varrho), f_{31}(\varrho), f_{12}(\varrho)) = \tilde{f}(\varrho)I_0.$$

Or, I_0 est colinéaire à (a, b, c) ; donc il existe un réel non nul λ tel que $I_0 = \lambda(a, b, c)$. En posant $f = \lambda\tilde{f}(\varrho)$, il vient

$$(f_{23}(\varrho), f_{31}(\varrho), f_{12}(\varrho)) = f(\varrho)(a, b, c).$$

Pour $\varrho = 0$ on a :

$$(a, b, c) = (f_{23}(0), f_{31}(0), f_{12}(0)) = f(0)(a, b, c).$$

D'où $f(0) = 1$. Il suffit donc de prendre $\varphi = \text{id}_{\mathbb{R}^3}$ et $h = 0$.

Si les F_i ne sont pas toutes nulles, on se sert du lemme 2.4 qui assure l'existence de trois fonctions $\theta_1(\varrho)$, $\theta_2(\varrho)$ et $\theta_3(\varrho)$ telles que $\theta_i(0) = 1$, pour $i \in \{1, 2, 3\}$ et satisfaisant les relations :

$$\{y_i\theta_i, y_j\theta_j\} = y_i y_j \theta_i \theta_j f_{ij}^{[q]}(\varrho(y)).$$

L'application

$$\psi : (y_1, y_2, y_3) \longmapsto (y_1\theta_1(\varrho), y_2\theta_2(\varrho), y_3\theta_3(\varrho))$$

est un changement de coordonnées au voisinage de 0 puisque $\theta_i(0) = 1$ pour tout i . En posant $z_i = y_i\theta_i(\varrho(y))$, on obtient :

$$(11) \quad \{z_i, z_j\} = z_i z_j f_{ij}^{[q]}(\varrho(y)).$$

On doit exprimer $\varrho(y)$ en fonction des variables z_1, z_2 et z_3 .

Mais auparavant, on va montrer qu'il existe une fonction \bar{f} qui vaut 1 en zéro et un vecteur \bar{V} non colinéaire à (a, b, c) tels que

$$(f_{23}^{[q]}(\varrho), f_{31}^{[q]}(\varrho), f_{12}^{[q]}(\varrho)) = \bar{f}(\varrho)(a, b, c) + \varrho^q \bar{V}.$$

Rappelons que q est le plus petit entier tel que les fonctions F_i n'aient pas leur jet d'ordre q simultanément nul en zéro. Donc en faisant un

développement limité des F_i au voisinage de 0, à l'ordre $(q - 1)$ et en tenant compte du fait que $I_0 = \lambda(a, b, c)$, il vient

$$(f_{23}^{[q-1]}(\varrho), f_{31}^{[q-1]}(\varrho), f_{12}^{[q-1]}(\varrho)) = \left(\sum_{\ell=0}^{q-1} \frac{\bar{\lambda}_\ell}{\ell!} \varrho^\ell \right) (a, b, c).$$

Par ailleurs, d'après le lemme 2.2 la dérivée d'ordre q en zéro de F_i est égale à $q! \mu_i$; donc on a :

$$q! (\mu_1, \mu_2, \mu_3) = (F_1^{(q)}(0), F_2^{(q)}(0), F_3^{(q)}(0)).$$

Soit

$$q! (\mu_1, \mu_2, \mu_3) = -(f_{23}^{(q)}(0), f_{31}^{(q)}(0), f_{12}^{(q)}(0)) \times (n_1, n_2, n_3),$$

où le symbole \times désigne le produit vectoriel usuel sur \mathbb{R}^3 . Il s'en suit qu'il existe un réel κ_0 tel que :

$$\frac{1}{q!} (f_{23}^{(q)}(0), f_{31}^{(q)}(0), f_{12}^{(q)}(0)) = \frac{1}{n_3} (\mu_2, -\mu_1, 0) + \kappa_0 (n_1, n_2, n_3).$$

Posons

$$\bar{f} = \sum_{\ell=0}^{q-1} \frac{\bar{\lambda}_\ell}{\ell!} \varrho^\ell + \lambda \kappa_0 \varrho^q = 1 + \lambda_1 \varrho + \dots + \lambda_q \varrho^q \quad \text{et} \quad \bar{V} = \frac{1}{n_3} (\mu_2, -\mu_1, 0).$$

Il vient

$$(12) \quad (f_{23}^{[q]}(\varrho), f_{31}^{[q]}(\varrho), f_{12}^{[q]}(\varrho)) = \bar{f}(\varrho)(a, b, c) + \varrho^q \bar{V}.$$

À présent, on va exprimer $\varrho(y)$ en fonction des z_i . En posant

$$\theta = \theta_1^{n_1} \theta_2^{n_2} \theta_3^{n_3},$$

on obtient

$$\varrho(z) = \varrho(y) \theta(\varrho(y)).$$

Mais, l'application $t \mapsto t\theta(t)$ est un difféomorphisme local au voisinage de zéro car $\theta(0) = 1$. Sa restriction à un intervalle centré en zéro de rayon ϵ (assez petit) admet une réciproque donnée par $t \mapsto t\beta(t)$, où β est une fonction qui vaut 1 en zéro. Notons γ cette réciproque, nous avons l'égalité

$$\varrho(y) = \gamma(\varrho(z)).$$

Cette dernière égalité et la relation (12) donnent

$$(13) \quad (f_{23}^{[q]}(\varrho(y)), f_{31}^{[q]}(\varrho(y)), f_{12}^{[q]}(\varrho(y))) = \bar{f} \circ \gamma(\varrho(z))(a, b, c) + \gamma^q(\varrho(z))\bar{V}.$$

On note

$$f = \bar{f} \circ \gamma, \quad h = \gamma^q, \quad \bar{\Pi}^2 = \frac{1}{n_3} \left(\mu_1 z_1 z_3 \frac{\partial}{\partial z_1} \wedge \frac{\partial}{\partial z_3} + \mu_2 z_2 z_3 \frac{\partial}{\partial z_2} \wedge \frac{\partial}{\partial z_3} \right).$$

Avec ces notations, les relations (11) et (13) impliquent :

$$\psi_* \Pi = f(\varrho) \Pi^2 + h(\varrho) \bar{\Pi}^2.$$

La structure de Poisson diagonale $\bar{\Pi}^2$ n'est pas un multiple réel de Π^2 car s'il existait un réel δ tel que $(\mu_2, -\mu_1, 0) = \delta(a, b, c)$, les μ_i seraient tous nuls puisque le coefficient c est par hypothèse strictement positif. Ceci voudrait dire que les F_i sont nulles, or ce cas est exclu. La fonction h a un $(q - 1)$ -jet nul en zéro puisqu'on a

$$h(\varrho) = \gamma^q(\varrho) = \varrho^q \beta^q(\varrho) \quad \text{avec} \quad \beta(0) = 1.$$

D'où la proposition. \square

Nous venons de voir que si ϱ est une fonction de Casimir alors $\Pi' = f(\varrho)\Pi^2$. Sinon, il est formellement isomorphe à une structure de Poisson du type $\Pi''' = f(\varrho)\Pi^2 + h(\varrho)\bar{\Pi}^2$.

PROPOSITION 2.3. — *Soit $\Pi'' = f(\varrho)\Pi^2$ une structure de Poisson sur \mathbb{R}^m , Π^2 étant une structure de Poisson quadratique diagonalisable, f une fonction non constante qui vaut 1 en zéro et ϱ une fonction de Casimir pour Π'' . Il existe un entier non nul p et un changement de coordonnées Φ préservant 0 tels que :*

$$\Phi_* \Pi'' = (1 \pm \varrho^p) \Pi^2.$$

Preuve. — Soient (x_1, \dots, x_m) des coordonnées nulles en 0 telles que

$$\Pi'' = f(\varrho(x)) \sum_{i < j} a_{ij} x_i x_j \frac{\partial}{\partial x_i} \wedge \frac{\partial}{\partial x_j}.$$

Posons $y_i = x_i \theta_i(\varrho)$, avec $\theta_i(0) = 1$ pour tout i . Il s'agit de montrer que l'on peut trouver des θ_i tels que le changement de coordonnées $(x_1, \dots, x_m) \mapsto (y_1, \dots, y_m)$ vérifie la proposition. Nous avons

$$\{y_i, y_j\} = \theta_i \theta_j \{x_i, x_j\} = a_{ij} \theta_i \theta_j x_i x_j f(\varrho(x)) = a_{ij} y_i y_j f(\varrho(x)).$$

Par un raisonnement identique à celui fait dans la preuve de la proposition précédente, on montre l'existence d'une fonction $\bar{\gamma}$ définie par $\bar{\gamma} : t \mapsto t\bar{\beta}(t)$, avec $\bar{\beta}(0) = 1$ et telle que

$$\varrho(x) = \bar{\gamma}(\varrho(y)).$$

Par suite,

$$\{y_i, y_j\} = a_{ij}y_iy_j f \circ \bar{\gamma}(\varrho(y)).$$

Mais, la fonction $\bar{\gamma}$ dépend du choix des θ_i . On peut choisir les fonctions θ_i de façon qu'on ait :

$$f \circ \bar{\gamma}(\varrho) = 1 \pm \varrho^p.$$

En effet, d'une manière générale, on a le développement de Taylor

$$f(t) = 1 + a_p t^p + a_{p+1} t^{p+1} + \dots,$$

où p est le plus petit entier tel que la dérivée d'ordre p en zéro de f ne soit pas nulle. Ceci peut encore s'écrire

$$f(t) = 1 + \frac{a_p}{|a_p|} \left(t \sqrt[p]{|a_p|(1 + tR(t))} \right)^p.$$

Or, la fonction définie par

$$\delta : t \mapsto t \sqrt[p]{|a_p|(1 + tR(t))}$$

est un difféomorphisme local au voisinage de zéro. Donc, sa restriction à un intervalle centré en zéro et de rayon assez petit admet une fonction réciproque que l'on notera δ^{-1} . En prenant $\bar{\gamma} = \delta^{-1}$, on a :

$$f \circ \bar{\gamma}(\varrho) = 1 + \frac{a_p}{|a_p|} \varrho^p = 1 \pm \varrho^p.$$

Ainsi, pour un choix convenable des fonctions θ_i , on peut écrire :

$$\{y_i, y_j\} = (1 \pm \varrho^p)a_{ij}y_iy_j.$$

D'où la proposition. \square

Revenons en dimension 3 et considérons la forme normale formelle donnée par :

$$\Pi''' = f(\varrho)\Pi^2 + h(\varrho)\bar{\Pi}^2,$$

avec $f(0) = 1$, $\varrho(z) = z_1^{n_1} z_2^{n_2} z_3^{n_3}$, $h(\varrho) = \varrho^q + h_{q+1}\varrho^{q+1} + \dots$ et

$$\bar{\Pi}^2 = \frac{1}{n_3} \left(\mu_1 z_1 z_3 \frac{\partial}{\partial z_1} \wedge \frac{\partial}{\partial z_3} + \mu_2 z_2 z_3 \frac{\partial}{\partial z_2} \wedge \frac{\partial}{\partial z_3} \right).$$

PROPOSITION 2.4. — *Il existe un changement de coordonnées ψ fixant 0 et vérifiant*

$$\psi_* \Pi''' = (1 + \alpha_1 \varrho + \dots + \alpha_{q-1} \varrho^{q-1}) \Pi^2 + \varrho^q \tilde{\Pi}^2,$$

où $\tilde{\Pi}^2$ est une structure de Poisson diagonale qui n'est pas un multiple de Π^2 .

Démonstration. — Nous cherchons un changement de coordonnées du type

$$\psi : (z_1, z_2, z_3) \longmapsto (z_1 \theta_1(\varrho), z_2 \theta_2(\varrho), z_3 \theta_3(\varrho)),$$

avec $\theta_i(0) = 1$. Pour les commodités du calcul nous noterons

$$b_{12} = 0, \quad b_{23} = \frac{\mu_2}{n_3}, \quad b_{31} = -\frac{\mu_1}{n_3}.$$

Notons également $x_i = z_i \theta_i(\varrho)$. Alors

$$\{x_i, x_j\} = z_i z_j \theta_i \theta_j \left(f(\varrho) a_{ij} + h(\varrho) b_{ij} + \varrho h(\varrho) \left(\sum_{\ell} b_{i\ell} n_{\ell} \frac{\theta'_j}{\theta_j} - \sum_{\ell} b_{j\ell} n_{\ell} \frac{\theta'_i}{\theta_i} \right) \right).$$

Ceci peut encore s'écrire

$$(14) \quad \{x_i, x_j\} = x_i x_j \alpha_{ij}(\varrho(z)),$$

avec $\alpha_{ij}(\varrho) = f(\varrho) a_{ij} + h(\varrho) b_{ij} + \varrho h(\varrho) \left(\sum_{\ell} b_{i\ell} n_{\ell} \frac{\theta'_j}{\theta_j} - \sum_{\ell} b_{j\ell} n_{\ell} \frac{\theta'_i}{\theta_i} \right)$.

Afin d'obtenir une écriture synthétique des relations (14), nous adoptons la notation

$$\vec{\alpha}(\varrho) = (\alpha_{23}(\varrho), \alpha_{31}(\varrho), \alpha_{12}(\varrho)).$$

En développant les composantes α_{ij} puis en remplaçant (n_1, n_2, n_3) par $\lambda(a, b, c)$, nous obtenons

$$\begin{aligned} \vec{\alpha}(\varrho) = & \left(f(\varrho) - \frac{\lambda}{n_3} \varrho h(\varrho) \left(\mu_2 \frac{\theta'_1}{\theta_1} - \mu_1 \frac{\theta'_2}{\theta_2} \right) \right) (a, b, c) \\ & + \frac{h(\varrho)}{n_3} \left(1 + \varrho \left(n_1 \frac{\theta'_1}{\theta_1} + n_2 \frac{\theta'_2}{\theta_2} + n_3 \frac{\theta'_3}{\theta_3} \right) \right) (\mu_2, -\mu_1, 0). \end{aligned}$$

Posons

$$C_1(\varrho) = f(\varrho) - \frac{\lambda}{n_3} \varrho h(\varrho) \left(\mu_2 \frac{\theta'_1}{\theta_1} - \mu_1 \frac{\theta'_2}{\theta_2} \right),$$

$$C_2(\varrho) = h(\varrho) \left(1 + \varrho \left(n_1 \frac{\theta'_1}{\theta_1} + n_2 \frac{\theta'_2}{\theta_2} + n_3 \frac{\theta'_3}{\theta_3} \right) \right).$$

Il vient alors

$$\tilde{\alpha}(\varrho) = C_1(\varrho)(a, b, c) + \frac{C_2(\varrho)}{n_3}(\mu_2, -\mu_1, 0).$$

Maintenant, il faut exprimer $C_1(\varrho(z))$ et $C_2(\varrho(z))$ en fonction de $\varrho(x)$; le raisonnement est identique à celui fait dans la preuve de la proposition 2.2 : si l'on pose $\eta = \theta_1^{n_1} \theta_2^{n_2} \theta_3^{n_3}$, alors

$$\varrho(x) = \varrho(z) \eta(\varrho(z)).$$

Le fait que $\eta(0) = 1$ implique l'existence d'une fonction ξ définie au voisinage de zéro vérifiant $\xi(0) = 1$ et telle que les deux fonctions $t \mapsto t \eta(t)$ et $t \mapsto t \xi(t)$ soient réciproques l'une de l'autre. Ainsi, nous avons

$$\varrho(z) = \varrho(x) \xi(\varrho(x)).$$

Remplaçons $\varrho(z)$ par cette valeur dans les expressions de $C_1(\varrho(z))$ et $C_2(\varrho(z))$ et faisons un développement limité de ces fonctions en tenant compte du fait que $f(0) = 1$ et h est d'ordre q en 0; il vient

$$C_1(\varrho(z)) = 1 + \alpha_1 \varrho(x) + \dots + \alpha_q \varrho^q(x) + \varrho^{q+1}(x) R_1(\varrho(x)),$$

$$C_2(\varrho(z)) = (\varrho(x) \sqrt[q]{1 + \varrho(x) R_2(\varrho(x))})^q.$$

Pour un bon choix des fonctions θ_i , on a

$$C_1(\varrho(z)) = 1 + \alpha_1 \varrho(x) + \dots + \alpha_q \varrho^q(x), \quad C_2(\varrho(z)) = \varrho^q(x).$$

En effet, si l'on considère un changement de coordonnées ψ qui est la composée de deux changements de coordonnées définis par

$$\phi : (z_1, z_2, z_3) \mapsto (z_1 \gamma_1(\varrho), z_2 \gamma_2(\varrho), z_3 \gamma_3(\varrho)),$$

$$\bar{\phi} : (z_1, z_2, z_3) \mapsto (z_1 \bar{\gamma}_1(\varrho), z_2 \bar{\gamma}_2(\varrho), z_3 \bar{\gamma}_3(\varrho)),$$

avec la condition suivante : $\bar{\gamma}_1 \bar{\gamma}_2 \bar{\gamma}_3 = 1$. On montre, comme dans la preuve de la proposition 2.3, que l'on peut choisir les γ_i de manière qu'on ait :

$$(15) \quad C_2 \circ \varrho = (\varrho \circ \phi)^q.$$

De même, pour un choix convenable des fonctions $\bar{\gamma}_i$, on a :

$$(16) \quad C_1 \circ \varrho = 1 + \alpha_1(\varrho \circ \psi) + \cdots + \alpha_q(\varrho \circ \psi)^q,$$

avec $\psi = \bar{\phi} \circ \phi$. Or, l'hypothèse $\bar{\gamma}_1 \bar{\gamma}_2 \bar{\gamma}_3 = 1$ entraîne la relation $\varrho \circ \bar{\phi} = \varrho$. Il vient :

$$\varrho(x) = \varrho \circ \psi(z) = \varrho \circ \phi(z).$$

Par conséquent, les relations (16) et (15) donnent :

$$C_1(\varrho(z)) = 1 + \alpha_1 \varrho(x) + \cdots + \alpha_q \varrho^q(x), \quad C_2(\varrho(z)) = \varrho^q(x).$$

Ainsi, nous obtenons :

$$\begin{aligned} \bar{\alpha}(\varrho(z)) &= (1 + \alpha_1 \varrho(x) + \cdots + \alpha_{q-1} \varrho^{q-1}(x))(a, b, c) \\ &\quad + \varrho^q(x) \left(\frac{1}{n_3} (\mu_2, -\mu_1, 0) + \alpha_q(a, b, c) \right). \end{aligned}$$

Notons

$$\begin{aligned} \tilde{\Pi}^2 &= \alpha_q c x_1 x_2 \frac{\partial}{\partial x_1} \wedge \frac{\partial}{\partial x_2} + \left(\frac{\mu_2}{n_3} + \alpha_q a \right) x_2 x_3 \frac{\partial}{\partial x_2} \wedge \frac{\partial}{\partial x_3} \\ &\quad - \left(\frac{\mu_1}{n_3} - \alpha_q b \right) x_3 x_1 \frac{\partial}{\partial x_3} \wedge \frac{\partial}{\partial x_1}. \end{aligned}$$

Les relations (14) et la nouvelle expression de $\bar{\alpha}(\varrho(z))$ donnent

$$\psi_* \Pi'' = (1 + \alpha_1 \varrho + \cdots + \alpha_{q-1} \varrho^{q-1}) \Pi^2 + \varrho^q \tilde{\Pi}^2.$$

Le tenseur $\tilde{\Pi}^2$ n'est pas un multiple de Π^2 car $n_3^{-1}(\mu_2, -\mu_1, 0) + \alpha_q(a, b, c)$ n'est pas colinéaire à (a, b, c) . Ce qui achève la démonstration. \square

Il découle des deux dernières propositions et du raisonnement qui précède l'énoncé du théorème 2.1 que toute structure de Poisson sur \mathbb{R}^3 du type $\Pi^2 + P$ (où la perturbation P a un 2-jet nul en 0) est formellement isomorphe à M_0 , M_1 , M_2 ou M_3 . Pour prouver complètement le théorème 2.1, il faut s'assurer que ces modèles ne sont pas isomorphes.

PROPOSITION 2.5. — Soit $\Pi = (1 + \alpha_1 \varrho + \dots + \alpha_{q-1} \varrho^{q-1}) \Pi^2 + \varrho^q \tilde{\Pi}^2$ une structure de Poisson sur \mathbb{R}^3 avec $\tilde{\Pi}^2$ qui n'est pas un multiple de Π^2 . Alors Π n'est isomorphe à aucune structure de Poisson du type $\Lambda = F \Pi^2$, où F est une fonction de \mathbb{R}^3 telle que $F(0) = 1$.

Preuve. — Raisonons par l'absurde. Supposons qu'il existe un difféomorphisme φ préservant l'origine tel que $\varphi_* \Pi = \Lambda$. Il envoie chaque feuille du feuilletage \mathcal{F}_Π associé à Π sur une feuille du feuilletage \mathcal{F}_Λ . L'aspect des ces feuilletages symplectiques montre que les composantes (y_1, y_2, y_3) de φ sont sous la forme

$$y_i = x_i \theta_i(x_1, x_2, x_3) \quad \text{avec} \quad \theta_i(0) \neq 0.$$

On a :

$$\{y_i, y_j\} = \theta_i \theta_j \{x_i, x_j\} + \theta_i x_j \{x_i, \theta_j\} + \theta_j x_i \{\theta_i, x_j\} + x_i x_j \{\theta_i, \theta_j\}.$$

Notons \tilde{a}_{ij} les coefficients de la structure de Poisson diagonale $\tilde{\Pi}^2$. Notons également

$$H(\varrho) = 1 + \alpha_1 \varrho + \dots + \alpha_{q-1} \varrho^{q-1},$$

$$\tilde{A}_i \cdot I = \sum_{j=1}^n \tilde{a}_{ij} I_j, \quad \Theta_i = \ln(|\theta_i|) = \sum_I \Theta_i^I x^I.$$

Avec ces notations on peut écrire :

$$\{y_i, y_j\} = y_i y_j \left(\frac{1}{x_i x_j} \{x_i, x_j\} + \frac{1}{x_i} \{x_i, \Theta_j\} + \frac{1}{x_j} \{\Theta_i, x_j\} + \{\Theta_i, \Theta_j\} \right).$$

Ce qui peut encore s'écrire

$$\{y_i, y_j\} = y_i y_j \left(H(\varrho) \left(a_{ij} + \sum_I x^I (A_i \cdot I \Theta_j^I - A_j \cdot I \Theta_i^I + \sum_{\substack{J+K=I \\ r,s}} \Theta_i^J \Theta_j^K a_{rs} J_r K_s) \right) + \varrho^q \left(\tilde{a}_{ij} + \sum_I x^I \left(\tilde{A}_i \cdot I \Theta_j^I - \tilde{A}_j \cdot I \Theta_i^I + \sum_{\substack{J+K=I \\ r,s}} \Theta_i^J \Theta_j^K \tilde{a}_{rs} J_r K_s \right) \right) \right).$$

Par ailleurs, il résulte de l'hypothèse $\varphi_*\Pi = \Pi^2$ que le crochet $\{y_i, y_j\}$ vaut aussi $a_{ij}y_iy_jF$. Posons

$$F = \sum F^I x^I$$

et considérons uniquement les termes en $\varrho^q(x)$. En vertu du fait que $A_i \cdot I$ est nul pour tout I colinéaire à I_0 , les termes en $\varrho^q(x)$ donnent :

$$(17) \quad \sum_{\substack{0 \leq h \leq q-1 \\ 1 \leq r, s \leq 3}} \sum_{J+K=(q-h)I_0} \alpha_h \Theta_i^J \Theta_j^K a_{rs} J_r K_s + \tilde{a}_{ij} = a_{ij} F^{qI_0}.$$

Mais, si $J + K$ est colinéaire à I_0 , alors le terme $\sum_{r,s} a_{rs} J_r K_s$ est nul car c'est le produit mixte de trois vecteurs liés. En effet, on a :

$$\sum_{r,s} a_{rs} J_r K_s = \sum_r (A_r \cdot K) J_r = \det((a, b, c), J, K).$$

Comme $I_0 = \lambda(a, b, c)$, donc si $J + K$ est lié à I_0 , on a nécessairement la nullité de $\sum_{r,s} a_{rs} J_r K_s$. Ainsi, le système (17) équivaut à

$$\tilde{a}_{ij} = a_{ij} F^{qI_0},$$

ce qui contredit l'hypothèse suivant laquelle $\tilde{\Pi}^2$ n'est pas un multiple de Π^2 . Par conséquent Π et Λ ne sont pas isomorphes. \square

À présent, nous allons montrer que l'entier p qui intervient dans le modèle M_2 est un invariant.

PROPOSITION 2.6. — Soient $\Pi = (1 + \varepsilon \varrho^p) \Pi^2$ et $\Pi' = (1 + \varepsilon' \varrho^q) \Pi^2$ deux structures de Poisson sur \mathbb{R}^3 , avec $\varepsilon = \pm 1$ et $\varepsilon = \pm \varepsilon'$. Si Π et Π' sont isomorphes alors $p = q$.

Preuve. — Supposons que $p < q$ et qu'il existe un difféomorphisme φ tel que $\varphi_*\Pi = \Pi'$. Les composantes de φ s'écrivent :

$$\varphi_i = y_i = x_i \theta_i(x_1, x_2, x_3) \quad \text{avec} \quad \theta_i(0) \neq 0.$$

Un calcul analogue à celui fait dans la preuve de la proposition 2.5 montre qu'en posant

$$\Theta_i = \ln |\theta_i| = \sum_I x^I \Theta_i^I,$$

les crochets des composantes de φ s'écrivent :

$$\{y_i, y_j\} = y_i y_j (1 + \varepsilon \varrho^p) \left(a_{ij} + \sum_I x^I \left(A_i \cdot I \Theta_j^I - A_j \cdot I \Theta_i^I + \sum_{\substack{J+K=I \\ r,s}} \Theta_i^J \Theta_j^K a_{rs} J_r K_s \right) \right).$$

De l'hypothèse $\varphi_* \Pi = \Pi'$, il résulte que

$$\{y_i, y_j\} = a_{ij} y_i y_j (1 + \varepsilon' \varrho^q(y)) = a_{ij} y_i y_j (1 + \varepsilon' \varrho^q(x) (\theta_1^{n_1} \theta_2^{n_2} \theta_3^{n_3})^q).$$

Donc, si l'on considère seulement les termes en $\varrho^p(x)$, nous obtenons :

$$\pm a_{ij} + \sum_{\substack{J+K=pI_0 \\ r,s}} \Theta_i^J \Theta_j^K a_{rs} J_r K_s = 0.$$

Or, lorsque $J + K$ est colinéaire à I_0 , on montre comme dans la preuve de la proposition 2.5 que $\sum_{r,s} a_{rs} J_r K_s$ est nul. Il s'en suit que $a_{ij} = 0$, ce qui est absurde. Donc, nécessairement on a $p \geq q$. De la même manière on montre que $q \geq p$. D'où $p = q$. \square

REMARQUE. — En tenant un raisonnement similaire, on montre que M_2 n'est pas isomorphe à M_0 . Ce même raisonnement permet de prouver la proposition qui suit.

PROPOSITION 2.7. — Soient $\Pi = (1 + \alpha_m \varrho^m + \dots + \alpha_{p-1} \varrho^{p-1}) \Pi^2 + \varrho^p \tilde{\Pi}^2$ et $\Pi' = (1 + \beta_{m'} \varrho^{m'} + \dots + \beta_{q-1} \varrho^{q-1}) \Pi^2 + \varrho^q \bar{\Pi}^2$ deux structures de Poisson sur \mathbb{R}^3 , où α_m et $\beta_{m'}$ sont deux réels non nuls, $\tilde{\Pi}^2$ et $\bar{\Pi}^2$ sont deux structures de Poisson quadratiques diagonales qui ne sont pas multiples de Π^2 . Si Π et Π' sont isomorphes on a :

- $m = m'$,
- $p = q$,
- il existe deux réels k_1 et k_2 tels qu'on ait $\tilde{\Pi}^2 = k_1 \Pi^2 + k_2 \bar{\Pi}^2$.

REMARQUE. — Les coefficients a_{ij} d'une structure de Poisson quadratique diagonalisable sont des invariants (voir [Wa2]). Or, contrairement au modèle M_1 , les coefficients a , b et c sont de même signe dans M_2 et M_3 . Donc M_1 n'est isomorphe ni à M_2 , ni à M_3 . Il reste à montrer que M_1 n'est pas isomorphe à M_0 .

Pour tout $(\alpha, \beta) \in \mathbb{R}^2$, on note

$$\begin{aligned} \Pi_{\alpha\beta} = & ayz \frac{\partial}{\partial y} \wedge \frac{\partial}{\partial z} + (bzx - \beta y^{m_1} z^{m_2+1}) \frac{\partial}{\partial z} \wedge \frac{\partial}{\partial x} \\ & + (cxy + \alpha y^{m_1+1} z^{m_2}) \frac{\partial}{\partial x} \wedge \frac{\partial}{\partial y}, \end{aligned}$$

avec $a < 0 \leq b < c$, $(m_1, m_2) = -\frac{1}{a}(b, c) \in \mathbb{N} \times \mathbb{N}^*$, $m_1 + m_2 \geq 2$.

PROPOSITION 2.8. — Si $\Pi_{\alpha\beta}$ et $\Pi_{\alpha'\beta'}$ sont isomorphes alors $(\alpha, \beta) = k(\alpha', \beta')$, où k est un réel non nul.

Preuve. — Supposons qu'il existe un difféomorphisme φ préservant l'origine et tel que $\varphi_* \Pi_{\alpha\beta} = \Pi_{\alpha'\beta'}$. Soit $\varphi^{(1)}$ la linéarisée de φ en 0. Comme $\Pi_{\alpha\beta}$ et $\Pi_{\alpha'\beta'}$ admettent Π^2 pour 2-jet en 0, on a $\varphi_*^{(1)} \Pi^2 = \Pi^2$. Vu l'aspect des feuilles symplectiques de Π^2 , on a

$$\varphi^{(1)}(x, y, z) = (\delta_1 x, \delta_2 y, \delta_3 z) \quad \text{avec} \quad \delta_i \in \mathbb{R}^*.$$

À présent, nous notons

$$\psi = (\varphi^{(1)})^{-1} \circ \varphi.$$

Le difféomorphisme ψ transforme $\Pi_{\alpha\beta}$ en une structure de Poisson $\Pi_{\alpha''\beta''}$: on a

$$\Pi_{\alpha''\beta''} = (\varphi^{(1)})_*^{-1} \Pi_{\alpha'\beta'} = \Pi^2 + \frac{\delta_2^{m_1} \delta_3^{m_2}}{\delta_1} y'^{m_1} z'^{m_2} \frac{\partial}{\partial x'} \left(\alpha' y' \frac{\partial}{\partial y'} + \beta' z' \frac{\partial}{\partial z'} \right),$$

où l'on convient de poser :

$$x' = \frac{1}{\delta_1} x, \quad y' = \frac{1}{\delta_2} y, \quad z' = \frac{1}{\delta_3} z.$$

Par identification, on a

$$(\alpha'', \beta'') = \frac{\delta_2^{m_1} \delta_3^{m_2}}{\delta_1} (\alpha', \beta').$$

Par la suite, on notera

$$q = m_1 + m_2 + 1$$

et on désignera par $(\psi^{-1})^{[q-2]}$ le jet d'ordre $(q - 2)$ en 0 de la réciproque de ψ . Posons :

$$\eta = (\psi^{-1})^{[q-2]} \circ \psi = Id + \eta^{(q-1)} + \dots$$

On a :

$$\eta_* \Pi_{\alpha\beta} = \Pi^2 + \Pi_{\alpha''\beta''}^{(q)} + \dots$$

Donc, en notant η_i , pour $i \in \{1, 2, 3\}$, les composantes de η , il vient :

$$(S) \quad \begin{cases} \{\eta_1, \eta_2\}_{\alpha\beta} = c\eta_1\eta_2 + \alpha''\eta_2^{m_1+1}\eta_3^{m_2} + \dots, \\ \{\eta_1, \eta_3\}_{\alpha\beta} = -b\eta_1\eta_2 + \beta''\eta_2^{m_1}\eta_3^{m_2+1} + \dots. \end{cases}$$

Posons

$$x = x_1, \quad y = x_2, \quad z = x_3,$$

$$\eta_i = x_i + \gamma_i, \quad \text{pour tout } i \in \{1, 2, 3\},$$

$$\gamma_i = \sum_{|I| \geq q-1} \gamma_i^I x^I.$$

Considérons uniquement les termes en $y^{m_1+1}z^{m_2}$ (resp. en $y^{m_1}z^{m_2+1}$) dans la première équation (resp. dans la seconde équation) de (S), il vient

$$\alpha y^{m_1+1}z^{m_2} + \gamma_1^{I_q}(-am_2)y^{m_1+1}z^{m_2} = c\gamma_1^{I_q}y^{m_1+1}z^{m_2} + \alpha''y^{m_1+1}z^{m_2},$$

$$\beta y^{m_1}z^{m_2+1} + \gamma_1^{I_q}(am_1)y^{m_1}z^{m_2+1} = -b\gamma_1^{I_q}y^{m_1}z^{m_2+1} + \beta''y^{m_1}z^{m_2+1}$$

avec $I_q = (0, m_1, m_2)$. Compte tenu du fait que $(b, c) = -a(m_1, m_2)$, on trouve :

$$(\alpha, \beta) = (\alpha'', \beta'') = \frac{\delta_2^{m_1}\delta_3^{m_2}}{\delta_1}(\alpha', \beta').$$

Ce qui achève la preuve. \square

REMARQUE. — Cette proposition montre que M_0 n'est pas isomorphe à M_1 et il résulte de sa preuve que si α et β ne sont pas simultanément nuls alors $\Pi_{\alpha\beta}$ dépend uniquement du rapport de α par β . Nous pouvons donc supposer que $\beta = 1$.

Le but de ce qui suit est de donner une version C^∞ du théorème 2.1.

3. Action infinitésimale – Rotationnel d'un champ de p -vecteurs

Dans la suite, les champs de vecteurs considérés s'annuleront tous à l'origine. Les structures de Poisson que l'on étudie s'avèrent être souvent du type $\Pi = X \wedge Y$, où X et Y sont deux champs de vecteurs commutants. On sera donc amené à utiliser le résultat suivant :

THÉORÈME 3.1 (voir [Ch]). — Soit φ (resp. φ_0) une action infinitésimale de \mathbb{R}^n sur \mathbb{R}^m donnée par les champs de vecteurs X_1, \dots, X_n (resp. X_{1_0}, \dots, X_{n_0}) qui commutent deux à deux. On suppose que pour tout $i \in \{1, \dots, n\}$ on a :

$$X_i = X_{i_0} + X_{i_\infty},$$

où les X_{i_∞} sont des champs de vecteurs plats en 0. On note φ_0 l'action infinitésimale donnée par X_{1_0}, \dots, X_{n_0} . Si φ_0 est hyperbolique (faiblement ou fortement) alors il existe un C^∞ -difféomorphisme du type $\psi = \text{id}_{\mathbb{R}^m} + \psi_\infty$ avec ψ_∞ plat en 0, qui transforme φ en φ_0 c'est-à-dire que l'on a :

$$\psi_* X_i = X_{i_0}, \quad \forall i \in \{1, \dots, n\}.$$

À présent, nous allons introduire un champ de vecteurs attaché au tenseur de Poisson qui est appelé rotationnel ou champ de vecteurs modulaire.

Considérons une variété M orientable; soit Ω une forme volume. L'application Ω^b de l'espace des champs de p -vecteurs dans celui des $(n-p)$ -formes différentielles sur M définie par $A \mapsto i_A \Omega$ est un isomorphisme d'espaces vectoriels.

Notons Ω^\sharp son isomorphisme réciproque et $D_\Omega = \Omega^\sharp \circ d \circ \Omega^b$ (où d est l'opérateur de différentiation extérieure).

DÉFINITION. — On appelle *rotationnel* d'un champ de p -vecteurs A relativement à Ω , le champ de $(p-1)$ -vecteurs $D_\Omega(A)$.

L'opérateur D_Ω est de carré nul, c'est-à-dire qu'il vérifie $D_\Omega \circ D_\Omega = 0$. Le rotationnel d'un champ de vecteurs relativement à Ω est exactement la divergence de ce vecteurs par rapport à Ω et le rotationnel d'une structure de Poisson est un champ de vecteurs. En outre, le crochet de Lie de deux champs de vecteurs X et Y s'exprime par la relation

$$[X, Y] = -D_\Omega(X \wedge Y) - D_\Omega(X) \wedge Y + X \wedge D_\Omega(Y).$$

Soient (x_1, \dots, x_n) des coordonnées locales définies dans un ouvert U . Posons :

$$\Pi = \sum_{i < j} \Pi_{ij} \frac{\partial}{\partial x_i} \wedge \frac{\partial}{\partial x_j}, \quad \Omega_0 = dx_1 \wedge \dots \wedge dx_n.$$

Alors le rotationnel de Π par rapport à Ω_0 s'écrit localement

$$D_{\Omega_0}(\Pi) = \sum_{ij} \frac{\partial \Pi_{ij}}{\partial x_j} \frac{\partial}{\partial x_i}.$$

Si Π est un tenseur de Poisson, alors ses rotationnels sont des isomorphismes infinitésimaux, c'est-à-dire qu'on a $[\Pi, D_{\Omega}(\Pi)] = 0$ (le crochet $[\cdot, \cdot]$ étant celui de Schouten). Lorsque la variété est de dimension 3, l'identité de Jacobi $[\Pi, \Pi] = 0$ équivaut à la relation $\Pi \wedge D_{\Omega}(\Pi) = 0$.

Pour plus de détails sur cet opérateur, on pourra consulter par exemple [D-H].

PROPOSITION 3.1. — Soient Π et Π_0 deux structures de Poisson sur \mathbb{R}^m ayant un 1-jet nul à l'origine et une partie quadratique diagonale, de rotationnels respectifs X et X_0 relativement à la forme volume canonique Ω_0 telles que

$$\Pi = \Pi_0 + \Pi_{\infty},$$

où Π_{∞} est plat en 0. On suppose qu'il existe deux champs de vecteurs Y, Y_0 hyperboliques en 0, avec $Y - Y_0$ plat en 0 qui vérifient :

$$\Pi = X \wedge Y, \quad \Pi_0 = X_0 \wedge Y_0.$$

Si X_0 et Y_0 donnent une action infinitésimale hyperbolique (fortement ou faiblement) de \mathbb{R}^2 alors il existe un C^{∞} -difféomorphisme $\delta = \text{id}_{\mathbb{R}^m} + \delta_{\infty}$, avec δ_{∞} plat en 0, tel que $\delta_*\Pi = \Pi_0$.

Pour démontrer cette proposition, on sert du théorème suivant :

THÉORÈME 3.2 (voir [R]). — Soient X un champ de vecteurs sur \mathbb{R}^n hyperbolique en 0 et g une fonction plate en 0. L'équation $X(f) = g$ est résoluble.

Démonstration de la proposition 3.1. — Soient f et g deux fonctions différentiables telles que $f(0) = 1$ et $g(0) = 0$. On pose

$$\bar{X} = fX + gY, \quad \bar{Y} = \frac{1}{f}Y.$$

Il est clair que $\Pi = \bar{X} \wedge \bar{Y}$. Montrons que l'on peut choisir f et g de manière que le crochet des champs de vecteurs \bar{X} et \bar{Y} soit nul. Nous avons

$$[\bar{X}, \bar{Y}] = [X, Y] - \frac{1}{f}Y(f)X - \frac{1}{f^2}(fX(f) + gY(f) + fY(g))Y.$$

Comme $D_{\Omega_0}(X)$ est nul, donc en utilisant la formule ci-dessus et en remplaçant $D_{\Omega_0}(Y)$ par $\operatorname{div}(Y)$, nous obtenons :

$$[X, Y] = -D_{\Omega_0}(X \wedge Y) - D_{\Omega_0}(X)Y + D_{\Omega_0}(Y)X = (\operatorname{div}(Y) - 1)X,$$

où Ω_0 est la forme volume canonique sur \mathbb{R}^m .

Il vient donc

$$[\bar{X}, \bar{Y}] = (\operatorname{div}(Y) - 1 - Y(\ln f))X - \frac{1}{f^2}(fX(f) + Y(fg))Y.$$

Ainsi, pour que les champs de vecteurs \bar{X} et \bar{Y} commutent, il suffit que le système suivant soit satisfait :

$$(S) \quad Y(\ln f) = \operatorname{div}(Y) - 1, \quad Y(fg) = -fX(f).$$

Si $\operatorname{div}(Y) - 1$ est plate en 0, ce système est résoluble. En effet, supposons pour l'instant que $\operatorname{div}(Y) - 1$ est plate en 0. Alors le théorème 3.2 garantit l'existence d'une fonction $f = 1 + f_\infty$, avec f_∞ plate en 0 vérifiant la première équation de (S). Ce même théorème permet d'affirmer que pour une telle fonction f , il existe une solution g de la seconde équation de (S) plate en 0. Par conséquent, il suffit de montrer que $\operatorname{div}(Y) - 1$ est plate en 0. Montrons-le par l'absurde. On a

$$(18) \quad [X, Y] = (\operatorname{div}(Y) - 1)X.$$

D'autre part, en utilisant les décompositions $X = X_0 + X_\infty$, $Y = Y_0 + Y_\infty$, avec X_∞ et Y_∞ plats en 0, on voit que l'on peut écrire le crochet de X et Y sous la forme

$$[X, Y] = [X_0, Y_0] + [X, Y]_\infty,$$

où $[X, Y]_\infty$ est un champ de vecteurs plat en 0. Compte tenu du fait que X_0 et Y_0 commutent, il vient :

$$(19) \quad [X, Y] = [X, Y]_\infty.$$

Des relations (18) et (19) on tire

$$(20) \quad (\operatorname{div}(Y) - 1)X = [X, Y]_\infty.$$

Il résulte de (20) que $\operatorname{div}(Y) - 1$ est plat en 0. Par suite, les champs de vecteurs \bar{X} et \bar{Y} commutent. En outre, par construction, la linéarisée de

l'action infinitésimale $\bar{\phi}$ donnée par \bar{X} et \bar{Y} coïncide avec celle de l'action infinitésimale hyperbolique donnée par X_0 et Y_0 ; par conséquent $\bar{\phi}$ est hyperbolique. Le théorème de Chaperon s'applique : il montre l'existence d'un C^∞ -difféomorphisme

$$\delta = \text{id}_{\mathbb{R}^m} + \delta_\infty$$

avec δ_∞ plat en 0, tel que $\delta_*\bar{X} = X_0$ et $\delta_*\bar{Y} = Y_0$. D'où

$$\delta_*\Pi = \delta_*\bar{X} \wedge \delta_*\bar{Y} = \Pi_0,$$

ce qui achève la démonstration. \square

4. Modèles locaux en classe C^∞

THÉORÈME 4.1. — *Soit Π une structure de Poisson sur \mathbb{R}^3 dont le jet d'ordre 1 est nul à l'origine. On suppose qu'il existe des coordonnées (x_1, x_2, x_3) nulles en 0 telles le 2-jet de Π en 0 s'écrit*

$$\Pi^2 = cx_1x_2 \frac{\partial}{\partial x_1} \wedge \frac{\partial}{\partial x_2} + ax_2x_3 \frac{\partial}{\partial x_2} \wedge \frac{\partial}{\partial x_3} + bx_3x_1 \frac{\partial}{\partial x_3} \wedge \frac{\partial}{\partial x_1},$$

les coefficients a, b et c étant deux à deux distincts. On suppose également que si l'un des réels a, b ou c est nul, les deux autres sont de signe contraire. Alors Π est isomorphe en classe C^∞ à l'un des quatre modèles locaux du théorème 2.1.

Pour établir la version C^∞ du théorème 2.1, il suffit de montrer que les modèles locaux obtenus satisfont les hypothèses de la proposition 3.1. Considérons une structure de Poisson $\Pi = \Pi_0 + \Pi_\infty$, où Π_0 désigne l'un des quatre modèles locaux polynomiaux et Π_∞ un champ de bi-vecteurs plat à l'origine. Dans la suite, nous noterons

$$\lambda_1 = c - b, \quad \lambda_2 = a - c, \quad \lambda_3 = b - a.$$

Nous désignons par X (resp. X_0) le rotationnel de Π (resp. Π_0) relativement à la forme volume canonique Ω_0 de \mathbb{R}^3 . Comme par hypothèse aucun des λ_i n'est nul, donc tout champ de vecteurs dont la linéarisée est donnée par

$$X^{(1)} = \lambda_1 x \frac{\partial}{\partial x} + \lambda_2 y \frac{\partial}{\partial y} + \lambda_3 z \frac{\partial}{\partial z}$$

est hyperbolique. Compte tenu du fait que l'identité de Jacobi pour les structures de Poisson Π et Π_0 s'écrit respectivement $\Pi \wedge X = 0$ et $\Pi_0 \wedge X_0 = 0$, il existe des champs de vecteurs Y et Y_0 tels que

$$\Pi = X \wedge Y, \quad \Pi_0 = X_0 \wedge Y_0.$$

Pour appliquer la proposition 3.1, nous voyons d'abord s'il est possible de choisir un champ de vecteurs Y_0 hyperbolique en 0, tel que X_0 et Y_0 donnent une action infinitésimale hyperbolique (fortement ou faiblement).

Nous emploierons le lemme qui suit :

LEMME 4.1. — Soit Π une structure de Poisson sur \mathbb{R}^m de rotationnel X relativement à Ω_0 . On suppose que la linéarisée de X en 0 est un difféomorphisme local au voisinage de 0. Alors tout champ de vecteurs à divergence constante (relativement à Ω_0) qui vérifie la relation $\Pi = X \wedge Y$, commute avec X .

Preuve. — On a :

$$[X, Y] = (\operatorname{div}(Y) - 1)X.$$

Posons $\operatorname{div}(Y) - 1 = \mu$ et considérons uniquement les termes linéaires, nous obtenons

$$[X^{(1)}, Y^{(1)}] = \mu X^{(1)},$$

où $X^{(1)}$ et $Y^{(1)}$ sont respectivement les linéarisées en 0 de X et Y . Par hypothèse, $X^{(1)}$ est un difféomorphisme local au voisinage de 0; donc sa restriction à une boule centrée en 0 de rayon assez petit admet une réciproque que l'on note $Z^{(1)}$. On a alors :

$$Z^{(1)}(X^{(1)}Y^{(1)} - Y^{(1)}X^{(1)}) = \mu \operatorname{id},$$

ou encore

$$Y^{(1)} - Z^{(1)}Y^{(1)}X^{(1)} = \mu \operatorname{id}.$$

Par passage aux traces, on obtient la nullité de μ . D'où le lemme. \square

Maintenant, nous allons examiner successivement les quatre cas.

A) On suppose que $\Pi_0 = \Pi^2$. — Le rotationnel de Π_0 relativement à Ω_0 est :

$$X^{(1)} = \lambda_1 x \frac{\partial}{\partial x} + \lambda_2 y \frac{\partial}{\partial y} + \lambda_3 z \frac{\partial}{\partial z}.$$

Soit k un réel non nul, posons

$$(K_1, K_2, K_3) = \left(k\lambda_1, \frac{c}{\lambda_1} + k\lambda_2, \frac{-b}{\lambda_1} + k\lambda_3 \right),$$

$$Y_0 = K_1 x \frac{\partial}{\partial x} + K_2 y \frac{\partial}{\partial y} + K_3 z \frac{\partial}{\partial z}.$$

On a la relation $\Pi^2 = X^{(1)} \wedge Y_0$. On choisit un réel k tel qu'aucun des K_i ne soit nul; alors Y_0 est hyperbolique en 0. D'autre part, $X^{(1)}$

et Y_0 commutent ; ils donnent une action infinitésimale φ_0 dont les poids sont les applications définies sur \mathbb{R}^2 par

$$\begin{aligned} P_1(v_1, v_2) &= \exp(\lambda_1 v_1 + K_1 v_2), \\ P_2(v_1, v_2) &= \exp(\lambda_2 v_1 + K_2 v_2), \\ P_3(v_1, v_2) &= \exp(\lambda_3 v_1 + K_3 v_2). \end{aligned}$$

Dans la suite, on identifiera les P_i à des covecteurs en posant :

$$P_1 = (\lambda_1, K_1), \quad P_2 = (\lambda_2, K_2), \quad P_3 = (\lambda_3, K_3).$$

Si a, b et c sont non nuls, ces poids sont deux à deux indépendants puisqu'on a :

$$\det(P_2, P_3) = a \neq 0, \quad \det(P_3, P_1) = b \neq 0, \quad \det(P_1, P_2) = c \neq 0.$$

Donc, dans ce cas φ_0 est une action infinitésimale fortement hyperbolique.

Lorsque l'un des réels a, b ou c est nul, φ_0 est une action infinitésimale faiblement hyperbolique. En effet, supposons par exemple que $b = 0$. Les valeurs propres de $X^{(1)}$ s'écrivent $\lambda_1 = c, \lambda_2 = a - c$ et $\lambda_3 = -a$. Les poids de φ_0 sont :

$$P_1 = (c, kc), \quad P_2 = (\lambda_2, 1 + k\lambda_2), \quad P_3 = (-a, -ka).$$

Nous avons l'égalité $aP_1 = -cP_3$. Mais, par hypothèse a et c sont de signe contraire, donc le segment $[P_1, P_3]$ ne contient pas l'origine. Par ailleurs, on a

$$\det(P_2, P_3) = a \neq 0, \quad \det(P_1, P_2) = c \neq 0.$$

Par conséquent, φ_0 est faiblement hyperbolique. La proposition 3.1 s'applique : il existe un changement de coordonnées φ de classe C^∞ au voisinage de l'origine tel que $\varphi_*\Pi = \Pi^2$.

B) On suppose $\alpha \in \mathbb{R}, a < 0$ et $(m_1, m_2) = -\frac{1}{a}(b, c) \in \mathbb{N}^2$ et

$$\Pi_0 = \Pi^2 + y^{m_1} z^{m_2} \partial x \wedge (\alpha y \partial y + z \partial z).$$

Le rotationnel de Π_0 relativement à Ω_0 est :

$$X_0 = X^{(1)} + (\alpha(m_1 + 1) + (m_2 + 1)) y^{m_1} z^{m_2} \frac{\partial}{\partial x}.$$

Soit :

$$X_0 = X^{(1)} - \frac{1}{a}(\alpha\lambda_3 - \lambda_2) y^{m_1} z^{m_2} \frac{\partial}{\partial x}.$$

Il faut envisager les deux cas $\alpha\lambda_3 - \lambda_2 \neq 0$ et $\alpha\lambda_3 - \lambda_2 = 0$.

B₁) Cas où $\alpha\lambda_3 - \lambda_2 \neq 0$. — Posons

$$K_2 = -\frac{\alpha a}{\alpha\lambda_3 - \lambda_2}, \quad K_3 = -\frac{a}{\alpha\lambda_3 - \lambda_2},$$

$$K_1 = \frac{\lambda_1 K_3 + b}{\lambda_3} = \frac{\lambda_1 K_2 - c}{\lambda_2},$$

$$Y_0 = K_1 x \frac{\partial}{\partial x} + K_2 y \frac{\partial}{\partial y} + K_3 z \frac{\partial}{\partial z}.$$

On la relation $\Pi_0 = X_0 \wedge Y_0$, de plus le lemme précédent montre que X_0 et Y_0 commutent. Ils donnent une action infinitésimale φ_0 ayant pour poids :

$$P_1 = (\lambda_1, K_1), \quad P_2 = (\lambda_2, K_2), \quad P_3 = (\lambda_3, K_3).$$

Si a , b et c sont non nuls, les poids sont deux à deux indépendants. Donc φ_0 est fortement hyperbolique. En revanche, si l'un des réels a , b ou c est nul, φ_0 est faiblement hyperbolique. Supposons que $b = 0$; les poids de φ deviennent :

$$P_1 = \left(c, -\frac{c}{\alpha a + \lambda_2}\right), \quad P_2 = \left(\lambda_2, \frac{\alpha a}{\alpha a + \lambda_2}\right), \quad P_3 = \left(-a, \frac{a}{\alpha a + \lambda_2}\right).$$

On voit que $aP_1 = -cP_3$, mais le segment $[P_1, P_3]$ ne contient pas l'origine puisque a et c ne sont pas de même signe. Et comme on a

$$\det(P_1, P_2) = c \neq 0, \quad \det(P_2, P_3) = a \neq 0,$$

l'action infinitésimale φ est faiblement hyperbolique.

B₂) Cas où $\alpha\lambda_3 - \lambda_2 = 0$. — Pour tout k fixé, le champ de vecteurs Y_0 donné par

$$Y_0 = -\frac{1}{\lambda_3} y^{m_1} z^{m_1} \frac{\partial}{\partial x} + \frac{c}{\lambda_1} y \frac{\partial}{\partial y} - \frac{b}{\lambda_1} z \frac{\partial}{\partial z} + kX^{(1)}$$

vérifie $\Pi_0 = X_0 \wedge Y_0$. D'après le lemme 4.1 ce champ de vecteurs commute avec X_0 . On choisira un réel k tel que $k(k\lambda_2\lambda_1 + c)(k\lambda_3\lambda_1 - b) \neq 0$. Ainsi, on montre comme dans la partie A), que l'action infinitésimale donnée par X_0 et Y_0 est hyperbolique. Les hypothèses de la proposition 3.1 sont satisfaites. On en déduit que toute structure de Poisson $\Pi = \Pi_0 + \Pi_\infty$, avec Π_∞ plat en 0, est C^∞ -isomorphe à Π_0 .

C) On suppose $\Pi_0 = (1 + \varepsilon \varrho^p)\Pi^2$, avec $\varepsilon = \pm 1$, $\varrho(x, y, z) = x^{n_1} y^{n_2} z^{n_3}$ et $I_0 = \lambda(a, b, c) \in \mathbb{N}^{*3}$. — Le rotationnel de Π_0 relativement à Ω_0 est :

$$X_0 = (1 + \varepsilon \varrho^p)X^{(1)}.$$

En tenant un raisonnement identique à celui fait dans A), on voit que la proposition 3.1 s'applique. Par conséquent toute structure de Poisson $\Pi = \Pi_0 + \Pi_\infty$, avec Π_∞ plat à l'origine, est C^∞ -isomorphe à Π_0 .

D) On suppose que $\Pi_0 = (1 + \alpha_1 \varrho + \dots + \alpha_{q-1} \varrho^{q-1}) \Pi^2 + \varrho^q \tilde{\Pi}^2$ ($\tilde{\Pi}^2$ étant une structure de Poisson quadratique diagonale qui n'est pas un multiple de Π^2 et $q \in \mathbb{N}$). — On a

$$X_0 = (1 + \alpha_1 \varrho + \dots + \alpha_{q-1} \varrho^{q-1}) X^{(1)} + \varrho^q \tilde{X}^{(1)} + q \varrho^q \tilde{Y},$$

où l'on convient de noter :

$$\begin{aligned} \tilde{\Pi}^2 &= \tilde{c}xy \frac{\partial}{\partial x} \wedge \frac{\partial}{\partial y} + \tilde{a}yz \frac{\partial}{\partial y} \wedge \frac{\partial}{\partial z} + \tilde{b}zx \frac{\partial}{\partial z} \wedge \frac{\partial}{\partial y}, \\ \tilde{X}^{(1)} &= (\tilde{c} - \tilde{b})x \frac{\partial}{\partial x} + (\tilde{a} - \tilde{c})y \frac{\partial}{\partial y} + (\tilde{b} - \tilde{a})z \frac{\partial}{\partial z}, \\ \tilde{Y} &= (\tilde{c}n_2 - \tilde{b}n_3)x \frac{\partial}{\partial x} + (\tilde{a}n_3 - \tilde{c}n_1)y \frac{\partial}{\partial y} + (\tilde{b}n_1 - \tilde{a}n_2)z \frac{\partial}{\partial z}. \end{aligned}$$

Introduisons les notations suivantes :

$$\mathcal{V} = (\tilde{a}, \tilde{b}, \tilde{c}), \quad \mathcal{I} = (1, 1, 1), \quad I_0 = (n_1, n_2, n_3) = \lambda(a, b, c).$$

Supposons que les vecteurs \mathcal{I} , I_0 et \mathcal{V} sont linéairement indépendants et posons :

$$Y_0 = \frac{1}{\det(\mathcal{I}, I_0, \mathcal{V})} \tilde{Y}.$$

Alors on a la relation $\Pi_0 = X_0 \wedge Y_0$. Le lemme 4.1 assure la commutativité des champs de vecteurs X_0 et Y_0 . Ces vecteurs donnent une action infinitésimale φ_0 hyperbolique. Nous appliquons la proposition 3.1 qui dit que Π est isomorphe à Π_0 .

Cependant, si ces vecteurs sont liés, on ne peut plus appliquer cette proposition. En effet, si $\det(\mathcal{I}, I_0, \mathcal{V}) = 0$ et si l'un des coefficients α_i est non nul, alors aucun des champs de vecteurs Y_0 vérifiant $\Pi_0 = X_0 \wedge Y_0$ ne commute avec X_0 . Pour franchir cette difficulté, nous allons suivre une autre méthode. Nous utilisons le lemme 4.2 qui suit.

Dans la suite, nous placerons toujours dans le cas où la structure de Poisson Π s'écrit :

$$\Pi = (1 + \alpha_1 \varrho + \dots + \alpha_{q-1} \varrho^{q-1}) \Pi^2 + \varrho^q \tilde{\Pi}^2 + \Pi_\infty = \Pi_0 + \Pi_\infty.$$

Nous avons le lemme suivant :

LEMME 4.2. — *Il existe un changement de coordonnées ξ de classe C^∞ au voisinage de l'origine, du type $\xi = \text{id}_{\mathbb{R}^3} + \xi_\infty$, avec ξ_∞ plat en 0 et tel que $\xi_*\Pi$ soit une structure de Poisson diagonale.*

Preuve. — Soient r_2 et r_3 deux réels positifs. On considère le champ de vecteurs linéaire diagonal donné par

$$Y^{(1)} = -(br_2 + cr_3)x \frac{\partial}{\partial x} + ar_2y \frac{\partial}{\partial y} + ar_3z \frac{\partial}{\partial z}.$$

La trace de $Y^{(1)}$ est négative; en outre le champ de vecteurs $\bar{Y}^{(1)} = Y^{(1)}/\text{tr}(Y^{(1)})$ vérifie la relation :

$$\Pi^2 = X^{(1)} \wedge \bar{Y}^{(1)}.$$

Soit Y un champ de vecteurs satisfaisant la relation $\Pi = X \wedge Y$ (X étant le rotationnel de Π). Nous pouvons supposer qu'il existe un champ de vecteurs Y_0 polynomial en ϱ tel que $Y_\infty = Y - Y_0$ soit plat en 0.

Quitte à modifier Y en lui ajoutant un terme kX (avec $k \in \mathbb{R}$) on peut toujours supposer que la linéarisée de Y en 0 est égale à $\bar{Y}^{(1)}$. Notons que $\bar{Y}^{(1)}$ possède une valeur propre positive notée μ_1 et deux valeurs propres négatives que l'on note μ_2 et μ_3 .

On peut donc appliquer un résultat de Sternberg qui garantit l'existence d'un changement de coordonnées $\eta = \text{id} + \eta_\infty$, avec η_∞ plat en 0, tel que $\eta_*Y = Y_0$. On en déduit

$$\eta_*\Pi = \eta_*X \wedge \eta_*Y = \eta_*(D_{\Omega_0}(\Pi)) \wedge \eta_*Y.$$

On sait que, si l'on note $J\eta^{-1}$ le Jacobien de la réciproque de η , on a la relation

$$J\eta^{-1}\eta_*(D_{\Omega_0}(\Pi)) = D_{\Omega_0}(J\eta^{-1}\eta_*\Pi).$$

On tire

$$J\eta^{-1}\eta_*\Pi = D_{\Omega_0}(J\eta^{-1}\eta_*\Pi) \wedge \eta_*Y.$$

Posons

$$\Pi' = J\eta^{-1}\eta_*\Pi, \quad X' = D_{\Omega_0}(\Pi'), \quad Y' = \eta_*Y.$$

Le champ de bivecteurs Π' est un tenseur de Poisson car c'est le produit d'un tenseur de Poisson sur \mathbb{R}^3 par une fonction. En outre, on a les relations :

$$\Pi' = X' \wedge Y', \quad \eta_*\Pi = \frac{1}{J\eta^{-1}}\Pi'.$$

Par conséquent, pour montrer que l'hypersurface $\{x = 0\}$ est invariante pour $\eta_*\Pi$ (c'est-à-dire qu'elle est tangente au feuilletage associé à $\eta_*\Pi$), il suffit de prouver qu'elle est invariante pour Π' . On a :

$$\Pi' = f(\varrho)\Pi^2 + \varrho^g\tilde{\Pi}^2 + \Pi_\infty$$

avec Π'_∞ plat en 0. Désignons par Π'_1 , X'_1 et Y'_1 respectivement les restrictions à l'hypersurface $\{x = 0\}$ de Π' , X' et Y' . Nous avons

$$\begin{aligned} \Pi'_1 &= ayz \frac{\partial}{\partial y} \wedge \frac{\partial}{\partial z} + \Pi'_{1\infty}, \\ X'_1 &= \lambda_2 y \frac{\partial}{\partial y} + \lambda_3 z \frac{\partial}{\partial z} + X'_{1\infty}, \\ Y'_1 &= \mu_2 y \frac{\partial}{\partial y} + \mu_3 z \frac{\partial}{\partial z}. \end{aligned}$$

La relation $\Pi' = X' \wedge Y'$ implique

$$(\Sigma) \quad \Pi'_1 = X'_1 \wedge Y'_1, \quad \Pi'_1 \wedge Y'_1 = 0.$$

Notons $P_{ij}(y, z)$ les composantes de $\Pi'_{1\infty}$. Le système (Σ) donnent les équations

$$(22) \quad \mu_2 y P_{31} + \mu_3 z P_{12} = 0,$$

$$(23) \quad \mu_2 y \left(\frac{\partial P_{12}}{\partial y} + \frac{\partial P_{13}}{\partial z} \right) = P_{12},$$

$$(24) \quad \mu_3 z \left(\frac{\partial P_{12}}{\partial y} + \frac{\partial P_{13}}{\partial z} \right) = P_{13}.$$

Dérivons (22) par rapport à z ; on tire :

$$\mu_2 y \frac{\partial P_{13}}{\partial z} = \mu_3 P_{12} + \mu_3 z \frac{\partial P_{12}}{\partial z}.$$

En portant ceci dans (23), on obtient :

$$\mu_2 y \frac{\partial P_{12}}{\partial y} + \mu_3 z \frac{\partial P_{12}}{\partial z} = (1 - \mu_3) P_{12}.$$

De même, les relations (22) et (24) donnent

$$\mu_2 y \frac{\partial P_{13}}{\partial y} + \mu_3 z \frac{\partial P_{13}}{\partial z} = (1 - \mu_2) P_{12}$$

ou encore

$$Y'_1(P_{12}) = (1 - \mu_3)P_{12}, \quad Y'_1(P_{13}) = (1 - \mu_2)P_{13}$$

On en déduit que P_{12} et P_{13} sont nulles. Ce qui montre que le plan $\{x = 0\}$ est invariant pour la structure de Poisson Λ (donc pour $\eta_*\Pi$).

Par un raisonnement similaire, on montre qu'il existe un changement de coordonnées δ de classe C^∞ au voisinage de l'origine laissant fixe le plan $\{x = 0\}$ et tel que $\{y = 0\}$ soit invariant pour $(\delta \circ \eta)_*\Pi$. Enfin on réitère ce même raisonnement parallèlement à $\{x = 0\}$ et $\{y = 0\}$ pour obtenir le lemme. \square

Ainsi, pour le dernier modèle $\Pi = \Pi_0 + \Pi_\infty$, il existe un difféomorphisme $\xi = \text{id}_{\mathbb{R}^3} + \xi_\infty$, avec ξ_∞ plat en 0 et tel que $\xi_*\Pi$ soit une structure de Poisson diagonale. Comme les réels a , b et c sont non nuls nous pouvons écrire :

$$\bar{\Pi} = \xi_*\Pi = (1 + \bar{h})\Pi_0,$$

où \bar{h} est plat à l'origine. Pour finir nous allons utiliser la méthode du chemin pour montrer que l'on peut éliminer le terme plat $\bar{h}\Pi_0$. Posons :

$$\Pi_t = (1 + t\bar{h})\Pi_0 = h_t\Pi_0.$$

On cherche une famille (φ_t) de difféomorphismes telle que $(\varphi_t)_*\Pi_t = \Pi_0$. Ce qui revient à chercher une famille (Z_t) de champs de vecteurs vérifiant :

$$[Z_t, \Pi_t] + \frac{d\Pi_t}{dt} = 0.$$

On doit donc résoudre l'équation :

$$(25) \quad [Z_t, \Pi_t] = -\bar{h}\Pi_0.$$

Or, on sait que Π_0 se décompose en $\Pi_0 = X_0 \wedge Y_0$ où X_0 est le rotationnel de Π_0 relativement à la forme volume canonique Ω_0 . Cherchons Z_t sous la forme $Z_t = g_t X_0$. L'équation (25) devient :

$$[g_t X_0, h_t \Pi_0] = -\bar{h}\Pi_0.$$

Compte tenu du fait $[X_0, \Pi_0] = 0$, il vient :

$$-\bar{h}\Pi_0 = (g_t X_0(h_t) - h_t X_0(g_t))\Pi_0 = -h_t^2 \left(X_0 \left(\frac{g_t}{h_t} \right) \right) \Pi_0.$$

Il suffit de résoudre l'équation :

$$X_0 \left(\frac{g_t}{h_t} \right) = \frac{\bar{h}}{h_t^2}.$$

Mais, par hypothèse X_0 est hyperbolique en 0 et \bar{h} plate en 0 donc, d'après le théorème 3.2, cette équation admet au moins une solution. Nous venons donc de montrer qu'il existe une famille (φ_t) de difféomorphismes telle que

$$(\varphi_t)_* \Pi_t = \Pi_0.$$

On en déduit que la structure de Poisson Π est C^∞ -isomorphe à $\Pi_0 = f(\varrho)\Pi^2 + \varrho^q \tilde{\Pi}^2$, ce qui achève la démonstration du théorème 4.1. \square

REMARQUE. — Deux méthodes de résolution différentes ont été utilisées pour passer du formel au C^∞ . La première, qui repose essentiellement sur la proposition 3.1, est valable pour les cas A), B) et C); tandis que la seconde est efficace uniquement pour les cas A), C) et D).

5. Singularités de 1-formes intégrables

En dimension 3, à toute 1-forme intégrable est associée une structure de Poisson *via* l'isomorphisme défini par : $\omega \mapsto \Pi$ si et seulement si $i_\Pi \Omega_0 = \omega$, où Ω_0 désigne la forme volume canonique de \mathbb{R}^3 . La condition d'intégrabilité $\omega \wedge d\omega = 0$ est équivalente à $\Pi \wedge D_{\Omega_0}(\Pi) = 0$.

Considérons deux 1-formes intégrables ω et ω' qui sont C^∞ -conjuguées, c'est-à-dire qu'il existe un difféomorphisme φ de classe C^∞ tel que $\varphi^* \omega = \omega'$. Notons Π et Π' respectivement les structures de Poisson associées à ω et ω' . Nous avons

$$\varphi^* \omega = \varphi^*(i_\Pi \Omega_0) = i_{\varphi_* \Pi} \varphi^* \Omega_0 = (J\varphi) i_{\varphi_* \Pi} \Omega_0.$$

Donc on a la relation $\Pi' = (J\varphi) \varphi_* \Pi$ où $J\varphi$ est le Jacobien de φ . Cependant, les formes normales des 1-formes intégrables ne sont pas une transcription des formes normales des structures de Poisson. Voici un contre-exemple.

CONTRE-EXEMPLE. — Soit ω_2 la 1-forme intégrable donnée par :

$$\omega_2 = yz \, dx + mzx \, dy + nxy \, dz,$$

avec $m, n \in \mathbb{N}^*$. Posons $\varrho(x, y, z) = xy^m z^n$ et considérons la 1-forme intégrable suivante :

$$\omega = (1 + \varrho^q) \omega_2.$$

Nous allons montrer que ω est C^∞ -conjuguée à ω_2 . Pour ce faire, on considère le difféomorphisme :

$$\varphi(x, y, z) = (x\theta(\varrho), y, z).$$

Il s'agit de déterminer une fonction $\theta(\varrho)$ ne s'annulant pas à l'origine telle que $\varphi^*\omega_2 = \omega$. Cette dernière relation est équivalente à :

$$yz d(x\theta) + mzx\theta dy + nxy\theta dz = (1 + \varrho^q)\omega_2.$$

Ce qui peut encore s'écrire :

$$\omega_2\theta + xyz\theta' d\varrho = (1 + \varrho^q)\omega_2.$$

En remarquant que

$$\frac{\omega_2}{xyz} = \frac{d\varrho}{\varrho},$$

il vient

$$\theta d\varrho + \varrho\theta' d\varrho = (1 + \varrho^q)d\varrho.$$

On doit donc résoudre l'équation

$$(\varrho\theta)' = 1 + \varrho^q.$$

On prend la solution donnée par :

$$\theta(\varrho) = \frac{1}{\varrho} \int_0^{\varrho} (1 + r^q) dr.$$

Ceci prouve que ω_2 est C^∞ -conjuguée à ω .

Pourtant, les structures de Poisson associées respectivement à ω_2 et ω ne sont pas isomorphes. En effet, ces structures de Poisson sont

$$\begin{aligned} \Pi^2 &= cxy \frac{\partial}{\partial x} \wedge \frac{\partial}{\partial y} + ayz \frac{\partial}{\partial y} \wedge \frac{\partial}{\partial z} + bzx \frac{\partial}{\partial z} \wedge \frac{\partial}{\partial x}, \\ \Pi &= (1 + \varrho^q)\Pi^2. \end{aligned}$$

Nous avons vu dans le chapitre précédent que ces deux structures de Poisson ne sont pas isomorphes. \square

Dans [Ce-LN], on donne des résultats de formes normales de 1-formes intégrables sur \mathbb{R}^n . En se servant de l'étude faite sur les structures de Poisson, nous précisons ces résultats dans le cas où $n = 3$. Partons d'une

forme intégrable ω de classe C^∞ au voisinage de $O \in \mathbb{R}^3$ ayant pour 2-jet en 0

$$\omega_2 = ayz \, dx + bzx \, dy + cxy \, dz,$$

avec $(a - b)(b - c)(c - a) \neq 0$. La structure de Poisson Π associée à ω est définie par la relation $\omega = i_\Pi \Omega_0$. Supposons que si l'un des coefficients a, b ou c est nul alors les deux autres sont de signe contraire.

Nous savons que sous ces hypothèses la structure de Poisson Π est isomorphe en classe C^∞ à l'un des quatre modèles locaux du théorème 2.1. En d'autres termes, il existe un changement de coordonnées φ de classe C^∞ au voisinage de l'origine tel que $\varphi^* \omega = (J\varphi)\omega_0$, où $J\varphi$ est le Jacobien de φ et ω_0 l'une des formes intégrables suivantes

$$\begin{aligned} \mathcal{T}_0 &= \omega_2, \\ \mathcal{T}_1 &= \omega_2 + y^{m_1} z^{m_2} (\alpha y \, dz - z \, dy), \\ \mathcal{T}_2 &= (1 + \varrho^q)\omega_2, \\ \mathcal{T}_3 &= (1 + \alpha_1 \varrho + \dots + \alpha_{q-1} \varrho^{q-1})\omega_2 + \varrho^q \tilde{\omega}_2. \end{aligned}$$

avec les notations du paragraphe précédent et $\tilde{\omega}_2 = \tilde{a}yz \, dx + \tilde{b}zx \, dy + \tilde{c}xy \, dz$, le vecteur $(\tilde{a}, \tilde{b}, \tilde{c})$ n'étant pas colinéaire à (a, b, c) .

En fait, on peut même prendre φ tel que sa linéarisée en 0 coïncide avec l'identité. On a donc $\omega = (1 + h)\omega_0$, avec $h(0) = 0$. Montrons qu'il est possible de se débarrasser de la fonction h .

LEMME 5.1. — *La 1-forme intégrable ω est C^∞ -conjuguée à ω_0 .*

Preuve. — Elle utilise la méthode du chemin. Posons $\omega_t = (1 + th)\omega_0$. Cherchons une famille de difféomorphismes $(\varphi_t)_t$ telle que $(\varphi_t)^* \omega_t = \omega_0$, pour tout t . Cela revient à chercher une famille de champs de vecteurs $(X_t)_t$ vérifiant :

$$(26) \quad L_{X_t} \omega_t + \frac{d\omega_t}{dt} = 0,$$

où L_{X_t} est la dérivation de Lie suivant le champ de vecteurs X_t . Cette équation (26) équivaut à :

$$(1 + th)L_{X_t} \omega_0 + tX_t(h)\omega_0 = -h\omega_0.$$

Nous savons que chacun des quatre modèles locaux de structures de Poisson se décompose sous la forme

$$\Pi_0 = D_{\Omega_0}(\Pi_0) \wedge Y_0.$$

Fixons un tel champ de vecteurs Y_0 et posons

$$X_t = f_t Y_0.$$

Il s'agit donc de déterminer une famille (f_t) de fonctions différentiables vérifiant :

$$(27) \quad (1 + th)L_{f_t Y_0} \omega_0 + t f_t Y_0(h) \omega_0 = -h \omega_0.$$

Or, il découle de la relation $\omega_0 = i_{\Pi_0} \Omega_0$ que l'on a

$$i_{(f_t Y_0)} \omega_0 = f_t i_{Y_0} \omega_0 = 0.$$

Par conséquent, on a

$$L_{f_t Y_0} \omega_0 = i_{(f_t Y_0)} d\omega_0 = f_t i_{Y_0} d\omega_0 = f_t i_{Y_0} di_{\Pi_0} \Omega_0.$$

Mais par définition de l'opérateur D_{Ω_0} on a

$$di_{\Pi_0} \omega_0 = i_{D_{\Omega_0}(\Pi_0)} \omega_0.$$

On trouve

$$L_{f_t Y_0} \omega_0 = f_t i_{Y_0} i_{D_{\Omega_0}(\Pi_0)} \Omega_0 = f_t i_{\Pi_0} \Omega_0 = f_t \omega_0.$$

En reportant ceci dans (27) on obtient :

$$((1 + th)f_t + t f_t Y_0(h)) \omega_0 = -h \omega_0.$$

Il suffit de prendre

$$f_t = -\frac{h}{1 + t(h + Y_0(h))}.$$

Ce qui montre la forme intégrable ω est conjuguée à ω_0 . D'où le lemme. \square

Il découle du lemme précédent que toute 1-forme intégrable ayant ω_2 pour 2-jet en 0 est C^∞ -conjuguée à l'un des quatre types de 1-formes \mathcal{T}_0 , \mathcal{T}_1 , \mathcal{T}_2 ou \mathcal{T}_3 ci-dessus. Nous allons voir qu'il y a exactement trois modèles locaux de 1-formes intégrables.

LEMME 5.2. — *Avec les notations précédentes, la 1-forme intégrable donnée par $\omega_0 = (1 + \varrho^q) \omega_2$ est C^∞ -conjuguée à ω_2 .*

La preuve est faite dans le contre-exemple donné au début de ce paragraphe.

REMARQUE. — On peut aussi démontrer le lemme 5.2 en utilisant le fait que la fonction polynomiale $\varrho(x, y, z)$ est une intégrale première formelle faible au sens de [M-M]) (cela signifie que $\omega_0 \wedge d\varrho = 0$). Il suffit alors d'appliquer [Ce-LN] qui dit ceci : lorsque (a, b, c) est colinéaire à un triplet de \mathbb{N}^3 avec $(a - b)(b - c)(c - a) \neq 0$, pour que ω_0 soit C^∞ -conjuguée à ω_2 il faut et il suffit qu'elle admette une intégrale première formelle faible.

LEMME 5.3. — Avec les notations précédentes la 1-forme

$$\omega_0 = (1 + \alpha_1 \varrho + \dots + \alpha_{q-1} \varrho^{q-1}) \omega_2 + \varrho^q \tilde{\omega}_2,$$

est C^∞ -conjuguée à $\omega_2 + \varrho^q \tilde{\omega}_2$.

Preuve. — Posons

$$f(\varrho) = 1 + \alpha_1 \varrho + \dots + \alpha_{q-1} \varrho^{q-1},$$

$$\tilde{\omega}_2 = \tilde{a}yz dx + \tilde{b}zx dy + \tilde{c}yx dz.$$

Considérons le changement de coordonnées définies au voisinage de l'origine par $\varphi : (x, y, z) \mapsto (x\theta(\varrho), y\gamma(\varrho), z)$ avec $\theta\gamma = 1$. La relation $\varphi^* \omega_0 = \omega_2 + \varrho^q \tilde{\omega}_2$ se traduit par :

$$\begin{aligned} f(\varrho)\omega_2 + xyzf(\varrho)(a\gamma d\theta + b\theta d\gamma) + \varrho^q \tilde{\omega}_2 \\ + xyz\varrho^q(\tilde{a}\gamma d\theta + \tilde{b}\theta d\gamma) = \omega_2 + \varrho^q \tilde{\omega}_2. \end{aligned}$$

En utilisant les relations

$$\frac{\omega_2}{xyz} = \frac{d\varrho}{\varrho}, \quad \theta\gamma = 1,$$

l'égalité précédente donne :

$$f(\varrho)\left(a\frac{\theta'}{\theta} + b\frac{\gamma'}{\gamma}\right) + \varrho^q\left(\tilde{a}\frac{\theta'}{\theta} + \tilde{b}\frac{\gamma'}{\gamma}\right) = \frac{1 - f(\varrho)}{\varrho}.$$

Or, la relation $\theta\gamma = 1$ implique

$$\frac{\theta'}{\theta} = -\frac{\gamma'}{\gamma}.$$

Donc, il vient

$$\frac{\theta'}{\theta}((a - b)f(\varrho) + (\tilde{a} - \tilde{b})\varrho^q) = \frac{1 - f(\varrho)}{\varrho}.$$

On sait résoudre cette équation, par conséquent il existe bien un changement de coordonnées φ de classe C^∞ tel que $\varphi^* \omega_0 = \omega_2 + \varrho^q \tilde{\omega}_2$. \square

En définitive, nous avons démontré le théorème suivant :

THÉORÈME 5.1. — Soit ω une 1-forme intégrable de classe C^∞ au voisinage de l'origine $O \in \mathbb{R}^3$ ayant pour 2-jet en 0

$$\omega_2 = ayz dx + bzx dy + cxy dz,$$

avec $(a-b)(b-c)(c-a) \neq 0$. Supposons que si l'un des coefficients a, b ou c est nul, les deux autres sont de signe contraire. Alors ω est C^∞ -conjuguée à l'un des modèles suivants :

$$\begin{aligned}\mathcal{F}_0 &= \omega_2, \\ \mathcal{F}_1 &= \omega_2 + y^{m_1} z^{m_2} (\alpha y dz - z dy), \\ \mathcal{F}_2 &= \omega_2 + \varrho^q \tilde{\omega}_2,\end{aligned}$$

où $\tilde{\omega}_2 = \tilde{a}yz dx + \tilde{b}zx dy + \tilde{c}xy dz$, le vecteur $(\tilde{a}, \tilde{b}, \tilde{c})$ n'étant pas colinéaire à (a, b, c) .

REMARQUE. — Nous avons vu au paragraphe IV que pour $j = 0$ ou 1 , la structure de Poisson définie par

$$i_{\Pi_j} dx \wedge dy \wedge dz = \mathcal{F}_j$$

se décompose en $\Pi_j = X_j \wedge Y_j$, où X_j est le rotationnel de Π_j et Y_j est un champ de vecteurs qui commute avec X_j .

De plus, X_j et Y_j sont polynomiaux (ces champs de vecteurs ont été déterminés dans la section précédente). Cela est également valable pour le modèle \mathcal{F}_2 si on suppose que les vecteurs (a, b, c) , $(\tilde{a}, \tilde{b}, \tilde{c})$ et $(1, 1, 1)$ sont linéairement indépendants. On peut donc conclure que \mathcal{F}_0 et \mathcal{F}_1 sont tangentes à une action commutative polynomiale tandis que \mathcal{F}_2 l'est génériquement.

BIBLIOGRAPHIE

- [A] ARNOL'D (V.-I.). — *Geometrical methods in the theory of differential equations*. — Grundlehren der mathematischen, Springer Verlag, second ed., 1988.
- [Ca-LN] CAMACHO (C.), LINS NETO (A.). — *The topology of integrable differential forms near a singularity*, Pub. Math. I.H.E.S., t. 55, 1982, p. 5-35.

- [Ce-LN] CERVEAU (D.), LINS NETO (A.). — *Formes tangentés à des actions commutatives*, Ann. Fac. Sci. Toulouse, t. **VI**, 1984, p. 51–85.
- [Ch] CHAPERON (M.). — *Géométrie différentielle et singularités de systèmes dynamiques*, Astérisque, 1986, p. 138–139.
- [C1] CONN (J.-F.). — *Normal forms for analytic Poisson structures*, Ann. of Math., t. **119** (2), 1984, p. 576–601.
- [C2] CONN (J.-F.). — *Normal forms for smooth Poisson structures*, Ann. of Math., t. **121** (2), 1985, p. 565–593.
- [De] DESOLNEUX MOULIS (N.). — *Linéarisation de certaines structures de Poisson*, Pub. Dép. Math., Université Claude Bernard Lyon, 1986.
- [D1] DUFOUR (J.-P.). — *Linéarisation de structures de Poisson*, J. Diff. Geometry, t. **32**, 1990, p. 415–428.
- [D2] DUFOUR (J.-P.). — *Quadratisation de structures de Poisson*, Preprint, Montpellier, 1993.
- [D-H] DUFOUR (J.-P.), HARAKI (A.). — *Rotationnels et structures de Poisson quadratiques*, C.R. Acad. Sci. Paris, t. **312**, I, 1991, p. 137–140.
- [D-M] DUFOUR (J.-P.), MOLINIER (J.-C.). — *Une nouvelle famille de d'algèbre de Lie non dégénérées*, Indag. Math., N.S., t. **6** (1), 1995, p. 67–82.
- [D-W] DUFOUR (J.-P.), WADE (A.). — *Formes normales de structures de Poisson ayant un 1-jet nul*, à paraître dans J. of Geometry and Phys.
- [H] HARAKI (A.). — *Structures de Poisson quadratiques*, Thèse, Montpellier, 1993.
- [K] KOSZUL (J.-L.). — *Crochets de Schouten-Nijenhuis et cohomologie*, Astérisque, t. **127** bis (hors série), 1985, p. 257–271.
- [L-M] LIBERMANN (P.), MARLE (M.). — *Symplectic geometry and analytical mechanics*. — Reidel, Dordrecht, Holland, 1987.
- [L] LICHNEROWICZ (A.). — *Les variétés de Poisson et leurs algèbres de Lie associées*, J. Diff. Geometry, t. **12**, 1977, p. 253–300.
- [L-N] LINS NETO (A.). — *Local structural stability of C^2 -integrable 1-forms*, Ann. Inst. Fourier, Grenoble, t. **27** (2), 1977, p. 197–225.
- [Ma] MARTINET (J.). — *Normalisation des champs de vecteurs holomorphes (d'après A.D. Brujno)*, Séminaire Bourbaki, t. **564**, 1980–1981.
- [M-M] MATTEI (J.-F.), MOUSSU (R.). — *Holonomie et intégrales premières*, Ann. Sci. École Normale Supérieure, t. **13**, 1980, p. 469–523.
- [Mo] MOLINIER (J.-C.). — *Linéarisation de structures de Poisson*, Thèse, Montpellier, 1993.
- [R] ROUSSARIE (R.). — *Modèles locaux de champs de vecteurs et formes*, Astérisque, 1975.

- [Sch] SCHOUTEN (J.-A.). — *On the differential operators of first order in tensor calculus*, *Convegno Int. Geom. Diff. Italia*, 1953, p. 1–7, Roma, Cremonese.
- [Wa1] WADE (A.). — *Normalisation formelle de structures de Poisson*, *C.R. Acad. Sci. Paris*, t. **324 I**, 1997, p. 531–536.
- [Wa2] WADE (A.). — *Normalisation de structures de Poisson*, Thèse, Montpellier, 1996.
- [We1] WEINSTEIN (A.). — *The local structure of Poisson manifold*, *J. Diff. Geometry*, t. **18**, 1983, p. 523–557.
- [We2] WEINSTEIN (A.). — *The Modular Automorphism Group of a Poisson Manifold*, Preprint (mai 1996).