

THEORIE DES NOMBRES

- Besançon -

Année 1976-77

EXEMPLE D'ANNULATEUR NON PRINCIPAL
D'UN GROUPE DE χ -CLASSES RELATIVES

Georges GRAS

Faculté des Sciences. Mathématiques

ERA. CNRS N° 070654

25030 Besançon Cedex

Exemple d'annulateur non principal
d'un groupe de χ -classes relatives

par Georges GRAS

Introduction. - Nous utilisons les notations et les résultats de [2] .

On rappelle que l'interprétation du théorème de Stickelberger ([2], Th. II 5) est que pour tout $\chi \in \mathfrak{X}^-$, le $\mathbb{Z}^{(g_\chi)}$ -module \mathbb{H}_χ est annihilé par l'idéal $B_1(\chi'^{-1})(\chi'(a) - a, \Lambda_\chi)$ de $\mathbb{Z}^{(g_\chi)}(\chi'|\chi)$; ici a est choisi de telle sorte que $(\frac{K_\chi}{a})$ engendre G_χ et on sait aussi que l'idéal $(\chi'(a) - a, \Lambda_\chi)$ est presque toujours l'idéal unité . Par conséquent, lorsque c'est le cas, $(B_1(\chi'^{-1}))$ annule \mathbb{H}_χ ; ceci ne veut pas dire que l'annulateur de \mathbb{H}_χ soit l'idéal principal $(B_1(\chi'^{-1}))$; cependant, pour trouver un cas où l'annulateur de \mathbb{H}_χ soit non principal, il semble qu'il soit plus facile de se placer dans un cas où l'idéal $(\chi'(a) - a, \Lambda_\chi)$ n'est pas l'idéal unité .

Nous nous proposons de construire un tel exemple .

Etude de $\mathbb{Q}^{(47)}$. Prenons $\iota = 47$ et $K_\chi = \mathbb{Q}^{(\iota)}$; on a alors $g_\chi = 46$ et on sait que $\mathbb{Z}^{(g_\chi)} = \mathbb{Z}^{(46)} = \mathbb{Z}^{(23)}$ est non principal .

On a le schéma suivant (où $K_\psi = \mathbb{Q}(\sqrt{-47})$ et où $\mathbb{Q}_+^{(47)}$ est le sous-corps réel maximal de $\mathbb{Q}^{(47)}$) :

$$\begin{array}{ccc}
 \mathbb{Q}_+^{(47)} & \xrightarrow{2} & \mathbb{Q}^{(47)} = K_\chi \\
 23 \downarrow & & \downarrow 23 \\
 \mathbb{Q} & \xrightarrow{2} & \mathbb{Q}(\sqrt{-47}) = K_\psi
 \end{array}$$

On vérifie sur une table ([1] par exemple) que $|\mathbb{H}_\psi| = 5$ et que $|\mathbb{H}(K_\chi)^-| = 5 \cdot 139$. D'après la proposition II 2 de [2], on a

$|\mathbb{H}_\chi| |\mathbb{H}_\psi| = |\mathbb{H}(K_\chi)^{-}|$, d'où $|\mathbb{H}_\chi| = 139$. On a donc $\mathbb{H}_\chi \simeq \mathbb{Z}^{(23)} / \mathfrak{p}_{139}$, où \mathfrak{p}_{139} est un idéal premier au-dessus de 139 dans $\mathbb{Z}^{(23)}$.

Considérons l'idéal $(\chi'(a) - a, \Lambda_\chi)$: on a $\Lambda_\chi = 47$ (cf. [2], Prop. II 5) et $(\chi'(a) - a, \Lambda_\chi) = \mathfrak{p}_{47}$ (idéal premier au-dessus de 47 dans $\mathbb{Q}^{(23)}$) . Si maintenant on utilise le théorème II 2 de [2] , on ob-

tient $|\mathbb{H}_\chi| = 2^{\alpha_\chi} w_{\chi'|\chi} \prod (\frac{1}{2} B_1(\chi'^{-1}))$; or ici $\alpha_\chi = 0$, $w_{\chi'|\chi} = 47$, d'où $47 \prod_{\chi'|\chi} \frac{1}{2} B_1(\chi'^{-1}) = 139$. Il résulte de tout ceci (et notamment du fait que le nombre de classes de $\mathbb{Q}^{(47)}$ est impair) que $(\frac{1}{2} B_1(\chi'^{-1}))_{\mathfrak{p}_{47}}$ est l'annulateur de \mathbb{H}_χ : en effet, c'est un idéal entier de norme 139 (c'est \mathfrak{p}_{139}) .

Montrons maintenant que l'idéal \mathfrak{p}_{139} est non principal . En vertu de la relation $(\frac{1}{2} B_1(\chi'^{-1}))_{\mathfrak{p}_{47}} = \mathfrak{p}_{139}$, il suffit de prouver que \mathfrak{p}_{47} est non principal dans $\mathbb{Q}^{(23)}$. On a le schéma suivant :

$$\begin{array}{ccc} \mathbb{Q}^{(23)} & \xrightarrow{2} & \mathbb{Q}^{(23)} & \mathfrak{p}_{47} \\ 11 \downarrow & & \downarrow 11 & \\ \mathbb{Q} & \xrightarrow{\quad} & \mathbb{Q}(\sqrt{-23}) & \mathfrak{P}_{47} \end{array}$$

On remarque que la non principalité de $\mathbb{Q}^{(23)}$ provient de celle de $\mathbb{Q}(\sqrt{-23})$. Soit \mathfrak{P}_{47} l'idéal premier au-dessous de \mathfrak{p}_{47} dans $\mathbb{Q}(\sqrt{-23})$; 47 étant totalement décomposé dans $\mathbb{Q}^{(23)}$, si \mathfrak{p}_{47} était principal dans $\mathbb{Q}^{(23)}$, il en résulterait que $N_{\mathbb{Q}^{(23)}/\mathbb{Q}(\sqrt{-23})} \mathfrak{p}_{47} = \mathfrak{P}_{47}$ serait aussi principal ; or ceci n'est pas comme on peut le vérifier élémentairement :

En effet, si on suppose $\mathfrak{P}_{47} = (\alpha)$, $\alpha = \frac{x + y\sqrt{-23}}{2}$, $x, y \in \mathbb{Z}$

de même parité , on est conduit à résoudre l'équation $x^2 + 23y^2 = 4.47$ qui est manifestement impossible .

En résumé :

Proposition :

Soit χ le caractère rationnel impair pour lequel $K_\chi = \mathbb{Q}^{(47)}$
et soit $\mathbb{H}_\chi = \{h \in \mathbb{H}(\mathbb{Q}^{(47)}), P_\chi(\sigma_\chi)h = 1\} = \left\{ h \in \mathbb{H}(\mathbb{Q}^{(47)}), \right.$
 $\left. N_{\mathbb{Q}^{(47)}/\mathbb{Q}_+}^{(47)} h = N_{\mathbb{Q}^{(47)}/\mathbb{Q}(\sqrt{-47})}^{(47)} h = 1 \right\}$. Alors l'annulateur de \mathbb{H}_χ

(en tant que $\mathbb{Z}^{(23)}$ -module) est un idéal premier non principal (de norme 139).

Références

- [1] Borevitch et Chafarevitch, Théorie des Nombres, Gauthier-Villars, Paris (1967).
- [2] Gras (G.), Application de la notion de φ -objet à l'étude du groupe des classes d'idéaux des extensions abéliennes, Publ. Math. de l'Université de Besançon (théorie des Nombres), 1975-76, Fasc. 2.