

RÉMY DESPLANCHES

**$K^{ime}$  diamètre de classes d'espaces de Sobolev sur  $IR^n$  associés  
à des opérateurs de type « Schrödinger »**

*Annales de la faculté des sciences de Toulouse 5<sup>e</sup> série*, tome 7, n° 3-4 (1985), p. 205-228

[http://www.numdam.org/item?id=AFST\\_1985\\_5\\_7\\_3-4\\_205\\_0](http://www.numdam.org/item?id=AFST_1985_5_7_3-4_205_0)

© Université Paul Sabatier, 1985, tous droits réservés.

L'accès aux archives de la revue « Annales de la faculté des sciences de Toulouse » (<http://picard.ups-tlse.fr/~annales/>) implique l'accord avec les conditions générales d'utilisation (<http://www.numdam.org/conditions>). Toute utilisation commerciale ou impression systématique est constitutive d'une infraction pénale. Toute copie ou impression de ce fichier doit contenir la présente mention de copyright.

NUMDAM

Article numérisé dans le cadre du programme  
Numérisation de documents anciens mathématiques  
<http://www.numdam.org/>

**$k^{\text{ième}}$  DIAMETRE DE CLASSES D'ESPACES DE SOBOLEV  
SUR  $\mathbb{R}^n$  ASSOCIES A DES OPERATEURS DE TYPE «SCHRÖDINGER»**

Rémy Desplanches <sup>(1)</sup>

(1) U.E.R. de Mathématiques, Université de Nantes 2, rue de la Houssinière 44072 Nantes Cédex.

**Résumé :** On étudie ici les propriétés du spectre de l'opérateur de Schrödinger  $A_U = -\Delta + U$ . Lorsque  $U(x) \geq 1$ ,  $\lim_{|x| \rightarrow +\infty} U(x) = +\infty$ , on sait que le spectre de  $A_U$  est discret. Soit  $N(\lambda)$  le nombre de valeurs propres inférieures ou égales à  $\lambda$ . On connaît le comportement asymptotique de  $N(\lambda)$  [8,10]. Nous donnons, dans une première partie, une généralisation de ce résultat sous des conditions plus faibles sur  $U$ .

Dans une seconde partie, nous étudions le cas de potentiels qui ne tendent pas vers l'infini dans toutes les directions et nous donnons un encadrement de la suite des  $k^{\text{ième}}$  diamètres de la boule unité d'espaces de Sobolev associés dans  $L^2$ .

**Summary :** In the paper, we study the spectral properties of Schrödinger operators  $A_U = -\Delta + U$ . If we assume  $U(x) \geq 1$ ,  $\lim_{|x| \rightarrow +\infty} U(x) = +\infty$  the spectrum of  $A_U$  is discrete. Let  $N(\lambda)$  the number of eigenvalues less than  $\lambda$ , the asymptotic of  $N(\lambda)$  is known [8,10]. We first generalize this result under weaker assumptions on  $U$ .

In a second part, we examine cases where the potentials do not tend to infinity everywhere as  $|x| \rightarrow +\infty$ . We give an estimate of the sequence of  $n$ th width of associated Sobolev spaces in  $L^2$ .

## 0. - INTRODUCTION

Considérons l'opérateur de Schrödinger sur  $\mathbb{R}^n$ ,  $A_U = -\Delta + U$ , où  $\Delta$  est l'opérateur de Laplace  $\Delta = \sum_{j=1}^n \frac{\partial^2}{\partial x_j^2}$  et  $U$  un potentiel, fonction définie sur  $\mathbb{R}^n$ , que nous supposons à valeurs réelles, appartenant à  $L^2_{loc}(\mathbb{R}^n)$  et bornée inférieurement. L'opérateur  $A_U$  est alors essentiellement auto-adjoint sur  $C_0^\infty(\mathbb{R}^n)$  (Kato [6]). Notons  $\mathcal{A}_U$  le prolongement auto-adjoint de  $A_U$ ,  $D(\mathcal{A}_U)$  le domaine de  $\mathcal{A}_U$  muni de la norme du graphe. Dans le cas où  $\lim_{|x| \rightarrow +\infty} U(x) = +\infty$  on sait que l'injection de  $D(\mathcal{A}_U)$  dans  $L^2(\mathbb{R}^n)$  est compacte et que le spectre de  $\mathcal{A}_U$  est alors constitué d'une suite croissante  $(\lambda_j)_{j \geq 0}$  de valeurs propres, de multiplicité finie, admettant  $+\infty$ , comme seul point d'accumulation. Avec des conditions supplémentaires de régularité sur  $U$ , on peut donner le comportement asymptotique de la suite des valeurs propres (Cf [4], [10], [13]). Soit  $N(\lambda) = \sum_{\lambda_j \leq \lambda} 1$ , la fonction de répartition de la suite  $(\lambda_j)_{j \geq 0}$ . Dans [10], par exemple, G.V. Rozenbljum avec des conditions assez faibles sur  $U$ , montre que :

$$(\beta) \quad N(\lambda) \sim \gamma_n \int_{(\lambda-U(x))_+^{n/2}} dx \quad \text{où} \quad \gamma_n = (2\sqrt{\pi})^{-n} \Gamma\left(\frac{n}{2} + 1\right)^{-1}.$$

Ce résultat a été généralisé par Pham The Lai dans [8] à des opérateurs  $\mathcal{A} = \mathcal{A}_0 + U$  où  $\mathcal{A}_0$  est un opérateur elliptique à coefficients constants d'ordre  $2m$ . Ce cas sera l'objet du paragraphe II, où nous donnons (avec des conditions plus faibles sur  $U$ ) une autre généralisation de  $(\beta)$ .

Mais la condition  $(\alpha)$  n'est pas nécessaire pour que l'injection de  $D(\mathcal{A}_U)$  dans  $L^2(\mathbb{R}^n)$  soit compacte (Cf [3]). Citons comme exemple [1], où la compacité de l'injection est établie avec la condition  $\int_{|x-y| < 1} \frac{1}{U(y)} dy \rightarrow 0$  pour  $|x| \rightarrow +\infty$ . Comme autre exemple, on verra que, pour  $U(x,y) = |x|^{2\sigma} |y|^{2\sigma'}$ ,  $x \in \mathbb{R}^p$ ,  $y \in \mathbb{R}^q$  avec  $n = p+q$ ,  $\sigma > 0$ ,  $\sigma' > 0$ , l'injection de l'espace associé  $\{u \in H^1(\mathbb{R}^n), U^{1/2} u \in L^2(\mathbb{R}^n)\}$  dans  $L^2(\mathbb{R}^n)$  est compacte. D'autre part il est clair que, pour un tel potentiel la formule  $(\beta)$  n'a plus de sens. L'objet du § III est l'étude de ce type de potentiel. Nous donnerons le comportement de la suite des  $k^{\text{ième}}$  diamètres, au sens de Kolmogorov, de la boule unité de l'espace associé dans  $L^2(\mathbb{R}^n)$ .

Notons que parallèlement, Robert [9] a étudié le cas où le potentiel  $U$  s'écrit  $U(x,y) = |x|^{2l} (1+y^2)^k$ ,  $(x,y) \in \mathbb{R}^2$ ,  $k$  et  $l$  entiers  $> 0$ . Par la méthode du noyau. Nous retrouvons ici, en particulier ses résultats, ainsi que ceux de Simon [12].

Enfin nous terminons par un autre exemple de potentiel s'annulant sur une variété non bornée. Il s'agit du potentiel [11]

$$U(x,y) = \left[ \sum_{i < j} (x_i y_j - x_j y_i)^2 \right]^{1/2}, \quad x \in \mathbb{R}^q, \quad y \in \mathbb{R}^q.$$

Nous donnons ici une autre démonstration du résultat de Simon que nous complétons par une étude des  $k^{\text{ième}}$  diamètres de la boule unité de l'espace associé dans  $L^2(\mathbb{R}^{2q})$ .

A notre connaissance c'est le premier exemple de l'estimation de  $k^{\text{ième}}$  diamètre d'espace de Sobolev associé à un potentiel  $U$  ne tendant pas vers  $+\infty$  dans toutes les directions. Nous espérons pouvoir étendre ces résultats à une classe plus large de potentiels, pouvant s'annuler sur une variété non bornée, contenant en particulier des potentiels polynomiaux.

## I. - DEFINITIONS

### 1.1. $k^{\text{ième}}$ diamètre dans un espace vectoriel normé.

Soit  $A$  une partie d'un espace normé  $E$ , on appelle  $k^{\text{ième}}$  diamètre de  $A$  dans  $E$  le nombre

$$d_k(A,E) = \inf_{E_k \in \mathcal{S}_k} \sup_{x \in A} \inf_{y \in E_k} \|x-y\|_E$$

où  $\mathcal{S}_k$  désigne l'ensemble des sous-espaces de dimension  $k$  de  $E$ . On a les propriétés suivantes :

- (i)  $d_0(A,E)$  est le rayon de la plus petite boule centrée à l'origine contenant  $A$ .
- (ii)  $d_k(\alpha A,E) = \alpha d_k(A,E)$  ( $\alpha \geq 0$ )
- (iii)  $A \subset B \Rightarrow d_k(A,E) \leq d_k(B,E)$
- (iv) La suite  $d_k$  est décroissante. De plus, pour que  $d_k \rightarrow 0$  lorsque  $k \rightarrow +\infty$ , il faut et il suffit que  $A$  soit précompact.

Un résultat important est le théorème de Krein ([7] par exemple).

Soit  $E_{k+1}$  un sous-espace de dimension  $k+1$  de  $E$  et  $SE_{k+1}$  la boule unité de  $E_{k+1}$ . Alors

$$d_k(SE_{k+1},E) = 1.$$

Nous renvoyons à C. Goulaouic [5] pour une étude complète.

### 1.2. Formule du mini-max.

Le lien entre la notion de  $n^{\text{ième}}$  diamètre et la théorie spectrale est donnée par la formule du mini-max de Courant-Fischer.

Considérons la situation variationnelle  $(G, H, a)$ , où  $G$  et  $H$  sont deux espaces de Hilbert séparables,  $G$  étant un sous-espace dense dans  $H$ , l'injection de  $G$  dans  $H$  étant compacte, et,  $a$  est une forme sesquilinéaire hermitienne, positive, continue et coercive sur  $G$ .

On note  $A$ , l'opérateur non borné, de domaine  $D(A)$ , dans  $H$ , associé à  $(G, H, a)$  par le lemme de Lax-Milgram.  $A$  est auto-adjoint positif. Son spectre est constitué d'une suite de valeurs propres  $(\lambda_j)_{j \geq 0}$ , réelles positives, de multiplicité finie, tendant vers  $+\infty$ . Il existe alors une base hilbertienne  $(\varphi_j)_{j \geq 0}$  de  $H$ , constituée de valeurs propres de  $A$  et formant un système orthogonal dans  $G$  pour  $a$  telle que

$$G = \left\{ u = \sum_{j=0}^{\infty} u_j \varphi_j ; \sum_{j=0}^{\infty} \lambda_j |u_j|^2 = a(u, u) < +\infty \right\}$$

Si  $S_a G = \{ u \in G ; a(u, u) \leq 1 \}$ ,

On montre que

$$d_k(S_a G, H) = \lambda_k^{-1/2}.$$

## II. - UNE CLASSE D'ESPACES DE SOBOLEV A POIDS SUR $\mathbb{R}^n$

Rappelons d'abord les résultats obtenus dans [8] sur le comportement asymptotique des valeurs propres de l'opérateur :

$$\mathcal{A} = \mathcal{A}_0 + U$$

dans  $\mathbb{R}^n$ , où  $\mathcal{A}_0$  est un opérateur différentiel d'ordre  $2m$ , à coefficients constants, formellement auto-adjoint et où  $U$  est un potentiel tel que

$$(1) \quad U(x) \geq 1 \quad \lim_{|x| \rightarrow +\infty} U(x) = +\infty \quad U \in L_{loc}^{\infty}$$

$$\text{Posons } \mathcal{A}_0(D) = \sum_{\substack{|\alpha| \leq m \\ |\beta| \leq m}} a_{\alpha\beta} D^{\alpha+\beta}.$$

On suppose que les coefficients vérifient  $a_{\alpha\beta} = \overline{a_{\beta\alpha}}$  pour tout  $\alpha, \beta$  et que  $\mathcal{A}_0(D)$  vérifie la condition d'ellipticité suivante.

- (2) Il existe une constante  $E > 0$  telle que, pour tout système de nombres complexes  $\tau = (\tau_\alpha)$ ,  $|\alpha| = m$  nous avons

$$\sum_{|\alpha|=|\beta|=m} a_{\alpha\beta} \tau_\alpha \bar{\tau}_\beta \geq E \sum_{|\alpha|=m} \frac{m!}{\alpha!} |\tau_\alpha|^2$$

$H^m = H^m(\mathbb{R}^n)$  désignant l'espace de Sobolev usuel et posant  $V = U^{1/2}$  notons :

$$H_V^m = \{u \in H^m ; \forall u \in L^2\}$$

$H_V^m$  est un espace de Hilbert muni de la norme naturelle

$$\|u\|_{H_V^m}^2 = \|u\|_{H^m}^2 + \|Vu\|_{L^2}^2$$

Considérons alors la forme intégralo-différentielle

$$a_V(u,v) = a_0(u,v) + \int V^2 u \bar{v} dx$$

où

$$a_0(u,v) = \sum_{\substack{|\alpha| \leq m \\ |\beta| \leq m}} \int a_{\alpha\beta} D^\alpha u \bar{D}^\beta v dx \quad \text{est une forme hermitienne sur } H^m.$$

$a_V(u,v)$  est continue sur  $H_V^m \times H_V^m$  et puisque  $V$  est réel  $a_V(u,v)$  est hermitienne sur  $H_V^m$ . Elle est de plus coercive.

Soit  $A$  l'opérateur non borné dans  $L_2$ , auto-adjoint, engendré par le triplet  $(a_V, H_V^m, L^2)$ .  $A$  est une réalisation auto-adjointe de l'opérateur différentiel

$$\mathcal{A}(\cdot, D) = \mathcal{A}_0(D) + U(\cdot)$$

Le spectre de  $A$  est réel. Soit  $(\lambda_j)$  la suite des valeurs propres de  $A$ , rangées dans l'ordre croissant, répétées suivant la multiplicité. Notons

$$N(\lambda, A) = \sum_{j, \lambda_j \leq \lambda} 1$$

le nombre de valeurs propres  $\lambda_j$  de  $A$  inférieures ou égales à  $\lambda$ . Alors, avec les hypothèses supplémentaires sur  $U(x)$ , (voir [10]).

- (3) Il existe une constante  $C > 0$  telle que :  
 $\sigma(2\lambda, U) \leq C \sigma(\lambda, U)$  pour  $\lambda$  suffisamment grand où  $\sigma(\lambda, U) = \text{mes} \{x ; U(x) < \lambda\}$ ,
- (4) Il existe une constante  $C > 0$  telle que :  
 $U(y) \leq C U(x)$  presque partout, lorsque  $|x-y| \leq 1$ ,

- (5) Il existe une fonction continue  $\eta(t) \geq 0$ ,  $0 \leq t \leq 1$ ,  $\eta(0) = 0$  et un réel  $\beta \in [0,1[$  tels que

$$\int_{\substack{|x-y| \leq 1 \\ |\alpha+z-y| \leq 1}} |U(x+z) - U(x)| dx \leq \eta(|z|) |z|^\beta U(y)^{1 + \frac{\beta}{2m}}$$

pour tout  $y, z \in \mathbb{R}^n$ ,  $|z| \leq 1$ , on a

$$N(\lambda, A) \sim \ell \phi(\lambda, U) \quad \lambda \rightarrow +\infty$$

où  $\phi(\lambda, U)$  est la fonction

$$\phi(\lambda, U) = \int (\lambda - U(x))_+^{\frac{m}{2m}} dx \quad (f_+ \text{ désignant la partie positive de } f)$$

et  $\ell$  une constante qui dépend du symbole principal  $\mathcal{A}'(\xi)$  de  $\mathcal{A}$ .

Nous allons dans ce paragraphe étudier le comportement asymptotique des  $k^{\text{ième}}$  diamètres d'une classe plus générale d'espaces du type ci-dessus.

### 2.1. Les espaces $W_V^{m,p}(\mathbb{R}^n)$ . Énoncé du résultat

Soit  $V : \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}$  vérifiant

$$(1) \quad V(x) \geq 1, \quad V(x) \in L_{loc}^\infty, \quad \lim_{|x| \rightarrow \infty} V(x) = +\infty$$

On suppose de plus que  $V$  vérifie seulement les hypothèses (3) et (4) ci-dessus

$$(3) \quad \sigma(2\lambda, V) \leq C \sigma(\lambda, V) \text{ pour } \lambda \text{ suffisamment grand}$$

$$(4) \quad V(y) \leq C V(x) \text{ presque partout, lorsque } |x-y| \leq 1.$$

Soit  $m$  entier  $\geq 1$ ,  $p$  réel  $> 1$ , on pose

$$W_V^{m,p}(\mathbb{R}^n) = W_V^{m,p} = \left\{ u \in \mathcal{D}'(\mathbb{R}^n), \forall \alpha \text{ avec } |\alpha| \leq m, \int V^{1 - \frac{|\alpha|}{m}} D^\alpha u \in L^p(\mathbb{R}^n) \right\}$$

$W_V^{m,p}$  est un espace de Banach muni de la norme

$$\|u\|_{W_V^{m,p}}^p = \sum_{|\alpha| \leq m} \int V^{1 - \frac{|\alpha|}{m}} |D^\alpha u|^p$$

PROPOSITION 2.1.1. *L'injection  $W_V^{m,p} \hookrightarrow L^p(\mathbb{R}^n)$  est compacte.*

*Démonstration.* On vérifie d'abord que  $W_V^{m,p}$  est réflexif. Puis on montre comme dans [8], lemme 1.1., que l'image de toute suite bornée de  $W_V^{m,p}$  contient une sous-suite qui converge fortement dans  $L^p$ .

On pose

$$N(\lambda) = \sum_{k : d_k^{-1} \leq \lambda} 1, \quad \lambda > 1,$$

où

$$d_k = d_k(S W_V^{m,p}, L^p)$$

$S W_V^{m,p}$  désignant la boule unité de  $W_V^{m,p}$ .

$N(\lambda)$  est donc le nombre de  $k^{\text{ième}}$  diamètres supérieurs ou égaux à  $\frac{1}{\lambda}$ . Puis

$$\phi(\lambda, V) = \int (\lambda - V(x))_+^{n/m} dx.$$

Alors, on a le

THEOREME 2.1.2. *Sous les hypothèses (1), (3), (4) sur le potentiel  $V$ , on a :*

$$N(\lambda) \approx \phi(\lambda, V)$$

( $\approx$  signifiant qu'il existe des constantes  $C_1$  et  $C_2 > 0$  telles que

$$C_2 \phi(\lambda, V) \leq N(\lambda) \leq C_1 \phi(\lambda, V) \quad (\text{pour } \lambda \text{ suffisamment grand}).$$

*Note :* Dans la suite les constantes issues des majorations seront souvent notées par la lettre générale  $C$  ; par conséquent différentes  $C$  se suivent sans être nécessairement égales.

## 2.2. Approximation polynomiale

On considère un réseau laticiel  $\Xi$  de cubes  $Q$  (de  $\mathbb{R}^n$ ), de coté  $\epsilon^{1/m}$ ,  $0 < \epsilon < 1$ . Pour un cube arbitraire  $Q$ , de centre  $x_Q$ , nous notons

$$V_Q^+ = \text{ess sup}_{x \in Q} V(x), \quad V_Q^- = \text{ess inf}_{x \in Q} V(x)$$

Soit  $D_\epsilon = \{Q ; V_Q^- \geq \frac{1}{\epsilon}\}$ . On a :



LEMME 2.2.1. Pour  $u \in W_V^{m,p}$ , il existe  $P_{\underline{z}}u$ , fonction de  $L^p(\mathbb{R}^n)$ , polynomiale dans chaque cube  $Q$ , de degré  $< m$  telle que

$$\|u - P_{\underline{z}}u\|_{L^p(\mathbb{R}^n)} \leq C \epsilon \|u\|_{W_V^{m,p}}$$

$C$  étant une constante  $> 0$ , indépendante de  $\epsilon$  et de  $u$ .

*Démonstration.* Soit  $D$  le sous-ensemble de  $\mathbb{R}^n$ , constitué par les cubes  $Q$  de  $D_\epsilon$ . Sur  $D$ , on approche  $u$  par 0. On a

$$\int_D |u|^p dx \leq \int_D \epsilon^p V^p |u|^p dx = \epsilon^p \int_D V^p |u|^p dx.$$

Sur chaque cube  $Q \notin D_\epsilon$ , on approche  $u \in W_V^{m,p}$  par un polynôme  $P_Q u$  de degré  $\leq m-1$  tel que :

$$\int_Q D^\alpha (u - P_Q u) dx = 0 \quad 0 \leq |\alpha| \leq m-1$$

En utilisant l'inégalité de Poincaré (généralisé) [Cf [2] par exemple] on obtient :

$$\int_Q |u - P_Q u|^p dx \leq C^p \epsilon^p \sum_{|\alpha|=m} \int_Q |D^\alpha u|^p dx$$

où  $C$  est une constante qui ne dépend que de  $m$  et de  $n$ .

Alors si on note  $P_{\underline{z}}$  l'opération qui à  $u \in W_V^{m,p}$  associe 0 sur  $D$  et  $P_Q u$  sur chaque cube  $Q \notin D_\epsilon$  on obtient bien une fonction  $P_{\underline{z}}u$ , polynomiale dans chaque cube telle que

$$\|u - P_{\underline{z}}u\|_{L^p(\mathbb{R}^n)} \leq C \epsilon \|u\|_{W_V^{m,p}}$$

Doù le lemme.

On approche ainsi, à  $\epsilon$  près. Tout élément de la boule unité de  $W_V^{m,p}$ , par un élément d'un sous-espace vectoriel dont la dimension  $k(\epsilon)$  est une fonction de  $\epsilon$ ,  $n$ ,  $m$ ,  $V$ . Considérons maintenant  $E = \{Q : V_Q^- < \frac{1}{\epsilon}\}$ .

Soit  $\varphi \in \mathcal{D}(\mathbb{R}^n)$ , à support dans le cube  $\delta = [-1, 1]^n$ . Soit  $T_Q$  la composée d'une translation et d'un homothétie de telle manière que  $T_Q$  applique  $Q$  sur  $\delta$ . Notons  $\varphi_Q = \varphi \circ T_Q$ . On a donc  $\varphi_Q(x) = \varphi\left(\frac{1}{\epsilon^{1/m}}(x - x_Q)\right)$  où  $x_Q$  est le centre de  $Q$ .

Soit  $E_{\underline{z}}$  l'espace vectoriel engendré par les fonction  $\varphi_Q$ ,  $Q \in E$ . Il est clair que :

$$E_{\underline{z}} \subset W_V^{m,p} \quad \text{et} \quad \dim E_{\underline{z}} = k(\epsilon).$$

On munit  $E_{\underline{z}}$  de la norme induite par  $L^p(\mathbb{R}^n)$ .

LEMME 2.2.2. Soit  $S \in E_{\epsilon}$  la boule unité de  $E_{\epsilon}$ . Alors

$$S \in E_{\epsilon} \subset B \epsilon^{-1} S W_V^{m,p}$$

avec  $B > 0$ , indépendante de  $\epsilon$ .

Démonstration. Il suffit de prouver que, si  $f_{\gamma} = \sum_{Q \in E} \gamma_Q \varphi_Q$

$$\|f_{\gamma}\|_{W_V^{m,p}} \leq B \epsilon^{-1} \|f_{\gamma}\|_{L^p(\mathbb{R}^n)}$$

où  $B$  est une constante  $> 0$  indépendante de  $\epsilon$ .

Or

$$\begin{aligned} \|f_{\gamma}\|_{L^p(\mathbb{R}^n)}^p &= \int_{\mathbb{R}^n} \left| \sum_Q \gamma_Q \varphi_Q(x) \right|^p dx = \sum_Q |\gamma_Q|^p \int_Q |\varphi_Q(x)|^p dx \\ &= \sum_Q |\gamma_Q|^p \epsilon^{n/m} \int_{\delta} |\varphi(y)|^p dx = C_1 \sum_Q |\gamma_Q|^p \epsilon^{n/m} \end{aligned}$$

D'autre part :

$$\begin{aligned} \|f_{\gamma}\|_{W_V^{m,p}}^p &= \sum_{|\alpha| \leq m} \int_{\mathbb{R}^n} V^{(1-\frac{|\alpha|}{m})p}(x) \left| \sum_Q \gamma_Q D^{\alpha} \varphi_Q(x) \right|^p dx \\ &= \sum_{|\alpha| \leq m} \sum_Q |\gamma_Q|^p \int_Q V^{(1-\frac{|\alpha|}{m})p}(x) |D^{\alpha} \varphi_Q(x)|^p dx \end{aligned}$$

Mais sur chaque cube  $Q$  de  $E$ ,  $V_Q^{-1} < \frac{1}{\epsilon}$ , et donc compte tenu de l'hypothèse (4) sur  $V$ , on a  $V(x) < \frac{c}{\epsilon}$  presque partout sur  $Q$ . Alors :

$$\begin{aligned} \|f_{\gamma}\|_{W_V^{m,p}}^p &\leq C \sum_{|\alpha| \leq m} \sum_Q |\gamma_Q|^p \frac{1}{\epsilon^{(1-\frac{|\alpha|}{m})p}} \int_Q |D^{\alpha} \varphi_Q(x)|^p dx \\ &\leq C \sum_{|\alpha| \leq m} \sum_Q |\gamma_Q|^p \frac{1}{\epsilon^{(1-\frac{|\alpha|}{m})p}} \int_Q \frac{1}{\epsilon^{|\alpha|p}} |(D^{\alpha} \varphi)_Q(x)|^p dx \\ &\leq C \sum_{|\alpha| \leq m} \sum_Q |\gamma_Q|^p \frac{1}{\epsilon^p} \int_{\Delta} \epsilon^{n/m} |D^{\alpha} \varphi|^p dx \\ &\leq C \sum_Q |\gamma_Q|^p \epsilon^{n/m} \epsilon^{-p} \sum_{|\alpha| \leq m} \int_{\Delta} |D^{\alpha} \varphi|^p dx \end{aligned}$$

Finalement, il existe  $B^p > 0$  telle que :

$$\|f_\gamma\|_{W_V^{m,p}}^p \leq B^p \epsilon^{-p} \|f_\gamma\|_{L^p(\mathbb{R}^1)}^p.$$

D'où le résultat.

$k(\epsilon)$  étant le nombre des cubes de  $E$ , nous donnons maintenant une estimation de  $k(\epsilon)$  en fonction de  $\epsilon$ , puis de  $\phi(\frac{1}{\epsilon}, V)$ . Nous établissons auparavant une propriété de la fonction  $\phi(\lambda, V)$ .

LEMME 2.2. Soit  $a > 0$ , alors il existe une constante  $b = b(a) > 0$  telle que :

$$\phi(a\lambda, V) \leq b \phi(\lambda, V)$$

pour  $\lambda$  suffisamment grand.

*Démonstration.* Tout d'abord, il est clair que la condition (3) entraîne :

$$\sigma(a\lambda, V) \leq d \sigma\left(\frac{\lambda}{2}, V\right)$$

la constante  $d$  étant obtenue par itération de la condition (3). De l'inégalité  $a\lambda - V \leq a\lambda$ , on déduit  $(a\lambda - V)_+ \leq a\lambda I_{[V < a\lambda]}$  où  $I_{[V < a\lambda]}$  est la fonction caractéristique de  $\{x : V(x) < a\lambda\}$ . D'où :

$$\int (a\lambda - V)_+^{n/m} dx \leq a^{n/m} \lambda^{n/m} \sigma(a\lambda, V) \leq d 2^{n/m} a^{n/m} \left(\frac{\lambda}{2}\right)^{n/m} \sigma\left(\frac{\lambda}{2}, V\right)$$

Or, pour  $V \leq \frac{\lambda}{2}$ , on a  $\lambda - V \geq \frac{\lambda}{2}$  et donc

$$\left(\frac{\lambda}{2}\right)^{n/m} \sigma\left(\frac{\lambda}{2}, V\right) \leq \int (\lambda - V(x))_+^{n/m} dx.$$

D'où le résultat.

LEMME 2.2.3.

$$k(\epsilon) \approx \frac{1}{\epsilon^{n/m}} \int_{V(x) < \frac{1}{\epsilon}} dx.$$

*Démonstration.* Soit  $E' = \{Q \in E ; V_Q^+ \geq \frac{1}{\epsilon}\}$ .  $V$  vérifiant l'hypothèse (4), on en déduit pour chaque  $Q \in E'$ ,  $\frac{1}{C\epsilon} \leq V(x)$  presque partout,  $\forall x \in Q$ .

Alors, si  $h(\epsilon)$  est le nombre de cubes de  $E'$ , on a :

$$h(\epsilon)\epsilon^{n/m} \leq k(\epsilon) \epsilon^{n/m} - \sigma\left(\frac{1}{C\epsilon}, V\right)$$

$$\text{soit } \frac{h(\epsilon)}{k(\epsilon)} \leq 1 - \frac{\sigma(\frac{1}{C\epsilon}, V)}{k(\epsilon)\epsilon^{n/m}}.$$

Mais, pour tout  $Q \in E$ ,  $V_Q^+ < \frac{C}{\epsilon}$ , puisque  $V_Q^- < \frac{1}{\epsilon}$ , et donc

$$k(\epsilon)\epsilon^{n/m} \leq \sigma(\frac{C}{\epsilon}, V)$$

De plus, utilisant l'hypothèse (3), on peut trouver des constantes  $a_1, a_2$  telles que

$$\frac{1}{a_2} \sigma(\frac{1}{\epsilon}, V) \leq \sigma(\frac{1}{C\epsilon}, V), \quad \sigma(\frac{C}{\epsilon}, V) \leq a_2 \sigma(\frac{1}{\epsilon}, V)$$

et donc

$$\frac{1}{a_1 a_2} \leq \frac{\sigma(\frac{1}{C\epsilon}, V)}{\sigma(\frac{1}{\epsilon}, V)}$$

On en déduit

$$\frac{1}{a_1 a_2} \leq 1 - \frac{h(\epsilon)}{k(\epsilon)}$$

D'autre part il est clair que :

$$\epsilon^{n/m}(k(\epsilon) - h(\epsilon)) \leq \int_{V(x) < \frac{1}{\epsilon}} 1 \, dx \leq \epsilon^{n/m} k(\epsilon)$$

Ce qui donne

$$1 \leq \frac{n(\epsilon)}{\frac{1}{\epsilon^{n/m}} \int_{V(x) < \frac{1}{\epsilon}} 1 \, dx} \leq \frac{1}{1 - \frac{h(\epsilon)}{k(\epsilon)}} \leq a_1 a_2.$$

LEMME 2.2.4.

$$\frac{1}{\epsilon^{n/m}} \int_{V(x) < \frac{1}{\epsilon}} 1 \, dx \approx \phi(\frac{1}{\epsilon}, V)$$

*Démonstration.* Notons  $I_{[V < \frac{1}{\epsilon}]}$  la fonction caractéristique de  $\{x ; V(x) < \frac{1}{\epsilon}\}$ . On a :

$$\frac{1}{\epsilon} I_{[V < \frac{1}{\epsilon}]} \leq (\frac{2}{\epsilon} - V)_+$$

D'où

$$\frac{1}{\epsilon^{n/m}} \int_{V(x) < \frac{1}{\epsilon}} 1 \, dx \leq \int (\frac{2}{\epsilon} - V)_+^{n/m} \, dx$$

Ce qui donne en utilisant le lemme 2.2.2.

$$\frac{1}{\epsilon^{n/m}} \int_{V(x) < \frac{1}{\epsilon}} dx \leq C \phi\left(\frac{1}{\epsilon}, V\right)$$

Inversement l'inégalité

$$\left(\frac{1}{\epsilon} - V(x)\right)_+ \leq \frac{1}{\epsilon} \mathbb{1}_{\left[V < \frac{1}{\epsilon}\right]}$$

entraîne

$$\phi\left(\frac{1}{\epsilon}, V\right) \leq \frac{1}{\epsilon^{n/m}} \int_{V(x) < \frac{1}{\epsilon}} dx.$$

### 2.3. Démonstration du théorème 2.1.2.

Posons  $k(\epsilon) = l(\epsilon) + 1$ ,  $d_{k(\epsilon)}(S W_V^{m,p}, L^p(\mathbb{R})) = d_{k(\epsilon)}$ .

D'après le lemme 2.2.1., il existe une constante  $C$  telle que :

$$d_{k(\epsilon)} \leq C\epsilon,$$

d'où

$$d_k\left(\frac{\epsilon}{C}\right) \leq \epsilon$$

Prenons  $\epsilon = \frac{1}{\lambda}$ , alors les lemmes 2.2.3. et 2.2.4. donnent :

$$N(\lambda) \leq k\left(\frac{\epsilon}{C}\right) \leq A \int \left(\frac{C}{\epsilon} - V\right)_+^{n/m} dx.$$

Et, en utilisant le lemme 2.2.2.

$$N(\lambda) \leq C_1 \int \left(\frac{1}{\epsilon} - V\right)_+^{n/m} dx = C_1 \phi(\lambda, V).$$

La minoration de  $d_{l(\epsilon)}$  s'obtient en utilisant le théorème de Krein, les propriétés des  $k^{\text{ièmes}}$  diamètres [Cf. § 1.1] et le lemme 2.2. Ce qui donne  $d_{l(\epsilon)} \geq B\epsilon$ , d'où  $d_{l\left(\frac{\epsilon}{B}\right)} \geq \epsilon$ .

Et pour  $\epsilon = \frac{1}{\lambda}$ , d'après les lemmes 2.2.3 et 2.2.4., on a donc

$$N(\lambda) \geq l\left(\frac{\epsilon}{B}\right) \geq C \int \left(\frac{B}{\epsilon} - V\right)_+^{n/m} dx$$

D'où en utilisant le lemme 2.2.

$$N(\lambda) \geq C_2 \int \left(\frac{1}{\epsilon} - V\right)_+^{n/m} dx = C_2 \phi(\lambda, V).$$

Ceci termine la preuve du théorème.

**III. - OPERATEURS DE SCHRODINGER A POTENTIEL «DEGENERE»**

Dans ce paragraphe nous abordons le cas de potentiels qui ne tendent pas vers l'infini dans toutes les directions.

Nous considérons les potentiels définis sur  $\mathbb{R}^n$  par :

$$U(x,y) = |x|^{2\sigma} |y|^{2\sigma'}, \quad x \in \mathbb{R}^p, y \in \mathbb{R}^q, \quad p+q = n \quad (p,q \geq 1)$$

avec  $\sigma, \sigma'$  réels  $> 0$ .

Nous traiterons d'abord le cas  $n = 2$ . Puis nous terminerons par l'exemple d'un potentiel proposé par Feynman

$$U(x,y) = |x \wedge y|, \quad x \in \mathbb{R}^p, y \in \mathbb{R}^p, \quad p \geq 2.$$

On considère donc, comme dans le § II, pour chacun de ces potentiels, l'espace de Hilbert :

$$H_V^1 = H_V^1(\mathbb{R}^n) = \{u \in H^1(\mathbb{R}^n), \forall u \in L^2(\mathbb{R}^n)\} \quad \text{où } V = U^{1/2}$$

et on étudie le  $k^{\text{ième}}$  diamètre de la boule unité de  $H_V^1$  dans  $L$ . On établit d'abord une propriété des espaces  $H_V^1$ .

**PROPOSITION 3.0.**  $\mathcal{D}(\mathbb{R}^n)$  est dense dans  $H_V^1$ .

*Démonstration.* Par troncature et régularisation. Soit  $\Psi \in \mathcal{D}(\mathbb{R}^n)$  telle que  $\Psi(x) = 1$  si  $|x| \leq 1$ ,  $\Psi(x) = 0$  si  $|x| \geq 2$ . Posons  $\Psi_j(x) = \Psi(\frac{x}{j})$ ,  $j \in \mathbb{N}^*$ . Si  $u \in H^1(\mathbb{R}^n)$ , on sait que  $\Psi_j u \rightarrow u$  ( $j \rightarrow +\infty$ ) dans  $H^1(\mathbb{R}^n)$ . De plus  $\forall \Psi_j u \rightarrow V u$  (simplement) et par hypothèse  $\forall u \in L^2$  avec  $|\Psi_j u| \leq |Vu|$ . D'après le théorème de la convergence dominée,  $\Psi_j u \rightarrow V u$  dans  $L^2(\mathbb{R}^n)$ . On en déduit que  $\Psi_j u$  converge vers  $u$  dans  $H_V^1$ . Donc l'ensemble des fonctions à support compact est dense dans  $H_V^1$ . Soit alors  $u \in H_V^1$  à support compact. Par régularisation, on obtient une suite  $(u_i)_{i \in \mathbb{N}}$   $u_i \in \mathcal{D}(\mathbb{R}^n)$  qui converge vers  $u$  pour la topologie de  $H^1(\mathbb{R}^n)$ . Soit  $B(0,1)$  la boule unité fermée de  $\mathbb{R}^n$ .

On a,  $\text{supp } |u_i - u| \subset \text{supp } u + B(0,1) = K$ , avec  $K$  compact. Alors, il existe une constante  $C > 0$ ,  $C = \sup_{x \in K} V(x)$ , ( $V$  continue) telle que

$$\int_{\mathbb{R}^n} |Vu_i - Vu|^2 dx \leq C \int_{\mathbb{R}^n} |u_i - u|^2 dx.$$

D'où  $(u_i)_{i \in \mathbb{N}}$  converge vers  $u$  dans  $H_V^1$ .

### 3.1. Espace $H_{\sigma,\sigma'}^1$ ,

Soit  $V(x,y) = |x|^\sigma |y|^{\sigma'}$ ,  $(x,y) \in \mathbb{R}^2$ .  $\sigma > 0$ ,  $\sigma' > 0$ . L'espace  $H_V^1$  sera noté  $H_{\sigma,\sigma'}^1$ .

On a le :

THEOREME 3.1.

a) L'injection  $H_{\sigma,\sigma'}^1 \hookrightarrow L^2$  est compacte

b) Soit  $S$  la boule unité de  $H_{\sigma,\sigma'}^1$ ,  $d_k = d_k(S, L^2)$ .

Alors

$$1) \text{ si } \sigma' < \sigma \quad d_k \approx \left(\frac{1}{k}\right)^{\sigma'/(1+\sigma+\sigma')}$$

$$2) \text{ si } \sigma = \sigma' \quad d_k \approx \left(\frac{\log k}{k}\right)^{\sigma/(1+2\sigma)}$$

$$3) \text{ si } \sigma' > \sigma \quad d_k \approx \left(\frac{1}{k}\right)^{\sigma/(1+\sigma+\sigma')}.$$

#### 3.1.1. Démonstration de la partie a) du théorème.

Elle est basée sur la proposition suivante :

PROPOSITION 3.1.1. Il existe une constante  $C > 0$  telle que pour tout  $u \in H_{\sigma,\sigma'}^1$ ,

$$\int_{\mathbb{R}^2} |x|^{2\sigma/(1+\sigma')} |u|^2 \, dx \, dy \leq C \|u\|_{H_{\sigma,\sigma'}^1}^2$$

$$\int_{\mathbb{R}^2} |y|^{2\sigma'/(1+\sigma)} |u|^2 \, dx \, dy \leq C \|u\|_{H_{\sigma,\sigma'}^1}^2.$$

*Démonstration.* A cause des symétries évidentes, il suffit de montrer que pour  $x > 0$ ,  $y > 0$ , il existe  $C > 0$  telle que :

$$I = \int_{\mathbb{R}_+^2} x^{2\sigma/(1+\sigma')} |u|^2 \, dx \, dy \leq C \|u\|_{H_{\sigma,\sigma'}^1}^2$$

pour tout  $u \in \mathcal{D}(\mathbb{R}^2)$  (Proposition 3.0).

Soit

$$A_1 = \{(x,y), x^{\sigma/(1+\sigma')} y \leq 1\}, \quad A_2 = \{(x,y), x^{\sigma/(1+\sigma')} > 1\}$$

. Pour  $\sigma' \leq 1$ , écrivons

$$I = \int_{A_1} x^{2\sigma/(1+\sigma')} |u|^2 \, dx \, dy + \int_{A_2} x^{2\sigma/(1+\sigma')} |u|^2 \, dx \, dy = I_1 + I_2.$$

On a

$$I_1 = \int_{A_1} x^{2\sigma/(1+\sigma')-\sigma} x^\sigma y^{1-\sigma'} y^{\sigma'-1} |u|^2 dx dy$$

$$\leq \int_{\mathbb{R}_+^2} x^\sigma y^{\sigma'-1} |u|^2 dx dy, \text{ car } \sigma' \leq 1.$$

D'où

$$I_1 \leq C \int_{\mathbb{R}_+^2} x^\sigma y^{\sigma'} |u| \left| \frac{\partial u}{\partial y} \right| dx dy \quad (\text{en intégrant par parties}).$$

$$\leq C \|u\|_{H_{\sigma,\sigma'}^1}^2$$

De même

$$I_2 = \int_{A_2} x^{2\sigma/(1+\sigma')-2\sigma} x^{2\sigma} y^{2\sigma'} y^{-2\sigma'} |u|^2 dx dy$$

$$\leq \int_{A_2} x^{2\sigma} y^{2\sigma'} |u|^2 dx dy \leq C \|u\|_{H_{\sigma,\sigma'}^1}^2 \quad (\text{car } \sigma' > 0)$$

. Pour  $2^n - 1 < \sigma' \leq 2^{n+1} - 1$  ( $n \geq 1$ ), on a par itération :

$$I \leq C \left( \int_{\mathbb{R}_+^2} x^{2^{n+1}\sigma/(1+\sigma')} y^{2^{n+1}-2} |u|^2 dx dy + \int_{\mathbb{R}_+^2} \left| \frac{\partial u}{\partial y} \right|^2 dx dy \right).$$

En appliquant la méthode précédente à la première intégrale du second membre, on obtient le résultat.

On montre de même que :

$$\int_{\mathbb{R}_+^2} y^{2\sigma'/(1+\sigma)} |u|^2 dx dy \leq C \|u\|_{H_{\sigma,\sigma'}^1}^2$$

D'où la proposition.

Si  $W(x,y)$  est un potentiel tel que  $W(x,y) \rightarrow +\infty$  lorsque  $|(x,y)| \rightarrow +\infty$  on sait que dans ce cas l'injection de  $H_W^1 = \{u \in H^1, W^{1/2} u \in L^2\}$  dans  $L^2$  est compacte. Prenons  $W(x,y) = |x|^{2\sigma/(1+\sigma')} + |y|^{2\sigma'/(1+\sigma)}$ . D'après la proposition 3.1.1., l'injection de  $H_{\sigma,\sigma'}^1$  dans  $H_W^1$  est continue. Donc l'injection de  $H_{\sigma,\sigma'}^1$  dans  $L^2$  est compacte.

### 3.1.2. Subdivision de $\mathbb{R}_+^2$

A cause des symétries, on se limite encore ici à  $x > 0, y > 0$ .



Soit  $\epsilon > 0$ ,  $0 < \epsilon < 1$ . On considère un réseau  $\Xi$  de carrés  $Q$ , de côté  $\epsilon$ , les côtés étant parallèles aux axes. Pour un carré  $Q$ , de centre  $\xi_Q = (x_Q, y_Q)$  nous notons

$$V_Q^+ = \sup_{(x,y) \in Q} V(x,y), \quad V_Q^- = \inf_{(x,y) \in Q} V(x,y)$$

Soit  $E$  le domaine constitué par les carrés tels que  $V_Q^- < \epsilon^{-1}$

Soit  $D$  le domaine constitué par les carrés tels que  $V_Q^+ \geq \epsilon^{-1}$

On partage  $E$  en trois domaines  $D_1, D_2, D_3$  :  $D_2$  étant constitué par les carrés  $Q$  tels que  $0 < y < \epsilon$ ,  $x > \epsilon \frac{-1+\sigma'}{\sigma}$ ,  $D_3$  par les carrés tels que  $0 < x < \epsilon$ ,  $y > \epsilon \frac{-1+\sigma'}{\sigma}$ .

LEMME 3.1.2. Pour  $u \in H_{\sigma, \sigma'}^1$ , il existe  $P_{\Xi} u$ , fonction de  $L^2(\mathbb{R}^2)$ , polynomiale dans chaque carré  $Q$ , telle que :

$$\|u - P_{\Xi} u\|_{L^2} \leq C \epsilon \|u\|_{H_{\sigma, \sigma'}^1}$$

$C$  étant une constante  $> 0$ , indépendante de  $\epsilon$  et de  $u$ .

*Démonstration.*

a) Dans chaque carré  $Q$  de  $D$ , on définit  $P_Q u = 0$  puisque :

$$\int_D |u|^2 dx dy \leq \int_D \epsilon^2 V^2 |u|^2 dx dy \leq \epsilon^2 \|u\|_{H_{\sigma, \sigma'}^1}^2,$$

b) Dans chaque carré de  $D_2, D_3$ , on prend  $P_Q u = 0$  compte-tenu de la proposition 3.1.1., puisque l'on a  $\epsilon^2 x^{2\sigma/(1+\sigma')} > 1$  ou  $\epsilon^2 y^{2\sigma'/(1+\sigma)} > 1$  sur chaque carré de  $D_2, D_3$ .

c) Dans chaque carré de  $D_1$ , on définit  $P_Q u$  comme le polynôme (de degré 0) tel que  $\int_Q (u - P_Q u) dx dy = 0$ .

En utilisant l'inégalité de Poincaré, on obtient :

$$\begin{aligned} \int_Q |u - P_Q u|^2 dx dy &\leq C \epsilon^2 \sum_{|\alpha|=1} \int_Q |D^\alpha u|^2 dx dy \\ &\leq C \epsilon^2 \|u\|_{H_{\sigma, \sigma'}^1}^2 \end{aligned}$$

D'où le lemme.

On a ainsi approché à  $\epsilon$  près tout élément de la boule unité de  $H_{\sigma, \sigma'}^1$ , par un élément d'un sous-espace vectoriel de  $L^2(\mathbb{R}^2)$  dont la dimension  $k(\epsilon) = k$  est une fonction de  $\epsilon$  et de  $V$ .

On considère maintenant comme dans 2.2. une fonction  $\varphi \in \mathcal{D}(\mathbb{R}^2)$  à support dans

le carré  $\mathcal{I} = ([-1,1])^2$  et les fonctions  $\varphi_Q = \varphi \circ T_Q$ . Soit  $E_k$ , l'espace vectoriel engendré par les fonctions  $\varphi_Q$ ,  $Q \in D_1$ , muni de la norme  $L^2$ . Il est clair que

$$(1) \quad E_k \subset H_{\sigma, \sigma'}^1 \text{ et } \dim E_k = k.$$

On obtient le

LEMME 3.1.3. Soit  $S E_k$  la boule unité de  $E_k$ . Alors il existe une constante  $B$  indépendante de  $\epsilon$  telle que

$$S E_k \subset B \epsilon^{-1} S H_{\sigma, \sigma'}^1.$$

*Démonstration.* On reprend la démonstration du lemme 2.2.2.

Il suffit de remarquer que, pour les carrés traversés par la frontière de  $D_1$ , c'est-à-dire les carrés de  $D_1$  tels que  $V_Q^+ \geq \epsilon^{-1}$ , il existe une constante  $A > 0$ , indépendante de  $\epsilon$  et de  $Q$  telle que

$$(2) \quad V_Q^+ \leq \frac{A}{\epsilon} \quad Q \in D_1.$$

Ceci se démontre en utilisant, par exemple, le théorème des accroissements finis.

### 3.1.3. Estimation de $k = k(\epsilon)$

Des comparaisons sur les aires (en utilisant (2) par exemple) donnent

$$k(\epsilon) \approx \frac{1}{\epsilon^2} \int_{\substack{0 \leq V \leq \epsilon \\ 0 \leq y \leq \epsilon \\ V(x,y) \leq \epsilon^{-1}}} \frac{-1+\sigma'}{\sigma} dx dy$$

D'où

$$(3) \quad \left\{ \begin{array}{ll} k \approx \epsilon^{-\frac{1+\sigma+\sigma'}{\sigma'}} + \epsilon^{-\frac{1+\sigma+\sigma'}{\sigma}} & \text{si } \sigma \neq \sigma' \\ k \approx \epsilon^{-\frac{1+2\sigma}{\sigma}} \text{Log} \frac{1}{\epsilon} & \text{si } \sigma = \sigma' \end{array} \right.$$

### 3.1.4. Démonstration du théorème 3.1.b)

La majoration de  $d_k$  est immédiate en utilisant (3) et le lemme 3.1.2. La minoration de  $d_k$  s'obtient en utilisant (3), (1), le lemme 3.1.3. et le théorème de Krein [§ 1.1].

### 3.2. Généralisation

On considère  $n = p + q$ ,  $x \in \mathbb{R}^p$ ,  $y \in \mathbb{R}^q$ ,  $\sigma > 0$ ,  $\sigma' > 0$

$$V(x,y) = |x|^\sigma |y|^{\sigma'} \quad |x| = |x_1| + \dots + |x_p|, |y| = |y_1| + \dots + |y_q|$$

Soit

$$H_{\sigma,\sigma'}^{1,n} = \{u \in H^1(\mathbb{R}^n); \forall u \in L^2(\mathbb{R}^n)\}.$$

On obtient alors :

#### THEOREME 3.2.

a) L'injection  $H_{\sigma,\sigma'}^{1,n} \hookrightarrow L^2$  est compacte.

b) Soit  $S$   $H_{\sigma,\sigma'}^{1,n}$ , la boule unité de  $H_{\sigma,\sigma'}^{1,n}$ . Notons  $d_n = d_n(S, L^2)$  alors

$$1) \text{ si } q\sigma < p\sigma', \quad d_k \approx \left(\frac{1}{k}\right)^{\sigma/(p(1+\sigma+\sigma'))}$$

$$2) \text{ si } q\sigma = p\sigma', \quad d_k \approx \left(\frac{\text{Log } k}{k}\right)^{\sigma/(p(1+\sigma+\sigma'))}$$

$$3) \text{ si } q\sigma > p\sigma', \quad d_k \approx \left(\frac{1}{k}\right)^{\sigma'/(q(1+\sigma+\sigma'))}.$$

*Démonstration.* La proposition 3.1.1. donne pour  $i = 1, \dots, p$ .

$$\begin{aligned} \int_{\mathbb{R}_+^n} x_i^{2\sigma/(1+\sigma')} |u|^2 d\xi &\leq C \left( \int_{\mathbb{R}_+^n} x_i^{2\sigma} y_1^{2\sigma'} |u|^2 d\xi + \int_{\mathbb{R}_+^n} \left| \frac{\partial u}{\partial y_1} \right|^2 d\xi \right) \\ &\leq C \|u\|_{H_{\sigma,\sigma'}^{1,n}}^2 \end{aligned}$$

De même pour  $i = 1, 2, \dots, q$

$$\int_{\mathbb{R}_+^n} y_i^{2\sigma'/(1+\sigma)} |u|^2 d\xi \leq C \|u\|_{H_{\sigma,\sigma'}^{1,n}}^2$$

On en déduit la compacité de l'injection de  $H_{\sigma,\sigma'}^{1,n}$ , dans  $L^2$  comme dans 3.1.1. Puis on considère de même dans  $\mathbb{R}_+^n$  un réseau de cubes  $Q$  de côté  $\epsilon$  et les domaines  $E$  et  $D$  constitués par les cubes tels

que  $V_Q^- < \epsilon^{-1}$  et  $V_Q \geq \epsilon^{-1}$ , puis les domaines pour lesquels  $x_i > \epsilon^{-\frac{1+\sigma'}{\sigma}}$ ,  $y_i > \epsilon^{-\frac{1+\sigma}{\sigma'}}$ .

Les lemmes 3.1.2. et 3.1.3. s'écrivent immédiatement.

Estimons  $k(\epsilon)$ . On a :

$$k(\epsilon) \approx \frac{1}{\epsilon^{p+q}} \int_{\substack{0 \leq x_i \leq \epsilon^{-\frac{1+\sigma'}{\sigma}} \\ 0 \leq y_i \leq \epsilon^{-\frac{1+\sigma}{\sigma'}} \\ V(x,y) \leq \epsilon^{-1}}} d\xi \quad \begin{matrix} i=1,\dots,p \\ i=1,\dots,q \end{matrix}$$

En procédant par exemple par minoration et majoration, on obtient :

$$\begin{matrix} \text{si} & q\sigma \neq p\sigma' & k(\epsilon) \approx \epsilon^{-\frac{1+\sigma+\sigma'}{\sigma} p} + \epsilon^{-\frac{1+\sigma+\sigma'}{\sigma'} q} \\ & q\sigma = p\sigma' & k(\epsilon) \approx \epsilon^{-\frac{1+\sigma+\sigma'}{\sigma'} q} \text{Log } \epsilon^{-\frac{1+\sigma'}{\sigma}} \end{matrix}$$

En raisonnant comme dans 3.1.4., on obtient le théorème.

### 3.3. Le «modèle» de Feynman

Soit  $q \geq 2$ ,  $x \in \mathbb{R}^q$ ,  $y \in \mathbb{R}^q$ ,  $(x,y) \in \mathbb{R}^{2q}$

$$W(x,y) = |x \wedge y| = \left[ \sum_{i < j} (x_i y_j - x_j y_i)^2 \right]^{1/2}$$

Dans [11], B. Simon montre que l'opérateur

$$-\Delta_x - \Delta_y + W$$

a un spectre purement discret. Nous donnons ici une autre démonstration de ce résultat que nous complétons par une estimation du  $k^{\text{ième}}$  diamètre de la boule unité de l'espace associé dans  $L^2$ . Pour des commodités d'écriture, nous considérons le potentiel

$$U(x,y) = \sum_{i < j} |x_i y_j - x_j y_i|$$

et l'espace  $H_V^1 = \{u \in H^1, \forall u \in L^2\}$ . où  $V = U^{1/2}$ .

PROPOSITION 3.3.1. Il existe une constante  $C > 0$ , telle que, pour tout  $u \in H_V^1$

$$(4) \quad \int_{\mathbb{R}^{2q}} \sum_i (|x_i|^{2/3} + |y_i|^{2/3}) |u|^2 dx dy \leq C \|u\|_{H_V^1}^2.$$

*Démonstration.* En vertu de la proposition 3.0. il suffit de considérer  $u \in \mathcal{D}(\mathbb{R}^{2q})$ . D'autre part, les  $x_i, y_i$  jouant des rôles symétriques, il vous suffit de démontrer par exemple, pour  $i, j$  quelconques,  $i \neq j$ , que :

$$(5) \int_{\mathbb{R}^{2q}} |x_i|^{2/3} |u|^2 dx dy \leq C \left( \int_{\mathbb{R}^{2q}} |x_i y_j - x_j y_i| |u|^2 dx dy + \int_{\mathbb{R}^{2q}} \left| \frac{\partial u}{\partial y_i} \right|^2 dx dy \right)$$

On en déduit immédiatement (4).

Posons

$$B_1 = \{(x,y) \in \mathbb{R}^{2q} \mid |x_i y_j - x_j y_i| |x_i|^{-2/3} \leq 1\}, B_2 = \mathbb{R}^{2q} - B_1.$$

Ecrivons

$$\begin{aligned} I &= \int_{\mathbb{R}^{2q}} |x_i|^{2/3} |u|^2 dx dy = \int_{B_1} |x_i|^{2/3} |u|^2 dx dy + \int_{B_2} |x_i|^{2/3} |u|^2 dx dy \\ &= \int_{B_1} |x_i| |x_i y_j - x_j y_i|^{-1/2} |x_i|^{-1/3} |x_i y_j - x_j y_i|^{1/2} |u|^2 dx dy \\ &\quad + \int_{B_2} |x_i|^{2/3} |x_i y_j - x_j y_i|^{-1} |x_i y_j - x_j y_i| |u|^2 dx dy \end{aligned}$$

Alors

$$\begin{aligned} I &\leq \int_{\mathbb{R}^{2q}} |x_i| |x_i y_j - x_j y_i|^{-1/2} |u|^2 dx dy + \int_{\mathbb{R}^{2q}} |x_i y_j - x_j y_i| |u|^2 dx dy \\ &\leq C \left( \int_{\mathbb{R}^{2q}} |x_i y_j - x_j y_i|^{1/2} |u| \left| \frac{\partial u}{\partial y_j} \right| dx dy + \int_{\mathbb{R}^{2q}} |x_i y_j - x_j y_i| |u|^2 dx dy \right) \end{aligned}$$

D'où l'inégalité cherchée en utilisant l'inégalité de Cauchy-Schwarz. On obtient alors le :

THEOREME 3.3.2.

a) L'injection de  $H_V^1$  dans  $L^2$  est compacte.

b) Soit  $S$   $H_V^1$  la boule unité de  $H_V^1$ ,  $d_k = d_k(S, L^2)$  alors

$$d_k \approx \left(\frac{1}{K}\right)^{1/(4(q+1))}.$$

*Démonstration.* On procède comme dans 3.1.1. et 3.1.2. La compacité de l'injection est immédiate (corollaire de 3.3.1.). On considère le réseau laticiel  $\mathbb{Z}$  de cubes  $Q$  (de  $\mathbb{R}^{2q}$ ) de côté  $\epsilon$ , les domaines  $D = \{Q; V_Q^- \geq \epsilon^{-1}\}$ ,  $E = \{Q; V_Q^- < \epsilon^{-1}\}$  et les sous-domaines  $D_i$  de  $E$  pour lesquels  $x_i > \epsilon^{-3}$ , et  $D'_i$  pour lesquels  $y_i > \epsilon^{-3}$ . Soit  $F = \{Q \in E; |x_i| \leq \epsilon^{-3} \text{ et } |y_i| \leq \epsilon^{-3} \text{ pour } i = 1, 2, \dots, q\}$ . On approche  $u$  par 0 dans  $D$ ,  $D_i$ ,  $D'_i$ , et par un polynôme de degré 0 dans chaque cube de  $F$ . Le lemme 3.1.2. s'écrit immédiatement.

De même pour établir le lemme 3.1.3., il suffit de démontrer qu'il existe une constante  $A > 0$ , telle que

$$(6) \quad V_Q^+ \leq \frac{A}{\epsilon}, \quad \forall Q \in F, \text{ ou encore } V_Q^{+2} \leq \frac{A}{\epsilon^2}.$$

Or si  $Q \in F$ , il existe  $(x_0, y_0)$  tel que  $V_Q^2(x_0, y_0) \leq \frac{1}{\epsilon^2}$ . Alors pour

$$(x, y) \in Q, |V_Q^2(x, y) - V_Q^2(x_0, y_0)| \leq C \epsilon M$$

où

$$M = \sup_{i, j, (x, y) \in Q} \left\{ \left| \frac{\partial V^2}{\partial x_i} \right| ; \left| \frac{\partial V^2}{\partial y_j} \right| \right\}$$

Comme  $M \leq \frac{q}{\epsilon^3}$  pour tout cube  $Q$  de  $F$ , on a bien l'inégalité (6). L'estimation de  $k = k(\epsilon)$  s'obtient

comme précédemment. ( $k(\epsilon)$  étant le nombre de cubes du réseau) on a :

$$k \approx \frac{1}{\epsilon^{2q}} \int_{\substack{|x_i| \leq \epsilon^{-3} \\ |y_i| \leq \epsilon^{-3} \\ V(x, y) \leq \epsilon^{-1}}} d\xi \quad \begin{matrix} i=1, 2, \dots, q \\ i=1, 2, \dots, q \end{matrix}$$

ce qui donne

$$(7) \quad k \approx \frac{1}{\epsilon^{4(q+1)}}$$

On achève la démonstration comme dans 3.1.4.

Montrons (7). Le résultat peut s'obtenir en majorant et minorant l'intégrale

$$I_q(\epsilon) = \int_G dx dy$$

où

$$G = (x, y) \in \mathbb{R}^{2q}; V(x, y) \leq \epsilon^{-1}, |x_i| \leq \epsilon^{-3}, |y_i| \leq \epsilon^{-3}, i=1, 2, \dots, q.$$

1) Majoration. Pour  $q = 2$ , écrivons

$$I_2(\epsilon) = \int_{G, |x_2| \leq |x_1|} dx dy + \int_{G, |x_1| \leq |x_2|} dx dy$$

Or

$$\begin{aligned} \int_{G, |x_2| \leq |x_1|} dx dy &\leq \int_{|x_i| \leq \epsilon^{-3}, |y_1| \leq \epsilon^{-3}, |x_2| \leq |x_1|} \frac{2}{\epsilon^2 |x_1|} dx_1 dx_2 dy_1 \\ &\leq \int_{|x_1| \leq \epsilon^{-3}, |y_1| \leq \epsilon^{-3}} \frac{2}{\epsilon^2} dx_1 dy_1 \leq C \frac{1}{\epsilon^8} \end{aligned}$$

Pour  $q > 2$ , on a de même

$$I_q(\epsilon) = \int_{G, |x_q| \leq |x_1|} dx dy + \int_{G, |x_1| \leq |x_q|} dx dy$$

Or

$$\int_{G, |x_1| \leq |x_q|} dx dy \leq \int_{\substack{|x_i| \leq \epsilon^{-3}, |y_i| \leq \epsilon^{-3}, |x_1| \leq |x_q|, i=1,2,\dots,q \\ \sum_{1 \leq i < j \leq q-1} |x_i y_j - x_j y_i| \leq \epsilon^{-2}, |x_1 y_q - x_q y_1| \leq \epsilon^{-2}}} dx dy.$$

En intégrant par rapport à  $y_q$ , puis  $x_q$ , on obtient

$$\begin{aligned} \int_{G, |x_1| \leq |x_q|} dx dy &\leq \frac{C}{\epsilon^2} \int_{\substack{|x_i| \leq \epsilon^{-3}, |y_i| \leq \epsilon^{-3} \quad i=1,2,\dots,q-1 \\ \sum_{1 \leq i < j \leq q-1} |x_i y_j - x_j y_i| \leq \epsilon^{-2}}} dx dy \\ &\leq \frac{C}{\epsilon^2} I_{q-1}(\epsilon) \end{aligned}$$

D'où  $I_q(\epsilon) \leq \frac{C}{\epsilon^2} I_{q-1}(\epsilon)$ . Comme  $I_2 \leq \frac{C}{8}$ , on a  $I_q(\epsilon) \leq \frac{C}{\epsilon^{2q+4}}$

2) Minoration. Posons

$$I'_q(\epsilon) = \int_{\substack{\epsilon \leq x_1 \leq \epsilon^{-3}, 0 \leq x_i \leq \epsilon^{-3}, i=2,\dots,q \\ |y_i| \leq \epsilon^{-3}, i=1,\dots,q \\ V(x,y) \leq \epsilon^{-1}}} dx dy \leq I_q(\epsilon).$$

On a

$$\begin{aligned} I'_q(\epsilon) &\geq \int_{\substack{\epsilon \leq x_1 \leq \epsilon^{-3}, 0 \leq x_i \leq \epsilon^{-3}, i=2,\dots,q \\ |y_i| \leq \epsilon^{-3}, i=1,\dots,q, \sum_{1 \leq i < j \leq q-1} |x_i y_j - x_j y_i| \leq \frac{1}{2\epsilon^2} \\ 0 \leq x_i y_q - x_q y_i, i=1,2,\dots,q-1, \sum_{i=1}^{q-1} (x_i y_q - x_q y_i) \leq \frac{1}{q\epsilon^2} \\ 0 < q x_q \leq x_1 + x_2 + \dots + x_{q-1}}} dx dy \end{aligned}$$

On intègre en  $y_q$  puis  $x_q$ , on obtient :

$$I'_q(\epsilon) \geq \frac{1}{q\epsilon^2} I'_{q-1}(\epsilon)$$

Pour  $q=2$ , on a

$$\begin{aligned} I'_2(\epsilon) &\geq \int_{\substack{\epsilon \leq x_1 \leq \epsilon^{-3}, 0 \leq x_2 \leq \epsilon^{-3}, |y_i| \leq \epsilon^{-3}, i=1,2 \\ 0 \leq x_1 x_2 - x_2 y_1 \leq \frac{1}{2\epsilon^2}, 0 < 2 x_2 < x_1}} dx dy \end{aligned}$$

$$\text{D'où } I_2'(\epsilon) \geq \frac{1}{\epsilon^8}.$$

$$\text{On en déduit } I_q(\epsilon) \geq \frac{B}{\epsilon^{2q+4}}.$$

$$\text{Finalement, on a } I_q(\epsilon) \approx \frac{1}{\epsilon^{2q+4}}. \text{ D'où (7).}$$



## REFERENCES

- [1] V. BENCI et D. FORTUNATO. «*Discreteness conditions of the spectrum of Schrödinger operators*». J. of Math. Analysis and appl. 64 (1978) p. 695-700.
- [2] R. DESPLANCHES. Thèse de 3ème cycle. Nantes juin 1977.
- [3] J.S. de WET, F. MANDL. «*On the asymptotic distribution of eigenvalues*». Proc. Roy. Soc. London A. 200 (1950) p. 572-580.
- [4] J.M. GLAZMAN. «*Direct methods of qualitative spectral analysis of singular differential operators*». Israel program for scientific translations. Jerusalem (1965).
- [5] C. GOULAOUIC. «*Valeurs propres de problèmes aux limites irréguliers*». Cours CIME (1974).
- [6] T. KATO. «*Schrödinger operators with singular potential*». Israël J. Math. 13 (1973) p. 135-148.
- [7] G.G. LORENTZ. «*Approximation of fonctions*». Holt Rinehart and Winston. (1966).
- [8] PHAM THE LAI. «*Comportement asymptotique des valeurs propres d'une classe d'opérateurs de type «Schrödinger»*». J. of Math. Kyoto Univ. 18 (2) (1978) p. 353-375.
- [9] D. ROBERT. «*Comportement asymptotique des valeurs propres d'opérateurs du type Schrödinger à potentiel dégénéré*». J. Math. Pures et appl. 61. (1982) p. 275-300.
- [10] G.V. ROSENBLJUM. «*Asymptotics of the eigenvalue of the Schrödinger operator*». Math. USSR Sbornik 22 (3) (1974) p. 349-371.
- [11] B. SIMON. «*Some quantum operators with discret spectrum but classically continuous spectrum*». (Soumis à Ann. Phys).
- [12] B. SIMON. «*Non classical Eigenvalue Asymptotics*». J. of Fonc Anal. V. 53-1. 83 p. 84-98.
- [13] E.C. TITCHMARSCH. «*Eigenfunctions expansions*». Vol. I et II. Clarendon. Press Oxford.

(Manuscrit reçu le 14 mai 1985)