

ANNALI DELLA  
SCUOLA NORMALE SUPERIORE DI PISA  
*Classe di Scienze*

LADISLAS FEJES

**Sur un théorème concernant l'approximation des courbes  
par des suites de polygones**

*Annali della Scuola Normale Superiore di Pisa, Classe di Scienze 2<sup>e</sup> série*, tome 9, n° 2  
(1940), p. 143-145

[http://www.numdam.org/item?id=ASNSP\\_1940\\_2\\_9\\_2\\_143\\_0](http://www.numdam.org/item?id=ASNSP_1940_2_9_2_143_0)

© Scuola Normale Superiore, Pisa, 1940, tous droits réservés.

L'accès aux archives de la revue « *Annali della Scuola Normale Superiore di Pisa, Classe di Scienze* » (<http://www.sns.it/it/edizioni/riviste/annaliscienze/>) implique l'accord avec les conditions générales d'utilisation (<http://www.numdam.org/conditions>). Toute utilisation commerciale ou impression systématique est constitutive d'une infraction pénale. Toute copie ou impression de ce fichier doit contenir la présente mention de copyright.

NUMDAM

*Article numérisé dans le cadre du programme  
Numérisation de documents anciens mathématiques*  
<http://www.numdam.org/>

## SUR UN THÉORÈME CONCERNANT L'APPROXIMATION DES COURBES PAR DES SUITES DE POLYGONES

par LADISLAS FEJES (Budapest).

Soient  $K$  une courbe convexe fermée et  $P$  un polygone quelconque situés dans le même plan. Considérons l'ensemble des points situés dans l'une quelconque des deux régions limitées par  $P$  et  $K$  sans appartenir à l'autre <sup>(1)</sup>. Cet ensemble possède certainement une aire que nous appellerons *déviatio*n <sup>(2)</sup> entre  $P$  et  $K$ . Remarquons tout d'abord que celle-ci ne peut s'annuler que dans le cas où  $P$  et  $K$  coïncident.

Nous allons démontrer le

**THÉORÈME:** *On peut construire pour chaque courbe convexe fermée  $K$  ayant l'aire  $T$  une suite de polygones  $P_3, P_4, \dots, P_n, \dots$  de 3, 4, ...,  $n, \dots$  côtés telle que*

$$\lim_{n \rightarrow \infty} n^2 \tau_n \leq \frac{\pi^2}{4} T$$

$\tau_n$  étant la déviation entre  $P_n$  et  $K$ .

L'égalité sera atteinte dans le cas d'une ellipse quelconque.

Faisons tout d'abord une remarque qui nous sera utile dans la démonstration. Soient  $y=f(x)$  un arc de courbe convexe défini dans l'intervalle  $(a, b)$  et  $y=P(x)$  une ligne droite quelconque. Il est aisé de voir que l'intégrale  $\int_a^b |f(x) - P(x)| dx$  qui peut être considéré comme la déviation entre  $f(x)$  et  $P(x)$  atteindra son minimum pour la ligne  $y=\bar{P}(x)$  qui coïncide avec  $y=f(x)$  dans les points dont les abscisses  $\xi', \xi''$  sont telles que  $(\xi' - a) = \frac{1}{2} (\xi'' - \xi') = (b - \xi'')$  et on aura pour un

<sup>(1)</sup> L'ensemble considéré peut être représenté par la somme:  $\overline{\mathbf{D}\mathbf{K}} + \overline{\mathbf{D}\mathbf{K}}$  en désignant par  $\mathbf{D}, \mathbf{K}$  et  $\overline{\mathbf{D}}, \overline{\mathbf{K}}$  l'ensemble des points situés dans  $P$  et  $K$  respectivement les complémentaires de celles-ci. C'est M. D. KÖNIG qui m'a donné l'éveil de la définition simple donnée dans le texte.

<sup>(2)</sup> L. FEJES: *Poliéderekre vonatkozó szélsőérték-feladatok.* (Matematikai és Fizikai Lapok, XLV (1938), 191-199). Voir l'extrait allemand.

arc de courbe  $y=f(x)$  situé au dessus de l'intervalle  $(a, b)$

$$\int_a^b |f(x) - \bar{P}(x)| dx = \int_{\xi_i'}^{\xi_i''} f(x) dx - \int_a^{\xi_i'} f(x) dx - \int_{\xi_i''}^b f(x) dx = 2 \int_{\xi_i'}^{\xi_i''} f(x) dx - \int_a^b f(x) dx.$$

Posons maintenant  $a=x_0 < x_1 < x_2 < \dots < x_{n-1} < x_n=b$  et considérons les valeurs  $\xi_i', \xi_i''$  satisfaisant aux égalités  $(\xi_i' - x_i) = \frac{1}{2}(\xi_i'' - \xi_i') = (x_{i+1} - \xi_i')$ . La ligne brisée de  $n$  côtes  $P_n(x)$  qui coïncide avec  $f(x)$  dans les points ayant pour abscisses  $\xi_i', \xi_i''$  ( $i=1, 2, \dots, n$ ) possède une déviation par rapport à  $f(x)$  telle que

$$\int_a^b |f(x) - P_n(x)| dx \leq 2 \sum_{i=1}^n \int_{\xi_i'}^{\xi_i''} f(x) dx - \int_a^b f(x) dx.$$

Considérons d'ailleurs parmi tous les polygones de  $n$  côtés celui qui a la plus petite déviation par rapport à un cercle  $C$  donné. Il est aisé de voir que c'est un polygone régulier concentrique au cercle  $C$  la portion de son périmètre extérieure à  $C$  ayant même longueur que la portion intérieure.

La démonstration de notre théorème ne fera après ces remarques préliminaires aucune difficulté <sup>(3)</sup>. Désignons par  $MN$  la plus grande corde de la courbe  $K$  et décrivons autour de  $MN$  comme diamètre un cercle  $C$  ayant pour centre  $O$ . Construisons le polygone  $Q_1 Q_2 \dots Q_n$  ci-dessus considéré qui a la plus petite déviation par rapport à  $C$  et menons les perpendiculaires sur  $MN$  des points  $A_1, B_1, A_2, B_2, \dots, A_n, B_n$  en désignant par  $A_i$  et  $B_i$  les points d'intersection de  $Q_i Q_{i+1}$  et  $C$ . Soient  $A_i'$  et  $B_i'$  les pieds de ces perpendiculaires qui coupent la courbe  $K$  en  $A_i'', B_i''$  et soient  $m$  et  $n$  les deux droites perpendiculaires à  $MN$ , situées de part et d'autre du polygone  $Q_1 Q_2 \dots Q_n$  et ayant la plus petite distance entre elles.

Considérons maintenant le polygone dont les côtés coïncident avec les droites  $A_i'' B_i''$  et particulièrement la partie  $P$  de ce polygone comprise entre les parallèles  $m$  et  $n$ . C'est un polygone ayant au plus  $n+2$  côtés. Or une considération simple nous assure — tenant compte de la remarque faite ci-dessus — que la déviation entre  $P$  et  $K$  ne peut être plus grande que  $2 \sum_{i=1}^n T(A_i B_i) - T$ , en désignant par  $T(A_i B_i)$  l'aire de la région bornée par  $\overline{A_i' A_i''} \overline{A_i'' B_i''} \overline{B_i'' B_i'} \overline{B_i' A_i'}$ .

<sup>(3)</sup> Les raisonnements suivants ont été empruntés à un travail de M. E. SAS: *Über eine Extremumeigenschaft der Ellipsen* (Compositio Mathematica, 6 (1939), 468) où il démontre qu'on peut inscrire dans chaque courbe convexe fermée ayant l'aire  $T$  un polygone de  $n$  côtés dont l'aire  $t_n$  est  $t_n \geq \frac{n}{2\pi} \sin \frac{2\pi}{n} T$ . On peut déduire avec un raisonnement analogue l'inégalité  $T_n \leq \frac{n-2}{\pi} \operatorname{tg} \frac{\pi}{n-2} T$  se comportant au polygone circonscrit. (L. FEJES: *Eine Bemerkung zur Approximation durch n-Eckringe*. Compositio Mathematica 7 (1940)).

Soient  $\alpha_i$  et  $\beta_i$  les angles comptés avec un signe à partir de  $OM$  jusqu'aux demi-droites  $OA_i$  respectivement  $OB_i$  et posons  $\beta_i - \alpha_i = \varphi_n$ ,  $\alpha_i = \alpha + (i-1) \frac{2\pi}{n}$ ; cela met en évidence que  $\sum_{i=1}^n T(A_i B_i) = T(\alpha)$  ne dépend que de  $\alpha$ . Attribuons à  $\alpha$  diverses valeurs et considérons la moyenne  $\frac{1}{2\pi} \int_0^{2\pi} T(\alpha) d\alpha$  de  $T(\alpha)$ . On a  $\frac{1}{2\pi} \int_0^{2\pi} T(\alpha) d\alpha = \frac{n\varphi_n}{2\pi} T$ , ce qui montre que parmi les polygones  $P$  ci-dessus considérés il y a certainement un dont la déviation  $\tau_{n+2}$  par rapport à  $K$  est telle que  $\tau_{n+2} \leq \frac{n\varphi_n - \pi}{\pi} T$ , dont il résulte immédiatement (4) notre théorème.

On en tire en appliquant l'inégalité isopérimétrique le

COROLLAIRE 1. - *Étant donnée une courbe convexe fermée dont le périmètre est  $L$ , il existe une suite de polygones de  $n$  côtés avec des déviations  $\tau_n$  telles que*

$$\lim_{n \rightarrow \infty} n^2 \tau_n \leq \frac{\pi}{16} L^2$$

*et l'égalité ne peut être atteinte que dans le cas d'un cercle.*

On arrivera enfin d'après ce que précède sans difficulté au

COROLLAIRE 2. - *On peut construire pour chaque arc de courbe convexe (ou concave)  $y=f(x)$ , défini dans l'intervalle  $(a, b)$  et ayant la longueur  $L$ , une suite de lignes brisées de  $1, 2, \dots, n, \dots$  côtés et ayant pour équations  $y=P_1(x), y=P_2(x), \dots, y=P_n(x), \dots$  telles que*

$$\lim_{n \rightarrow \infty} n^2 \int_a^b |f(x) - P_n(x)| dx \leq \frac{\pi}{32} L^2$$

*l'égalité n'étant atteinte que pour un demi-cercle.*

(4) On a  $2 \operatorname{tg} \frac{\varphi_n}{2} = \operatorname{tg} \frac{\pi}{n}$  et par conséquent  $\varphi_n = 2 \operatorname{arc} \operatorname{tg} \left( \frac{1}{2} \operatorname{tg} \frac{\pi}{n} \right) = \frac{\pi}{n} + \frac{1}{4} \frac{\pi^3}{n^3} + O\left(\frac{1}{n^5}\right)$ .