

Seconde solution de la question 121

Nouvelles annales de mathématiques 1^{re} série, tome 6 (1847), p. 179-180

http://www.numdam.org/item?id=NAM_1847_1_6__179_0

© Nouvelles annales de mathématiques, 1847, tous droits réservés.

L'accès aux archives de la revue « Nouvelles annales de mathématiques » implique l'accord avec les conditions générales d'utilisation (<http://www.numdam.org/conditions>). Toute utilisation commerciale ou impression systématique est constitutive d'une infraction pénale. Toute copie ou impression de ce fichier doit contenir la présente mention de copyright.

NUMDAM

Article numérisé dans le cadre du programme
Numérisation de documents anciens mathématiques

<http://www.numdam.org/>

SECONDE SOLUTION DE LA QUESTION 121

(Voyez t. V, page 202.)

PAR M. B... (de Liège).

Étant donnée une progression arithmétique de n termes dont la raison soit égale au premier terme; élevant chaque terme au carré, le tiers de n fois le carré du dernier terme est toujours entre la somme de tous les carrés et cette somme moins le carré du dernier terme; démontrer cette propriété par la géométrie.

Démonstration. Soit une pyramide à base carrée. Je divise sa hauteur en n parties égales, que je prends pour unités; puis par les points de division je mène des plans parallèles à la base. Les $n - 1$ sections que j'obtiens sont des carrés. Soient $a_1, a_2, a_3 \dots a_{n-1}$ leurs côtés, et a_n la base; ces différentes quantités représentent les termes de la progression arithmétique. Les aires des sections seront $a_1^2, a_2^2, a_3^2 \dots a_{n-1}^2$, et représenteront les carrés des termes de la progression.

Sur ces diverses sections construisons des prismes dont la hauteur soit 1 (fig. 38).

Sous ces mêmes sections construisons aussi des prismes dont la hauteur soit 1 (fig. 39).

Les volumes de ces prismes seront respectivement :

Fig. 1.

a_1^2
 a_2^2
 \vdots
 a_n^2

Fig. 2.

a_1^2
 a_2^2
 \vdots
 a_{n-1}^2

On voit par ces figures que le volume de la pyramide est

moindre que la somme de la première colonne, et plus grand que celle de la seconde. Or le volume de cette pyramide est

$\frac{1}{3}na_n^2$; donc

$$a_1^2 + a_2^2 + \dots + a_n^2 > \frac{1}{3}na_n^2 > a_1^2 + a_2^2 + \dots + a_{n-1}^2,$$

ce qui est l'expression du théorème.

On voit facilement que le problème 113 peut se résoudre d'une manière analogue (voir t. V, p. 348).
