

OSSIAN BONNET

Démonstration du théorème de M. Serret

Nouvelles annales de mathématiques 1^{re} série, tome 6
(1847), p. 375-376

http://www.numdam.org/item?id=NAM_1847_1_6__375_1

© Nouvelles annales de mathématiques, 1847, tous droits réservés.

L'accès aux archives de la revue « Nouvelles annales de mathématiques » implique l'accord avec les conditions générales d'utilisation (<http://www.numdam.org/conditions>). Toute utilisation commerciale ou impression systématique est constitutive d'une infraction pénale. Toute copie ou impression de ce fichier doit contenir la présente mention de copyright.

NUMDAM

Article numérisé dans le cadre du programme
Numérisation de documents anciens mathématiques

<http://www.numdam.org/>

DÉMONSTRATION

du Théorème de *M. Serret* (Question 146, p. 216).

PAR M. OSSIAN BONNET,

Répétiteur à l'École polytechnique.

L'équation du parabolôïde hyperbolique étant

$$z = xy,$$

les lignes de courbure seront représentées par la double équation différentielle

$$\frac{dx}{\sqrt{1+x^2}} \pm \frac{dy}{\sqrt{1+y^2}} = 0.$$

Or, on tire aisément de cette équation

$$\sqrt{1+y^2}dx + \frac{xydx}{\sqrt{1+x^2}} \pm \sqrt{1+x^2}dy \pm \frac{xydy}{\sqrt{1+y^2}} = 0;$$

ou intégrant

$$x\sqrt{1+y^2} \pm y\sqrt{1+x^2} = \text{const.},$$

c'est-à-dire

$$\sqrt{x^2+z^2} \pm \sqrt{y^2+z^2} = \text{const.};$$

ce qui prouve la proposition.

Note. Voir p. 268 ; c'est à tort que nous avons mis *cas particulier*, car le théorème n'a lieu que pour ce cas, comme on peut le voir dans le mémoire de M. Serret (*Journal de mathématiques*, XII, p. 248, 1847).
