

J. DE VIRIEU

Solution de la question 508

Nouvelles annales de mathématiques 1^{re} série, tome 19
(1860), p. 398-400

http://www.numdam.org/item?id=NAM_1860_1_19__398_1

© Nouvelles annales de mathématiques, 1860, tous droits réservés.

L'accès aux archives de la revue « Nouvelles annales de mathématiques » implique l'accord avec les conditions générales d'utilisation (<http://www.numdam.org/conditions>). Toute utilisation commerciale ou impression systématique est constitutive d'une infraction pénale. Toute copie ou impression de ce fichier doit contenir la présente mention de copyright.

NUMDAM

Article numérisé dans le cadre du programme
Numérisation de documents anciens mathématiques

<http://www.numdam.org/>

SOLUTION DE LA QUESTION 508

(voir p. 48);

PAR M. J. DE VIRIEU,
Régent à Saumur.

1. On a identiquement

$$\begin{aligned}\Delta^n(xu) &= \Delta^{n-1} \Delta(xu) = \Delta^{n-1}(x \Delta u + u + \Delta u) \\ &= \Delta^{n-1}(x \Delta u) + \Delta^{n-1}u + \Delta^n u,\end{aligned}$$

d'où

$$\begin{aligned} \Delta^n(xu) &= \Delta^{n-1}(x\Delta u) + \Delta^{n-1}u + \Delta^n u, \\ \Delta^{n-1}(x\Delta u) &= \Delta^{n-2}(x\Delta^2 u) + \Delta^{n-1}u + \Delta^n u, \\ &\dots\dots\dots \\ \Delta(x\Delta^{n-1}u) &= x\Delta^n u + \Delta^{n-1}u + \Delta^n u; \end{aligned}$$

ajoutant membre à membre,

$$\Delta^n(xu) = n\Delta^{n-1}u + (x+n)\Delta^n u.$$

2. Posons $u = x^{n+r}$, r entier absolu qui peut être nul, on aura

$$\begin{aligned} &\Delta^n(x^{n+r+1}) \\ = n\Delta^{n-1}(x^{n+r}) &+ (x+n)\Delta^n(x^{n+r}), \\ &n\Delta^{n-1}(x^{n+r}) \\ = n(n-1)\Delta^{n-2}(x^{n+r-1}) &+ n(x+n-1)\Delta^{n-1}(x^{n+r}), \\ &\dots\dots\dots \\ &n \cdot (n-1) \dots 3\Delta^2(x^{r+3}) \\ = n \cdot (n-1) \dots 2\Delta(x^{r+2}) &+ n \cdot (n-1) \dots 3(x+2)\Delta^2(x^{r+2}); \end{aligned}$$

ajoutant membre à membre,

$$(A) \Delta^n(x^{n+r+1}) = n! \left[\Delta(x^{r+2}) + \sum_{k=0}^{k=n-2} \frac{(x+n-k)}{(n-k)!} \Delta^{n-k}(x^{n-k+r}) \right] \Delta.$$

3. En posant $r = 0$, comme $\Delta^q x^q = q!$, la formule (A) devient

$$\begin{aligned} \Delta^n(x^{n+1}) &= n! \left[\Delta(x^2) - \sum_{k=0}^{k=n-2} x+n-k \right] \\ &= n! \left[2x+1 + \frac{2x+n+2}{1} \frac{n-1}{2} \right] \\ &= n!(n+1) \frac{2x+n}{2}, \end{aligned}$$

donc

$$(B) \quad \Delta^n(x^{n+1}) = (n+1)! \frac{2x+n}{2};$$

mais on a

$$\sum_{k=0}^{h=n} (-1)^k n_k (x+k)^{n+1} = (-1)^n \Delta^n(x^{n+1}),$$

et enfin

$$\sum_{k=0}^{k=n} (-1)^k n_k (x+k)^{n-1} = (-1)^n (n+1)! \frac{2x+n}{2},$$

ce qui montre que le deuxième membre de la formule proposée doit être multiplié par $(-1)^n$.

4. En posant $r=1$ dans (A) et employant (B), on arrive au moyen de quelques transformations à la formule suivante, qui est peut-être nouvelle :

$$\sum_{k=0}^{k=n} (-1)^k n_k (x+k)^{n+2} = (-1)^n \cdot (n+2)! \frac{3 \cdot (2x+n)^2 + n}{24}.$$
