

DESBOVES

**Question du grand concours généralisée
(voir t. XVIII, p. 77, 261 et 294)**

Nouvelles annales de mathématiques 1^{re} série, tome 19
(1860), p. 47-51

http://www.numdam.org/item?id=NAM_1860_1_19__47_0

© Nouvelles annales de mathématiques, 1860, tous droits réservés.

L'accès aux archives de la revue « Nouvelles annales de mathématiques » implique l'accord avec les conditions générales d'utilisation (<http://www.numdam.org/conditions>). Toute utilisation commerciale ou impression systématique est constitutive d'une infraction pénale. Toute copie ou impression de ce fichier doit contenir la présente mention de copyright.

NUMDAM

Article numérisé dans le cadre du programme
Numérisation de documents anciens mathématiques

<http://www.numdam.org/>

QUESTION DU GRAND CONCOURS GÉNÉRALISÉE

(voir t. XVIII, p. 77, 261 et 294);

PAR M. DESBOVES,
Professeur.

On donne dans un même plan une conique C et une courbe quelconque A ; de tous les points de A on mène deux tangentes à la conique, et par les points de contact les deux normales correspondantes; il faut trouver le lieu B des intersections de ces normales.

Réciproquement, connaissant la courbe B de tous les points de cette courbe, on mène des normales à la conique C , et par les pieds des normales les tangentes correspondantes; on demande de trouver le lieu D des intersections de ces tangentes.

Remarque. Le lieu D pourra être identique avec la courbe A ; mais plus généralement il se composera de plusieurs courbes distinctes, dont la courbe A fera nécessairement partie.

On a un exemple du premier cas, lorsque B est une ligne droite et la conique C une parabole; alors la courbe A et la courbe D sont identiques, et représentent toutes deux une hyperbole.

On peut donner du second cas deux exemples remarquables :

1°. Lorsque la conique C est une parabole, et que la courbe A se confond avec elle, la courbe B est évidemment la développée de la parabole; mais si l'on prend pour ligne B la développée de la parabole, on trouve que le lieu D se compose non-seulement de la parabole C , mais aussi d'une seconde parabole qui a même axe que la

première, un paramètre huit fois plus petit et la convexité tournée en sens contraire.

2°. La conique C étant une parabole, et la ligne A une perpendiculaire à l'axe de la conique (c'est le problème particulier du concours général), on trouve que B est une parabole ayant même axe que la parabole C; mais si on se donne pour ligne B la parabole précédemment trouvée, on voit que le lieu D se compose de la perpendiculaire à l'axe de la parabole, et d'une hyperbole du troisième ordre ayant pour asymptotes l'axe de la parabole et une perpendiculaire à cet axe.

Voici quelques théorèmes généraux, qui lient entre elles les courbes A et B.

Théorème I. Lorsque la courbe A est la plus générale de son degré, la courbe B est de degré double si la conique C est une parabole, et de degré triple si la conique C est une ellipse ou une hyperbole. Une discussion qui n'exige pas que l'on connaisse l'équation de la courbe B, fait connaître les cas particuliers où le degré de cette courbe s'abaisse.

Théorème II. La réciproque du premier théorème est vraie : en général, le degré de la courbe D est double ou triple du degré de la courbe A, suivant que la conique C est une parabole, ou bien une ellipse, ou une hyperbole.

Théorème III. Si la conique C est une ellipse ou une hyperbole, et si la ligne A a une branche de courbe infinie ayant pour asymptote $\beta = k\alpha + h$ (k n'est ni nul ni infini), la ligne B a une branche infinie correspondante, dont l'asymptote est

$$y = -\frac{x}{k} - \frac{c^2 h}{a^2 k^2 \pm b^2}. \quad (*)$$

(*) a, b, c sont les demi-axes et la demi-excentricité de la conique.

Cette asymptote devient une normale à la conique, lorsque la première est une tangente à cette même conique.

Théorème IV. Si la conique C est une parabole, et si la courbe A possède une branche infinie ayant pour asymptote une droite non parallèle à l'axe de la parabole C, la ligne B aura une branche infinie perpendiculaire à la première à l'infini, mais cette branche ne pourra avoir d'asymptote que dans le cas où l'asymptote de A sera tangente à la parabole C. D'ailleurs dans ce cas même l'asymptote n'existera pas nécessairement; mais si l'asymptote de A est parallèle à l'axe de la parabole C, la courbe B a toujours une asymptote normale à la parabole.

Théorème V. Si la ligne A passe par le centre de la conique C, et qu'en ce point le coefficient angulaire m de la tangente à la courbe A ne soit ni nul ni infini, c'est-à-dire si la tangente n'est parallèle à aucun des deux axes, la ligne B a une branche infinie ayant pour asymptote

$$y = \mp \frac{a^2 m}{b^2} x.$$

Théorème VI. Lorsque la conique C est une hyperbole, outre les asymptotes données par les théorèmes précédents, la ligne B a encore des asymptotes en nombre généralement égal au nombre des points d'intersection de la ligne A et des asymptotes de l'hyperbole C. Voici la construction à faire pour obtenir l'asymptote correspondant à l'un des points d'intersection.

Par le point d'intersection qu'on a choisi, on mène une tangente à l'hyperbole C, puis par le point de contact une normale à la même courbe; l'asymptote de la ligne B sera parallèle à cette normale. On aura ensuite l'abscisse à l'origine de la même asymptote en prenant

une quatrième proportionnelle aux axes a et b et à moins l'ordonnée à l'origine de la normale précédente.

Les théorèmes généraux précédents conduisent immédiatement aux conséquences suivantes :

1. Lorsque la conique C est une parabole et la ligne A une ligne droite, la ligne B est une parabole dont l'axe est perpendiculaire à la ligne droite donnée. Dans le cas particulier où la droite A est tangente à la parabole C ou parallèle à l'axe de cette parabole, la ligne B est une normale à la même courbe (théorèmes I et IV).

2. Lorsque la conique C est une ellipse ou une hyperbole, et la ligne A une ligne droite $\beta = k\alpha + h$, la ligne B est du troisième ordre, et a une asymptote

$$y = -\frac{x}{k} - \frac{c^2 h}{a^2 k^2 \pm b^2}.$$

Dans le cas de l'hyperbole, le théorème VI donne deux autres asymptotes.

Ces derniers résultats ont déjà été trouvés par MM. Terquem et de Jonquières.

3. Lorsque la conique C est une ellipse ou une hyperbole, et la ligne A une droite $\beta = m\alpha$ passant par le centre de la conique, en vertu des théorèmes III et V, la ligne B est une hyperbole qui a pour asymptotes

$$y = -\frac{1}{m} x, \quad y = \mp \frac{a^2 m}{b^2} x.$$

Dans le cas particulier où la ligne A est l'une des diagonales du rectangle construit sur les deux axes de la conique C , la ligne B est une droite perpendiculaire à la diagonale, menée par le centre de la conique.

4. La conique C étant toujours une ellipse ou une hyperbole, et la ligne A devenant une parallèle à l'un des axes de la conique, le coefficient k du théorème IV de-

vient nul ou infini, et l'on ne peut plus affirmer l'existence de la branche infinie de B et de son asymptote. Dans ce cas on trouve très-facilement, par un calcul direct, que la ligne B est une ellipse ou une hyperbole, suivant que la conique C est elle-même une ellipse ou une hyperbole.

Tous les théorèmes énoncés sont la conséquence des formules suivantes :

$$y = -\frac{2\alpha\beta}{p}, \quad x = \frac{2p^2 - \alpha p + p^2}{p};$$

$$y = \frac{c^2\beta(\alpha^2 - a^2)}{\pm b^2\alpha^2 + a^2\beta^2}, \quad x = \frac{c^2\alpha(\pm b^2 - \beta^2)}{\pm b^2\alpha^2 + a^2\beta^2}.$$

Les deux premières sont relatives à la parabole rapportée à son axe et à la tangente au sommet, et les deux dernières sont relatives à l'ellipse et à l'hyperbole rapportées à leurs axes : α et β sont les coordonnées d'un point du plan de la conique C d'où l'on mène les tangentes à cette courbe; x et y sont les coordonnées du point d'intersection des normales correspondantes.

Remarque. Les formules que nous venons d'écrire conduisent aussi de la manière la plus simple aux équations des développées des coniques.

Note du Rédacteur. La courbe B a-t-elle des points doubles et de rebroussement? et combien? Ces données déterminent la classe de la courbe.