

H. RESAL

**Note sur la détermination du centre de gravité du volume du tronc de prisme droit à base triangulaire**

*Nouvelles annales de mathématiques 2<sup>e</sup> série*, tome 15 (1876), p. 289-292

[http://www.numdam.org/item?id=NAM\\_1876\\_2\\_15\\_\\_289\\_0](http://www.numdam.org/item?id=NAM_1876_2_15__289_0)

© Nouvelles annales de mathématiques, 1876, tous droits réservés.

L'accès aux archives de la revue « Nouvelles annales de mathématiques » implique l'accord avec les conditions générales d'utilisation (<http://www.numdam.org/conditions>). Toute utilisation commerciale ou impression systématique est constitutive d'une infraction pénale. Toute copie ou impression de ce fichier doit contenir la présente mention de copyright.

NUMDAM

Article numérisé dans le cadre du programme  
Numérisation de documents anciens mathématiques

<http://www.numdam.org/>

**NOTE SUR LA DÉTERMINATION DU CENTRE DE GRAVITÉ  
DU VOLUME DU TRONC DE PRISME DROIT A BASE  
TRIANGULAIRE ;**

PAR M. H. RESAL.

Il n'existe, du moins à ma connaissance, aucun Traité de Statique ou de Mécanique où l'on ait considéré en particulier le tronc de prisme droit à base triangulaire au point de vue de la recherche du centre de gravité de son volume. Ce centre jouit cependant de quelques propriétés intéressantes, que je me propose de faire connaître dans cette Note.

Je prends respectivement pour plan horizontal et pour plan vertical de projection le plan de la base et celui d'une face latérale  $C'c'B'b'$ .

Soient (*fig. 1*)

(ABC, A'B'C') la base ;

(ABC, a'b'c') la troncature ;

(O, O'), (O, o') les centres de gravité de l'aire B de la base et de celle de la troncature ;

$h = A'a'$ ,  $h' = B'b'$ ,  $h'' = C'c'$  les longueurs des trois arêtes ;

$H = \frac{h + h' + h''}{3}$  la distance O'o'.

Je décompose le volume en trois tétraèdres par deux plans, l'un mené par les sommets (C, c'), (A, a'), (B, B'), l'autre par les sommets (A, a'), (B, b'), (C, C'). Pour simplifier, nous désignerons les tétraèdres par les projections verticales de leurs sommets. Soient  $x, x', x'', x_1$  les distances des arêtes  $h, h', h''$  et du centre de gravité cherché (G, G') à un plan vertical quelconque (P).


La distance du centre de gravité du volume  $\frac{Bh}{3}$  du tétraèdre  $C'a'A'B'$  au plan (P) est

$$\frac{2x + x' + x''}{4},$$

et son moment par rapport au même plan

$$\frac{Bh}{3} \left( \frac{2x + x' + x''}{4} \right).$$

Fig. 1.



On reconnaît facilement que les volumes  $\frac{Bh'}{3}$ ,  $\frac{Bh''}{3}$  des tétraèdres  $a'c'b'B'$ ,  $a'c'C'B'$  ont respectivement pour moments

$$\frac{B}{3} h' \left( \frac{x + 2x' + x''}{4} \right), \quad \frac{B}{3} h'' \left( \frac{x + x' + 2x''}{4} \right).$$

On a ainsi

$$\begin{aligned} BHx_1 = \frac{B}{12} [ & h(2x + x' + x'') + h'(x + 2x' + x'') \\ & + h''(x + x' + 2x'') ]. \end{aligned}$$

Supposons que l'on fasse passer (P) par le point O, on a

$$x + x' + x'' = 0$$

et par suite

$$(1) \quad Hx_1 = \frac{hx + h'x' + h''x''}{12}.$$

Cette formule montre que (G, G') se trouve dans le plan vertical passant par O et la projection horizontale g du centre de gravité des trois arêtes.

Si l'on divise les côtés AB et AC aux points I et J de manière que l'on ait

$$\frac{AI}{IB} = \frac{h'}{h}, \quad \frac{AJ}{CJ} = \frac{h''}{h},$$

le point g sera déterminé par l'intersection des droites CI en BJ. En supposant maintenant que le plan (P) soit mené perpendiculairement à Gg, la formule (1) donne

$$Hx_1 = \frac{(h + h' + h'')}{12} \times Og = H \cdot \frac{Og}{4},$$

d'où

$$x_1 = \frac{Og}{4}.$$

Ainsi le point G se trouve sur Og à la distance de O égale au quart de cette longueur.

Soit maintenant  $z_1 = G'K$  la distance du point (G, G') au plan de la base, on a

$$BH z_1 = \frac{Bh}{3} \frac{h}{4} + \frac{Bh'}{3} \frac{(h + h' + h'')}{4} + \frac{Bh''}{3} \frac{(h + h'')}{4},$$

d'où

$$(2) \quad z_1 = \frac{h^2 + h'^2 + h''^2 + hh' + h'h'' + hh''}{12H}.$$

Cette valeur peut se mettre sous la forme

$$z_1 = \frac{h^2 + h'^2 + h''^2 + (h + h' + h'')^2}{24H},$$

d'où

$$(3) \quad z_1 = \frac{3}{8} \left\{ H + \frac{1}{H} \left[ \left( \frac{h}{3} \right)^2 + \left( \frac{h'}{3} \right)^2 + \left( \frac{h''}{3} \right)^2 \right] \right\},$$

expression qu'il est facile de construire géométriquement.

Si l'on pose

$$h = H + \zeta, \quad h' = H + \zeta', \quad h'' = H + \zeta'',$$

et si l'on remarque que  $\zeta + \zeta' + \zeta'' = 0$ , la formule (2) devient

$$z_1 = \frac{H}{2} + \frac{1}{24H} [(\zeta + \zeta' + \zeta'')^2 + \zeta^2 + \zeta'^2 + \zeta''^2].$$

On voit ainsi que le centre de gravité (G, G') se trouve à un niveau plus élevé que le milieu de la droite O'o'.