

## **Solutions de questions proposées dans les Nouvelles annales**

*Nouvelles annales de mathématiques 2<sup>e</sup> série*, tome 17  
(1878), p. 523-525

[http://www.numdam.org/item?id=NAM\\_1878\\_2\\_17\\_\\_523\\_1](http://www.numdam.org/item?id=NAM_1878_2_17__523_1)

© Nouvelles annales de mathématiques, 1878, tous droits réservés.

L'accès aux archives de la revue « Nouvelles annales de mathématiques » implique l'accord avec les conditions générales d'utilisation (<http://www.numdam.org/conditions>). Toute utilisation commerciale ou impression systématique est constitutive d'une infraction pénale. Toute copie ou impression de ce fichier doit contenir la présente mention de copyright.

NUMDAM

Article numérisé dans le cadre du programme  
Numérisation de documents anciens mathématiques

<http://www.numdam.org/>

---

---

**SOLUTIONS DE QUESTIONS  
PROPOSÉES DANS LES NOUVELLES ANNALES**

---

*Question 1286*

(voir 2<sup>e</sup> série, t. XVII, p. 432);

PAR M. P. TERRIER.

*Deux droites de même longueur, OA, OB, et un point P sont donnés, une droite mobile, passant par le point P, coupe OA en A<sub>1</sub> et OB en B<sub>1</sub>. On décrit deux cercles ayant pour centres A<sub>1</sub> et B<sub>1</sub>, et passant respectivement par A et B. Trouver le lieu géométrique des points communs à ces deux cercles. (DROZ.)*

Les droites *a* et *b* tangentes au cercle OA en A et B, et la corde MN (réelle ou idéale) commune aux cercles A<sub>1</sub> et B<sub>1</sub>, sont les axes radicaux des cercles O, A<sub>1</sub> et B<sub>1</sub>, considérés deux à deux. La corde MN passe donc par le point d'intersection Q des tangentes *a* et *b*, et la puissance de ce point, par rapport aux points M, N, est égale au carré de QA. Le lieu des points M, N est donc un cercle qui a son centre au point P, avec lequel les centres A<sub>1</sub> et B<sub>1</sub> sont alignés.

*Note.* Autres solutions de MM. Moret-Blanc; Fillon, répétiteur au lycée du Havre; Jean Griess; C. Yagane; Fauquembergue.

---

**Question 1290**( voir 2<sup>e</sup> série, t. XVII, p. 479 );

PAR M. J. DE VIRIEU,

Professeur à Lyon.

Soient  $r, r_1, r_2, r_3$  les rayons des cercles tangents aux côtés d'un triangle; démontrer que

$$a + b + c = 3(r^{-1}r_1r_2r_3)^{\frac{1}{2}} - (rr_1^{-1}r_2r_3)^{\frac{1}{2}} - (rr_1r_2^{-1}r_3)^{\frac{1}{2}} - (rr_1r_2r_3^{-1})^{\frac{1}{2}}.$$

(T. MITCHESON, B. A.; L. C. P.)

Les formules connues

$$s = rp, \quad s = r_1(p - a),$$

$$s = r_2(p - b), \quad s = r_3(p - c), \quad s = (rr_1r_2r_3)^{\frac{1}{2}}$$

donnent

$$p = (r^{-1}r_1r_2r_3)^{\frac{1}{2}}, \quad p - a = (rr_1^{-1}r_2r_3)^{\frac{1}{2}},$$

$$p - b = (rr_1r_2^{-1}r_3)^{\frac{1}{2}}, \quad p - c = (rr_1r_2r_3^{-1})^{\frac{1}{2}}.$$

Si de trois fois la première de ces quatre équations on retranche la somme des trois dernières, on a

$$a + b + c = 3(r^{-1}r_1r_2r_3)^{\frac{1}{2}} - (rr_1^{-1}r_2r_3)^{\frac{1}{2}} - (rr_1r_2^{-1}r_3)^{\frac{1}{2}} - (rr_1r_2r_3^{-1})^{\frac{1}{2}}.$$

*Note.* Solutions analogues de MM. Ch. Cochez; Moret-Blanc; C. Boell, élève du lycée du Havre; E. Fauquembergue, maître répétiteur au Lycée de Saint-Quentin; Robaglia, maître répétiteur au lycée d'Alger.

**Question 1292**( voir 2<sup>e</sup> série, t. XVII, p. 480 );

PAR M. C. H., ABONNÉ.

Démontrer qu'il est impossible de résoudre en nombres entiers aucune des trois équations

$$(1) \quad x_1^6 + x_2^6 + x_3^6 + x_4^6 + x_5^6 + x_6^6 + x_7^6 = 9 \cdot x_8 + 8,$$

$$(2) \quad x^3 + y^6 = 9 \cdot z + 7,$$

$$(3) \quad x^3 + y^6 = 7 \cdot z + 5. \quad \text{(LAISANT.)}$$

1° Il est évident, d'après l'équation (1), que les sept nombres  $x_1, x_2, \dots, x_7$  ne sont pas tous multiples de 3; car, dans ce cas, leur somme serait multiple de 9.

Or, la sixième puissance d'un nombre non divisible par 3, étant égale à un multiple de 9, augmenté de l'unité, le premier membre de l'équation (1) est nécessairement de la forme  $9.n + r$ , où  $r$  représente un entier moindre que 8. Donc l'équation (1) est impossible en nombres entiers.

2° Remarquons de même que, dans l'équation (2), les nombres  $x, y$  ne peuvent être tous deux multiples de 3.

Si aucun de ces nombres n'admet 3 comme facteur, on aura

$$x^5 = 9m \pm 1, \quad y^6 = 9.n + 1;$$

$$x^3 + y^6 = 9z + 2, \quad \text{ou} \quad x^3 + y^6 = 9z.$$

En supposant  $x$  divisible par 3, on a

$$x^3 + y^6 = 9z + 1.$$

Enfin, si  $y$  est multiple de 3, il en résulte

$$x^3 + y^6 = 9z \pm 1.$$

Donc, en représentant par  $r$  un nombre moindre que 9, l'équation  $x^3 + y^6 = 9z + r$  n'admet de solutions entières que pour  $r = 0, = 1, = 2, = 8$ .

3° Le cube d'un nombre premier avec 7, étant égal à un multiple de 7, augmenté ou diminué de l'unité, le premier membre,  $x^3 + y^6$ , de l'équation (3) ne peut avoir que l'une de ces formes :

$$7z, \quad 7z + 1, \quad 7z + 2, \quad 7z + 6.$$

Et, par conséquent, aucune des équations

$$x^3 + y^6 = 7z + 3, \quad = 7z + 4, \quad = 7z + 5$$

n'admet de solution entière.

*Note.* La même question a été résolue par M. Moret-Blanc.