

CH. BIEHLER

**Sur une classe d'équations algébriques
dont toutes les racines sont réelles**

Nouvelles annales de mathématiques 3^e série, tome 6
(1887), p. 9-18

http://www.numdam.org/item?id=NAM_1887_3_6__9_1

© Nouvelles annales de mathématiques, 1887, tous droits réservés.

L'accès aux archives de la revue « Nouvelles annales de mathématiques » implique l'accord avec les conditions générales d'utilisation (<http://www.numdam.org/conditions>). Toute utilisation commerciale ou impression systématique est constitutive d'une infraction pénale. Toute copie ou impression de ce fichier doit contenir la présente mention de copyright.

NUMDAM

Article numérisé dans le cadre du programme
Numérisation de documents anciens mathématiques

<http://www.numdam.org/>

**SUR UNE CLASSE D'ÉQUATIONS ALGÈBRIQUES
DONT TOUTES LES RACINES SONT RÉELLES;**

PAR M. CH. BIEHLER.

1. Si l'on pose

$$y = \frac{1}{\sqrt{1 - 2xx + x^2}},$$

la dérivée d'ordre n de y par rapport à x est une expression de la forme

$$\frac{Q_n(x, \alpha)}{(1 - 2\alpha x + \alpha^2)^{n + \frac{1}{2}}},$$

où $Q_n(x, \alpha)$ est un polynôme de degré n en x et de degré n en α .

Je vais mettre en évidence quelques propriétés du polynôme $Q_n(x, \alpha)$, et je supposerai, dans ce qui va suivre, que x ait reçu des valeurs telles que le trinôme $1 - 2\alpha x + \alpha^2$ ait ses zéros imaginaires, c'est-à-dire que x soit compris entre -1 et $+1$.

De l'égalité

$$y = \frac{1}{\sqrt{1 - 2\alpha x + \alpha^2}},$$

on tire

$$y' = -\frac{1}{\sqrt{1 - 2\alpha x + \alpha^2}} \times \frac{x - \alpha}{1 - 2\alpha x + \alpha^2}$$

ou bien

$$y'(1 - 2\alpha x + \alpha^2) + y(x - \alpha) = 0.$$

En dérivant n fois les deux membres par rapport à x , il viendra

$$y^{(n+1)}(1 - 2\alpha x + \alpha^2) + (2n + 1)y^{(n)}(x - \alpha) + n^2 y^{(n-1)} = 0.$$

En remplaçant $y^{(n+1)}$, $y^{(n)}$, $y^{(n-1)}$ par leurs valeurs exprimées en fonction des polynômes de la forme $Q_n(x, \alpha)$, on aura

$$(\alpha) \quad \begin{cases} Q_{n+1}(x, \alpha) + (2n + 1)(x - \alpha)Q_n(x, \alpha) \\ + n^2(1 - 2\alpha x + \alpha^2)Q_{n-1}(x, \alpha) = 0. \end{cases}$$

En différenciant l'équation

$$y^{(n)} = \frac{Q_n(x, \alpha)}{(1 - 2\alpha x + \alpha^2)^{n + \frac{1}{2}}},$$

aisément que $Q_{n+1}(x, \alpha) = 0$ a aussi toutes ses racines réelles et séparées par celles de $Q_n(x, \alpha) = 0$.

On arrive encore au même résultat en appliquant le théorème de Rolle, au moyen de l'équation différentielle (d). On voit clairement, dans tout ce qui précède, la nécessité de supposer que le polynôme

$$(1 - 2\alpha x + \alpha^2)$$

ne change pas de signe quand α varie de $-\infty$ à $+\infty$ et par suite la nécessité d'astreindre x à être compris entre -1 et $+1$.

3. Si l'on développe la fonction $\frac{1}{\sqrt{1 - 2\alpha x + \alpha^2}}$ suivant les puissances ascendantes de α , sous la forme

$$\frac{1}{\sqrt{1 - 2\alpha x + \alpha^2}} = X_0 + \alpha X_1 + \alpha^2 X_2 + \dots + \alpha^n X_n + \dots,$$

les coefficients X_0, X_1, \dots, X_n sont, comme l'on sait, les polynômes de Legendre. Leur degré en x est égal à l'indice de X . Ces polynômes sont liés aux polynômes $Q_n(x, \alpha)$ par la relation

$$\frac{1}{1 \cdot 2 \cdot 3 \dots n} \left(\frac{\partial^n y}{\partial \alpha^n} \right)_0 = X_n:$$

or

$$\frac{\partial^n y}{\partial \alpha^n} = \frac{Q_n(x, \alpha)}{(1 - 2\alpha x + \alpha^2)^{n + \frac{1}{2}}}.$$

En faisant $\alpha = 0$ dans cette égalité, on obtient

$$1 \cdot 2 \cdot 3 \dots n X_n = Q_n(x, 0).$$

Cette relation nous fournit immédiatement celle qui lie entre eux trois polynômes X d'indices consécutifs. En faisant $\alpha = 0$ dans la relation (a), on obtient

$$Q_{n+1}(x, 0) + (2n + 1)(-x)Q_n(x, 0) + n^2 Q_{n-1}(x, 0) = 0$$

ou

$$(n-1)! X_{n+1} - (2n-1)x.n! X_n - n^2(n-1)! X_{n-1} = 0,$$

en désignant le produit 1.2.3...n par n!.

En supprimant le facteur numérique n!, il viendra

$$(e) \quad (n-1)X_{n+1} - (2n-1)xX_n + nX_{n-1} = 0.$$

Cette relation permet d'appliquer le théorème de Sturm à l'équation

$$X_n = 0,$$

et de montrer qu'elle a toutes ses racines réelles.

Pour savoir si la suite X_n, X_{n-1}, . . . , X₁, X₀ gagne ou perd ses variations, il suffit de considérer l'équation (e), qui nous fait voir que les coefficients de la plus haute puissance de x ont le même signe dans toutes les fonctions X_n, X_{n-1}, . . . , X. La suite perd donc ses variations quand x passe de -∞ à +∞.

Le polynôme Q_n(x, α) peut s'exprimer d'une manière simple en fonction des quantités X_n.

On a, en effet,

$$Q_n(x, \alpha) = Q_n(x, 0) - \alpha Q'_n(x, 0) + \frac{\alpha^2}{1.2} Q''_n(x, 0) - \dots + \frac{\alpha^n}{n!} Q_n^{(n)}(x, 0).$$

les dérivées étant prises par rapport à α

D'après la relation (c).

$$Q'_n(x, \alpha) = -n^2 Q_{n-1}(x, \alpha);$$

par suite,

$$Q''_n(x, \alpha) = -n^2 Q'_{n-1}(x, \alpha) = n^2(n-1)^2 Q_{n-2}(x, \alpha),$$

$$\dots \dots \dots Q^{(\mu)}(x, \alpha) = (-1)^\mu n^2(n-1)^2 \dots (n-\mu+1)^2 Q_{n-\mu}(x, \alpha).$$

En faisant $x = 0$ dans toutes ces égalités, on aura

$$\begin{aligned}
Q'_n(x, 0) &= -n^2 Q_{n-1}(x, 0), \\
Q''_n(x, 0) &= n^2(n-1)^2 Q_{n-2}(x, 0), \\
&\dots\dots\dots \\
Q^{(\mu)}(x, 0) &= (-1)^\mu n^2(n-1)^2 \dots (n-\mu+1)^2 Q_{n-\mu}(x, 0),
\end{aligned}$$

et, en remplaçant $Q_{n-1}(x, 0) \dots, Q_{n-\mu}(x, 0)$ par leur expression en $X_{n-1}, \dots, X_{n-\mu}$, il viendra

$$\begin{aligned}
Q'_n(x, 0) &= -n \cdot n! X_{n-1}, \\
Q''_n(x, 0) &= n(n-1) n! X_{n-2}, \\
&\dots\dots\dots \\
Q^{(\mu)}_n(x, 0) &= (-1)^\mu n(n-1) \dots (n-\mu+1) n! X_{n-\mu};
\end{aligned}$$

on peut donc écrire

$$\begin{aligned}
\frac{Q_n(x, \alpha)}{n!} &= X_n - n \alpha X_{n-1} + \frac{n(n-1)}{2!} \alpha^2 X_{n-2} - \dots \\
&\quad - (-1)^\mu \frac{n(n-1) \dots (n-\mu+1)}{\mu!} \alpha^\mu X_{n-\mu} + \dots
\end{aligned}$$

L'équation différentielle (d) nous fournit la valeur de $Q_n(x, \alpha)$ pour $x = 0$; cette expression peut aussi se tirer de la précédente en remarquant qu'on a, d'une manière générale,

$$(n-1)[X_{n+1}]_{x=0} - n[X_{n-1}]_{x=0} = 0.$$

Les polynômes X_n ne renferment, d'après la relation (e), que des puissances de même parité; l'expression de $Q_n(0, \alpha)$ ne renfermera donc que des puissances de α de même parité. L'équation différentielle (d) nous donne

$$\begin{aligned}
(-1)^\mu \frac{Q_n(0, \alpha)}{n!} &= \alpha^n - \frac{n(n-1)}{1 \cdot 2^2} \alpha^{n-2} \\
&\quad + \frac{n(n-1)(n-2)(n-3)}{(1 \cdot 2)^2 \times 2^4} \alpha^{n-4} - \dots \\
&\quad + (-1)^\mu \frac{n(n-1) \dots (n-2p+1)}{(1 \cdot 2 \cdot 3 \cdot p)^2 2^{2p}} \alpha^{n-2p} + \dots
\end{aligned}$$

La valeur $x = 0$ transforme $(1 - 2ax + x^2)$ en $1 + x^2$;
par suite, l'équation

$$Q_n(0, x) = 0$$

a aussi toutes ses racines réelles.

4. Nous allons maintenant chercher d'autres expressions du polynôme X_n .

A cet effet, remarquons que

$$y = \frac{1}{\sqrt{1 - 2ax + x^2}}$$

peut s'écrire

$$y = \frac{1}{\sqrt{1 - x^2}} \times \frac{1}{\sqrt{1 + \left(\frac{x - a}{\sqrt{1 - x^2}}\right)^2}}$$

Si l'on pose

$$\frac{x - a}{\sqrt{1 - x^2}} = z,$$

on aura

$$y = \frac{1}{\sqrt{1 - x^2}} \times \frac{1}{\sqrt{1 + z^2}},$$

par suite

$$\frac{\partial y}{\partial x} = \frac{\partial y}{\partial z} \times \frac{\partial z}{\partial x} = \frac{\partial y}{\partial z} \left(\frac{-1}{\sqrt{1 - x^2}} \right),$$

$$\frac{\partial^2 y}{\partial x^2} = \frac{\partial^2 y}{\partial z^2} \left(\frac{-1}{\sqrt{1 - x^2}} \right)^2,$$

.....

$$\frac{\partial^n y}{\partial x^n} = \frac{\partial^n y}{\partial z^n} \frac{(-1)^n}{(\sqrt{1 - x^2})^n}.$$

Or

$$\frac{\partial^n y}{\partial z^n} = \frac{Q_n(0, z)}{(1 - z^2)^{n + \frac{1}{2}}} \frac{1}{\sqrt{1 - x^2}};$$

par suite

$$\frac{\partial^n y}{\partial x^n} = \frac{Q_n(0, z)}{(1 + z^2)^{n + \frac{1}{2}}} \frac{(-1)^n}{(\sqrt{1 - x^2})^n} \frac{1}{\sqrt{1 - x^2}},$$

(17)

et, faisant $\alpha = 0$,

$$\left(\frac{\partial^n y}{\partial \alpha^n}\right)_{\alpha=0} = \frac{Q_n(0, z_0)}{(1+z_0^2)^{n+\frac{1}{2}}} \frac{(-1)^n}{(\sqrt{1-x^2})^{n+1}},$$

en désignant par z_0 ce que devient z pour $\alpha = 0$. Mais

$$z = \frac{x-\alpha}{\sqrt{1-x^2}}, \quad \text{donc} \quad z_0 = \frac{x}{\sqrt{1-x^2}},$$

$$1+z_0^2 = 1 + \frac{x^2}{1-x^2} = \frac{1}{1-x^2};$$

par suite

$$\left(\frac{\partial^n y}{\partial \alpha^n}\right)_0 = Q_n\left(0, \frac{x}{\sqrt{1-x^2}}\right) \frac{(1-x^2)^{n+\frac{1}{2}}(-1)^n}{(\sqrt{1-x^2})^{n+1}},$$

$$\left(\frac{\partial^n y}{\partial \alpha^n}\right)_0 = (-1)^n Q_n\left(0, \frac{x}{\sqrt{1-x^2}}\right) (\sqrt{1-x^2})^n,$$

ou enfin

$$n! X_n = (-1)^n Q_n\left(0, \frac{x}{\sqrt{1-x^2}}\right) (\sqrt{1-x^2})^n.$$

Cette égalité nous fait voir que les racines de l'équation $X_n = 0$ sont toutes comprises entre -1 et $+1$.

En effet, l'équation

$$Q_n(0, \alpha) = 0$$

a toutes ses racines réelles; soient $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_n$ ces racines.

Les racines de l'équation $X_n = 0$ étant désignées par x_1, x_2, \dots, x_n , on a

$$\alpha_1 = \frac{x_1}{\sqrt{1-x_1^2}}, \quad \dots, \quad \alpha_n = \frac{x_n}{\sqrt{1-x_n^2}},$$

d'où

$$x_1 = \frac{\alpha_1}{\sqrt{1+\alpha_1^2}}, \quad \dots, \quad x_n = \frac{\alpha_n}{\sqrt{1+\alpha_n^2}},$$

au signe près; on voit par suite que x_1, x_2, \dots, x_n sont

toutes réelles et plus petites que l'unité en valeur absolue.

Nous avons trouvé l'expression de $Q_n(0, \alpha)$, à savoir

$$(-1)^n \frac{Q_n(0, \alpha)}{n!} = \alpha^n - \frac{n(n-1)}{1 \cdot 2^2} \alpha^{n-2} \\ + \frac{n(n-1)(n-2)(n-3)}{(1 \cdot 2)^2 2^4} \alpha^{n-4} - \dots;$$

on en déduit

$$X_n = \frac{(-1)^n}{n!} Q_n \left(0, \frac{x}{\sqrt{1-x^2}} \right) (\sqrt{1-x^2})^n \\ = x^n - \frac{n(n-1)}{1 \cdot 2^2} x^{n-2}(1-x^2) \\ + \frac{n(n-1)(n-2)(n-3)}{(1 \cdot 2)^2 2^4} x^{n-4}(1-x^2)^2 - \dots \\ + (-1)^p \frac{n(n-1) \dots (n-2p+1)}{(p!)^2 \times 2^{2p}} x^{n-2p}(1-x^2)^p + \dots$$

On sait que, si l'on prend la dérivée d'ordre n de $(x^2-1)^n$ en employant la formule connue pour la dérivée d'ordre n d'une fonction de fonction de la forme $\varphi(x^2)$, à savoir

$$\frac{d^n [\varphi(x^2)]}{dx^n} = (2x)^n \varphi^{(n)}(x^2) - \frac{n(n-1)}{1} (2x)^{n-2} \varphi^{n-1}(x^2) \\ - \frac{n(n-1)(n-2)(n-3)}{1 \cdot 2} (2x)^{n-4} \varphi^{n-3}(x^2) + \dots,$$

il viendra

$$\frac{d^n [(x^2-1)^n]}{dx^n} = 2^n n! \left[x^n + \frac{n(n-1)}{2^2} x^{n-2}(x^2-1) \right. \\ \left. + \frac{n(n-1)(n-2)(n-3)}{(1 \cdot 2)^2 2^4} x^{n-4}(x^2-1)^2 + \dots \right].$$

En comparant cette expression avec celle de X_n précédemment trouvée, il viendra

$$X_n = \frac{1}{2^n n!} \frac{d^n [(x^2-1)^n]}{dx^n},$$

qui est l'expression bien connue du polynôme X_n .