

SÉMINAIRE DE THÉORIE SPECTRALE ET GÉOMÉTRIE

HE OUYANG

On isospectral deformations on nilmanifolds

Séminaire de Théorie spectrale et géométrie, tome S9 (1991), p. 119-120

<http://www.numdam.org/item?id=TSG_1991__S9__119_0>

© Séminaire de Théorie spectrale et géométrie (Grenoble), 1991, tous droits réservés.

L'accès aux archives de la revue « Séminaire de Théorie spectrale et géométrie » implique l'accord avec les conditions générales d'utilisation (<http://www.numdam.org/conditions>). Toute utilisation commerciale ou impression systématique est constitutive d'une infraction pénale. Toute copie ou impression de ce fichier doit contenir la présente mention de copyright.

NUMDAM

*Article numérisé dans le cadre du programme
Numérisation de documents anciens mathématiques
<http://www.numdam.org/>*

**RENCONTRES DE THEORIE SPECTRALE ET GEOMETRIE
GRENOBLE 1991
(Aussois du 7 au 14 avril)**

**On isospectral deformations
on nilmanifolds**

He OUYANG

Department of Mathematics
Washington University
ST LOUIS MO 63130
U.S.A.

Suppose G is a simply-connected nilpotent Lie-group and Γ a discrete cocompact subgroup in G .

Suppose g is a left-invariant metric on nilmanifold $M = \Gamma \backslash G$ and $\{\Phi_t\}_{t \in I}$ is a continuous family of almost inner automorphisms relative to Γ (see [G]).

Then Gordon and Wilson proved in [GW] that $\{g_t = \Phi_t^* g\}_{t \in I}$ is an isospectral deformation of metric g on $\Gamma \backslash G$. Conversely we proved following theorem : if G is a 2-step nilpotent Lie-group, $\Gamma < G$ a cocompact lattice and $\{g_t\}_{t \in I}$ is a continuous isospectral family of left-invariant metrics on $\Gamma \backslash G$, then there exists a continuous family of almost inner automorphisms $\{\Phi_t\}_{t \in I}$ of G relative to Γ such that $g_t = \Phi_t^* g_0$. When G is nonsingular, the theorem is proved firstly by H. Pesce. He also independently proved the general theorem by explicitly describing all the irreducible unitary representations appeared in the representation of G on $L^2(\Gamma \backslash G)$.

For arbitrary step nilpotent group case, the same question is still open.

References

- [G] GORDON C. — *The Laplacian spectra versus the length spectra of Riemannian manifolds*, Comtemp Math., 51 (1986), 63–80.
- [GW] GORDON C., WILSON E. — *Isospectral deformations of compact solvmanifolds*, J. Differential Geom., 19 (1984), 241–256.
- [O] OUYANG H. — *On spectral rigidity of deformations modulo almost inner automorphisms on nilmanifolds*, Preprint, 1990.
- [P] PESCE H. — *Finitude spectrale des variétés de Heisenberg*, Prépublication de l’Institut Fourier n° 157, Grenoble, 1990.
- [P] PESCE H. — *Calcul du spectre d’une nilvariété de rang deux et applications*, Prépublication de l’Institut Fourier, Grenoble, 1991.