

ANNALES DE LA FACULTÉ DES SCIENCES DE TOULOUSE

A. LAFAY

Note sur la série $\sum_1^{\infty} \frac{1}{n^s}$

Annales de la faculté des sciences de Toulouse 1^{re} série, tome 6, n^o 3 (1892), p. I1-I6

http://www.numdam.org/item?id=AFST_1892_1_6_3_I1_0

© Université Paul Sabatier, 1892, tous droits réservés.

L'accès aux archives de la revue « Annales de la faculté des sciences de Toulouse » (<http://picard.ups-tlse.fr/~annales/>) implique l'accord avec les conditions générales d'utilisation (<http://www.numdam.org/conditions>). Toute utilisation commerciale ou impression systématique est constitutive d'une infraction pénale. Toute copie ou impression de ce fichier doit contenir la présente mention de copyright.

NUMDAM

*Article numérisé dans le cadre du programme
Numérisation de documents anciens mathématiques
http://www.numdam.org/*

NOTE SUR LA SÉRIE $\sum_1^\infty \frac{1}{n^s}$,

PAR M. A. LAFAY,

Lieutenant d'Artillerie au 11^e bataillon de forteresse, à Lyon.

1. Dans cette Note, nous allons étudier la série $\sum_1^\infty \frac{1}{n^s}$ à l'aide des formules générales suivantes qui peuvent être utilisées dans bien des cas analogues.

De la relation évidente

$$(o) \quad 0 = \int_r^q f(x) dx - \sum_r^{q-1} \int_0^1 f(n+1-u) du,$$

on déduit, en intégrant par parties l'intégrale placée sous le signe \sum et en utilisant les propriétés bien connues des polynômes bernoulliens, $\varphi_\alpha(u)$,

$$(1) \quad \sum_r^{q-1} f(n) = \int_r^q f(x) dx - \sum_r^{q-1} \int_0^1 f'(n+1-u) du,$$

$$(2) \quad \sum_r^{q-1} f(n) = \left[\int f(x) dx - \frac{1}{1 \cdot 2} f(x) \right]_r^q - \sum_r^{q-1} \int_0^1 f''(n+1-u) \varphi_1(u) du,$$

.....

$$(2p) \quad \sum_r^{q-1} f(n) = \left[\int f(x) dx - \frac{1}{1 \cdot 2} f(x) + \frac{1}{2} B_1 f'(x) + \dots + (-1)^{p-2} \frac{B_{p-1}}{1 \cdot 2 \dots (2p-2)} f^{2p-3}(x) \right]_r^q - \sum_r^{q-1} \int_0^1 f^{2p}(n+1-u) \varphi_{2p-1}(u) du.$$

Ces formules s'obtiennent également de la manière suivante : Dans la

formule d'Euler

$$\begin{aligned} \int_a^{a+h} f(x) dx &= \frac{h}{1,2} \Delta f(a) + h f(a) - \frac{1}{2} B_1 h^2 \Delta f'(a) + \dots \\ &+ (-1)^{p-1} \frac{B_{p-1} h^{2p-2}}{1 \cdot 2 \dots (2p-2)} \Delta f^{2p-3}(a) \\ &+ h^{2p} \int_0^h f^{2p}(a+h-u) \varphi_{2p-1} \left(\frac{u}{h} \right) du, \end{aligned}$$

faisons $a = n$, $h = 1$; puis effectuons sur l'équation ainsi obtenue l'opération \sum_r^{q-1} par rapport à n , en isolant dans le premier membre le terme $\sum_r^{q-1} f(n)$, nous aurons la formule $(2p)$.

2. L'application de ces formules nécessite l'étude des conditions d'absolue convergence des séries

$$R_\alpha = \sum_r^{q-1} \int_0^1 f^\alpha(n+1-u) \varphi_{\alpha-1}(u) du \quad (\alpha = 1, 2, \dots, 2p),$$

lorsque q devient infini; pour cela nous nous servons de la transformation suivante qui simplifie le travail, mais donne naturellement des conditions moins larges.

On a, en désignant par M le maximum de $|\varphi_{\alpha-1}(u)|$ entre 0 et 1 et en appliquant la relation (o),

$$\begin{aligned} |R_\alpha| &< \sum_r^{q-1} \left| \int_0^1 f^\alpha(n+1-u) \varphi_{\alpha-1}(u) du \right| \\ &< M \sum_r^{q-1} \int_0^1 |f^\alpha(n+1-u)| du < M \int_r^q |f^\alpha(x)| dx, \end{aligned}$$

relations qui permettent d'écrire

$$(A) \quad R_\alpha = e^{\omega \sqrt{-1}} \varphi_{\alpha-1}(\theta) \int_0^q |f^\alpha(x)| dx \quad \text{avec} \quad 0 \leq \theta \leq 1,$$

NOTE SUR LA SÉRIE $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^s}$.

et montrent qu'il suffit pour que R_α soit absolument convergente que l'intégrale $\int_r^{q=\infty} |f^\alpha(x)| dx$ soit finie et déterminée.

3. Considérons maintenant la série $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^s}$ dans laquelle $s = a + bi$; il vient en appliquant (1),

$$(1') \quad \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^s} = \int_1^{\infty} \frac{dx}{x^s} - R_1.$$

Supposons $a > 0$, la relation (A) montre que la série complémentaire R_1 est absolument convergente; car, $\left| \left(\frac{1}{x^s} \right)' \right| = \left| \frac{-h}{x^{1+s}} \right| = \frac{+ \sqrt{a^2 + b^2}}{x^{1+a}}$ reste fini dans le champ d'intégration (1 à ∞) et est infiniment petit d'ordre supérieur à 1 pour $x = \infty$.

L'étude de $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^s}$ est ainsi ramenée à celle de l'intégrale $\int_1^{\infty} \frac{dx}{x^s}$, c'est-à-dire de

$$\lim_{q \rightarrow \infty} \left[\frac{q^{1-s}}{1-s} - \frac{1}{1-s} \right],$$

et l'on trouve alors facilement que la série considérée est

- 1° Absolument convergente si $\alpha > 1$;
- 2° Finie, mais indéterminée comme l'expression $\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{1}{b} (\sin b \arg x + i \cos b \arg x)$, si $\alpha = 1$ avec $b \geq 0$;
- 3° Divergente si $\alpha = 1$ avec $b = 0$, ou $\alpha < 1$ avec b quelconque,

et cette dernière conséquence subsiste pour $\alpha \leq 0$, car dans cette hypothèse (1') montre que $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^s}$ est la somme algébrique de deux quantités dont les ordres d'infinitude diffèrent et ne peuvent mutuellement se réduire.

4. D'après ce qui précède, $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^s}$, considérée comme fonction de s , n'est analytiquement bien définie que pour des valeurs de s dont l'affixe se trouve

dans la région du plan déterminée par la condition $\alpha > 1$; mais l'équation

$$\sum_1^{q-1} \frac{1}{n^s} = \left(\frac{q^{1-s}}{1-s} - \frac{1}{1-s} \right) - R_1$$

nous fournit directement, par la considération de $\lim_{q \rightarrow \infty} \left[\sum_1^{q-1} \frac{1}{n^s} - \frac{q^{1-s}}{1-s} \right]$,

une fonction de s qui, absolument confondue avec $\sum_1^{\infty} \frac{1}{n^s}$ dans la région ($\alpha > 1$), conserve des propriétés analytiques bien définies dans la région plus étendue ($\alpha > 0$), car dans toute cette région la série R_1 reste absolument convergente.

Enfin l'application de la formule (2p) nous conduit à la fonction

$$\zeta(s) = \lim_{q \rightarrow \infty} \left\{ \sum_1^{q-1} \frac{1}{n^s} - \left[\frac{q^{1-s}}{1-s} - \frac{1}{2} q^{-s} - \frac{1}{2} B_1 s q^{-s-1} + \dots + (-1)^{p-1} \frac{B_{p-1}}{1 \cdot 2 \dots (2p-2)} s(s+1) \dots (s+2p-4) q^{-s-2p+3} \right] \right\},$$

dont le domaine analytique s'étend indéfiniment pour des valeurs de p , de plus en plus grandes.

Cette fonction $\zeta(s)$ qui se trouve ainsi mise sous la forme

$$(2p') \quad \zeta(s) = \frac{1}{s-1} + \frac{1}{2} + \frac{1}{2} B_1 s - \frac{B_2}{1 \cdot 2 \cdot 3 \cdot 4} s(s+1)(s+2) + \dots + (-1)^{p-2} \frac{B_{p-1}}{1 \cdot 2 \dots (2p-2)} s(s+1) \dots (s+2p-4) - s(s+1) \dots (s+2p-1) \sum_1^{\infty} \int_0^1 \frac{\varphi_{2p-1}(u)}{(n+1-u)^{s+2p}}$$

n'est autre chose que la fonction considérée par Riemann.

5. De la formule (2p') se déduisent facilement quelques propriétés de $\zeta(s)$,

1° $\zeta(s) - \frac{1}{s-1}$ ou $(s-1)\zeta(s)$ sont des fonctions holomorphes;

2° $\zeta(-2n) = 0$ ($n = 1, 2, \dots$) (RIEMANN),

car

$$\begin{aligned}\zeta(-2n) &= -\frac{1}{2n+1} + \frac{1}{2} - \frac{B_1}{1 \cdot 2} 2n + \dots \\ &\quad + (-1)^i \frac{B_i}{1 \cdot 2 \dots i} 2n(2n-1)\dots(2n-2i+2) + \dots + (-1)^n B_n,\end{aligned}$$

et le second membre est égal à

$$\begin{aligned}-(2n!) \varphi_{2n}(x) &= -[1^{2n} + 2^{2n} + \dots + (x-1)^{2n}] \quad \text{pour } x=1; \\ 3^\circ \quad \zeta(-2n+1) &= (-1)^n \frac{B_n}{2n} \quad (n=1, 2, \dots) \quad (\text{M. STIELTJES}),\end{aligned}$$

car, comme plus haut, on a

$$\zeta(-2n+1) = -(2n-1)! \varphi_{2n-1}(1) + (-1)^n \frac{B_n}{2n}.$$

4° Enfin, de la formule particulière

$$(1'') \quad \zeta(s) = \frac{1}{s-1} + s \sum_1^\infty \int_0^1 (n+1-u)^{-s-1} u du$$

déduite de (1), nous tirons, en remplaçant l'intégrale qui y figure par le développement

$$\begin{aligned}\int_0^1 (n+1-u)^{-s-1} u du &= \int_0^1 \frac{u du}{(n+1-u)^2} + \frac{1-s}{1} \int_0^1 \frac{\zeta(n+1-u) u du}{(n+1-u)^2} + \dots \\ &\quad + \frac{(1-s)^i}{1 \cdot 2 \dots i} \int_0^1 \frac{\zeta^i(n+1-u) u du}{(n+1-u)^2} + \dots\end{aligned}$$

et en ordonnant suivant les puissances de $(s-1)$,

$$\zeta(s) = \frac{1}{s-1} + M_0 + M_1(s-1) + \dots + M_i(s-1)^i + \dots,$$

dans laquelle

$$M_i = \frac{(-1)^i}{1 \cdot 2 \dots i} \sum_1^\infty \int_0^1 \frac{\zeta^i(n+1-u) - i\zeta^{i-1}(n+1-u)}{(n+1-u)^2} u du,$$

et l'application de cette même formule (1), dans laquelle on fait $f(x) = \frac{\zeta^i x}{x}$,

donne pour M_i l'expression indiquée par M. Jensen (*Comptes rendus*, t. CIV)

$$\begin{aligned} M_i &= \frac{(-1)^i}{1 \cdot 2 \cdots i} \lim_{q \rightarrow \infty} \left[\sum_{n=1}^{q-1} \left(\frac{1}{n} \zeta^i n \right) - \frac{1}{i+1} \zeta^{i+1} q \right] \\ &= \frac{(-1)^i}{1 \cdot 2 \cdots i} \sum_{n=1}^{\infty} \int_0^1 \frac{\zeta^i (n+1-u) - i \zeta^{i-1} (n+1-u)}{(n+1-u)^2} u du. \end{aligned}$$

