
ANNALES DE MATHÉMATIQUES PURÉS ET APPLIQUÉES.

GARNIER

**Géométrie. Recherche de la distance entre les centres des cercles
inscrit et circonscrit à un même triangle**

Annales de Mathématiques pures et appliquées, tome 3 (1812-1813), p. 346-347

[<http://www.numdam.org/item?id=AMPA_1812-1813__3__346_1>](http://www.numdam.org/item?id=AMPA_1812-1813__3__346_1)

© Annales de Mathématiques pures et appliquées, 1812-1813, tous droits réservés.

L'accès aux archives de la revue « Annales de Mathématiques pures et appliquées » implique l'accord avec les conditions générales d'utilisation (<http://www.numdam.org/conditions>). Toute utilisation commerciale ou impression systématique est constitutive d'une infraction pénale. Toute copie ou impression de ce fichier doit contenir la présente mention de copyright.

NUMDAM

*Article numérisé dans le cadre du programme
Numérisation de documents anciens mathématiques
http://www.numdam.org/*

GÉOMÉTRIE.

Recherche de la distance entre les centres des cercles inscrit et circonscrit à un même triangle ;

Par M. GARNIER, docteur ès sciences, ancien professeur à l'école polytechnique.



AU RÉDACTEUR DES *ANNALES*,

MONSIEUR,

LA lecture de vos *Annales* me laisse le regret de n'avoir pas connu plutôt cet intéressant recueil ; il m'aurait servi à améliorer

quelques théories de la première section de mon algèbre ; mais enfin je l'exploite au profit, tant de la seconde que de l'*Application de l'algèbre à la géométrie*, et des réciproques, ouvrage dont je prépare de nouvelles éditions ; ainsi, Monsieur, vous voyez que je serai de beaucoup votre débiteur.

Je ne sais trop, Monsieur, si vous consentirez à revenir sur une question déjà traitée dans le tome 1.^{er} de votre recueil (pages 149 - 158). Il s'agit de l'expression de la distance entre les centres des cercles inscrit et circonscrit à un même triangle. Il me semble que le procédé que j'ai l'honneur de vous adresser se recommande, par sa simplicité.

Soient A , B , C les trois angles du triangle proposé ; soient respectivement r et R les rayons des cercles inscrit et circonscrit ; soit enfin D la distance entre les centres de ces cercles.

En considérant D comme l'un des côtés d'un triangle dont le sommet est en A , observant que les deux autres côtés de ce triangle sont R et $\frac{r}{\sin. \frac{1}{2} A}$, et que l'angle compris est $\frac{1}{2}(B-C)$ ou $\frac{1}{2}(C-B)$; on trouvera, par l'équation fondamentale de la trigonométrie rectiligne,

$$2rR\cos. \frac{1}{2}(B-C)\sin. \frac{1}{2}A = r^2 + (R^2 - D^2)\sin^2 \frac{1}{2}A.$$

En transportant le sommet de ce triangle de A en B , on aura semblablement

$$2rR\cos. \frac{1}{2}(A-C)\sin. \frac{1}{2}B = r^2 + (R^2 - D^2)\sin^2 \frac{1}{2}B.$$

Retranchant cette dernière équation de la première, il viendra

$$\begin{aligned} 2rR\{\cos. \frac{1}{2}(B-C)\sin. \frac{1}{2}A - \cos. \frac{1}{2}(A-C)\sin. \frac{1}{2}B\} \\ = (R^2 - D^2)(\sin^2 \frac{1}{2}A - \sin^2 \frac{1}{2}B); \end{aligned}$$

or,

$$\begin{aligned} \cos. \frac{1}{2}(B-C)\sin. \frac{1}{2}A - \cos. \frac{1}{2}(A-C)\sin. \frac{1}{2}B &= \sin. \frac{1}{2}(A-B)\cos. \frac{1}{2}C \\ &= \sin. \frac{1}{2}(A-B)\sin. \frac{1}{2}(A+B) \\ &= \sin^2 \frac{1}{2}A - \sin^2 \frac{1}{2}B; \end{aligned}$$

on a donc, simplement

$$2rR = R^2 - D^2,$$

$$\text{ou } D = \sqrt{R^2 - 2rR}.$$

Paris, le 16 novembre 1812.