

POUDRA

**Construction graphique de la courbe  
gauche du troisième ordre qui passe par  
six points donnés dans l'espace**

*Nouvelles annales de mathématiques 2<sup>e</sup> série*, tome 5  
(1866), p. 313-315

[http://www.numdam.org/item?id=NAM\\_1866\\_2\\_5\\_\\_313\\_1](http://www.numdam.org/item?id=NAM_1866_2_5__313_1)

© Nouvelles annales de mathématiques, 1866, tous droits réservés.

L'accès aux archives de la revue « Nouvelles annales de mathématiques » implique l'accord avec les conditions générales d'utilisation (<http://www.numdam.org/conditions>). Toute utilisation commerciale ou impression systématique est constitutive d'une infraction pénale. Toute copie ou impression de ce fichier doit contenir la présente mention de copyright.

NUMDAM

Article numérisé dans le cadre du programme  
Numérisation de documents anciens mathématiques

<http://www.numdam.org/>

---

---

**CONSTRUCTION GRAPHIQUE**

de la courbe gauche du troisième ordre qui passe par six points donnés  
dans l'espace;

PAR M. POUDDRA.

---

Soient  $a, b, c, d, e, f$  les six points donnés dans l'espace. Prenons pour plan de construction celui qui passe

par les trois points  $a, b, c$ . Soient  $d^h, e^h$  les projections des points  $d$  et  $e$  de l'espace, sur ce plan  $abc$ .

Rabattons ces points  $d$  et  $e$  de l'espace sur le plan  $abc$  en faisant tourner les verticales projetantes  $dd^h, ee^h$  autour de leurs traces respectives  $d^h, e^h$  dans une même direction, et soient, sur la figure,  $d_1, e_1$ , ces points rabattus.

Considérons le point  $d$  comme le sommet d'un cône du second degré passant par les cinq points  $a, b, c, e, f$ , et dont la base sur le plan  $abc$  sera une section conique  $abcnog$ . Regardons de même le point  $e$  comme le sommet d'un second cône passant par les cinq points  $a, b, c, d, f$ : il aura pour base, sur le plan  $abc$ , une conique  $abchpm$  facile à déterminer.

Ces deux cônes ont une arête commune  $de$ ; leur intersection est alors une courbe du troisième ordre qui passera par les six points donnés. C'est cette courbe qu'il s'agit de construire simplement.

Par l'arête  $de$ , commune aux deux cônes, menons un plan quelconque: il coupera le plan  $abc$  suivant une droite telle que  $mgh$ , qui passera toujours par le point  $m$  quatrième intersection des deux bases, point  $m$  par lequel passe l'arête commune  $de$ . Cette droite  $mgh$  rencontrera en  $g$  la base du premier cône, et en  $h$  celle du second; et alors les droites  $dg, eh$  représenteront les arêtes des deux cônes qui sont dans le même plan; leur point d'intersection  $i$  sera donc un point de la courbe, mais rabattu. En continuant cette opération par une suite de plans coupants, on obtiendra autant de points de la courbe qu'on le désirera.

Si du point  $d_1$  on mène les deux droites  $d_1j, d_1k$ , tangentes à la base  $abcymo$  du cône dont ce point  $d_1$  est le sommet rabattu, ce seront les limites des arêtes de ce cône, et la courbe cherchée et rabattue doit donc être tangente à

ces deux droites. On obtiendra facilement les points de tangence : ainsi pour la tangente  $d_1o$ , on trace la droite  $mor$ , qui rencontre la seconde base  $abchpm$  au point  $r$ , et ce point joint à  $e_1$  donne la droite  $re_1j$ , laquelle représente l'arête du second cône qui se trouve dans le même plan que la base  $omr$  du premier. Le point  $j$  d'intersection de ces deux arêtes sera le point de tangence de la droite  $d_1oj$  et de la courbe. On trouvera de même le point  $k$ . En agissant de la même manière pour les tangentes  $e_1l$ ,  $e_1p$ , on trouvera les points  $l$  et  $n$ , où ces droites sont tangentes à la courbe.

On obtiendra la tangente à la courbe en un point quelconque  $i$  en menant les deux arêtes  $dgi$ ,  $ehi$ , qui déterminent sur les bases respectives les points  $g$  et  $h$ ; les tangentes en ces points se rencontreront en un point qui, joint à  $i$ , donnera la tangente cherchée.

On trouvera facilement les asymptotes de la courbe gauche; il suffit de déterminer dans les deux cônes les couples d'arêtes parallèles et mener (comme ci-dessus pour la tangente au point  $i$ ) les deux tangentes aux bases respectives passant par les traces de ces arêtes, alors par le point d'intersection de ces deux tangentes menant une parallèle aux couples d'arêtes ce sera une tangente à leur point d'intersection, qui est à l'infini; ce sera donc une asymptote de la courbe. Une des couples d'arêtes parallèles est la droite  $dem$ ; il peut y en avoir trois autres, dont deux peuvent être imaginaires.

Tous les résultats obtenus par ces constructions sont tracés sur le plan  $abc$  et représentent les constructions de l'espace rabattues sur ce plan; en relevant tous les points on obtiendra donc la courbe gauche dans l'espace, et les pieds des verticales donneront la projection de cette courbe sur ce plan  $abc$ .

---