

# RENDICONTI *del* SEMINARIO MATEMATICO *della* UNIVERSITÀ DI PADOVA

GIORGIO TREVISAN

## **Un teorema per i sistemi di due equazioni differenziali ordinarie**

*Rendiconti del Seminario Matematico della Università di Padova,*  
tome 17 (1948), p. 219-221

[http://www.numdam.org/item?id=RSMUP\\_1948\\_\\_17\\_\\_219\\_0](http://www.numdam.org/item?id=RSMUP_1948__17__219_0)

© Rendiconti del Seminario Matematico della Università di Padova, 1948, tous droits réservés.

L'accès aux archives de la revue « Rendiconti del Seminario Matematico della Università di Padova » (<http://rendiconti.math.unipd.it/>) implique l'accord avec les conditions générales d'utilisation (<http://www.numdam.org/conditions>). Toute utilisation commerciale ou impression systématique est constitutive d'une infraction pénale. Toute copie ou impression de ce fichier doit contenir la présente mention de copyright.

NUMDAM

*Article numérisé dans le cadre du programme  
Numérisation de documents anciens mathématiques*

<http://www.numdam.org/>

## UN TEOREMA PER I SISTEMI DI DUE EQUAZIONI DIFFERENZIALI ORDINARIE

*Nota (\*) di* GIORGIO TREVISAN *(a Padova).*

1. - Le funzioni  $f(x, y, z)$  e  $g(x, y, z)$  definite in  $S$ :  
 $a \leq x \leq b$ ,  $-\infty < y < +\infty$ ,  $-\infty < z < +\infty$  siano misurabili secondo LEBESGUE rispetto ad  $x$  e continue rispetto a  $(y, z)$ ; ed inoltre in tutto  $S$  sia

$$|f(x, y, z)| \leq h(x) \quad |g(x, y, z)| \leq h(x)$$

con  $h(x)$  sommabile in  $a \leq x \leq b$ .

Sia inoltre

$$(1) \quad \begin{aligned} |f(x, y_1, z) - f(x, y_2, z)| &\leq h(x) |y_1 - y_2| \\ |g(x, y, z_1) - g(x, y, z_2)| &\leq h(x) |z_1 - z_2| \end{aligned}$$

con  $h(x)$  sommabile in  $a \leq x \leq b$ , e siano  $f$  e  $g$  rispettivamente non decrescenti in  $z$  ed  $y$  cioè

$$(2) \quad \begin{aligned} [f(x, y, z_1) - f(x, y, z_2)] [z_1 - z_2] &\geq 0, \\ [g(x, y_1, z) - g(x, y_2, z)] [y_1 - y_2] &\geq 0. \end{aligned}$$

(\*) Pervenuta in Redazione il 21 Ottobre 1948.

Dimostriamo ora il seguente

TEOREMA: *Nelle ipotesi poste, dette  $y_1 = y_1(x)$ ,  $x_1 = x_1(x)$  e  $y_2 = y_2(x)$ ,  $x_2 = x_2(x)$  due soluzioni assolutamente continue del sistema differenziale*

$$(3) \quad \begin{aligned} y' &= f(x, y, z) \\ x' &= g(x, y, z) \end{aligned}$$

definite in  $a \leq x \leq b$  <sup>(1)</sup>, tali che la funzione  $\varphi(x) = [y_1(x) - y_2(x)] \cdot [x_1(x) - x_2(x)]$  verifichi le

$$(4) \quad \varphi(a) = \varphi(b) = 0$$

riesce

$$\varphi(x) \equiv 0 \quad a \leq x \leq b.$$

Se il teorema non fosse vero esisterebbe almeno un intervallo  $\mathbf{I}$  contenuto in  $a \leq b$  tale che ai suoi estremi  $\varphi(x)$  è nulla mentre nel suo interno è diversa da zero. Dimostriamo come il fare una tale ipotesi porti ad un assurdo.

Non è restrittivo supporre che l'intervallo  $\mathbf{I}$  coincida con  $a \leq x \leq b$ .

Sia per fissare le idee  $\varphi(x) > 0$ .

Si ha:

$$(5) \quad \begin{aligned} (y_1' - y_2')(x_1 - x_2) + (x_1' - x_2')(y_1 - y_2) &= \\ = [f(x, y_1, x_1) - f(x, y_2, x_2)] [x_1 - x_2] + \\ + [g(x, y_1, x_1) - g(x, y_2, x_2)] [y_1 - y_2] &= \\ = [f(x, y_1, x_1) - f(x, y_2, x_1)] [x_1 - x_2] + \\ + [f(x, y_2, x_1) - f(x, y_2, x_2)] [x_1 - x_2] + \\ + [g(x, y_1, x_1) - g(x, y_2, x_1)] [y_1 - y_2] + \\ + [g(x, y_2, x_1) - g(x, y_2, x_2)] [y_1 - y_2]; \end{aligned}$$

(1) Le ipotesi fatte su  $f$  e  $g$  assicurano l'esistenza di almeno una siffatta soluzione.

ed integrando questa relazione da  $b$  ad  $x$  e tenuto conto della  $\varphi(b) = 0$  e delle (1) e (2) segue

$$(6) \quad 0 \leq \varphi(x) \leq 2 \left| \int_b^x h(t) \varphi(t) dt \right|;$$

da cui notoriamente  $\varphi(x) \equiv 0$  che è contro l'ipotesi.

Se si suppone  $\varphi(x) < 0$ , basta integrare la (5) da  $a$  ad  $x$  e procedere analogamente. Così il teorema è provato.

**2.** - Non porta varianti essenziali supporre invece delle (2), che  $f$  e  $g$  siano non crescenti in  $x$  ed in  $y$ .

**3.** - Le (4) sono certamente soddisfatte se si suppone  $y_1(a) = y_2(a)$  e  $x_1(b) = x_2(b)$ ; allora se in tutto  $a \leq x \leq b$  non è ad esempio  $x_1(x) \equiv x_2(x)$  si può determinare un intervallo  $a \leq \alpha \leq x \leq \beta$ , tale che  $x_1(x) \neq x_2(x)$  in  $\alpha < x < \beta$  e  $x_1(\beta) = x_2(\beta)$ , ma il teorema dimostrato nel n.º 1 comporta  $\varphi(x) \equiv 0$  e quindi  $y_1(x) \equiv y_2(x)$  in  $\alpha \leq x \leq \beta$  e l'equazione

$$x' = g(x, y_1(x), x) = g(x, y_2(x), x)$$

ammetterebbe due soluzioni  $x_1$  e  $x_2$  distinte aventi in  $\beta$  lo stesso valore contro le (1). Si conclude che  $y_1 \equiv y_2$ ,  $x_1 \equiv x_2$  in  $a \leq x \leq b$ .

Si ottiene così un noto criterio (2).

(2) G. SCORZA DRAGONI - *Teoremi di unicità e confronto relativi ad un problema al contorno per un sistema di due equazioni differenziali, ordinarie, del primo ordine.* [Rendiconti Seminario Matematico Università di Padova, Vol. XII (1941) pagg. 30-50], vedere i teoremi di pag. 41-45. nella dimostrazione qui data è evitato il ricorso al lemma di pag. 37, viene sfruttato in cambio il fatto che la (6) comporta  $\varphi(x) \equiv 0$ .