

RENDICONTI *del* SEMINARIO MATEMATICO *della* UNIVERSITÀ DI PADOVA

ROBERTO CONTI

**Sulla convergenza in media delle derivate di una
successione di funzioni convergente in lunghezza**

Rendiconti del Seminario Matematico della Università di Padova,
tome 23 (1954), p. 86-90

http://www.numdam.org/item?id=RSMUP_1954__23__86_0

© Rendiconti del Seminario Matematico della Università di Padova, 1954, tous droits réservés.

L'accès aux archives de la revue « Rendiconti del Seminario Matematico della Università di Padova » (<http://rendiconti.math.unipd.it/>) implique l'accord avec les conditions générales d'utilisation (<http://www.numdam.org/legal.php>). Toute utilisation commerciale ou impression systématique est constitutive d'une infraction pénale. Toute copie ou impression de ce fichier doit contenir la présente mention de copyright.

NUMDAM

*Article numérisé dans le cadre du programme
Numérisation de documents anciens mathématiques*
<http://www.numdam.org/>

SULLA CONVERGENZA IN MEDIA DELLE DERIVATE DI UNA SUCCESSIONE DI FUNZIONI CONVERGENTE IN LUNGHEZZA

Nota (*) di ROBERTO CONTI (Firenze)

1. E. BAIADA ha di recente provato il seguente criterio di convergenza in lunghezza, dimostrato poi più brevemente da G. SCORZA-DRAGONI¹⁾:

A) Sia $\{y_n(x)\}$ una successione uniformemente convergente di funzioni (reali) definite in un intervallo $a \leq x \leq b$ ed ivi assolutamente continue. La funzione limite $y_0(x)$ sia (continua e) a variazione limitata.

Si abbia inoltre per ogni n :

$$(A) \quad \lim_{h \rightarrow 0^+} \sum_{r=1}^{\infty} \int_a^{b-h/2^r} |y'_n(x+h/2^r) - y'_n(x)| dx \equiv 0,$$

dove il segno $\equiv 0$ indica (qui e nel seguito) che la convergenza a zero è uniforme rispetto all'indice n .

Allora la successione $\{L_n\}$ delle lunghezze delle curve $y = y_n(x)$ tende, per $n \rightarrow \infty$, verso la lunghezza L_0 della curva $y = y_0(x)$.

Da ciò segue, per un noto teorema di L. TONELLI²⁾:

(*) Pervenuta in redazione il 7 ottobre 1953.

¹⁾ E. BAIADA, *Un criterio di convergenza in lunghezza e la derivazione per serie*, Annali della S.N.S. di Pisa (3), 6, (1952), pp. 59-68; G. SCORZA-DRAGONI, *Un criterio di convergenza in lunghezza e la derivazione per serie*, Rend. Sem. Mat. dell'Univ. di Padova, XXII (1953), pp. 177-180.

²⁾ L. TONELLI, *Fondamenti di calcolo delle variazioni*, Vol. I (Bologna, 1921), p. 92.

B_1) Nelle ipotesi di A) la successione delle derivate $\{y'_n(x)\}$ converge in misura verso la derivata $y'_0(x)$ in $a|b$, ed inoltre, per un teorema di T. RADÒ³⁾:

B_2) Nelle ipotesi di A) la successione $\{y'_n(x)\}$ converge in $a|b$ verso la $y'_0(x)$ in media di ordine $1 - \alpha$, con $\alpha > 0$ (e minore di 1) arbitrario,

ed infine, per un teorema di A. P. MORSE⁴⁾:

B_3) Nelle ipotesi di A) la successione $\{y'_n(x)\}$ converge verso $y'_0(x)$ quasi in media in $a|b$.

In questa Nota ci proponiamo di rafforzare i tre enunciati B_1), B_2), B_3) col seguente:

B) Nelle ipotesi di A) la $y_0(x)$ risulta assolutamente continua in $a|b$ e quindi⁵⁾ la successione $\{y'_n(x)\}$ converge in media del 1° ordine verso la $y'_0(x)$ ⁶⁾.

2. Sappiamo da A) che $\{L_n\}$ converge verso L_0 ; allora⁷⁾ la successione $\{V_n\}$ delle variazioni in $a|b$ delle $y_n(x)$ converge verso la variazione V_0 in $a|b$ della $y_0(x)$. Di conseguenza la successione $\{V_n(\alpha, \beta)\}$ delle variazioni in $\alpha|b$ delle $y_n(x)$ converge verso la variazione $V_0(\alpha, \beta)$ in $\alpha|b$ della $y_0(x)$, qualunque sia l'intervallo $\alpha|b$ con $a \leq \alpha < \beta \leq b$ ⁸⁾.

³⁾ T. RADÒ, *Length and area*, Am. Math. Coll. Publ., vol. XXX (New York, 1948), p. 245 (III.3.70; III.3.71).

⁴⁾ A. P. MORSE, *Convergence in variation and related topics*, Trans. Am. Math. Soc., 41 (1937), pp. 48-83 (Teorema 5.6). Una successione $\{f_n(x)\}$ di funzioni sommabili su di un insieme E misurabile si dice che converge quasi in media (almost in the mean) verso una funzione $f_0(x)$, sommabile, se ad ogni numero $\varepsilon > 0$ corrisponde un sottinsieme E_ε di E tale che $\text{mis}(E - E_\varepsilon) < \varepsilon$ e $\lim_{n \rightarrow \infty} \int_{E_\varepsilon} |f_n(x) - f_0(x)| dx = 0$.

⁵⁾ Ved. L. TONELLI, Op. cit., p. 186.

⁶⁾ Nel seguito, parlando di convergenza in media, sottintenderemo sempre « del 1° ordine ».

⁷⁾ Ved. C. R. ADAMS-H. LEWY, *On convergence in length*, Duke Math. Journal, 1 (1935), pp. 19-26; p. 20.

⁸⁾ Poichè $V_n(\alpha, \beta) = V_n(a, \beta) - V_n(a, \alpha)$ basterà provare che per $a < c < b$ è $\lim V_n(a, c) = V_0(a, c)$. Ora si ha $\lim V_n(c, b) =$

In particolare, se poniamo, per $0 \leq h \leq b - a$:

$$\varphi_n(h) = V_n(a, a + h), \quad \varphi_0(h) = V_0(a, a + h),$$

la successione $\{\varphi_n(h)\}$ converge in $0 \leq h \leq b - a$ verso la $\varphi_0(h)$. Anzi, poichè la $\varphi_0(h)$ è funzione continua di h (essendo la variazione della $y_0(x)$ che è continua) e poichè le $\varphi_n(h)$ sono non decrescenti, la convergenza della $\{\varphi_n(h)\}$ verso $\varphi_0(h)$ è uniforme in $0 \leq h \leq b - a$ rispetto ad h ⁹⁾.

Dunque $\{\varphi_n(h)\}$ è una successione uniformemente convergente di funzioni (assolutamente) continue in $0 \leq h \leq b - a$ e pertanto essa è costituita di funzioni ugualmente uniformemente continue. Vale a dire, fissato ad arbitrio un numero $\varepsilon > 0$, si può determinare un numero $\delta > 0$ tale che per ogni coppia $h' < h''$ di punti di $0 \leq h \leq b - a$ si abbia

$$0 \leq \varphi_n(h'') - \varphi_n(h') < \varepsilon$$

qualunque sia l'indice n .

In particolare, fissato $\varepsilon > 0$ come si è detto, potremo determinare un $\delta > 0$ in modo che se $0 \leq h \leq \delta$ sia

$$0 \leq \varphi_n(h) - \varphi_n(0) = \varphi_n(h) < \varepsilon$$

qualunque sia l'indice n .

Ma è

$$\varphi_n(h) = V_n(a, a + h) = \int_a^{a+h} |y'_n(x)| dx$$

e pertanto, usando il simbolo $\equiv 0$ introdotto in A), la rela-

$= \lim (V_n - V_n(a, c)) \leq \lim V_n + \lim (-V_n(a, c)) = V_0 - \overline{\lim} V_n(a, c)$.
Se non fosse vera la tesi avremmo $\overline{\lim} V_n(a, c) > V_0(a, c)$ (dovendo sempre aversi, come è noto, che $\underline{\lim} V_n(\alpha, \beta) \geq V_0(\alpha, \beta)$ qualunque sia l'intervallo (α, β)) e quindi anche $\underline{\lim} V_n(c, b) < V_0 - V_0(a, c) = V_0(c, b)$, che è assurda, per quanto si è ricordato ora.

⁹⁾ Cfr. ad es. H. BUCHANAN-T. H. HILDEBRANDT, *Note on the convergence of a sequence of functions of a certain type*, Ann. of Math., (2), 9 (1908), pp. 123-6.

zione precedente si può scrivere

$$(1) \quad \lim_{h \rightarrow 0^+} \int_a^{a+h} |y'_n(x)| dx \equiv 0.$$

Svolgendo gli stessi ragionamenti sulle $\psi_n(h) = V_n(b-h, b)$ e $\psi_0(h) = V_0(b-h, b)$ si conclude con la

$$(2) \quad \lim_{h \rightarrow 0^+} \int_{b-h}^b |y'_n(x)| dx \equiv 0.$$

Si noti infine che per la A) potremo scrivere la

$$(3) \quad \lim_{h \rightarrow 0^+} \int_a^{b-h} |y'_n(x+h) - y'_n(x)| dx \equiv 0.$$

Ciò premesso, definiamo su tutto l'asse reale le funzioni $\bar{y}'_n(x)$ ponendole uguali a zero fuori di $a \leq x \leq b$, uguali a $y'_n(x)$ dove queste esistono finite, ed ancora uguali a zero negli altri punti di $a \leq x \leq b$.

Avremo per $0 \leq h \leq b-a$:

$$\begin{aligned} \int_{-\infty}^{+\infty} |\bar{y}'_n(x+h) - \bar{y}'_n(x)| dx &= \int_{a-h}^a |y'_n(x+h)| dx + \\ &+ \int_a^{b-h} |y'_n(x+h) - y'_n(x)| dx + \int_{b-h}^b |y'_n(x)| dx, \end{aligned}$$

e quindi per le (1), (2), (3):

$$\lim_{h \rightarrow 0^+} \int_{-\infty}^{+\infty} |\bar{y}'_n(x+h) - \bar{y}'_n(x)| dx \equiv 0,$$

da cui, anche, per λ reale, infinitesimo

$$(B) \quad \lim_{|\lambda| \rightarrow 0} \int_{-\infty}^{+\infty} |\bar{y}'_n(x+\lambda) - \bar{y}'_n(x)| dx \equiv 0.$$

Inoltre, avendosi

$$\int_{-\infty}^{+\infty} |\bar{y}'_n(x)| dx = \int_a^b |y'_n(x)| dx = V_n,$$

poichè, come si è osservato in principio $\{V_n\}$ converge (verso V_0), esisterà una costante $M > 0$ tale che sia

$$(C) \quad \int_{-\infty}^{+\infty} |\bar{y}'_n(x)| dx < M. \quad (n = 1, 2, \dots)$$

La (B) e la (C) assicurano ¹⁰⁾ l'esistenza [di una sottosuccessione $\{\bar{y}'_v(x)\}$ convergente in media in $(-\infty, +\infty)$, ossia l'esistenza] di una sottosuccessione $\{y'_v(x)\}$ convergente in media in $a^{|-|b}$, verso una certa $\eta(x)$.

Avremo allora

$$\begin{aligned} \left| y_0(x) - y_0(a) - \int_a^x \eta(t) dt \right| &= \left| y_0(x) - y_v(x) + y_v(a) - y_0(a) + \right. \\ &\quad \left. + \int_a^x y'_v(t) dt - \int_a^x \eta(t) dt \right| \leq \\ &\leq 2 \max_{a^{|-|b}} |y_v(x) - y_0(x)| + \int_a^b |y'_v(t) - \eta(t)| dt \end{aligned}$$

e quindi

$$y_0(x) = y_0(a) + \int_a^x \eta(t) dt,$$

da cui l'assoluta continuità della $y_0(x)$ e quanto asserito in B).

Oss. — Come ha rilevato E. BAIADA ¹¹⁾ le ipotesi di A) *non sono sufficienti* in generale ad assicurare anche la convergenza di $\{y'_n(x)\}$ quasi dappertutto in $a^{|-|b}$.

¹⁰⁾ M. RIESZ, *Sur les ensembles compacts de fonctions sommables*, Acta Szeged, t. VI (1932-4), pp. 136-142.

¹¹⁾ Loc. cit., p. 67.