

# RENDICONTI *del* SEMINARIO MATEMATICO *della* UNIVERSITÀ DI PADOVA

ALDO BRESSAN

## **Sul moto dei sistemi anolonomi a vincoli variabili**

*Rendiconti del Seminario Matematico della Università di Padova*,  
tome 29 (1959), p. 227-241

[http://www.numdam.org/item?id=RSMUP\\_1959\\_\\_29\\_\\_227\\_0](http://www.numdam.org/item?id=RSMUP_1959__29__227_0)

© Rendiconti del Seminario Matematico della Università di Padova, 1959, tous droits réservés.

L'accès aux archives de la revue « Rendiconti del Seminario Matematico della Università di Padova » (<http://rendiconti.math.unipd.it/>) implique l'accord avec les conditions générales d'utilisation (<http://www.numdam.org/conditions>). Toute utilisation commerciale ou impression systématique est constitutive d'une infraction pénale. Toute copie ou impression de ce fichier doit contenir la présente mention de copyright.

NUMDAM

*Article numérisé dans le cadre du programme  
Numérisation de documents anciens mathématiques*  
<http://www.numdam.org/>

# SUL MOTO DEI SISTEMI ANOLONOMI A VINCOLI VARIABILI

*Nota (\*) di ALDO BRESSAN (a Padova)*

Nella presente nota mi propongo di generalizzare al caso di vincoli olonomi bilaterali ed anolonomi (lineari) variabili, alcuni teoremi stabiliti da Agostinelli nel caso che i vincoli siano fissi<sup>1)</sup>, giovandosi della rappresentazione dei sistemi dinamici su una certa « varietà vincolare » introdotta da Boggio; in primo luogo il teorema affermatore che i moti dinamicamente possibili per un sistema anolonomo  $\mathcal{S}_a$ , a vincoli bilaterali e lisci sono anche moti di un certo sistema olonomo  $\mathcal{S}_o$ . Nel caso poi in cui sia presente qualche vincolo anolonomo unilaterale, anch'esso variabile, questo teorema è estendibile ai corrispondenti moti di confine.

Giovandomi di alcune delle considerate generalizzazioni facilmente estendo al caso di sistemi  $\mathcal{S}_a^*$  sufficientemente regolari e dotati di vincoli olonomi anche unilaterali e anolonomi bilaterali, il concetto di moto di tipo  $\mathcal{M}_S$  [ossia regolare se tale al confine, soluzione in senso lato delle equazioni dinamiche e dotato di velocità continue], e alcune sue proprietà che ho stabilite in un altro lavoro<sup>2)</sup>.

Estendo infine ai considerati sistemi  $\mathcal{S}_a^*$  un teorema di unicità nel futuro del generico moto di confine in modo che, in particolare, nel caso statico resti acquisita una regola di

---

(\*) Pervenuta in Redazione il 5 novembre 1958.

Indirizzo dell'A.: Seminario matematico, Università, Padova.

1) C. AGOSTINELLI, *Nuova forma sintetica delle equazioni del moto di un sistema anolonomo etc.*, Bollettino U.M.I., Serie III, A. XI, n. 1, Gruppo IV, marzo 1956, pag. 1.

2) A. BRESSAN, *Questioni di regolarità ed unicità del moto in presenza di vincoli olonomi unilaterali*, Rendiconti del Seminario Matem. dell'Università di Padova, 1959.

equilibrio, concernente, per quanto mi consta, casi più generali di quelli finora considerati.

1. - Considero un sistema  $\mathfrak{S}_a$ , riferito a coordinate lagrangiane  $q_1 \dots q_m$  di forza viva

$$(1) \quad \mathcal{T} = \frac{1}{2} \sum_{i,k=1}^m a_{ik}(q|t) \dot{q}_i \dot{q}_k + \sum_{i=1}^m a_{0i}(q|t) \dot{q}_i + \frac{1}{2} a_{00}(q|t)$$

su cui agisca una sollecitazione attiva di componenti lagrangiane

$$(2) \quad Q_h = Q_h(q|\dot{q}|t) \quad (h = 1 \dots m).$$

Fra i vincoli, tutti lisci, figurino, oltre ai vincoli olonomi bilaterali, di cui si è tenuto conto nell'espressione (1) della  $\mathcal{T}$ , quelli anolonomi bilaterali

$$(3) \quad \sum_{s=1}^m b_{r,s}(q|t) \dot{q}_s + b_{r,0}(q|t) = 0 \quad (r = 1 \dots \alpha)$$

e quelli unilaterali

$$(4) \quad \sum_{s=1}^m b_{r,s}(q|t) \dot{q}_s + b_{r,0}(q|t) \geq 0 \quad (r = \alpha + 1 \dots \beta).$$

Seguendo Hertz e Boggio<sup>3)</sup> rappresento il sistema  $\mathfrak{S}_a$  con un punto mobile su una « varietà vincolare »  $V_m(t)$  di equazione

$$(5) \quad Q = Q(q_1 \dots q_m t).$$

Risulta allora

$$(6) \quad \mathcal{T} = \frac{1}{2} \left( \frac{dQ}{dt} \right)^2$$

da cui, posto

$$(7) \quad q_0 = t \quad (\text{onde } \dot{q}_0 = 1 \text{ e } \ddot{q}_0 = 0),$$

si ha

$$(8) \quad a_{ik}(q|t) = \frac{\partial Q}{\partial q_i} \times \frac{\partial Q}{\partial q_k} \quad (i, k = 0, 1 \dots m).$$

<sup>3)</sup> Lincei, Serie VI, Tomo XVIII, A. 1953, pag. 452.

Suppongo i  $\beta$  vincoli (3) e (4) indipendenti nel senso che, punto per punto, tali siano ad ogni istante i  $\beta$  vettori

$$(9) \quad \mathbf{b}_r(q|t) = \sum_{h=1}^m b_{rh}(q|t) \frac{\partial Q}{\partial q_h} \quad (r = 1 \dots \beta).$$

Indico, seguendo Boggio, la proiezione ortogonale di  $\frac{d^2Q}{dt^2}$  sulla  $V_m(t)$  con  $\frac{d^2Q}{dt^2v}$  ecc. ...; rappresento inoltre la forza attiva col vettore tangenziale

$$(10) \quad \mathbf{F} = \sum_{h=1}^m Q_h \frac{\partial Q}{\partial q_h}$$

e la reazione effettiva dei vincoli anolonomi (3) e (4) — di componenti iagrangiane  $\Phi_h$  — col vettore

$$(11) \quad \Phi = \sum_{h=1}^m \Phi_h \frac{\partial Q}{\partial q_h}.$$

$S_a$  si muove come se fosse liberato dai vincoli (3) e (4), e soggetto alla forza attiva  $\mathbf{F} + \Phi$ , quindi il suo punto rappresentativo sulla  $V_m(t)$ , in base ad un risultato di Boggio <sup>4)</sup>, soddisfa l'equazione

$$(12) \quad \frac{d^2Q}{dt^2v} = \mathbf{F} + \Phi.$$

Da un teorema dimostrato dal Prof. Agostinelli <sup>5)</sup> nel caso di vincoli fissi e bilaterali, risulta che la suddetta  $\Phi$  è esprimibile mediante una certa funzione delle  $q, q, t$ , per cui l'equazione (12) ammette come integrali primi, i primi membri delle equazioni dei vincoli anolonomi eguagliati a costante.

**2.** - Nell'intenzione di generalizzare in primo luogo i suddetti risultati al caso in cui i vincoli olonomi ed anolonomi dipendono dal tempo, e quelli anolonomi sono almeno in parte unilaterali, a titolo di premessa estendo i simboli di Christoffel al caso di varietà  $V_m(t)$  mobili, e stabilisco alcune formule concernenti la derivazione totale rispetto al tempo.

<sup>4)</sup> Vedi loco cit. in nota <sup>1)</sup>.

<sup>5)</sup> Vedi loc. cit. in nota <sup>1)</sup>, pag. 5, formula (15).

Tenuto conto delle (7) pongo

$$(13) \quad \{ik, l\} = \frac{\partial^2 Q}{\partial q_i \partial q_k} \times \frac{\partial Q}{\partial q_l} \quad (i, l, k = 0, 1 \dots m)$$

e, detto  $a^{ik}$  il reciproco dell'elemento  $a_{ik}$  nella matrice  $\|a_{ik}\|$  per  $i, k = 1, \dots, m$  [e non per  $i, k = 0, 1, \dots, m$ ] pongo pure

$$(14) \quad \left\{ \begin{matrix} r \\ ik \end{matrix} \right\} = \{ik, l\} a^{lr} = \sum_{l=1}^m \{ik, l\} a^{lr} \\ (i, k = 0 \dots m) \quad (r = 1, \dots m).$$

Per (13) e (8) valgono allora le

$$(15) \quad \frac{\partial a_{il}}{\partial q_i} = \{ik, l\} + \{il, k\} \quad (i, k, l = 0, 1, \dots m)$$

onde le

$$(15') \quad \{ik, l\} = \frac{1}{2} \left[ \frac{\partial a_{il}}{\partial q_k} + \frac{\partial a_{lk}}{\partial q_i} - \frac{\partial a_{ik}}{\partial q_l} \right] \quad (i, k, l = 0, 1, \dots m)$$

che esprimono i simboli  $\{ik, l\}$  e  $\left\{ \begin{matrix} r \\ ik \end{matrix} \right\}$  mediante quantità, note appena sia data l'espressione (1) della forza viva <sup>o</sup>).

Verrà utilizzata in seguito la seguente

OSSERVAZIONE 1<sup>a</sup> - Se  $u_h$  e  $u^l$  sono le componenti covarianti e controvarianti del vettore tangenziale  $\mathbf{u}$ , si ha

$$(16) \quad \left\{ \begin{array}{l} \frac{d\mathbf{u}}{dt} \times \frac{\partial Q}{\partial q_h} = \frac{du_h}{dt} - \sum_{l=1}^m u^l \sum_{k=0}^m \{hk, l\} \dot{q}_k = \\ = \sum_{k=0}^m \left[ \frac{\partial u_h}{\partial q_k} - \left\{ \begin{matrix} l \\ hk \end{matrix} \right\} u_l \right] \dot{q}_k \quad (h = 0, 1, \dots m) \\ \mathbf{u} \times \frac{d}{dt} \frac{\partial Q}{\partial t} = \sum_{h=1}^m \sum_{k=0}^m \{0k, h\} u^h \dot{q}_k = \\ = \sum_{k=0}^m \sum_{l=1}^m \left\{ \begin{matrix} l \\ 0k \end{matrix} \right\} u_l \dot{q}_k \dot{q}_0. \end{array} \right.$$

<sup>o</sup>) Le (14), (15), (15') formalmente coincidono con formule ben note concernenti i simboli di Christoffel su varietà a  $m+1$  dimensioni. I simboli  $\{ik, l\}$  e  $\left\{ \begin{matrix} h \\ ik \end{matrix} \right\}$  qui introdotti saranno usati per la derivazione, rispetto al tempo di vettori a  $m$  componenti.

Infatti è

$$\begin{aligned} \frac{d\mathbf{u}}{dt} \times \frac{\partial Q}{\partial q_h} &= \frac{d}{dt} \left( \mathbf{u} \times \frac{\partial Q}{\partial q_h} \right) - \mathbf{u} \times \frac{d}{dt} \frac{\partial Q}{\partial q_h} = \\ &= \frac{d}{dt} u_h - \sum_{l=1}^m \sum_{k=0}^m u^l \frac{\partial Q}{\partial q_l} \times \frac{\partial^2 Q}{\partial q_h \partial q_k} \dot{q}_k \\ \mathbf{u} \times \frac{d}{dt} \frac{\partial Q}{\partial t} &= \sum_{l=1}^m \sum_{h=0}^m u^l \frac{\partial Q}{\partial q_l} \times \frac{\partial^2 Q}{\partial q_0 \partial q_h} \dot{q}_h \quad (h=0, 1, \dots, m), \end{aligned}$$

da cui per (13) e (14) seguono le (16).

OSSERVAZIONE 2ª - *Mediante i simboli di Christoffel generalizzati, espressi dalle (15) si possono dare ai binomi lagrangiani le seguenti uniformi espressioni*

$$(17) \quad \frac{d}{dt} \frac{\partial \mathcal{C}}{\partial \dot{q}_h} - \frac{\partial \mathcal{C}}{\partial q_h} = \frac{\partial Q}{\partial q_h} \times \frac{d^2 Q}{dt^2} = \sum_{k=1}^m a_{hk} \ddot{q}_k + \sum_{kl=0}^m \{kl, h\} \dot{q}_k \dot{q}_l$$

(h = 1, ... m).

Infatti, stanti le (7), è

$$\begin{aligned} \frac{\partial Q}{\partial q_h} \times \frac{d^2 Q}{dt^2} &= \frac{\partial Q}{\partial q_h} \times \frac{d}{dt} \sum_{k=0}^m \frac{\partial Q}{\partial q_k} \dot{q}_k = \frac{\partial Q}{\partial q_h} \times \sum_{k=1}^m \frac{\partial Q}{\partial \dot{q}_k} \ddot{q}_k + \\ &+ \frac{\partial Q}{\partial q_h} \times \sum_{jk=0}^m \frac{\partial Q}{\partial q_j \partial q_k} \dot{q}_j \dot{q}_k \quad (h = 1, \dots, m). \end{aligned}$$

Le (17) seguono allora per (8) e (15).

**3.** - Posso ora compiere le enunciate generalizzazioni.

Intanto si può senz'altro affermare che il moto

$$q_h = q_h(t) \quad h = 1 \dots m$$

colle  $\dot{q}_h$  e  $\ddot{q}_h$  continue è dinamicamente possibile per  $\mathcal{S}_a$  e di confine per tutti in vincoli anolonomi unilaterali (4) se, posto

$$(18) \quad \mathbf{w} = \sum_{h=1}^m \frac{\partial Q}{\partial q_h} \dot{q}_h = \frac{dQ}{dt} - \frac{\partial Q}{\partial t},$$

per tale moto sussistono identicamente le eguaglianze

$$(19) \quad \mathbf{b}_r \times \mathbf{w} + b_{r,0}(q|t) = 0 \quad (r = 1, \dots, \beta)$$

e vale pure

$$(20) \quad \frac{d^2 Q}{dt^2} = \mathbf{F} + \Phi$$

in corrispondenza a un vettore  $\Phi$  tangente alla  $V_m(t)$  nel punto  $Q[q(t) | t]$  e soddisfacente alla disuguaglianza

$$(21) \quad \Phi \times \delta Q \geq 0$$

in corrispondenza ad ogni  $\delta Q$  verificante le

$$(22) \quad \begin{aligned} \delta \eta_r &= \mathbf{b}_r \times \delta Q = 0 & r = 1, \dots, \alpha \\ \delta \eta_r &= \mathbf{b}_r \times \delta Q \geq 0 & r = \alpha + 1, \dots, \beta. \end{aligned}$$

Il detto vettore  $\Phi$ , appartenendo al  $\beta$ -spazio  $\mathcal{S}_\beta$ , tangente alla  $V_m(t)$  in  $Q[q(t) | t]$  e contenente  $\mathbf{b}_1, \dots, \mathbf{b}_\beta$ , ha la forma

$$(23) \quad \Phi = \sum_{r=1}^{\beta} \Phi^r \mathbf{b}_r.$$

Si può osservare che, posto

$$(24) \quad \Phi_r = \Phi \times \mathbf{b}_r \quad (r = 1, \dots, \beta),$$

$$(25) \quad B_{rs} = \mathbf{b}_r \times \mathbf{b}_s \quad (rs = 1, \dots, \beta),$$

e detto  $B^{rs}$  il reciproco dell'elemento  $B_{rs}$  nella matrice  $\|B_{rs}\|$  ( $r, s = 1 \dots \beta$ ), è allora

$$(24') \quad \Phi^r = \sum_{s=1}^{\beta} B^{rs} \Phi_s \quad (r = 1, \dots, \beta).$$

Per (23) e il significato dato alle  $\delta \eta_r$  dalle (22), segue

$$\Phi \times \delta Q = \sum_{r=1}^{\beta} \Phi^r \delta \eta_r.$$

onde la condizione che la (21) segua dalle (22), equivale alle disuguaglianze

$$(26) \quad \Phi^r \geq 0 \quad r = \alpha + 1, \dots, \beta.$$

Allo scopo di determinare le  $\Phi_1 \dots \Phi_\beta$  si osservi che da (20) segue

$$(27) \quad \Phi_r + \mathbf{F} \times \mathbf{b}_r = \frac{d^2 Q}{dt^2 v} \times \mathbf{b}_r = \frac{d^2 Q}{dt^2} \times \mathbf{b}_r, \quad r=1, \dots, \beta.$$

Per le identità (19) derivate totalmente rispetto al tempo e per la posizione (18) si ha

$$(28) \quad \mathbf{b}_r \times \frac{d^2 Q}{dt^2} = \mathbf{b}_r \times \frac{d}{dt} \boldsymbol{\omega} + \mathbf{b}_r \times \frac{d}{dt} \frac{\partial Q}{\partial \dot{t}} = \gamma_r(q | \dot{q} | t) \mathbf{b}_r, \quad r = 1, \dots, \beta,$$

avendo posto

$$(29) \quad \gamma_r(q | \dot{q} | t) = - \frac{d\mathbf{b}_r}{dt} \times \boldsymbol{\omega} + \mathbf{b}_r \times \frac{d}{dt} \frac{\partial Q}{\partial \dot{t}} - \frac{d\mathbf{b}_{r0}}{dt} \quad r=1, \dots, \beta.$$

L'equazione (20) per (23) (24'), (27) (28) può scriversi

$$(30) \quad \frac{d^2 Q}{dt^2 v} = \mathbf{F}^*$$

ove

$$(31) \quad \mathbf{F}^* = \mathbf{F} + \sum_{r,s=1}^{\beta} B^{rs} [\gamma_r - \mathbf{F} \times \mathbf{b}_r] \mathbf{b}_s$$

è una ben determinata funzione delle  $q \dot{q} t$ .

L'equazione (30) generalizza una equazione vettoriale sintetica ottenuta da Agostinelli <sup>7)</sup> e mostra che il moto  $\{q_h(t)\}$  è dinamicamente possibile per il sistema olonomo  $\mathcal{S}_0$  ottenuto da  $\mathcal{S}_a$  privandolo dei vincoli anolonomi (3) e (4) e sostituendo la sollecitazione  $\mathbf{F}$  con la  $\mathbf{F}^*$  data da (31).

\* \* \*

Le funzioni  $\gamma_r$ , introdotte con le posizioni (29) hanno le espressioni esplicite

$$(32) \quad \gamma_r = \gamma_r(q | \dot{q} | t) = - \sum_{h,k=0}^m \left[ \frac{\partial b_{r,h}}{\partial q_k} - \sum_{l=1}^m \frac{l}{hk} b_{rl} \right] \dot{q}_h \dot{q}_k$$

( $r = 1, \dots, \beta$ ),

<sup>7)</sup> Vedi loc. cit. in nota 1), pag. 5, formule (16) e (17).



costruire quando siano note l'espressione (1) dell'energia cinetica e le equazioni (3) e (4) dei vincoli anolonomi.

Infatti essendo  $\mathbf{b}_r$  tangenziale, per (16)<sub>1</sub>, (18) e (17), è

$$\begin{aligned} \frac{d\mathbf{b}_r}{dt} \times \mathbf{w} + \frac{d\mathbf{b}_{r,0}}{dt} &= \sum_{h=1}^m \frac{d\mathbf{b}_r}{dt} \times \frac{\partial Q}{\partial \dot{q}_h} \dot{q}_h + \frac{d\mathbf{b}_{r,0}}{dt} \dot{q}_0 = \\ &= \sum_{h=1}^m \dot{q}_h \sum_{k=0}^m \left[ \frac{\partial b_{r,h}}{\partial \dot{q}_k} - \sum_{l=1}^m \left\{ \begin{matrix} l \\ hk \end{matrix} \right\} b_{r,l} \right] \dot{q}_k + \sum_{k=1}^m \frac{\partial b_{r,0}}{\partial \dot{q}_k} \dot{q}_0 \dot{q}_k = \\ &= \sum_{h,k=0}^m \frac{\partial b_{r,h}}{\partial \dot{q}_k} \dot{q}_h \dot{q}_k - \sum_{hl=1}^m \left\{ \begin{matrix} l \\ hk \end{matrix} \right\} b_{r,l} \dot{q}_h \dot{q}_k \quad (r=1, \dots, \beta) \end{aligned}$$

e per (16)<sub>2</sub> è

$$\mathbf{b}_r \times \frac{d}{dt} \frac{\partial Q}{\partial \dot{t}} = \sum_{k=0}^m \sum_{h=1}^m \left\{ \begin{matrix} l \\ 0k \end{matrix} \right\} b_{r,l} \dot{q}_0 \dot{q}_h \quad (r=1, \dots, \beta);$$

da (29) segue dunque (32)

Le (27), (28) permettono poi di dare alle  $\Phi_r$  definite dalle (24) le espressioni in funzione di  $q$ ,  $\dot{q}$ ,  $t$

$$(33) \quad \Phi_r = \Phi_r(q | \dot{q} | t) = - \sum_{ik=1}^m a^{ik} b_{r,ik} Q_k + \gamma_r(q \dot{q} t) \quad (r=1, \dots, \beta)$$

e le  $\Phi^r$  definite dalle (24') sono espresse da

$$(34) \quad \Phi^r = \Phi^r(q \dot{q} t) = \sum_{s=1}^{\beta} B^{rs} [\gamma_s(q | \dot{q} | t) - \sum_{ik=1}^m a^{ik} b_{s,ik} Q_k] \quad (r=1, \dots, \beta).$$

Se il moto  $\{q_h(t)\}$  è dinamicamente possibile per  $\mathcal{S}_a$  e verifica le disequazioni (4) come uguaglianze, esso per (26) e (20) deve inoltre verificare le diseuguaglianze:

$$(35) \quad \Phi^r[q(t) | \dot{q}(t) | t] \geq 0 \quad (r=\alpha+1, \dots, \beta)$$

e le equazioni di Lagrange

$$(36) \quad \frac{d}{dt} \frac{\partial \mathcal{T}}{\partial \dot{q}_h} - \frac{\partial \mathcal{T}}{\partial q_h} = Q_h(q \dot{q} t) + \sum_{r=1}^{\beta} b_{r,h} \Phi^r(q | \dot{q} | t) \quad (h=1, \dots, m).$$

Per (17) le equazioni (36) possono scriversi

$$(36') \quad \sum_{k=1}^m a_{hk} \ddot{q}_k + \sum_{kl=0}^m \{kl, h\} \dot{q}_k \dot{q}_l = Q_h(q | \dot{q} | t) + \sum_{r=1}^{\beta} b_{r,h} \Phi^r(q | \dot{q} | t)$$

(h = 1, \dots, m),

o porsi, tenendo conto delle (15), nella forma normale

$$(36'') \quad \ddot{q}_i = - \sum_{kl=0}^m \left\{ \begin{matrix} i \\ kl \end{matrix} \right\} \dot{q}_k \dot{q}_l + \sum_{h=1}^m a^{ih} (Q_h + \sum_{r=1}^{\beta} b_{r,h} \Phi^r) \quad (i=1 \dots m).$$

Le equazioni (36') e (36''), nel caso di vincoli fissi si identificano con le equazioni stabilite da Agostinelli<sup>2)</sup>.

Le disequazioni (35) svaniscono nel caso che i vincoli anolonomi unilaterali manchino ( $\alpha = \beta$ ).

Suppongo ora che il moto  $\{q_h(t)\}$  soddisfi le equazioni (36') o (36''), ossia l'equazione vettoriale (30). Essendo

$$\sum_{s=1}^{\beta} B_{rs} \mathbf{b}_s \times \mathbf{b}_i = \begin{cases} 1 & r = i \\ 0 & r \neq i \end{cases} \quad (i, r=1 \dots \beta),$$

ne segue

$$\mathbf{b}_i \times \frac{d^2 Q}{dt^2} = \mathbf{F} \times \mathbf{b}_i + \sum_{rs=1}^{\beta} B^{rs} [\gamma_r - \mathbf{F} \times \mathbf{b}_r] \mathbf{b}_s \times \mathbf{b}_i = \gamma_i$$

(i = 1 \dots \beta).

Per (29) è allora

$$\mathbf{b}_i \times \frac{d}{dt} \left( \mathbf{w} + \frac{\partial Q}{\partial \dot{t}} \right) = - \frac{d\mathbf{b}_i}{dt} \times \mathbf{w} + \mathbf{b}_i \times \frac{d}{dt} \frac{\partial Q}{\partial \dot{t}} - \frac{d\mathbf{b}_{i0}}{dt}$$

(i = 1 \dots \beta)

ossia

$$\frac{d}{dt} [\mathbf{b}_i \times \mathbf{w} + \mathbf{b}_{i0}] = 0 \quad (i = 1 \dots \beta).$$

Vale dunque il

**TEOREMA I** - *Le equazioni (36') o le (36'') o ancora la (30) ammettono i  $\beta$  integrali primi*

$$(37) \quad \sum_{h=1}^m b_{ih}(q | \dot{q}) \dot{q}_h + b_{i0}(q | \dot{q}) = k_i \quad (i = 1 \dots \beta)$$

<sup>2)</sup> Vedi loc. cit. in nota <sup>2)</sup>.

che per valori nulli delle costanti esprimono la condizione che il moto  $\{q_h(t)\}$  rispetti tutti i vincoli anolonomi presenti e sia di confine per tutti quelli unilaterali.

Detto  $\mathcal{S}_0$  il sistema olonomo ottenuto liberando  $\mathcal{S}_a$  dai vincoli anolonomi (3) e (4) e sostituendo la sollecitazione attiva  $\mathbf{F}$  con la  $\mathbf{F}^*$  espressa da (31), per (30), (35) e per il Teorema I°, vale il seguente.

**TEOREMA II** - *Il moto  $\{q_h(t)\}$  è dinamicamente possibile pel considerato sistema  $\mathcal{S}_a$ , soggetto oltre agli olonomi ai vincoli anolonomi bilaterali (3) e unilaterali (4), e tale moto è di confine per tutti i considerati vincoli se e solo se esso è dinamicamente possibile per il considerato sistema olonomo  $\mathcal{S}_0$ , soddisfa le disuguaglianze (35) e l'atto di moto iniziale è consentito dai vincoli ad  $\mathcal{S}_a$  [onde in corrispondenza ad esso sono nulle le costanti degli integrali primi (37)].*

\* \* \*

Riguardo alla possibilità che sussistano alcuni integrali dei momenti generalizzati pel sistema  $\mathcal{S}_a$  supposto a vincoli tutti bilaterali, cioè che si abbia

$$(38) \quad \alpha = \beta,$$

vale il seguente

**TEOREMA III** - *L'energia cinetica  $\mathcal{T}(q|\dot{q}|t)$  del considerato sistema anolonomo  $\mathcal{S}_a$  non dipenda dalla coordinata  $q_i$ , e la corrispondente velocità  $\dot{q}_i$  non figuri nelle equazioni (3) dei vincoli anolonomi i quali siano tutti bilaterali [ossia valga la (38)].*

*Allora sussiste l'integrale dei momenti*

$$\frac{\partial \mathcal{T}}{\partial \dot{q}_i} = \text{cost}$$

*appena sia nulla  $Q_i(q|q|t)$  come accade nel caso che la forza derivi da un potenziale  $U(q|t)$  indipendente da  $q_i$ .*

L'asserto segue dalla validità delle (36) in cui, in base all'indipendenza da  $\dot{q}_i$  delle equazioni (3), si ponga

$$b_{r,i} = 0 \quad (r = 1 \dots \alpha) \quad (\alpha = \beta).$$

I Teoremi I - II e III sono stati dimostrati dal Prof. Agostinelli nel caso di vincoli fissi e bilaterali (9).

4. - Denoto con  $\mathcal{S}_a^*$  il sistema ottenuto da  $\mathcal{S}_a$  supponendo tutti bilaterali i vincoli anolonomi [ossia valga la (38)] e aggiungendo i vincoli olonomi unilaterali

$$(39) \quad q_{\mu+1} \geq 0, \dots, q_m \geq 0 \quad (1 \leq \mu < m).$$

In un precedente lavoro (10) ho studiato talune questioni di regolarità ed unicità del moto per sistemi olonomi dotati di certe proprietà di regolarità. Il contenuto dei precedenti numeri permette di estendere i risultati ottenuti al caso di sistemi  $\mathcal{S}_a^*$ .

Suppongo che sollecitazione e vincoli soddisfino alle condizioni di Lipschitz nel senso che siano continue rispetto alle  $q, \dot{q}, t$  e uniformemente lipschitziane rispetto alle  $q, \dot{q}$  le  $Q_h[q | \dot{q} | t]$  e le funzioni

$$a_{hk}(q | t), \quad \frac{\partial a_{hk}}{\partial q_l}, \quad b_{r,h}(q | t), \quad \frac{\partial b_{r,h}}{\partial q_l}$$

$$(r = 1 \dots \beta) \quad (h, k, l = 0 \dots m).$$

Pongo le seguenti definizioni

DEFINIZIONE 1<sup>a</sup> - *Dico che il moto  $\{q_h(t)\}$  è regolare se tale al confine, se tutte le velocità e le accelerazioni del sistema sono continue in ogni intervallo  $\overline{t_1 t_2}$  in cui lo siano le derivate prime e seconde di quelle delle  $q_{\mu+1}(t) \dots q_m(t)$  che si annullano almeno una volta in  $\overline{t_1 t_2}$  [le quali hanno il signi-*

9) Il teorema III è già stato esposto per vincoli variabili, da A. CONSIGLIO nella nota *Sopra la dinamica di un sistema di punti vincolati anolonomi*, Atti del IV Congresso U.M.I.

10) Vedi loc. cit. in nota 2).

ficato di coordinate lagrangiane  $q_h(t)$  responsabili delle prese o perdite di contatto del sistema con qualche vincolo olonomo unilaterale].

DEFINIZIONE 2<sup>a</sup> - Dico moto dinamico in senso lato per  $\mathcal{S}_\alpha^*$  ogni moto  $\{q_h(t)\}$  per cui in ogni intervallo  $\overline{t_1 t_2}$  in cui il sistema non prenda o perda contatto con qualcuno dei vincoli olonomi unilaterali (39), le  $\ddot{q}$  esistono continue e le equazioni di Appel son soddisfatte in corrispondenza a reazioni che i vincoli siano effettivamente capaci di esplicare.

DEFINIZIONE 3<sup>a</sup> - Dico di tipo  $\mathcal{M}_{\mathcal{S}_\alpha^*}^{\dot{q}}$  ogni  $m$ -pla  $\{q_h(t)\}$  colle  $q_h$  continue, rappresentanti un moto regolare se tale al confine e dinamico in senso lato per  $\mathcal{S}_\alpha^*$  (11).

Sia  $\mathcal{S}_0^*$  il sistema olonomo ottenuto liberando  $\mathcal{S}_\alpha^*$  dai vincoli anolonomi [che per (38)) sono espressi dalle equazioni (3)] e sostituendone la sollecitazione attiva con la  $F^*$  (12) di componenti lagrangiane

$$(41) \quad Q_h^*(q | \dot{q} | t) = Q_h(q | \dot{q} | t) + \sum_{r=1}^{\alpha} b_{r,h}(q | t) \Phi^r(q | \dot{q} | t) \quad (h = 1 \dots m)$$

con le  $\Phi^r(q | \dot{q} | t)$  espresse da (34).

OSSERVAZIONE - Le  $m$ -ple di tipo  $\mathcal{M}_{\mathcal{S}_\alpha^*}$  sono quelle di tipo  $\mathcal{M}_{\mathcal{S}_\alpha^*}$  secondo la def. n. 6 del lavoro citato in nota 2).

La tesi seconda del Teorema VIII del detto lavoro permette di affermare il seguente

TEOREMA IV - Per ogni moto  $\{q_h(t)\}$  di tipo  $\mathcal{M}_{\mathcal{S}_\alpha^*}$ , le  $\ddot{q}_h(t)$  esistono ovunque e sono continue.

3. - Per generalizzare al caso del considerato sistema  $\mathcal{S}_\alpha^*$  anche il teorema di unicit  XII del mio citato lavoro, costituente lo scopo principale della 2<sup>a</sup> parte di esso, premetto le

<sup>11)</sup> Dir  di tipo  $\mathcal{M}_{\mathcal{S}_\alpha^*}$  anche il moto rappresentato dalla detta  $m$ -pla.

<sup>12)</sup> Data da (31).

seguenti posizioni. Le

$$\alpha_i(q | \dot{q} | t) \quad (i = 1 \dots \mu)$$

risolvano le  $\mu$  equazioni

$$(42) \quad \left[ \frac{d}{dt} \frac{\partial \mathcal{T}}{\partial \dot{q}_h} - \frac{\partial \mathcal{T}}{\partial q_h} \right]_{\substack{\ddot{q}_{\mu+1}=0 \\ \ddot{q}_m=0}} = Q_h^*(q | \dot{q} | t) \quad (h = 1 \dots \mu)$$

lineari nelle  $\mu$  incognite  $q_1 \dots q_\mu$ , e sia

$$(43) \quad \Psi_j(q | \dot{q} | t) = -Q_j^*(q | \dot{q} | t) + \left[ \frac{d}{dt} \frac{\partial \mathcal{T}}{\partial \dot{q}_j} - \frac{\partial \mathcal{T}}{\partial q_j} \right]_{\substack{\ddot{q}_i = \alpha_i(q \dot{q} t) \\ \ddot{q}_k = 0}} \\ (i=1 \dots \mu) \quad (k=\mu+1 \dots m) \quad (j=\mu+1 \dots m).$$

Sussiste allora il seguente

**TEOREMA V** - Il moto  $\{q_h^*(t)\}$ , di tipo  $\mathfrak{M}_{\mathcal{S}_\alpha^*}$  nell'intervallo aperto  $\overline{t_1 t_2}$  sia di confine per tutti i vincoli (39), ossia valgano le identità

$$(44) \quad q_j^*(t) \equiv 0 \quad (j=\mu+1 \dots m).$$

Inoltre per  $j = \mu + 1 \dots m$  la  $\Psi_j[q^*(t) | \dot{q}^*(t) | t]$  oltre ad essere  $\geq 0$ , non passi mai dal valore zero a valori non nulli. Allora il moto  $\{q_h^*(t)\}$  gode della proprietà di unicità nel futuro in  $\overline{t_1 t_2}$  come moto di tipo  $\mathfrak{M}_{\mathcal{S}_\alpha^*}$ , nel senso che per ogni  $t_0$  in  $\overline{t_1 t_2}$  coincide con esso in  $\overline{t_0 t_2}$  ogni moto  $\{q_h(t)\}$  di tipo  $\mathfrak{M}_{\mathcal{S}_\alpha^*}$  verificante le

$$(45) \quad q_h(t_0) = q_h^*(t_0), \quad \dot{q}_h(t_0) = \dot{q}_h^*(t_0) \quad (h=1 \dots m).$$

Tale teorema è una conseguenza immediata del citato Teorema XII quando in primo luogo si ricordi che per l'osservazione fatta dopo la definizione 3<sup>a</sup> il moto  $\{q_h(t)\}$  di tipo  $\mathfrak{M}_{\mathcal{S}_\alpha^*}$  è pure di tipo  $\mathfrak{M}_{\mathcal{S}_0^*}$ , in secondo luogo si riconosca che le  $\Psi_j(q | \dot{q} | t)$  definite dalle (43) non sono altro che il 2° gruppo delle  $\Psi_j^{(\mu+1 \dots m)}(q | \dot{q} | t)$  definite mediante le (36)<sub>2</sub> del citato lavoro, ed infine si tenga presente il Teorema II di questa nota.

Da questo teorema discende la seguente « regola d'equilibrio »

Detta  $P^*$  la posizione  $q_1 = \dots = q_m = 0$ , in un intervallo aperto  $\overline{t_1 t_2}$  di tempo, eventualmente infinito,  $P^*$  risulti invariabile, e si abbia

$$(46) \quad \frac{\partial b_{,0}(0^+ t)}{\partial t} = 0 \quad (r=1 \dots \alpha) \quad (\alpha=\beta).$$

Per le quantità

$$(47) \quad Q_h^{**}(t) = \left[ Q_h - \sum_{rs=1}^{\alpha} B^{rs} \sum_{ik=1}^m a^{ikh} Q_i b_{,r,h} b_{,s,h} \right]_{q=0} \quad (h=1 \dots m),$$

riesca

$$(48) \quad Q_h^{**}(t) = \begin{cases} < 0 & h=1 \dots \mu \\ \leq 0 & h=\mu+1 \dots m \end{cases} \quad (1^3).$$

Infine, per  $h=\mu+1 \dots m$  la  $Q_h^{**}(t)$  non passi mai dal valore zero a valori non nulli.

Ne segue: se il sistema  $\mathcal{S}_\alpha^*$  ad un istante  $t_0$  di  $\overline{t_1 t_2}$  si trova in  $P^*$  con atto di moto nullo, e si può stabilire<sup>14)</sup> che il moto in  $\overline{t_1 t_2}$  è di tipo  $\mathcal{D}\overline{\mathcal{L}}_{\mathcal{S}_\alpha^*}$ , il sistema  $\mathcal{S}_\alpha^*$  permane in quiete in  $P^*$  nell'intervallo di tempo  $\overline{t_0 t_1}$ .

Osservato che le condizioni (46) non sono restrittive in quanto necessarie affinché la quiete in  $P^*$  e in  $\overline{t_1 t_2}$  ossia il moto  $\{q_h^*(t)\}$  con

$$(49) \quad q_h^*(t) \equiv 0 \quad (h=1 \dots m)$$

sia permesso dai vincoli anolonomi (3), passo alla dimostrazione della « regola di equilibrio ».

Essendo per la supposta fissità di

$$\left[ \frac{\partial^2 Q}{\partial t^2} \right]_{q=0} = 0,$$

<sup>13)</sup> Geometricamente ciò significa che il componente di  $F$  ortogonale a  $b_1, \dots, b_\alpha$  deve esser diretto verso la banda dei vincoli (3) consentita al sistema in  $P^*$ .

<sup>14)</sup> La cosa potrebbe stabilirsi, per es., applicando un criterio di scarto del tipo di quelli che considererò in un lavoro di prossima pubblicazione sui Teoremi di esistenza e di unicità del moto, per sistemi molto comuni e regolari.

per (13) è pure

$$(50) \quad \{00, h\}_{q=0} = 0 \quad (h = 1 \dots m),$$

Da (32) segue

$$(51) \quad \gamma_r[q^*(t) | \dot{q}^*(t) | t] \equiv 0 \quad (r = 1 \dots \alpha)$$

onde per (34) e (41) è

$$(52) \quad Q_h^*(0 | 0 | t) = Q_h^{**}(t) \quad (h = 1 \dots m)$$

Per (52) e (48)<sub>1</sub> e (41) è

$$(53) \quad Q_h(0 | 0 | t) + \sum_{r=1}^{\alpha} b_{r,h}(0 | 0 | t) \Phi^r(0 | 0 | t) \equiv 0 \quad (h = 1 \dots \mu).$$

Per (50) è poi

$$\left[ \sum_{k=1}^m a_{hk} \ddot{q}_k + \sum_{l=0}^m \{kl, h\} \dot{q}_k \dot{q}_l \right]_{q=0} = \{00, h\}_{q=0} = 0 \quad (h = 1 \dots \mu)$$

onde, per (53), le equazioni (36') relative ad  $S_{\alpha}^*$ , per  $h = 1 \dots \mu$ , son soddisfatte dal moto  $\{q_h^*(t)\}$  dato dalle (49).

Le componenti lagrangiane secondo le coordinate  $q_{\mu+1} \dots q_m$  della reazione vincolare competente al moto  $\{q_h^*(t)\}$ , per le posizioni (43), per le (50) e (52), sono le

$$\Psi_j[q^*(t) | q^*(t) | t] = - Q_j^*[0 | 0 | t] \geq 0 \quad (j = \mu + 1 \dots m).$$

Poiché il moto  $\{q_h^*(t)\}$  è evidentemente di tipo  $\mathcal{O}L_{S_{\alpha}^*}$ , in base al teorema precedente, segue la enunciata regola d'equilibrio.