

RENDICONTI *del* SEMINARIO MATEMATICO *della* UNIVERSITÀ DI PADOVA

GIULIANO BRATTI

Generalizzazione di una proposizione di analisi functoriale. Un'applicazione

Rendiconti del Seminario Matematico della Università di Padova,
tome 46 (1971), p. 223-226

http://www.numdam.org/item?id=RSMUP_1971__46__223_0

© Rendiconti del Seminario Matematico della Università di Padova, 1971, tous droits réservés.

L'accès aux archives de la revue « Rendiconti del Seminario Matematico della Università di Padova » (<http://rendiconti.math.unipd.it/>) implique l'accord avec les conditions générales d'utilisation (<http://www.numdam.org/conditions>). Toute utilisation commerciale ou impression systématique est constitutive d'une infraction pénale. Toute copie ou impression de ce fichier doit contenir la présente mention de copyright.

NUMDAM

*Article numérisé dans le cadre du programme
Numérisation de documents anciens mathématiques*
<http://www.numdam.org/>

GENERALIZZAZIONE DI UNA PROPOSIZIONE DI ANALISI FUNTORIALE. UN'APPLICAZIONE

GIULIANO BRATTI *)

§ 1. Oggetto di questo lavoro è di dare una generalizzazione della seguente proposizione di N. Popa, [3], pag. 673: *se* $A \in \mathcal{O}b(\mathcal{L}\mathcal{B}\mathcal{A})$, $B \in \mathcal{O}b(\mathcal{L}\mathcal{Q}\mathcal{C})$ e se $\varepsilon_A, \varepsilon_B : \mathcal{K} \rightarrow \mathcal{L}$, allora ${}_b\{\varepsilon_A \rightarrow \varepsilon_B\} \simeq \text{Hom}_b(A; B)$ e ${}_c\{\varepsilon_A \rightarrow \varepsilon_B\} \simeq \text{Hom}_c(A; B)$, mediante l'isomorfismo $T \rightarrow T_I$, I il corpo degli scalari, \mathcal{K} una sottocategoria piena di $\mathcal{L}\mathcal{Q}\mathcal{C}$.

Precisamente dimostrerò, nel § 2, questa proposizione: *sia* $F : \mathcal{K} \rightarrow \mathcal{L}$ un funtore tale che:

a) esiste $\chi \in {}_b\{\varepsilon_b\{\varepsilon_C \rightarrow F\} \rightarrow F\}$, $(\varepsilon_c\{\varepsilon_c\{\varepsilon_C \rightarrow F\} \rightarrow F\})$, con la proprietà che $\chi^c : {}_b\{\varepsilon_C \rightarrow F\} \rightarrow F(C)$, $\chi^c(S) = S^c(1 \otimes 1)$, $(\chi^c : {}_c\{\varepsilon_C \rightarrow F\} \rightarrow F(C))$, è isomorfismo (algebrico e) topologico, (C è il corpo complesso su cui è dato ogni spazio vettoriale topologico di \mathcal{L} , χ^c è la C -esima componente del morfismo χ);

b) $F(C) \in \mathcal{O}b(\mathcal{L}\mathcal{Q}\mathcal{C})$.

In tali ipotesi, se $A \in \mathcal{O}b(\mathcal{L}\mathcal{B}\mathcal{A})$, ${}_b\{\varepsilon_A \rightarrow F\} \simeq \text{Hom}_b(A, F(C))$, ${}_c\{\varepsilon_A \rightarrow F\} \simeq \text{Hom}_c(A; F(C))$.

Nel caso della proposizione di Popa è facile vedere che le condizioni a) e b) della generalizzazione sono soddisfatte: se $F = \varepsilon_B$, $B \in \mathcal{O}b(\mathcal{L}\mathcal{Q}\mathcal{C})$, $F(C) = B\varepsilon_C \simeq B$,

$${}_b\{\varepsilon_C \rightarrow F\} \simeq \text{Hom}_b(C; B) \simeq B,$$

$${}_c\{\varepsilon_C \rightarrow F\} \simeq \text{Hom}_c(C; B) \simeq B;$$

*) Indirizzo dell'A.: Seminario Matematico Università, 35100 Padova.

Lavoro eseguito nell'ambito dei gruppi di ricerca matematica del C.N.R.

il χ di a), poi, è l'isomorfismo canonico. Che si tratti di una effettiva generalizzazione sarà visto mediante un esempio alla fine della dimostrazione della generalizzazione nell'osservazione 1; quest'esempio dà, pure, la risoluzione di un problema lasciato aperto dall'A. in un suo precedente lavoro, [1], pag. 326. I simboli usati sono sempre quelli di [3].

§ 2. Sia $\psi : \text{Hom}_b(A; {}_b\{\varepsilon_C \rightarrow F\}) \rightarrow {}_b\{\varepsilon_A \rightarrow F\}$ la mappa lineare tale che: $\psi(T) = \chi \circ (T\varepsilon_1)$ dove χ è il morfismo functoriale di a) e $T\varepsilon_1 : \varepsilon_A \rightarrow \varepsilon_{{}_b\{\varepsilon_C \rightarrow F\}}$ con $(T\varepsilon_1)^E = T\varepsilon_{1E} : A\varepsilon E \rightarrow {}_b\{\varepsilon_C \rightarrow F\}\varepsilon E$.

1) ψ è iniettiva:

se per $T \in \text{Hom}_b(A; {}_b\{\varepsilon_C \rightarrow F\})$ con $T \neq 0$ fosse $\psi(T) = 0$ si avrebbe $\psi(T)^c = 0$. Poichè esiste $a \in A$ con $T(a) \neq 0$ è anche $T(a)^c \neq 0$; allora:

$$\begin{aligned} \chi^c \circ (T\varepsilon_{1c})[a \otimes 1] &= \psi^c(T)[a \otimes 1] = \\ &= \chi^c[T(a) \otimes 1] = T(a)^c(1 \otimes 1) \neq 0. \end{aligned}$$

Assurdo, poichè $\psi(T)^c = 0$.

2) ψ è suriettiva:

sia $\varphi : {}_b\{\varepsilon_A \rightarrow F\} \rightarrow \text{Hom}_b(A\varepsilon G; F(C))$ la mappa lineare tale che $\varphi(T) = T^C$. φ è iniettiva poichè se $T^C = 0$ e $T^E \neq 0$ esisterebbe $a \otimes e \in A \otimes_e E$, denso in $A\varepsilon E$, [4], pag. 46, con $T^E(a \otimes e) \neq 0$. Se $\eta_e : C \rightarrow E$ è la mappa (lineare e continua) tale che $n_e(\gamma) = \gamma e$, $\gamma \in C$, $e \in E$,

$$F(\eta_e) \circ T^C[a \otimes 1] = 0 = T^E(a \otimes e).$$

Assurdo. Quindi se $T^C = 0$, $T^E = 0 \forall E \in \mathcal{O}b(\mathcal{K})$. Indicato con η l'isomorfismo,

$$\eta : \text{Hom}_b(A\varepsilon C; F(C)) \rightarrow \text{Hom}_b(A; F(C)), \quad \eta(l)[a] = l(a \otimes 1)$$

e con η' l'isomorfismo,

$$\eta' : \text{Hom}_b(A; F(C)) \rightarrow \text{Hom}_b(A; {}_b\{\varepsilon_C \rightarrow F\}), \quad \eta'(l') = (\chi^c)^{-1} \circ l',$$

le mappe ψ e $\eta' \circ \eta \circ \varphi$ sono l'una l'inversa dell'altra, (da cui la surietti-

vità di ψ). Si ha, infatti, se $T \in {}_b\{\varepsilon_A \rightarrow F\}$,

$$\varphi \circ (\eta' \circ \eta \circ \varphi)[T] = \chi \circ [\{ (\chi^C)^{-1} \circ \eta(I^C) \} \varepsilon 1] .$$

La C -componente di quest'ultima è la $\chi^C \circ [\{ (\chi^C)^{-1} \circ \eta(T^C) \} \varepsilon 1_C]$ che coincide con T^C poichè:

$$\chi^C \circ [\{ (\chi^C)^{-1} \circ \eta(T^C) \} \varepsilon 1_C] [a \otimes 1] = \chi^C [\{ (\chi^C)^{-1} [T^C(a \otimes 1)] \} \otimes 1] .$$

$(\chi^C)^{-1} [T^C(a \otimes 1)] = S \in {}_b\{\varepsilon_C \rightarrow F\}$ con $S^C(1 \otimes 1) = T^C(a \otimes 1)$. Allora $\chi^C(S \otimes 1) = S^C(1 \otimes 1) = T^C(a \otimes 1)$. Risulta facile verificare che anche le E -componenti, $\forall E \in \mathcal{O}b(\mathcal{K})$, dei morfismi T e $\chi \circ [\{ (\chi^C)^{-1} \circ \eta(T^C) \} \varepsilon 1]$ coincidono.

3) ψ è isomorfismo (algebrico e) topologico:

l'inversa della ψ , $\eta' \circ \eta \circ \varphi$, è continua poichè su ${}_b\{\varepsilon_A \rightarrow F\}$ vi è la topologia relativa dalla topologia di $X\{\text{Hom}_b(A \varepsilon E; F(E)), \forall E \in \mathcal{O}b(\mathcal{K})\}$, [2], pag. 150. Resta allora da dimostrare che la ψ è continua per il che è sufficiente dimostrare, [2], pag. 150, che le

$$\psi^E : \text{Hom}_b(A; {}_b\{\varepsilon_A \rightarrow F\}) \rightarrow \text{Hom}_b(A \varepsilon E; F(E)),$$

$\psi^E(T) = \chi^E \circ (T \varepsilon 1_E)$ sono continue $\forall E \in \mathcal{O}b(\mathcal{K})$. Poichè il funtore ε_E è fortemente continuo su \mathcal{L} (e compatto-continuo su $\mathcal{K} \subseteq (\mathcal{L} \mathcal{Q} \mathcal{C})$, [3], pag. 672, e poichè la χ^E è continua, le ψ^E sono senz'altro tutte continue.

La generalizzazione è dimostrata.

OSSERVAZIONE 1. Sia (B) la categoria degli spazi di Banach e $()^{**} : (B) \rightarrow (B)$ il funtore biduale forte che associa ad ogni $E \in \mathcal{O}b(B)$ E^{**} biduale forte di E e ad ogni $\varphi \in \text{Hom}_b(E_1; E_2)$ ${}^{**}\varphi \in \text{Hom}_b(E_1^{**}; E_2^{**})$ bi-trasposta della φ . La verifica che $()^{**}$ è fortemente continuo è facile, che $()^{**}$ non sia funtore di Schwartz è dimostrato in [1]. Risulta: ${}_b\{\varepsilon_C \rightarrow ()^{**}\} \simeq C$; infatti, se $\nu \in {}_b\{\varepsilon_C \rightarrow ()^{**}\}$ è l'elemento tale che ν^E , E -componente di ν , è così definita, $\nu^E(x) = v_x$, $v_x : E^* \rightarrow C$, $v(\alpha) = \alpha(x)$, e se $T \in {}_b\{\varepsilon_A \rightarrow ()^{**}\}$ e $T^C(1) = v_y$, allora $T^C \equiv y\nu^C$. Si ha, in conseguenza, $T \equiv y\nu$ poichè

$$\begin{aligned} T^E(1 \otimes e) &= T^E \circ (1 \otimes_\varepsilon \varphi_e)(1 \otimes 1) = \\ &= {}^{**}\varphi_e \circ (y\nu^C)(1 \otimes 1) = {}^{**}\varphi_e(v_y) = v_{ye} = (y\nu^E)(1 \otimes e) \end{aligned}$$

se $\varphi_e : C \rightarrow E$ è la mappa (lineare e) continua con $\varphi_e(x) = xe$. L'ipotesi b) resta soddisfatta; la χ di a), in questo caso, è la seguente:

$$\forall E \in \mathcal{O}b(B), \chi^E : {}_b\{\varepsilon_C \rightarrow (\)^{**}\} \varepsilon E \rightarrow F(E) = E^{**}, \chi^E[xv \otimes e] = v_{xe}.$$

BIBLIOGRAFIA

- [1] BRATTI, G.: *Distribuzioni funtoriali in una variabile quasi periodiche*, Rend. Sem. Mat. Università di Padova, 1971.
- [2] KELLEY, J. L., NAMIOKA, I.: *Linear topological spaces*, D. Van Nostrand Company, 1963.
- [3] POPA, N.: *Quelques applications de la théorie des catégories dans la théorie des distributions*, Rev. Roum. Math. Pures et Appl., Tomo 13, N. 5, pp. 671-682, 1968.
- [4] SCHWARTZ, L.: *Théories des distributions a valeurs vectorielles*, Ann. Ist. Fourier, Tomo 7, 1967.

Manoscritto pervenuto in redazione l'1 giugno 1971.