

# RENDICONTI *del* SEMINARIO MATEMATICO *della* UNIVERSITÀ DI PADOVA

MAURIZIO EMALDI

## **Sugli $IK$ -gruppi risolubili**

*Rendiconti del Seminario Matematico della Università di Padova*,  
tome 46 (1971), p. 9-13

<[http://www.numdam.org/item?id=RSMUP\\_1971\\_\\_46\\_\\_9\\_0](http://www.numdam.org/item?id=RSMUP_1971__46__9_0)>

© Rendiconti del Seminario Matematico della Università di Padova, 1971, tous droits réservés.

L'accès aux archives de la revue « Rendiconti del Seminario Matematico della Università di Padova » (<http://rendiconti.math.unipd.it/>) implique l'accord avec les conditions générales d'utilisation (<http://www.numdam.org/conditions>). Toute utilisation commerciale ou impression systématique est constitutive d'une infraction pénale. Toute copie ou impression de ce fichier doit contenir la présente mention de copyright.

NUMDAM

*Article numérisé dans le cadre du programme  
Numérisation de documents anciens mathématiques*  
<http://www.numdam.org/>

## SUGLI $IK$ -GRUPPI RISOLUBILI

MAURIZIO EMALDI \*)

Sia  $G$  un gruppo e sia  $H$  un sottogruppo di  $G$ . Si chiama complemento di  $H$  in  $G$  ogni sottogruppo  $K$  di  $G$ , tale che  $G=H \cup K$  e  $H \cap K=1$ , dove  $1$  denota il gruppo identico. Un gruppo in cui ciascun sottogruppo (sottogruppo normale) ammette un complemento si dice [15] un  $K$ -gruppo ([7] un  $nC$ -gruppo). Un gruppo in cui ciascun sottogruppo ammette un complemento con cui è permutabile si dice [4] un  $C$ -gruppo. Un gruppo infinito in cui ciascun sottogruppo infinito ammette un complemento con cui è permutabile si dice [4] un  $IC$ -gruppo. Un gruppo in cui ciascun sottogruppo infinito (sottogruppo normale infinito) ammette un complemento verrà da noi detto un  $IK$ -gruppo (un  $nIC$ -gruppo). Caratterizzazioni dei  $K$ -gruppi risolubili<sup>1)</sup> sono state date, nel caso finito da Zacher [14] e, nel caso generale, da Emaldi [8], [9]. I  $C$ -gruppi sono stati caratterizzati, nel caso finito da Hall [10] e, nel caso generale, da Cernikov [3] e dalla Cernikova [5]. Uno studio degli  $IC$ -gruppi è stato fatto da Cernikov [4]. Nella presente nota si studiano gli  $IK$ -gruppi risolubili per i quali tutte le immagini omomorfe hanno il sottogruppo di Frattini<sup>2)</sup> identico.

1. Dedichiamo questo numero ad alcune proposizioni utili in seguito. Incominciamo con la seguente nota proposizione:

---

\*) Indirizzo dell'A.: Seminario Matematico, Università, 35100 Padova.

Lavoro eseguito nell'ambito dei gruppi di ricerca del Comitato Nazionale per la matematica del C.N.R.

1) Per la definizione si veda [11] vol. II, p. 179.

2) Per la definizione si veda [11] vol. II, p. 217.

PROP. 1. *Siano  $H$  un sottogruppo del gruppo  $G$  e  $N$  un sottogruppo normale di  $G$  contenuto in  $H$ . Allora:*

a) *se  $C$  è un complemento di  $H$  in  $G$ , allora  $NC/N$  è un complemento di  $H/N$  in  $G/N$ ;*

b) *se  $C$  è un complemento di  $N$  in  $G$ , allora  $H \cap C$  è un complemento di  $N$  in  $H$ , normale in  $G$  se  $H$  è abeliano e normale in  $G$ .*

PROP. 2. *Se  $G$  è un  $K$ -gruppo ( $IK$ -gruppo) allora il sottogruppo di Frattini  $\Phi(G)$  di  $G$  è identico (periodico).*

DIM. Siano  $A$  un qualunque sottogruppo ciclico di  $\Phi(G)$  e  $B$  un complemento di  $A$  in  $G$ . Allora da  $G = A \cup B$  segue  $G = B$  ([11], vol. II, p. 127). Per conseguenza,  $1 = A \cap B = A \cap G = A$ .

PROP. 3. *Sia  $A \neq 1$  un sottogruppo abeliano e normale del gruppo  $G$ . Se  $G$  è un  $nIC$ -gruppo e se  $A \cap \Phi(G) \neq A$ , allora  $A$  contiene sottogruppi normali minimi di  $G$ .*

DIM. Nelle ipotesi poste esiste in  $G$  un sottogruppo massimo  $M$  che non contiene  $A$ . Pertanto  $A \cap M$  è un sottogruppo normale di  $G = AM$  in quanto è normale in  $A$  e in  $M$ . Se  $A \cap M = 1$ , allora  $A$  è normale minimo in  $G$ . Se  $A \cap M$  è un gruppo finito non identico, allora è chiaro che  $A$  contiene sottogruppi normali minimi di  $G$ . Se  $A \cap M$  è un gruppo infinito, allora per la prop. 1 b) esiste in  $G$  un sottogruppo normale  $N$  che è complemento di  $A \cap M$  in  $A$ . E allora  $N$  è normale minimo in  $G$ .

PROP. 4. *Sia  $A \neq 1$  un sottogruppo abeliano e normale del gruppo  $G$ . Se  $G$  è un  $nIC$ -gruppo e se  $A \cap \Phi(G) = 1$ , allora  $A$  ammette almeno una decomposizione in prodotto diretto di sottogruppi normali minimi di  $G$  e ammette almeno un complemento in  $G$ .*

DIM. Per la prop. 3  $A$  contiene sottogruppi normali minimi di  $G$ . Indichiamo con  $T$  il prodotto di tutti i sottogruppi normali minimi di  $G$  contenuti in  $A$ . Allora ([6], p. 61)  $T$  ammette almeno una decomposizione in prodotto diretto di sottogruppi normali minimi di  $G$ . Se i fattori di una tale decomposizione di  $T$  sono in numero finito, allora  $T$  ha un complemento in  $G$  in quanto ciascuno di tali fattori ha un complemento in  $G$  ([13]); in caso diverso  $T$  è un gruppo infinito e, quindi,

---

3) Per la definizione si veda [11] vol. II, p. 153.

ha un complemento in  $G$ . Per la prop. 1 b) esiste allora un sottogruppo normale  $C$  di  $G$  che è complemento di  $T$  in  $A$ . Per la stessa definizione di  $T$  e per la prop. 3 si ha allora  $C=1$  e  $T=A$  in quanto  $C$  non può contenere sottogruppi normali minimi di  $G$ .

PROP. 5. [8] *Se il gruppo  $G$  possiede un sottogruppo abeliano e normale  $A$ , tale che:*

a)  *$A$  ammetta almeno una decomposizione in prodotto diretto di sottogruppi normali minimi di  $G$ ,*

b)  *$A$  ammetta almeno un complemento  $C$  in  $G$ , con  $C$  un  $K$ -gruppo, allora  $G$  è un  $K$ -gruppo.*

PROP. 6. *Se  $G$  è un  $nIC$ -gruppo che possiede un sottogruppo normale non identico  $A$ , tale che:*

a)  $A \cap \Phi(G) = 1$ ,

b)  $A$  sia uno  $ZA$ -gruppo<sup>4</sup>),

c)  $G/A$  sia risolubile,

*allora  $G$  è risolubile.*

DIM. Nelle ipotesi poste è sufficiente ([11] vol. II, p. 180) dimostrare che  $A$  è, in particolare, abeliano. Indichiamo con  $C$  il centro di  $A$ . Poichè  $C$  è un sottogruppo caratteristico di  $A$  e  $A$  è normale in  $G$ ,  $C$  è normale in  $G$ . Per la prop. 1 b)  $C$  ammette allora un complemento  $D$  in  $A$ . Ora  $D$  è ([11] vol. II, p. 219) uno  $ZA$ -gruppo e il centro di  $D$  è contenuto in  $C$ . Pertanto  $D=1$  e così  $C=A$ .

2. Siamo ora in grado di dimostrare i due teoremi che seguono.

TEOREMA 1. *Ogni  $IK$ -gruppo risolubile è localmente finito.*

DIM. Sia  $G$  un  $IK$ -gruppo e sia  $G^{(0)}=G$ ,  $G^{(1)}=G'$ , ...,  $G^{(n-1)}$ ,  $G^{(n)}=1$  la serie derivata di  $G$ . Per la prop. 1 a) possiamo procedere nella dimostrazione facendo induzione sulla lunghezza di questa serie. Se  $n=1$  il teorema segue dalla prop. 1 b). Sia  $n>1$ . Allora il gruppo fattoriale  $G/G^{(n-1)}$  è localmente finito. Supponiamo ora che  $G$  non sia localmente finito. Allora ([11]vol. II, p. 193)  $G^{(n-1)}$  non è localmente finito.

<sup>4</sup>) Per la definizione si veda [11] vol. II, p. 218.

Non è allora restrittivo supporre che  $G^{(n-1)}$  sia un gruppo libero da torsione. Per la prop. 2 si ha  $G^{(n-1)} \cap \Phi(G) = 1$ . Per la prop. 4  $G^{(n-1)}$  contiene sottogruppi normali minimi di  $G$  e questi risultano, di conseguenza, tutti liberi da torsione. Sia allora  $A$  un sottogruppo normale minimo di  $G$  contenuto in  $G^{(n-1)}$ . Poichè il centralizzante di  $A$  in  $G$  contiene  $G^{(n-1)}$ ,  $A$  risulta localmente finito ([2]). Questa contraddizione consente di affermare che  $G$  è localmente finito.

**TEOREMA 2.** *Per il gruppo risolubile  $G$  le seguenti condizioni sono fra loro equivalenti:*

- a)  $G$  è un  $K$ -gruppo;
- b)  $G$  è un  $IK$ -gruppo ogni cui immagine omomorfa ha il sottogruppo di Frattini identico;
- c)  $G$  è un  $nIC$ -gruppo ogni cui immagine omomorfa ha il sottogruppo di Frattini identico.

**DIM.** Per la prop. 1 a) e per la prop. 2 da a) segue b). Che da b) segua la c) è evidente. Dimostriamo che da c) segue a). Per la prop. 1 a) possiamo fare la dimostrazione per induzione sulla lunghezza della serie derivata  $G^{(0)} = G$ ,  $G^{(1)} = G'$ , ...,  $G^{(n-1)}$ ,  $G^{(n)} = 1$  di  $G$ . Se  $n = 1$  allora  $G$  è un  $K$ -gruppo. Infatti per la prop. 1 b)  $G$  è periodico. Sia  $n > 1$ . Allora il gruppo fattoriale  $G/G^{(n-1)}$  è, per l'ipotesi di induzione, un  $K$ -gruppo. Ora per la prop. 4  $G^{(n-1)}$  ammette almeno una decomposizione in prodotto diretto di sottogruppi normali minimi di  $G$  e ammette almeno un complemento  $C$  in  $G$ . Poichè  $C$  è un gruppo isomorfo al gruppo  $G/G^{(n-1)}$ , per la prop. 5  $G$  è un  $K$ -gruppo.

**COROLLARIO.** *Per il gruppo supersolubile<sup>5)</sup>  $G$  le seguenti condizioni sono fra loro equivalenti:*

- a)  $G$  è un  $K$ -gruppo;
- b)  $G$  è un  $IK$ -gruppo ogni cui immagine omomorfa ha il sottogruppo di Frattini identico.

**DIM.** Per la prop. 2 e per la prop. 1 a) da a) segue b). Dimostriamo che da b) segue a). Il derivato  $G'$  di  $G$  è uno  $ZA$ -gruppo [1]. Per la prop. 6  $G$  è risolubile. Per il teorema 2  $G$  è un  $K$ -gruppo.

---

<sup>5)</sup> Per la definizione si veda [11] vol. II, p. 228.

## BIBLIOGRAFIA

- [1] BAER, R.: *Supersoluble groups*, Proc. Amer. Math. Soc., 6 (1955), 16-32.
- [2] BAER, R.: *Irreducible groups of automorphisms of abelian groups*, Pacific J. Math., 14 (1964), 385-406.
- [3] CERNIKOV, S. N.: *Gruppy s sistemamy dopolnyaemyh podgrupp*, Mat. Sb., 35 (77), № 1 (1954), 93-128.
- [4] CERNIKOV, S. N.: *Gruppy s zadannymi svoïstvami sistem beskonečnyh podgrupp*, Ukr. Mat. J., 19, N. 6 (1967), 111-131.
- [5] CERNIKOVA, N. V.: *Gruppy s dopolnyaemyimi podgruppami*, Mat. Sb., 39 (81), N. 3 (1956), 273-292.
- [6] CHEVALLEY, C.: *Fundamental concepts of algebra*, Academic Press, New York 1956.
- [7] CHRISTENSEN, C.: *Complementations in groups*, Math. Z., 84 (1964), 52-69.
- [8] EMALDI, M.: *Sui gruppi risolubili complementati*, Rend. Sem. Mat. Univ. Padova, 42 (1969), 123-128.
- [9] EMALDI, M.: *Una nota sui gruppi risolubili complementati*, Boll. U.M.I., 5 (1970), 858-862.
- [10] HALL, P.: *Complemented groups*, Journ. London Math. Soc., 12 (1937), 201-204.
- [11] KUROSH, A. G.: *The theory of groups*, Chelsea, New York 1960.
- [12] NAPOLITANI, F.: *Sui gruppi risolubili complementati*, Rend. Sem. Mat. Univ. Padova, 38 (1967), 118-120.
- [13] ZACHER, G.: *Costruzione dei gruppi finiti a sottogruppo di Frattini identico*, Rend. Sem. Mat. Univ. Padova, 21 (1952), 383-394.
- [14] ZACHER, G.: *Caratterizzazione dei gruppi risolubili d'ordine finito complementati*, Rend. Sem. Mat. Univ. Padova, 22 (1953), 113-122.
- [15] SUZUKI, M.: *Structure of a group and structure of its lattice of subgroups*, Springer Berlin 1954.

Manoscritto pervenuto in redazione il 19 dicembre 1970.