

RENDICONTI *del* SEMINARIO MATEMATICO *della* UNIVERSITÀ DI PADOVA

MARIA ERMINIA MARINA

**Una disuguaglianza variazionale associata a un
operatore ellittico che può degenerare e con
condizioni al contorno di tipo misto**

Rendiconti del Seminario Matematico della Università di Padova,
tome 54 (1975), p. 107-121

http://www.numdam.org/item?id=RSMUP_1975__54__107_0

© Rendiconti del Seminario Matematico della Università di Padova, 1975, tous droits réservés.

L'accès aux archives de la revue « Rendiconti del Seminario Matematico della Università di Padova » (<http://rendiconti.math.unipd.it/>) implique l'accord avec les conditions générales d'utilisation (<http://www.numdam.org/conditions>). Toute utilisation commerciale ou impression systématique est constitutive d'une infraction pénale. Toute copie ou impression de ce fichier doit contenir la présente mention de copyright.

NUMDAM

*Article numérisé dans le cadre du programme
Numérisation de documents anciens mathématiques*
<http://www.numdam.org/>

Una disuguaglianza variazionale associata a un operatore ellittico che può degenerare e con condizioni al contorno di tipo misto.

MARIA ERMINIA MARINA (*)

SUMMARY - The Author discusses a variational inequality, with mixed boundary conditions, associated to the following bilinear form

$$a(u, v) = \int_{\Omega} \left[\sum_{i,j=1}^n (a_{ij} u_{x_i} + d_j u) v_{x_j} + \left(\sum_{i=1}^n b_i u_{x_i} + cu \right) v \right] dx + \int_{\partial\Omega} g u v d\sigma.$$

It is assumed that the coefficients a_{ij} are such that

$$\sum_{i,j=1}^n a_{ij}(x) \xi_i \xi_j \geq m(x) |\xi|^2 \quad \text{almost everywhere in } \bar{\Omega}, \text{ for } \xi \in R^n,$$

where $m(x)$ is a non negative function defined on $\bar{\Omega}$.

The existence, the uniqueness, and the regularity for the solution of the inequality (0.3) of our Introduction are proved.

The convergence for the solutions of a collection of variational inequalities associated to (0.3) is examined in $H^1(\Omega, m)$ space. To this purpose an a priori bound for the solutions is deduced and discussed.

Introduzione.

La teoria delle disuguaglianze variazionali associate a operatori uniformemente ellittici del secondo ordine e di tipo variazionale è

(*) Indirizzo dell'Autore: Istituto Matematico, Via L. B. Alberti 4, 16132 Genova.

Lavoro eseguito nell'ambito del G.N.A.F.A. e del Laboratorio per la Matematica Applicata del C.N.R.

stata studiata da parecchi autori (vedi Bibliografia). In particolare in [12] sono stati dimostrati teoremi di esistenza, unicità e regolarità delle soluzioni di un problema di tipo misto associato a una forma bilineare uniformemente ellittica e coerciva; il caso non coercivo è stato affrontato in [1], [7], [9].

Qui si vuole estendere alcuni dei risultati precedenti al caso degenere, studiando anche la convergenza delle soluzioni.

Sia Ω un insieme aperto e limitato di \mathbf{R}^n ($n > 2$), $\partial\Omega$ la sua frontiera che supponiamo localmente lipschitziana, Γ_0 un sottoinsieme chiuso di $\partial\Omega$ e $\Gamma_1 = \partial\Omega - \Gamma_0$.

Sia $m(x)$ una funzione non negativa, definita in $\bar{\Omega}$ tale che $m(x) \in L^\infty(\Omega)$, $m^{-1}(x) \in L^t(\Omega)$ ($t \geq n/2$). Siano $H^1(\Omega, m)$ e $H_0^1(\Omega, m)$ gli spazi ottenuti completando rispettivamente $C^1(\bar{\Omega})$ e $C_0^1(\Omega)$ secondo la norma

$$\|u\|_{H^1(\Omega, m)}^2 = \|u\|_{2, \Omega}^2 + \|u_x\|_{m, 2, \Omega}^2$$

essendo

$$\|u\|_{2, \Omega}^2 = \int_{\Omega} u^2 dx \quad \text{e} \quad \|u_x\|_{m, 2, \Omega}^2 = \sum_{i=1}^n \int_{\Omega} (u_{x_i} m^{\frac{1}{2}})^2 dx.$$

Posto $\bar{C}^1(\bar{\Omega}) = \{u \in C^1(\bar{\Omega}); u = 0 \text{ su } \Gamma_0\}$, indichiamo con V la chiusura di $\bar{C}^1(\bar{\Omega})$ in $H^1(\Omega, m)$. Se $u \in H^1(\Omega, m)$, $k \in \mathbf{R}$, $k \geq 0$, $B \subset \bar{\Omega}$, B chiuso, diciamo che $u \geq k$ ($u \leq k$) in B nel senso di $H^1(\Omega, m)$ se esiste una successione $\{u_j\}_{j \in \mathbf{N}}$ di funzioni appartenenti a $C^1(\bar{\Omega})$ tali che $u_j \geq k$ ($u_j \leq k$) su B e $\|u_j - u\|_{H^1(\Omega, m)} \rightarrow 0$.

Indichiamo con

$$\max_B u = \begin{cases} \inf \{k \in \mathbf{R}: u \leq k \text{ su } B \text{ nel senso di } H^1(\Omega, m)\} \\ +\infty \text{ se non esiste } k \text{ tale che } u \leq k \text{ nel senso di } H^1(\Omega, m), \end{cases}$$

$$\min_B u = \begin{cases} \sup \{k \in \mathbf{R}: u \geq k \text{ su } B \text{ nel senso di } H^1(\Omega, m)\} \\ -\infty \text{ se non esiste } k \text{ tale che } u \geq k \text{ nel senso di } H^1(\Omega, m). \end{cases}$$

È noto (vedi [11]) che se $u \in H^1(\Omega, m)$ esiste un'applicazione lineare e continua $\gamma_0: H^1(\Omega, m) \rightarrow L^s(\partial\Omega)$ con $s = 2(n-1)(n-2+n/t)^{-1}$ tale che $\gamma_0 u = u/\partial\Omega$, $\forall u \in C^1(\bar{\Omega})$. Sia $a: V \times V \rightarrow \mathbf{R}$ la seguente forma bilineare

$$(0.1) \quad a(u, v) = \int_{\Omega} [(a_{ij} u_{x_i} + d_j u) v_{x_j} + (b_i u_{x_i} + cu)v] dx + \int_{\Gamma_1} g \gamma_0 u \gamma_0 v d\sigma \quad (1)$$

(1) Il simbolo di sommatoria è sempre sottinteso secondo la convenzione di Einstein.

LEMMA 1.1. *Sia $u \in H^1(\Omega, m)$. Allora esistono due costanti $S(n, m, t, \Omega)$ e $D(n, m, t, \Omega)$ tali che*

$$(1.1) \quad \|u\|_{2^q, \Omega} \leq S \|u\|_{H^1(\Omega, m)}$$

e

$$(1.2) \quad \|\gamma_0 u\|_{s, \partial\Omega} \leq D \|u\|_{H^1(\Omega, m)}.$$

DIMOSTRAZIONE. Vedi [11] teoremi (3.1) e (3.9). C.V.D.

LEMMA 1.2. *Sia $g: \mathbf{R} \rightarrow \mathbf{R}$ una funzione uniformemente lipschitziana tale che $g(0) = 0$, $t \cdot g(t) \geq 0$, $\forall t \in \mathbf{R}$. Se $u \in V$ allora $g \circ u \in V$. Inoltre se la derivata g' di g è continua eccetto al più un numero finito di punti allora*

$$(g \circ u)_{x_i} = (g' \circ u) u_{x_i} \quad i = 1, \dots, n$$

nel senso delle distribuzioni, ove il secondo membro deve intendersi nullo se g' non è definito.

DIMOSTRAZIONE. Salvo poche varianti è la stessa di [11]. Proposizione 2.7. C.V.D.

LEMMA 1.3. *Siano $\{\varphi_n\}_{n \in \mathbf{N}}$ e φ elementi di V tali che $\|\varphi_n - \varphi\|_V \rightarrow 0$. Allora $\|\max(\varphi_n, 0) - \max(\varphi, 0)\|_V \rightarrow 0$.*

DIMOSTRAZIONE. Salvo poche varianti è la stessa di [1], § 5. C.V.D.

Sia $h \in \mathbf{R} \cup \{+\infty\}$, $k \in \mathbf{R}$, $0 \leq k \leq h$; poniamo se $h \in \mathbf{R}$

$$G_{k,h}(t) = \begin{cases} h - k & \text{se } t \geq h \\ t - k & \text{se } k \leq t < h \\ 0 & \text{se } -k \leq t < k \\ t + k & \text{se } -h \leq t < -k \\ k - h & \text{se } t < -h \end{cases}$$

e

$$G_{k,\infty}(t) = \begin{cases} t - k & \text{se } t \geq k \\ 0 & \text{se } -k \leq t < k \\ t + k & \text{se } t < -k \end{cases}$$

Sia

$$u \in V, \quad \Omega(k, h, u) = \Omega(k, h) = \{x \in \Omega: k \leq |u(x)| \leq h \text{ q.o.}, u_x \neq 0\}.$$

Risulta allora:

LEMMA 1.4. Sia $u \in V$, $h \in L^p(\Omega)$. Allora fissato $a \in \mathbf{R}$, $a > 0$, è possibile determinare r numeri reali $k_1 > k_2 > k_3 \dots > k_r = 0$ tali che posto $\Omega_1 = \Omega(k_1, \infty)$, $\Omega_s = \Omega(k_s, k_{s-1})$, $s = 1, \dots, r$, $u_1 = G_{k_1, \infty}(u)$, $u_s = G_{k_s, k_{s-1}}(u)$, $s = 1, \dots, r$ risulti:

$$(1.3) \quad \left\{ \begin{array}{ll} \|h\|_{p, \Omega_s} = a \quad \forall s = 1, \dots, r-1, & \|h\|_{p, \Omega_r} \leq a \\ \{x \in \Omega: (u_s)_x(x) \neq 0\} \subset \Omega_s & \forall s = 1, \dots, r \\ uu_s \geq u_s^2 & \forall s = 1, \dots, r \\ u_x = (u_s)_x \text{ in } \Omega_s & \forall s = 1, \dots, r \\ (u_1 + u_2 + \dots + u_s)_x u_s = u_x u_s & \forall s = 1, \dots, r \\ u_1 + u_2 + \dots + u_r = u & \end{array} \right.$$

Inoltre $r \leq (a^{-1} \|h\|_{p, \Omega})^p + 1$.

DIMOSTRAZIONE. Salvo poche varianti è la stessa del lemma 1.3 di [2] utilizzando il lemma 1.2. C.V.D.

LEMMA 1.5. Sia $u \in H^1(\Omega, m)$ tale che $a(u, v) \leq 0 (\geq 0)$, $\forall v \in V$, $v \geq 0$. Allora

$$\max_{\bar{\Omega}} u \leq \max_{r_0} (\max u, 0) (\min u \geq \min(\min u, 0)).$$

DIMOSTRAZIONE. Vedi [8], teorema 1.1. C.V.D.

LEMMA 1.6. Sia $T \in V'$. Allora esiste una ed una sola soluzione del problema $a(u, v) = \langle T, v \rangle$, $\forall v \in V$.

DIMOSTRAZIONE. Vedi [8] teorema 2.1. C.V.D.

Sia ψ definito come nell'introduzione, $\psi^+ = \max(\psi, 0)$ e $L: V \rightarrow V'$ tale che $a(u, v) = \langle Lu, v \rangle$, $\forall u, v \in V$.

Definiamo

$$\tilde{\mathcal{K}} = \{\tilde{u} \in V: \tilde{u} + \psi^+ \in \mathcal{K}\} \text{ e } \tilde{\mathcal{K}}_R = \{\tilde{u} \in \tilde{\mathcal{K}}, \|\tilde{u}\|_V \leq R\}.$$

Sussiste il seguente lemma:

LEMMA 1.7. *Per ogni $R \in \mathbf{R}$, $R > 0$, esiste una funzione $\tilde{u} \in \tilde{\mathcal{K}}_R$ soluzione del problema*

$$(1.4) \quad a(\tilde{u}_R, \tilde{v} - \tilde{u}_R) \geq \langle T - L\psi^+, \tilde{v} - \tilde{u}_R \rangle.$$

Inoltre se esiste una costante C tale che $\forall R \in \mathbf{R}$, $R > 0$, risulti $\|\tilde{u}_R\|_V \leq C$ il problema 0.3 ha soluzione.

DIMOSTRAZIONE. Tenuto conto della proposizione 4.6 di [11] e del lemma 1.6, si dimostra l'esistenza di una soluzione \tilde{u}_R di (1.4) in $\tilde{\mathcal{K}}_R$ con un ragionamento del tutto analogo a quello usato in [1], Teorema 1.2. La seconda asserzione è una conseguenza del ragionamento fatto nella dimostrazione del teorema 1.4 e 4.1 di [1]. C.V.D.

2. Al fine di dimostrare il teorema di esistenza 2.2 ci è utile il seguente

LEMMA 2.1. *Sia $\tilde{u} \in \tilde{\mathcal{K}}_R$ soluzione del problema 1.4. Allora*

$$\|\tilde{u}\|_V \leq (2^r - 1) \frac{2}{\min(1, \alpha)} \|T - L\psi^+\|_V$$

ove r è il numero definito nel lemma 1.4.

DIMOSTRAZIONE. Poichè $(b_i - d_i) m^{-\frac{1}{2}} \in L^{2a}(\Omega)$, fissato $a = \min(1, \alpha)/2S$ siano $\tilde{u}_1, \dots, \tilde{u}_R$ definiti come nel lemma 1.4. Risulta allora

$$\tilde{u} - \tilde{u}_s = \begin{cases} \tilde{u} - k_{s-1} + k_s & \text{se } k_{s-1} < \tilde{u} \\ k_s & \text{se } k_s < \tilde{u} \leq k_{s-1} \\ \tilde{u} & \text{se } -k_s < \tilde{u} \leq k_s \\ -k_s & \text{se } -k_{s-1} \leq \tilde{u} \leq -k_s \\ \tilde{u} + k_{s-1} - k_s & \text{se } \tilde{u} \leq -k_{s-1} \end{cases} \quad s = 1, \dots, r.$$

Osservato che $|\tilde{u} - \tilde{u}_s| \leq |\tilde{u}|$, $|(\tilde{u} - \tilde{u}_s)_x| \leq |\tilde{u}_x|$ risulta $\tilde{u} - \tilde{u}_s \in \tilde{\mathcal{K}}_R$, $\forall s = 1, \dots, r$. Ne segue che $a(\tilde{u}, \tilde{u}_s) \leq \langle T - L\psi^+, \tilde{u}_s \rangle$, $\forall s = 1, \dots, r$. Te-

nuta presente la (c) di (0.2) e la (1.3) si ha:

$$\begin{aligned} \|T - L\psi^+\|_{V'} \|\tilde{u}_s\|_V &\geq \int_{\Omega} [a_{ij} \tilde{u}_{x_i} (\tilde{u}_s)_{x_j} + (b_i - d_i) \tilde{u}_{x_i} \tilde{u}_s + d_i (\tilde{u} \tilde{u}_s)_{x_i} + c \tilde{u} \tilde{u}_s] dx + \\ &+ \int_{\Gamma_1} g \gamma_0 \tilde{u} \gamma_0 \tilde{u}_s d\sigma = \int_{\Omega} a_{ij} (\tilde{u}_s)_{x_i} (\tilde{u}_s)_{x_j} + (b_i - d_i) (\tilde{u}_s)_{x_i} \tilde{u}_s dx + \\ &+ \sum_{t=1}^{s-1} \left(\int_{\Omega} (b_i - d_i) (\tilde{u}_t)_{x_i} \tilde{u}_s \right) dx + \int_{\Omega} (d_i (\tilde{u} \tilde{u}_s)_{x_i} + c \tilde{u} \tilde{u}_s) dx + \\ &+ \int_{\Gamma_1} g \gamma_0 \tilde{u} \gamma_0 \tilde{u}_s d\sigma \geq \int_{\Omega} a_{ij} (\tilde{u}_s)_{x_i} (\tilde{u}_s)_{x_j} + (b_i - d_i) (\tilde{u}_s)_{x_i} \tilde{u}_s dx + \\ &+ \sum_{t=1}^{s-1} \int_{\Omega_i} (b_i - d_i) (\tilde{u}_t)_{x_i} \tilde{u}_s dx + \alpha \int_{\Omega} \tilde{u}_s^2 dx. \end{aligned}$$

Dalla disuguaglianza precedente con facili passaggi si deduce che

$$\|\tilde{u}_s\|_V \leq \frac{2^s}{\min(1, \alpha)} \|T - L\psi^+\|_{V'}$$

e quindi per la (1.3)

$$\|\tilde{u}\|_V \leq \sum_{s=1}^r \|u_s\|_V = (2^r - 1) \frac{2}{\min(1, \alpha)} \|T - L\psi^+\|_{V'} \quad \text{C.V.D.}$$

TEOREMA 2.2. *Esiste una funzione $u \in \mathcal{K}$ soluzione del problema 0.3.*

DIMOSTRAZIONE. È un'ovvia conseguenza dei lemmi (1.7) e (2.1).
C.V.D.

TEOREMA 2.3. *Sia $u_1 \in \mathcal{K}$ soluzione di (0.3), $u_2 \in H^1(\Omega, m)$, $u_2 \geq 0$ su Γ_0 , $u_2 - \psi \geq 0$ su $\bar{\Omega}$, u_2 soprasoluzione cioè $a(u_2, \varphi) \geq \langle T, \varphi \rangle$ per ogni $\varphi \in V$, $\varphi \geq 0$.*

Allora $\min(u_1, u_2) = u_1$.

DIMOSTRAZIONE. Sia $v = \min(u_1, u_2)$; $v \in \mathcal{K}$. Supponiamo per assurdo che $\max(u_1 - v) = 2M > 0$. Sia $0 < k < M$ e $w_k = \max(u_1/2 - v/2 - k, 0)$, $\Omega(k) = \{x \in \Omega: \frac{1}{2}(u_1 - v) \geq k, \frac{1}{2}(u_1 - v)_x \neq 0\}$. Poichè $u_1 -$

— $w_k \in \mathcal{K}$ si ha

$$a(u_1, w_k) \leq \langle T, w_k \rangle .$$

Se osserviamo che $a(u_2, w_k) \geq \langle T, w_k \rangle$, ne segue che $a(u_1 - u_2, w_k) \leq 0$ e quindi tenuto conto della (c) di (0.2) risulta:

$$\begin{aligned} 0 &\geq a\left(\frac{u_1 - u_2}{2}, w_k\right) = \int_{\Omega} \left[a_{ij} \left(\frac{u_1 - u_2}{2}\right)_{x_i} (w_k)_{x_j} + (b_i - d_i) \left(\frac{u_1 - u_2}{2}\right)_{x_i} w_k + \right. \\ &\quad \left. + d_i \left[\left(\frac{u_1 - u_2}{2}\right) w_k\right]_{x_i} + c \frac{u_1 - u_2}{2} w_k \right] dx + \int_{\Gamma_1} g \gamma_0 \left(\frac{u_1 - u_2}{2}\right) \gamma_0 w_k d\sigma \geq \\ &\geq \int_{\Omega} \left[a_{ij} \left(\frac{u_1 - u_2}{2}\right)_{x_i} (w_k)_{x_j} + (b_i - d_i) \left(\frac{u_1 - u_2}{2}\right)_{x_i} w_k \right] dx + \\ &\quad + \alpha \int_{\Omega} \left(\frac{u_1 - u_2}{2}\right) w_k dx = \int_{\Omega(k)} [a_{ij}(w_k)_{x_i} (w_k)_{x_j} + (b_i - d_i)(w_k)_{x_i} w_k + \alpha w_k^2] dx . \end{aligned}$$

Applicando la disuguaglianza di Hölder si deduce, usando la (1.1),

$$\min(1, \alpha) \|w_k\|_V^2 \leq S \| (b_i - d_i) m^{-\frac{1}{2}} \|_{2q, \Omega(k)} \|w_k\|_V^2 .$$

Facciamo tendere k ad M . Poichè $\lim |\Omega(k)| = 0$ ⁽³⁾, il $\lim \| (b_i - d_i) m^{-\frac{1}{2}} \|_{2q, \Omega(k)} = 0$; assurdo. C.V.D. $\lim_{k \rightarrow M}$

COROLLARIO 2.4. *La soluzione di (0.3) è unica.*

DIMOSTRAZIONE. Ovvvia conseguenza del teorema 2.3 e del fatto che ogni soluzione di (0.3) è una soprasoluzione rispetto a L . C.V.D.

Enunciamo infine alcuni teoremi le cui dimostrazioni, salvo ovvie varianti, si trovano in [12] Corollario 3.9 e in [9] teoremi 1.8, 1.10 e 1.11.

TEOREMA 2.5. *Siano ψ_1, ψ_2 due ostacoli, $\psi_1 \geq \psi_2$, u_1 e $u_2 \in V$ tali che $a(u_i, v - u_i) \geq \langle T, v - u_i \rangle$, $\forall v \in \mathcal{K}_i = \{v \in V : v - \psi_i \geq 0 \text{ su } \bar{\Omega}\}$, $i = 1, 2$. Allora $0 \leq u_1 - u_2 \leq \max_{\bar{\Omega}}(\psi_1 - \psi_2)$.*

⁽³⁾ Per ogni insieme E \mathcal{L} -misurabile denoteremo con $|E|$ la sua misura di Lebesgue.

TEOREMA 2.6. *Siano ψ_1, ψ_2 due ostacoli, u_1 e $u_2 \in V$ definiti come nel teorema 2.5. Allora*

$$\max_{\bar{\Omega}} |u_1 - u_2| \leq \max_{\bar{\Omega}} |\psi_1 - \psi_2|.$$

3. Vogliamo ora studiare la convergenza delle soluzioni di (0.3).

TEOREMA 3.1. *Siano $\psi_1, \psi_2 \in V$ due ostacoli, u_1 e $u_2 \in V$ definiti come nel teorema 2.5. Allora*

$$\|u_1 - u_2\|_V \leq C \|\psi_1 - \psi_2\|_V,$$

essendo C una costante dipendente solo dalle norme dei coefficienti di (0.1).

DIMOSTRAZIONE. Sia $w_1 = \frac{1}{2}(u_1 - u_2 + \psi_2 - \psi_1)$. Poichè $w_1 \in V$ e $(b_i - d_i)m^{-\frac{1}{2}} \in L^{2a}(\Omega)$, fissato $a = \min(1, \alpha)/2S$ siano w_1, \dots, w_r definiti come nel lemma 1.4. Si ha

$$u_1 - w_{1s} = \begin{cases} u_1 - k_{s-1} + k_s & \text{se } k_{s-1} \leq w_1 \\ \frac{u_1}{2} + \frac{u_2}{2} + \frac{\psi_1}{2} - \frac{\psi_2}{2} + k_s & \text{se } k_s \leq w_1 \leq k_{s-1} \\ u_1 & \text{se } -k_s \leq w_1 \leq k_s \quad s = 1, \dots, r. \\ \frac{u_1}{2} + \frac{u_2}{2} + \frac{\psi_1}{2} - \frac{\psi_2}{2} - k_s & \text{se } -k_{s-1} \leq w_1 \leq -k_s \\ u_1 + k_{s-1} - k_s & \text{se } w_1 \leq -k_{s-1} \end{cases}$$

Risulta ⁽⁴⁾ $u_1 - w_{1s} \in \mathcal{K}_1$, $\forall s = 1, \dots, r$ e quindi $a(u_1, w_{1s}) \leq \langle T, w_{1s} \rangle$, $\forall s = 1, \dots, r$. Indichiamo con $w_2 = -w_1$ e siano w_{2_1}, \dots, w_{2_r} definiti come nel lemma 1.4. Poichè $w_{2_s} = -w_{1_s}$, $\forall s = 1, \dots, r$, $w_2 - w_{2_s} \in \mathcal{K}_2$, $\forall s = 1, \dots, r$; si ha che $a(u_2, w_{2_s}) \leq \langle T, w_{2_s} \rangle$, $\forall s = 1, \dots, r$. Ne segue che

(4) Se osserviamo che:

$$(u_1 - k_{s-1} + k_s) - \left(\frac{u_1}{2} + \frac{u_2}{2} + \frac{\psi_1}{2} - \frac{\psi_2}{2} + k_s \right) \geq 0 \quad \text{su } \{x \in \Omega : w_1 \geq k_{s-1}\},$$

$$\left[u_1 + \left(\frac{u_2}{2} - \frac{u_1}{2} + \frac{\psi_1}{2} - \frac{\psi_2}{2} - k_s \right) \right] - u_1 \geq 0 \quad \text{su } \{x \in \Omega : -k_{s-1} \leq w_1 \leq -k_s\},$$

si ha: $(u_1 - w_{1s}) - \psi \geq 0$.

$a(u_1 - u_2, w_{1_s}) \leq 0$ e quindi

$$a\left(\frac{u_1 - u_2}{2} + \frac{\psi_2 - \psi_1}{2}, w_{1_s}\right) \leq a\left(\frac{\psi_2 - \psi_1}{2}, w_{1_s}\right).$$

Poichè la forma $a(u, v)$ è continua su $V \times V$, risulta

$$\left| a\left(\frac{\psi_2 - \psi_1}{2}, w_{1_s}\right) \right| \leq H \|\psi_2 - \psi_1\|_V \|w_{1_s}\|_V,$$

essendo H una costante dipendente soltanto dalle norme dei coefficienti di (0.1) (vedi [11] Proposizione 4.1). Dalle disuguaglianze precedenti si deduce allora con ragionamento analogo a quello fatto nel Lemma (2.1):

$$\begin{aligned} H \|\psi_2 - \psi_1\|_V \|w_{1_s}\|_V &\geq a\left(\frac{u_1 - u_2}{2} + \frac{\psi_2 - \psi_1}{2}, w_{1_s}\right) = a(w_1, w_{1_s}) > \\ &\geq \int_{\Omega} [a_{ij}(w_{1_s})_{x_i}(w_{1_s})_{x_j} + (b_i - d_i)(w_{1_s})_{x_i} w_{1_s}] dx + \\ &\quad + \sum_{i=1}^{s-1} \left[\int_{\Omega} (b_i - d_i)(w_{1_s})_{x_i} w_{1_s} dx \right] + \alpha \int_{\Omega} (w_{1_s})^2 dx \end{aligned}$$

e quindi

$$\|w_1\|_V \leq \sum_{s=1}^r \|w_{1_s}\|_V = H(2^r - 1) \frac{\min(1, \alpha)}{2} \|\psi_2 - \psi_1\|_V.$$

Ne segue

$$\begin{aligned} (3.1) \quad \|u_1 - u_2\|_V &= \|2w_2 + (\psi_1 - \psi_2)\|_V \leq \\ &\leq \left(H(2^r - 1) \frac{4}{\min(1, \alpha)} + 1 \right) \|\psi_1 - \psi_2\|_V \quad \text{C.V.D..} \end{aligned}$$

Dimostriamo ora una maggiorazione a priori nell'ipotesi che gli ostacoli siano elementi di $H^1(\Omega, m)$:

TEOREMA 3.2. *Sia $z \in V$ la soluzione del problema $a(z, \varphi) = \langle T, \varphi \rangle$, $\forall \varphi \in V$, $\psi_1, \psi_2 \in H^1(\Omega, m)$ due ostacoli, u_1 e $u_2 \in V$ definiti come nel teorema 2.5. Allora*

$$(3.2) \quad \|u_1 - u_2\|_V \leq \left(H \frac{(2^r - 1) 4}{\min(1, \alpha)} + 1 \right) \|\max(\psi_1, z) - \max(\psi_2, z)\|_V.$$

DIMOSTRAZIONE. Sia $i = 1, 2$, $\psi'_i = \max(\psi_i, z)$, $\mathcal{K}'_i = \{v \in V, v - \psi'_i \geq 0 \text{ su } \bar{\Omega}\}$. Risulta $\psi'_i - \psi_i \geq 0$ e $\mathcal{K}'_i \subset \mathcal{K}_i$. Poichè $a(u_i, \varphi) \geq \langle T, \varphi \rangle$, $\forall \varphi \in V$, $\varphi \geq 0$, si ha che $a(u_i - z, \varphi) \geq 0$, $\forall \varphi \in V$, $\varphi \geq 0$; dal lemma 1.5 segue che $u_i - z \geq 0$ e quindi $u_i \in \mathcal{K}'_i$. Allora u_i è soluzione del problema $a(u_i, v - u_i) \geq \langle T, v - u_i \rangle$, $\forall v \in \mathcal{K}'_i$ e dunque la (3.2) è immediata conseguenza della (3.1) C.V.D.

Siano ora $\{\psi_n\}_{n \in \mathbb{N}}$ e ψ ostacoli tali che $\|\psi_n - \psi\|_{H^1(\Omega, m)} \rightarrow 0$. Poichè $\max(\psi_n, z) - \max(\psi, z) = \max(\psi_n - z, 0) - \max(\psi - z, 0)$, dal lemma 1.3 si ha $\|\max(\psi_n, z) - \max(\psi, z)\|_V \rightarrow 0$.

Siano $\{u_n\}_{n \in \mathbb{N}}$ e u le soluzioni di (0.3) corrispondenti rispettivamente a $\{\psi_n\}_{n \in \mathbb{N}}$ e ψ . È immediata conseguenza del teorema precedente il seguente

TEOREMA 3.3. *Supponiamo che $\|\psi_n - \psi\|_{H^1(\Omega, m)} \rightarrow 0$. Allora $\|u_n - u\|_V \rightarrow 0$*

4. Consideriamo ora il seguente problema:

$$(4.1) \quad a(u, v - u) \geq \langle T, v - u \rangle, \quad \forall v \in \mathcal{K}, \quad u \in \mathcal{K}$$

ove

$$\langle T, v \rangle = \int_{\Omega} f v \, dx + \int_{\Omega} f_i v_{x_i} \, dx + \int_{\Gamma_1} h \gamma_0 v \, d\sigma,$$

essendo

$$f \in L^p(\Omega), \quad f_i m^{-1/p} \in L^p(\Omega), \quad 1 \leq i \leq n, \quad p \geq 2,$$

$$h \in L^r(\Gamma_1), \quad r \geq 2(n-1)n^{-1}(1-1/t)^{-1} = r.$$

Supponiamo inoltre che $\psi \in H^1(\Omega, m) \cap L^\infty(\Omega)$.

Vogliamo ora dimostrare che sotto certe ipotesi di sommabilità per la funzione $m(x)$, la soluzione del problema 4.1, certamente esistente perchè $T \in V'$, appartiene ad uno spazio $L^p(\Omega)$ con $p > 2^{\#}$.

Sia $M = \max(\max_{\bar{\Omega}} \psi, 0)$, $k \geq M$, $v_k = \max(u - k, 0)$, $\Omega(k) = \{x \in \bar{\Omega} : u \geq k\}$. Poichè $v_k \in V$, $(b_i - d_i) m^{-\frac{1}{2}} \in L^{2q}(\Omega)$, fissato $a = \min(1, \alpha)/2S$ siano v_{k_1}, \dots, v_{k_r} definiti come nel Lemma 1.4 applicato a v_k . Si ha

$$u - v_{k_s} = \begin{cases} u - k_{s-1} + k_s & \text{se } k_{s-1} \leq v_k \\ k + k_s & \text{se } k_s \leq v_k \leq k_{s-1} \\ u & \text{se } v_k \leq k_s \end{cases} \quad s = 1, \dots, r$$

e quindi $u - v_{k_s} \in \mathcal{K}$, $\forall s = 1, \dots, r$.

Poichè dalle ipotesi (0.2) si ha che $a(k, \varphi) \geq 0$, $\forall \varphi \in V$, $\varphi \geq 0$, otteniamo

$$a(u - k, v_{k_*}) \leq \int_{\Omega} f v_{k_*} dx + \int_{\Omega} f_i(v_{k_*})_{x_i} dx + \int_{\Gamma_1} h \gamma_0 v_{k_*} d\sigma.$$

Osservando che $v_{k_*} = (v_{k_*})_{x_i} = 0$ in $\bar{\Omega} - \Omega(k)$ dalla relazione precedente segue:

$$\int_{\Omega(k)} f v_{k_*} dx + \int_{\Omega(k)} f_i(v_{k_*})_{x_i} dx + \int_{\Gamma_1 \cap \Omega(k)} h \gamma_0 v_{k_*} d\sigma \geq a(v_k, v_{k_*}).$$

Dalla relazione precedente, con passaggi analoghi a quelli fatti nel lemma 2.1, si deduce che

$$(4.2) \quad \|v_k\|_V \leq (2^r - 1) \frac{2}{\min(1, \alpha)} \{ \|f\|_{2, \Omega(k)} + \|f_i m^{-1/2}\|_{2, \Omega(k)} + \|h\|_{v, \Gamma_1 \cap \Omega(k)} \}.$$

Indichiamo con $\mu(k) = |\Omega(k)| + [\Gamma_1 \cap \Omega(k)]^{2^{\sharp}/s}$ (5).

Tenuto conto che $\forall h \geq k \geq M$

$$(h - k) |\Omega(h)|^{1/2^{\sharp}} = \|h - k\|_{2^{\sharp}, \Omega(h)} \leq \|v_k\|_{2^{\sharp}, \Omega(h)} \leq \|v_k\|_{2^{\sharp}, \Omega(k)}$$

e

$$(h - k) [\Gamma_1 \cap \Omega(h)]^{1/s} = \|h - k\|_{s, \Gamma_1 \cap \Omega(h)} \leq \|\gamma_0 v_k\|_{s, \Gamma_1 \cap \Omega(h)} \leq \|\gamma_0 v_k\|_{s, \Gamma_1 \cap \Omega(k)},$$

dal lemma (1.1) segue che esiste una costante C_1 tale che

$$(4.3) \quad (h - k)^{2^{\sharp}} \mu(h) \leq C_1 \|v_k\|_V^{2^{\sharp}} \text{ per ogni } h \geq k \geq M.$$

Dalle (4.2) e (4.3) si deduce facilmente — vedi [8] teorema 2.4 — che esiste una costante C_2 tale che:

$$(4.4) \quad \mu(h) \leq C_2 (h - k)^{-2^{\sharp}} \{ \|f\|_{v, \Omega}^2 + (\|f_i m^{-1/p}\|_{v, \Omega} \|m^{-1}\|_{t, \Omega}^{(1/2 - 1/p)})^2 + \\ + \|h\|_{v, \Gamma_1}^2 \}^{2^{\sharp}/2} \cdot \mu(k)^{\min\{(1/2 - 1/p)(1 - 1/t)2^{\sharp}, (1 - 1/s - 1/p)s\}}.$$

Indichiamo con

$$\beta = \min\{(1/2 - 1/p)(1 - 1/t)2^{\sharp}, (1 - 1/s - 1/p)s\}.$$

(5) Indichiamo con $[E]$ la misura $(n - 1)$ dimensionale dell'insieme E \mathfrak{L} -misurabile.

Dalla (4.4), usando il lemma (3.1) di [11] deduciamo i seguenti teoremi.

TEOREMA 4.1. *Supponiamo che valgano le ipotesi fin qui dette e sia $t > n/2$. Se u è soluzione del problema (0.3) allora $u \in M(a(p, \nu))$ cioè*

$$\{x \in \bar{\Omega} : |u(x)| > k\} \leq C_3 k^{-a(p, \nu)}$$

essendo C_3 una costante dipendente dai dati del problema e

$$a(p, \nu)^{-1} = \max\{1/p^\# + 1/t(1-2p), 1/2^\# - s/2^\#(1-1/s-1/\nu)\}.$$

TEOREMA 4.2. *Supponiamo che valgano le ipotesi fin qui dette e sia $t > n$. Allora*

a) se $p > \frac{n(t-1)}{t-n}$ e $\nu > \frac{t(n-1)}{t-n}$, esiste una costante C_4 tale che

$$\psi(x) \leq u(x) \leq \max(\max_{\bar{\Omega}} \psi, 0) + C_4 \left\{ \|f\|_{v, \Omega}^2 + \left[\|f_i m^{-1/p}\|_{v, \Omega} \|m^{-1}\|_{t, \Omega}^{(1/p)} \right]^2 + \|h\|_{v, \Gamma_1}^2 \right\}^\dagger;$$

b) se $p = \frac{n(t-1)}{t-n}$ e $\nu = \frac{t(n-1)}{t-n}$ allora $u \in L^r(\Omega) \quad \forall r \geq 1$;

c) se $p < \frac{n(t-1)}{t-n}$ e $\nu < \frac{t(n-1)}{t-n}$ allora $u \in M(a(p, \nu))$ essendo $M(a(p, \nu))$ definito come nel teorema 4.1.

La dimostrazione dei teoremi precedenti si può fare ripetendo, salvo qualche modifica, lo stesso ragionamento fatto in [8], teoremi 2.5 e 2.6.

Riportiamo le varianti della dimostrazione.

Sia $\beta < 1$; poichè $\psi \in L^\infty(\Omega) \cap H^1(\Omega, m)$ risulta $\min(u, 0) \in L^\infty(\Omega) \cap V$. Sia $\eta(k) = \{x \in \bar{\Omega} : |u(x)| \geq k\}$. Si ha $\eta(k) = \{x \in \bar{\Omega} : \max(u, 0) \geq k\} \cup \{x \in \bar{\Omega} : \min(u, 0) \leq -k\}$. Poichè $\min(u, 0) \in L^\infty(\Omega)$, come è noto $\min(u, 0) \in M(a(p, \nu))$. D'altra parte dalla (4.4) segue (vedi [8]) che $\max(u, 0) \in M(a(p, \nu))$ e quindi risulta dimostrato il teorema 4.1 e la (c) del teorema 4.2.

Sia $\beta = 1$, $\varrho = (eC_2)^{-1/2^\#} \cdot [\|f\|_{v, \Omega}^2 + \|f_i m^{-1/p}\|_{v, \Omega} \|m^{-1}\|_{t, \Omega}^{(1/2-1/p)}]^2 + \|h\|_{v, \Gamma_1}^2]^{-1/2}$, $\theta \in (0, \varrho)$. Risulta (vedi [8])

$$|\Omega(h)| \leq e\mu(M) e^{-e(h-M)} \quad \text{per ogni } h \geq M,$$

e quindi per ogni $\theta \in (0, \varrho)$ si ha:

$$\int_{\Omega} e^{\theta \max(u,0) - M} dx = - \int_0^{+\infty} e^{\theta t - M} d|\Omega(t)| < +\infty.$$

Ne segue che $u \in L^r(\Omega)$, $\forall r \geq 1$ e quindi perveniamo alla dimostrazione della b) del teorema 4.2. La parte (a) del teorema si dimostra con lo stesso ragionamento fatto in [8].

BIBLIOGRAFIA

- [1] G. BOTTARO, *Alcune condizioni sufficienti per l'esistenza e l'unicità della soluzione di una disuguaglianza variazionale non coercitiva*. Di prossima pubblicazione su Ann. Math. Pure Appl.
- [2] G. BOTTARO - M. E. MARINA, *Problemi di Dirichlet per equazioni ellittiche di tipo variazionale su insiemi non limitati*, Boll. U.M.I. (4) **8** (1973), pp. 46-56.
- [3] H. BREZIS, *Problemes unilateraux*, Jr. Math. Pures et Appl., **51** (1972), pp. 1-168.
- [4] H. LEWY - G. STAMPACCHIA, *On the regularity of the solution of a variational inequality*, Comm. Pure Appl. Math., **22** (1969), pp. 153-188.
- [5] H. LEWY - G. STAMPACCHIA, *On existence and smoothness of solutions of some non coercive variational inequalities*, Arch. Rath. Mech. and Anal. **42** (1971), pp. 241-253.
- [6] J. L. LIONS, *Quelque méthode de résolution des problèmes aux limites non linéaires*, Dunod, Paris (1969).
- [7] J. L. LIONS - G. STAMPACCHIA, *Variational inequalities*, Comm. Pure Applied Math., **20** (1967), pp. 493-519.
- [8] M. E. MARINA, *Un problema al contorno di tipo misto per un operatore ellittico che può degenerare*, Rend. Accad. Naz. Lincei, **55** (1973), pp. 149-160.
- [9] M. E. MARINA, *Esistenza e unicità della soluzione di una disuguaglianza variazionale associata a un operatore non coercivo*, Boll. U.M.I., (4) **10** (1974), pp. 500-511.
- [10] U. MOSCO, *Convergence of convex sets and of solutions of variational inequalities*, Advances in Mathematics, **3**, n. 4 (1969), pp. 510-585.
- [11] M. K. V. MURTHY - G. STAMPACCHIA, *Boundary value problems for some degenerate elliptic operators*, Ann. Math. Pure Appl., **30** (1968), pp. 1-122.

- [12] M. K. V. MURTHY - G. STAMPACCHIA, *A variational inequality with mixed boundary conditions*, Israel J. of Math., **13** (1972), pp. 188-224.
- [13] G. STAMPACCHIA, *Variational inequalities*, Proc. Nato advanced Study Inst. Theory and Applications of monotone operators, Venice (1968), pp. 101-192.

Manoscritto pervenuto in redazione il 25 novembre 1974.