

ANNALES SCIENTIFIQUES DE L'É.N.S.

CH. HERMITE

Sur l'intégration des fractions rationnelles

Annales scientifiques de l'É.N.S. 2^e série, tome 1 (1872), p. 215-218

<http://www.numdam.org/item?id=ASENS_1872_2_1__215_0>

© Gauthier-Villars (Éditions scientifiques et médicales Elsevier), 1872, tous droits réservés.

L'accès aux archives de la revue « Annales scientifiques de l'É.N.S. » (<http://www.elsevier.com/locate/ansens>) implique l'accord avec les conditions générales d'utilisation (<http://www.numdam.org/conditions>). Toute utilisation commerciale ou impression systématique est constitutive d'une infraction pénale. Toute copie ou impression de ce fichier doit contenir la présente mention de copyright.

NUMDAM

Article numérisé dans le cadre du programme
Numérisation de documents anciens mathématiques
<http://www.numdam.org/>

SUR L'INTÉGRATION

DES

FRACTIONS RATIONNELLES,

PAR M. HERMITE,
MEMBRE DE L'INSTITUT DE FRANCE.

Le procédé élémentaire d'intégration des fractions rationnelles $\frac{F_1(x)}{F(x)}$ peut être présenté sous une forme telle, que la résolution de l'équation $F(x) = 0$ ne soit plus nécessaire pour le calcul de la partie algébrique de l'intégrale, mais seulement pour en obtenir la partie transcendante. Dans ce but, on mettra d'abord le dénominateur, au moyen de la théorie des racines égales, sous la forme suivante :

$$F(x) = A^{\alpha+1} B^{\beta+1} \dots L^{\lambda+1},$$

A, B, ..., L étant des polynômes tels, que l'équation $AB\dots L = 0$ n'ait que des racines simples, et l'on fera ensuite

$$\frac{F_1(x)}{F(x)} = \frac{P}{A^{\alpha+1}} + \frac{Q}{B^{\beta+1}} + \dots + \frac{S}{L^{\lambda+1}},$$

P, Q, ..., S étant des fonctions entières.

Cela posé, l'intégrale $\int \frac{Pdx}{A^{\alpha+1}}$ se traitera comme il suit : nous effectuerons sur A et sa dérivée A' les opérations du plus grand commun diviseur, de manière à obtenir deux polynômes G et H, satisfaisant à la condition

$$AG - A'H = 1.$$

Nous formerons ensuite deux séries de fonctions entières :

$$V_0, V_1, \dots, V_{\alpha-1},$$

$$P_1, P_2, \dots, P_{\alpha},$$

par ces relations, où les polynômes Q, Q_1, Q_2, \dots sont entièrement arbitraires, savoir :

$$\alpha V_0 = HP - AQ,$$

$$(\alpha - 1) V_1 = HP_1 - AQ_1,$$

$$(\alpha - 2) V_2 = HP_2 - AQ_2,$$

$$\dots\dots\dots,$$

$$V_{\alpha-1} = HP_{\alpha-1} - AQ_{\alpha-1},$$

$$P_1 = GP - A'Q - V'_0,$$

$$P_2 = GP_1 - A'Q_1 - V'_1,$$

$$\dots\dots\dots,$$

$$P_{\alpha} = GP_{\alpha-1} - A'Q_{\alpha-1} - V'_{\alpha-1}.$$

Maintenant je prouverai qu'en faisant

$$V = V_0 + AV_1 + A^2V_2 + \dots + A^{\alpha-1}V_{\alpha-1},$$

$$U = P_{\alpha},$$

on a l'égalité

$$\frac{P}{A^{\alpha+1}} = \frac{U}{A} + \left(\frac{V}{A^{\alpha}} \right)';$$

d'où

$$\int \frac{P dx}{A^{\alpha+1}} = \int \frac{U dx}{A} + \frac{V}{A^{\alpha}},$$

de sorte que $\frac{V}{A^{\alpha}}$ est la partie algébrique de l'intégrale proposée, et

$\int \frac{U dx}{A}$ la partie transcendante.

A cet effet, j'élimine G et H entre les trois égalités

$$AG - A'H = 1,$$

$$(\alpha - i) V_i = HP_i - AQ_i,$$

$$P_{i+1} = GP_i - A'Q_i - V'_i,$$

ce qui donne

$$AP_{i+1} = P_i + (\alpha - i)A'V_i - AV'_i.$$

Or on peut écrire cette relation de la manière suivante :

$$\frac{P_i}{A^{\alpha-i+1}} - \frac{P_{i+1}}{A^{\alpha-i}} = \left(\frac{V_i}{A^{\alpha-i}} \right)'.$$

En supposant ensuite $i = 0, 1, 2, \dots, \alpha - 1$ et ajoutant membre à membre, nous en concluons

$$\frac{P}{A^{\alpha+1}} - \frac{P_\alpha}{A} = \left(\frac{V_0}{A^\alpha} + \frac{V_1}{A^{\alpha-1}} + \dots + \frac{V_{\alpha-1}}{A} \right)',$$

ce qui fait bien voir qu'on satisfait à la condition proposée

$$\frac{P}{A^{\alpha+1}} = \frac{U}{A} + \left(\frac{V}{A^\alpha} \right)'$$

par les valeurs

$$\begin{aligned} V &= V_0 + AV_1 + A^2V_2 + \dots + A^{\alpha-1}V_{\alpha-1}, \\ U &= P_\alpha, \end{aligned}$$

comme il s'agissait de le démontrer.

J'ai dit que les polynômes Q, Q_1, Q_2, \dots étaient arbitraires; on pourra donc en disposer de manière que les degrés $V_0, V_1, V_2, \dots, V_{\alpha-1}$ soient moindres que le degré de A ; on pourra aussi les supposer tous nuls, ce qui donnera, par exemple,

$$\begin{aligned} \alpha V_0 &= HP, \\ \alpha(\alpha-1)V_1 &= H[(\alpha G - H')P - HP'], \\ &\dots \end{aligned}$$

Ces deux suppositions se concilient dans le cas de l'intégrale $\int \frac{dx}{(x^2+1)^{\alpha+1}}$, que je choisis comme application de la méthode. Nous aurons alors

$$\begin{aligned} A &= x^2 + 1, & A' &= 2x, \\ G &= 1, & H &= \frac{x}{2}, \end{aligned}$$

puis successivement

$$\alpha V_0 = \frac{x}{2},$$

$$(\alpha - 1) V_1 = \frac{2\alpha - 1}{2\alpha} \frac{x}{2},$$

$$(\alpha - 2) V_2 = \frac{(2\alpha - 1)(2\alpha - 3)}{2\alpha(2\alpha - 2)} \frac{x}{2},$$

$$(\alpha - 3) V_3 = \frac{(2\alpha - 1)(2\alpha - 3)(2\alpha - 5)}{2\alpha(2\alpha - 2)(2\alpha - 4)} \frac{x}{2},$$

.....,

$$V_{\alpha-1} = \frac{(2\alpha - 1)(2\alpha - 3) \dots 5.3}{2\alpha(2\alpha - 2) \dots 6.4} \frac{x}{2},$$

$$P = 1,$$

$$P_1 = \frac{2\alpha - 1}{2\alpha},$$

$$P_2 = \frac{(2\alpha - 1)(2\alpha - 3)}{2\alpha(2\alpha - 2)},$$

.....,

$$P_\alpha = \frac{(2\alpha - 1)(2\alpha - 3) \dots 3.1}{2\alpha(2\alpha - 2) \dots 4.2}.$$

Nous retrouvons ainsi la relation bien connue, à laquelle on parvient ordinairement au moyen de l'intégration par parties, savoir :

$$\int \frac{dx}{(x^2 + 1)^{\alpha+1}} = \frac{1.3.5 \dots (2\alpha - 1)}{2.4.6 \dots 2\alpha} \arctan x + \frac{x}{2(x^2 + 1)^\alpha} \\ \times \left[\frac{1}{\alpha} + \frac{2\alpha - 1}{2\alpha} \frac{x^2 + 1}{\alpha - 1} + \frac{(2\alpha - 1)(2\alpha - 3)}{2\alpha(2\alpha - 2)} \frac{(x^2 + 1)^2}{\alpha - 2} + \dots \right].$$

(*Nouvelles Annales de Mathématiques*, 2^e série, t. XI.)