

BULLETIN DE LA S. M. F.

MAURICE D'OCAGNE

Sur les adjointes infinitésimales des courbes planes

Bulletin de la S. M. F., tome 52 (1924), p. 132-161

[<http://www.numdam.org/item?id=BSMF_1924__52__132_1>](http://www.numdam.org/item?id=BSMF_1924__52__132_1)

© Bulletin de la S. M. F., 1924, tous droits réservés.

L'accès aux archives de la revue « Bulletin de la S. M. F. » (<http://smf.emath.fr/Publications/Bulletin/Presentation.html>) implique l'accord avec les conditions générales d'utilisation (<http://www.numdam.org/conditions>). Toute utilisation commerciale ou impression systématique est constitutive d'une infraction pénale. Toute copie ou impression de ce fichier doit contenir la présente mention de copyright.

NUMDAM

Article numérisé dans le cadre du programme
Numérisation de documents anciens mathématiques
<http://www.numdam.org/>

SUR LES ADJOINTES INFINITÉSIMALES DES COURBES PLANES ;

PAR M. MAURICE D'OCAGNE.

PRÉLIMINAIRES.

1. Le sujet ici traité, bien qu'élémentaire, mérite peut-être quelque attention en raison des nombreux exercices, à la fois de

géométrie et de calcul intégral, non dépourvus d'intérêt, auxquels il peut donner naissance. Les résultats qui s'y rapportent étaient épars dans plusieurs de mes Notes ⁽¹⁾. Je me propose de les rassembler ici en les précisant, les complétant et les simplifiant sur divers points.

Je rappellerai tout d'abord la définition que j'ai donnée des adjointes infinitésimales des courbes planes :

La courbe (M_1) est dite une adjointe infinitésimale de la courbe (M) si, le point M_1 étant lié à la fois au point M et à la tangente en ce point à la courbe (M) , les éléments de la courbe (M) qui dépendent des infiniment petits de l'ordre n peuvent se déduire des éléments de la courbe (M_1) qui dépendent des infiniment petits de l'ordre $n - 1$.

En particulier, les centres de courbure de la courbe (M) se déduisent des tangentes de la courbe (M_1) ; si, par suite, on met la liaison géométrique entre les uns et les autres sous une forme simple, la détermination des centres de courbure de la courbe (M) se ramène à celle des tangentes de la courbe (M_1) ; lorsque celle-ci est, notamment, une droite ou un cercle, on obtient ainsi des catégories de courbes pour lesquelles on a des constructions géométriques simples des centres de courbure.

2. Analytiquement, la transformation qui permet de passer de la courbe (M) à son adjointe (M_1) s'exprime par des équations telles que

$$(1) \quad \begin{cases} F(x_1, y_1, x, y, dx, dy) = 0, \\ G(x_1, y_1, x, y, dx, dy) = 0, \end{cases}$$

ou, sous forme explicite,

$$(1') \quad \begin{cases} x_1 = f(x, y, dx, dy), \\ y_1 = g(x, y, dx, dy), \end{cases}$$

ces équations étant, bien entendu, homogènes en dx et dy . Mais,

⁽¹⁾ Les principales de ces Notes ont paru dans les *Nouvelles Annales de Mathématiques* (1882, 1888, 1900), le *Journal de Mathématiques spéciales* (1888, 1890, 1895), l'*American Journal of Mathematics* (1888, 1892).

pour qu'une telle transformation donne effectivement naissance à une adjointe infinitésimale, une condition analytique est requise. Si, en effet, on pose

$$\frac{dy}{dx} = p, \quad \frac{dy_1}{dx_1} = p_1,$$

on a

$$(2) \quad p_1 = \frac{\frac{\partial g}{\partial x} + \frac{\partial g}{\partial y} p + \frac{\partial g}{\partial p} \frac{dp}{dx}}{\frac{\partial f}{\partial x} + \frac{\partial f}{\partial y} p + \frac{\partial f}{\partial p} \frac{dp}{dx}},$$

et comme, d'autre part, $\frac{dp}{dx}$ est lié au rayon de courbure ρ de la courbe (M) par l'équation

$$(3) \quad \frac{dp}{dx} = \frac{(1 + p^2)^{\frac{3}{2}}}{\rho},$$

on voit que l'équation (2) établit une relation univoque entre le coefficient angulaire p_1 de la tangente à l'adjointe (M_1) et le rayon de courbure ρ de la courbe (M), à moins que l'on n'ait

$$(4) \quad \frac{\frac{\partial g}{\partial x} + \frac{\partial g}{\partial y} p}{\frac{\partial f}{\partial x} + \frac{\partial f}{\partial y} p} = \frac{\frac{\partial g}{\partial p}}{\frac{\partial f}{\partial p}},$$

auquel cas p_1 conserve la même valeur, quel que soit $\frac{dp}{dx}$ et, par suite, le rayon de courbure de (M) ne dépend plus de la tangente à la courbe (M_1).

Or le premier membre de (4) représente le coefficient angulaire de la tangente M_1T , lorsque, p restant constant, on fait varier x et y , c'est-à-dire lorsque le point M se déplace sur la tangente MT supposée fixe; de même, le second membre représente le coefficient angulaire de la tangente M_1T , lorsque, x et y restant constants, on fait varier p , c'est-à-dire lorsque, le point M restant fixe, la droite MT pivote autour de ce point.

Autrement dit, pour que la transformation fournisse une adjointe infinitésimale, il faut que les courbes (M_1) correspondant au cas où le point M se déplace sur la tangente MT supposée fixe, et au cas où la tangente MT pivote autour du point M supposé fixe, aient en M_1 des tangentes distinctes. Si elles ont en M_1 même

tangente M_1T_1 , celle-ci reste la même pour toutes les valeurs du rayon de courbure en M .

Par exemple, si la construction fait dépendre le point M_1 exclusivement de la tangente MT et non de la position de M sur cette droite, la courbe (M_1) , pour M se déplaçant sur MT , se réduit au point M_1 qui peut être regardé comme en contact avec la courbe (M_1) correspondant au cas où MT tourne autour de M ; donc, ici, on n'a pas d'adjointe infinitésimale; c'est le cas, notamment, pour les polaires réciproques et les podaires.

3. Nous allons maintenant passer en revue un certain nombre d'adjointes infinitésimales. Auparavant, nous conviendrons de certaines notations qui permettront de simplifier grandement le langage dans la suite.

Nous considérerons dans le plan un axe fixe OX et, sur cet axe, un ou deux pôles fixes O et O' .

Par X et Y nous désignerons le point à l'infini, d'une part, dans la direction de OX , d'autre part, dans la direction perpendiculaire, en sorte que MX et MY représenteront respectivement la parallèle et la perpendiculaire à OX menées par M .

T et N seront les points de rencontre de OX avec la tangente et avec la normale à la courbe (M) en M ; P , l'extrémité de la sous-normale polaire pour le pôle O , c'est-à-dire le point de rencontre de la normale MN et de la perpendiculaire élevée à OM en O ; μ , le centre de courbure de (M) répondant au point M ; $d(M)$, la différentielle de l'arc de cette courbe en M ; ω , l'angle que OM fait avec OX , θ , celui de TM avec le même axe, en sorte que

$$d(M) = M\mu \cdot d\theta = MP \cdot d\omega.$$

Les mêmes lettres, avec l'indice 1, désigneront les mêmes éléments pour la courbe (M_1) . Elles seront affectées d'un accent si les éléments correspondants se réfèrent au pôle O' . De plus, nous appellerons T_0 et N_0 les points de rencontre des tangentes MT et M_1T_1 , d'une part, des normales MN et M_1N_1 , de l'autre.

Enfin, nous désignerons uniformément par l une longueur constante.

Suivant que, dans le mode de liaison de M_1 avec M et MT (ou, ce qui revient au même, MN) interviennent le pôle O ou l'axe OX

ou, à la fois, le pôle O et l'axe OX, ou les deux pôles O et O', nous dirons que (M_1) est une *adjointe par un pôle, ou par un axe, ou par un pôle et un axe, ou par deux pôles*. Si aucun de ces éléments n'intervient dans le mode de liaison, l'adjointe peut être dite *ordinaire*.

Il est indispensable, pour la suite, d'avoir présentes à l'esprit ces quelques conventions. Lorsque le tracé de la figure ne comportera aucune hésitation, nous laisserons au lecteur le soin de la faire.

ADJOINTES ORDINAIRES.

4. Le point M_1 est le point de MT tel que $MM_1 = l$ ⁽¹⁾.

Équations (1) :

$$\begin{aligned}(y - y_1) dx &= (x - x_1) dy, \\ (x - x_1)^2 + (y - y_1)^2 &= l^2.\end{aligned}$$

Ici, comme on sait, le centre de courbure μ est à l'intersection N_0 des normales MN et M_1N_1 .

5. Si l'on portait $MM_1 = l$ sur la normale MN, la courbe (M_1) serait parallèle à (M) et ne serait pas, pour celle-ci, une adjointe infinitésimale. Le critérium du n° 2 le montre, au reste, immédiatement; suivant, en effet, que M se déplace sur MT, ou reste fixe, (M_1) est la parallèle à MT, à la distance l , ou le cercle de centre M et de rayon l , lignes qui sont bien tangentes entre elles en M_1 . Mais on peut prendre sur MY le segment MM_1 dont la projection sur MN est $ML = l$ (fig. 1) ⁽²⁾.

Équations (1) :

$$\begin{aligned}x_1 &= x, \\ (y - y_1) dx &= l \sqrt{dx^2 + dy^2}.\end{aligned}$$

Nous avons ici, la tangente à la courbe (L) étant LM_1 ,

$$\frac{d(M)}{d(M_1)} = \frac{MT_0}{M_1T_0}, \quad \frac{d(M_1)}{d(L)} = \frac{M_1N_0}{L\mu}, \quad \frac{d(L)}{d(M)} = \frac{L\mu}{M\mu},$$

⁽¹⁾ La courbe (M) est alors une tractrice de M_1 ; aussi (M_1) peut-elle être dite *antitractrice* de (M) . Sur la façon dont le centre de seconde courbure de (M) est lié au centre de courbure de (M_1) , voir mon *Cours de Géométrie de l'École Polytechnique* (n° 63).

⁽²⁾ Cette adjointe intervient dans la détermination par intégration graphique des longueurs d'arcs. Voir mes Ouvrages : *Calcul graphique et nomographie* (n° 36), *Cours de Géométrie de l'École Polytechnique* (n° 242).

d'où, en multipliant ces trois égalités membre à membre,


$$\frac{M_1 N_0}{M_1 T_0} = \frac{M \mu}{MT_0},$$

ce qui montre que

$$\widehat{M_1 T_0 N_0} = \widehat{MT_0 \mu}.$$

Mais, puisque les angles $T_0 MN_0$ et $T_0 M_1 N_0$ sont droits, le quadri-

Fig. 1.



latère $MM_1 N_0 T_0$ est inscriptible; donc

$$\widehat{M_1 T_0 N_0} = \widehat{M_1 M N_0};$$

de plus, si l'on mène par μ la perpendiculaire μI à MM_1 (donc, confondue avec μX),

$$\widehat{M_1 M N_0} = \widehat{MI \mu};$$

par conséquent,

$$\widehat{MT_0 \mu} = \widehat{MI \mu} \quad \text{et} \quad MT_0 = IM.$$

De là, la construction : le point I étant le symétrique de T_0 par rapport à M , μ se trouve sur la droite IX .

ADJOINTES PAR UN PÔLE.

6. M_1 est la projection de O sur MP ; autrement dit, (M_1) est le podaire de la développée de (M) pour le pôle O .

Or, le triangle MM_1P_1 coupé par la transversale $I\mu$ donne

$$\frac{IP_1 \cdot \mu M \cdot JM_1}{IM \cdot \mu M_1 \cdot JP_1} = 1$$

ou

$$\frac{JM_1}{JP_1} = - \frac{IM \cdot \mu M_1}{IP_1 \cdot M \mu}.$$

Par suite,

$$\frac{JM_1}{JP_1} = - \frac{IM \cdot \mu M_1}{IL \cdot MM_1} = - \frac{IM \cdot M_1 \mu}{IL \cdot M_1 M} = -1.$$

Donc, le point J est le milieu de M_1P_1 ; d'où cette construction :
Le point I étant à la rencontre du rayon vecteur OM et de la perpendiculaire en M_1 à la normale MM_1 , le centre de courbure μ est sur la droite joignant le point I au milieu de la normale polaire M_1P_1 .

Remarque. — Cette adjointe des sous-normales polaires permet de trouver facilement la liaison géométrique entre les centres de courbure correspondants de courbes (M) , (M') , (M'') , ... lorsque les rayons vecteurs OM , OM' , OM'' , ..., comptés sur une même droite issue du pôle, sont liés par une relation telle que

$$\alpha \cdot OM + \alpha' \cdot OM' + \alpha'' \cdot OM'' + \dots = l,$$

les coefficients α , α' , α'' , ... étant constants, comme la longueur l .
 En effet, par différentiation, on a

$$\alpha \cdot OM_1 + \alpha' \cdot OM'_1 + \alpha'' \cdot OM''_1 + \dots = 0,$$

et, de nouveau, par différentiation,

$$\alpha \cdot OP_1 + \alpha' \cdot OP'_1 + \alpha'' \cdot OP''_1 + \dots = 0,$$

égalité qui définit la liaison géométrique entre les points P_1 , P'_1 , P''_1 , ... portés sur OM , et, par suite, celle entre les centres de courbure μ_1 , μ'_1 , μ''_1 , ..., qui leur sont liés par la construction précédente.

Si, par exemple, la courbe (M') est une *conchoïde* de (M) , c'est-à-dire si

$$OM' - OM = l,$$

on a

$$OM'_1 = OM_1 \quad \text{et} \quad OP'_1 = OP_1,$$

c'est-à-dire que les points M_1 et P_1 sont les mêmes pour (M) et

pour (M'). Donc, ayant pris les points de rencontre I et I' de OM avec les perpendiculaires élevées en M₁ à MM₁, et M'M₁, on tire par M₁ la droite M₁P₁, limitée à OM, dont le milieu J tombe sur Iμ, puis on tire I'J qui coupe M'M₁ au centre de courbure μ'.


Lorsque la courbe (M) est un cercle passant par O, la courbe (M₁) devient un *limaçon de Pascal*. Ici le point M₁ étant diamétralement opposé à M dans le cercle (M) de centre μ, le point P₁ se confond avec M et, par suite, J avec μ. On a donc simplement le centre de courbure μ sur la normale M₁M' en joignant le centre μ du cercle (M) au point I' où la perpendiculaire élevée en M₁ à M₁M' coupe OM.

8. On porte sur la tangente le segment MM₁ = MO (fig. 3).

Équations (1) :

$$\begin{aligned} x_1^2 - 2x x_1 + y_1^2 - 2y y_1 &= 0, \\ (y_1 - y) dx &= (x_1 - x) dy. \end{aligned}$$

Fig. 3.



On a

$$\begin{aligned} d.OM &= OP.d\omega, & d.MM_1 &= \mu N_0.d\theta, \\ d(M) &= MP.d\omega = M\mu.d\theta, \end{aligned}$$

d'où

$$\frac{OP}{MP} = \frac{\mu N_0}{M\mu}.$$

Par suite, si μI est parallèle à PO , il vient $\mu N_0 = \mu I$, et, si IN_0 coupe en J la perpendiculaire menée par M à OM , $MN_0 = MJ$, ce qui, les angles OMJ et N_0MM_1 étant égaux, puisque droits, entraîne que N_0J est parallèle à OM_1 . De là, la construction : *La parallèle à OM_1 menée par N_0 coupant OM en I , μ est sur la perpendiculaire élevée en I à OM .*


Remarque. — Il va sans dire que, si l'on avait porté MO dans l'autre sens sur la tangente, de sorte que M_1 fût venu dans la position symétrique de celle qu'il occupe sur la figure 3, par rapport à M , le point N_0 aurait passé en même temps dans la position symétrique par rapport à μ , et la construction effectuée sur ces nouvelles données aurait bien redonné le même point I .

9. On porte sur la normale le segment $MM_1 = MO$ (fig. 4).
Équations (1) :

$$\begin{aligned} x_1^2 - 2xx_1 + y_1^2 - 2yy_1 &= 0, \\ (y_1 - y) dy + (x_1 - x) dx &= 0. \end{aligned}$$

Si la normale en M_1 coupe au point H la normale à la développée

Fig. 4.



de (M) , c'est-à-dire la perpendiculaire élevée en μ à MM_1 , on a

$$\begin{aligned} d \cdot OM &= OP \cdot d\omega, & d \cdot MM_1 &= \mu H \cdot d\theta, \\ d(M) &= MP \cdot d\omega = M\mu \cdot d\theta, \end{aligned}$$

d'où

$$\frac{OP}{MP} = \frac{\mu H}{M\mu}.$$

(puisque OM_1 est parallèle à la normale MP); donc

$$\frac{M\mu}{M_1P_1} = \frac{MP}{M_1P'_1}.$$

Si OM_1 rencontre PP'_1 en I' et la parallèle à PP'_1 (c'est-à-dire à OM_1) menée par P_1 en I , on a

$$\frac{M_1I}{M_1P_1} = \frac{M_1I'}{M_1P'_1}$$

Il vient, par suite,

$$\frac{M\mu}{M_1I} = \frac{MP}{M_1I'},$$

ce qui prouve que le point μ se trouve sur IJ . D'où la construction : *Si les parallèles à OM menées par P et P_1 coupent, l'une MM_1 en J , l'autre OM_1 en I , le centre de courbure μ est sur IJ .*

ADJOINTES PAR UN AXE.

11. Porter sur la normale NM_1 le segment $NM_1 = l$.

Équations (1) :

$$\begin{aligned}(y_1 - y) dx + (x_1 - x) dy &= 0, \\ y_1^2 (dx^2 + dy^2) &= l^2 dx^2.\end{aligned}$$

Le centre instantané I du segment NM_1 se trouve à la rencontre de la normale M_1N_1 et de TY (normale au lieu OX de N). Le centre de courbure μ est la projection de I sur MN .

12. M_1 est le symétrique de T par rapport à M .

Équations (1) :

$$\begin{aligned}y_1 &= 2y, \\ (x_1 - x) dy &= y dx.\end{aligned}$$

Si TY coupe MN en I , μ est le milieu IN_0 , en vertu d'un théorème bien connu de Mannheim.

13. M_1 est le symétrique de N par rapport à M .

Équations (1) :

$$\begin{aligned}y_1 &= 2y, \\ (x_1 - x) dx + y dy &= 0.\end{aligned}$$

En vertu du même théorème de Mannheim, si la normale à la développée de MN, c'est-à-dire la perpendiculaire menée par μ à MN, coupe M_1N_1 en N'_1 et NY en N' , μ est le milieu de $N'N'_1$. De là, la construction : Si M_1N_1 coupe NY et la perpendiculaire élevée en N à MN, respectivement en I et en K, μ se trouve sur la droite qui joint I au milieu J de OK.

14. MM_1 est un segment de la normale MN, vu de T sous un angle constant.

Equations (1) :

$$(y_1 - y) dy + (x_1 - x) dx = 0, \\ [(y_1 - y) dx - (x_1 - x) dy] dy = k [(x_1 - x) dx dy + y dx^2 - y_1 dy^2],$$

k étant la tangente de l'angle constant MTM_1 .

Le point de rencontre I de MN et de TY est le centre instantané de l'angle constant MTM_1 ; donc la perpendiculaire abaissée de I sur M_1T est la normale à l'enveloppe de ce côté, et si elle coupe M_1N_1 en J, ce point est le centre instantané de l'angle constant TM_1M ; par suite, le point μ où MN touche son enveloppe est la projection de J sur cette normale; mais, dans le triangle M_1IJ , les droites M_1M et JM sont des hauteurs; donc, si elles se coupent en H, JH est la troisième hauteur du triangle; autrement dit, JH est perpendiculaire à M_1N_1 . De là, la construction : Si la normale MN coupe TY en I, et si la perpendiculaire menée par I à M_1N_1 coupe M_1T en H, μ est la projection de H sur MN.

15. M_1 est le point de rencontre de MN et de TY (fig. 6).

Équations (1) :

$$(x_1 - x) dy + y dx = 0, \\ (y_1 - y) dy + (x_1 - x) dx = 0.$$

On a


$$\frac{d(M)}{d(T)} = \frac{M\mu}{TM_1}, \quad \frac{d(T)}{d(M_1)} = \frac{TT_1}{M_1T_1}, \quad \frac{d(M_1)}{d(M)} = \frac{M_1I}{M\mu},$$

si I est le point de rencontre de M_1N_1 et de la perpendiculaire élevée en μ à MN. On tire de là

$$\frac{TT_1 \cdot M_1I}{TM_1 \cdot M_1T_1} = 1.$$

Il en résulte que, si la perpendiculaire menée de T à M, T', coupe JX en I, on a $JI = J\mu$. Dès lors, les côtés égaux étant per-

Fig. 7.



perpendiculaires deux à deux dans les triangles isocèles TMM_1 et $J\mu I$, il en est de même des bases MM_1 et $I\mu$; d'où la construction : *La perpendiculaire menée de T à M_1T , coupant JX en I, la perpendiculaire menée de I à MM_1 , passe par μ .*

Remarque analogue à celle du n° 8.

17. Reporter MN en MM_1 sur MY (') (fig. 8)

Équations (1) :

$$x_1 = x,$$

$$(y_1^2 - 2yy_1) dx^2 = y^2 dy^2.$$

On a

$$\frac{d \cdot \text{MM}_1}{d(\text{M})} = \frac{\text{MM}_1}{\text{MT}_0}.$$

Or,

$$d.MM_1 = d.MN = \mu I. d\theta,$$

NI étant perpendiculaire à OX et μI à MN, et

$$d(\mathbf{M}) = \mathbf{M} \mu . d\theta .$$

Il vient donc

$$\frac{\mu I}{M \mu} = \frac{MM_1}{MT_0}$$

(¹) Cette adjointe infinitésimale intervient dans la détermination par intégration graphique d'un moment d'arc par rapport à OX (*Calc. graph. et nomogr.*, n° 36, et *Cours de Géom. de l'École Polytech.*, n° 242).

20. M_1 est à la rencontre de MX et de NY (fig. 11).

Équations (1) :

$$x_1 = y, \\ (x_1 - x) dx - y dy = 0.$$

On a

$$\frac{d(M)}{d(M_1)} = \frac{MT_0}{M_1 T_0} = \frac{MT}{M_1 T_1}, \quad \frac{d(M_1)}{d(N)} = \frac{M_1 T_1}{NT_1}, \quad \frac{d(N)}{d(M)} = \frac{NI}{M_\mu},$$

d'où

$$MT \cdot NI = NT_1 \cdot M_\mu.$$

Mais, la similitude des triangles rectangles MTN et μNI donne


$$MT \cdot NI = N_\mu \cdot NT.$$

Il vient donc

$$\frac{N_\mu}{M_\mu} = \frac{NT_1}{NT} = \frac{JM_1}{JM},$$

si NT_0 coupe MM_1 en J , ce qui montre que μJ est parallèle à NM_1 ,

Fig. 11.



d'où la construction : Si la droite NT_0 coupe MM_1 en J , μ se trouve sur JY .

Si la courbe (M) est une parabole d'axe OX , MM_1 , égal à sa sous-normale, est constant et égal à son paramètre p , et l'adjointe (M_1) est identique à cette parabole ayant reçu une translation égale à p dans le sens de OX ; dès lors $M_1 T_1$ est parallèle à MT , et NJ également; on retrouve ainsi la construction de Mannheim, pour le centre de courbure de la parabole, déjà obtenue, à titre de cas particulier, à la fin du n° 48.

On voit immédiatement que la courbe (M_1) passe par les points de contact des tangentes à (M) issues de O' et par les points où les normales issues de O coupent le cercle de diamètre OO' , que, de plus, les asymptotes de (M_1) sont parallèles les unes aux asymptotes de (M) , les autres aux tangentes issues de O à (M) .

Équations (1), si l'on prend O pour origine, et si l'on pose $OO' = l$:

$$\begin{aligned} x_1 y - x y_1 &= 0, \\ y_1 dx - (x_1 - l) dxy &= 0. \end{aligned}$$

On a

$$\begin{aligned} d(M) &= M\mu \cdot d\theta = MP \cdot d\omega, \\ d(M_1) &= M_1 P'_1 \cdot d\theta = M_1 P_1 d\omega, \end{aligned}$$

d'où


$$\frac{M\mu}{MP} = \frac{M_1 P'_1}{M_1 P_1},$$

ou, si l'on mène par M_1 la parallèle MI à MN , et par P'_1 la parallèle $P'_1 I$ à OP ,

$$\frac{M\mu}{MP} = \frac{MI}{MJ},$$

ce qui montre que μ se trouve sur la droite OI , d'où la construc-

Fig. 14.



tion : Si la parallèle à MN menée par M_1 et la perpendiculaire à OM menée par P'_1 se coupent en I , μ est sur OI .


Remarque. — Il est clair que la courbe (M) est la trajectoire du point M animé d'une vitesse d'entraînement constante en gran-

deur et direction, de vecteur $O'O$, et d'une vitesse relative de vecteur OM_1 , pour laquelle, par conséquent, l'hodographe est précisément l'adjointe (M_1) .

24. M_1 est à la rencontre de OM et de la parallèle à MN menée par O' (fig. 15).

On voit immédiatement que (M_1) passe par les pieds des normales à (M) issues de O' , par les points où le cercle de diamètre OO'

Fig. 15.



est coupé par les tangentes issues de O à (M) et les parallèles aux asymptotes de (M) menées par O , et qu'elle a pour asymptotes les normales à (M) issues de O .

Équations (1) :

$$x_1 y - x y_1 = 0,$$

$$(x_1 - l) dx + y_1 dy = 0.$$

On a encore ici

$$d(M) = M \mu \cdot d\theta = MP \cdot d\omega,$$

$$d(M_1) = M_1 P'_1 \cdot d\theta = M_1 P_1 \cdot d\omega,$$

d'où

$$\frac{M \mu}{MP} = \frac{M_1 P'_1}{M_1 P_1},$$

ou, si l'on mène par P'_1 la parallèle $P'_1 I'$ à OP ,

$$\frac{M \mu}{MP} = \frac{M_1 I'}{M_1 I},$$

ce qui montre que μ est sur OI' .

Mais, dans le triangle $M_1 I' P'_1$, $M_1 O$ et $P'_1 O'$ sont des hauteurs; $I' J$ est donc la troisième hauteur, et, par suite est parallèle à $M_1 T_1$.

Élevons maintenant en N à MN la perpendiculaire NH . Cette droite est parallèle à $O' J$, comme $N\mu$ l'est à $O' I'$. Il en résulte que les triangles $NH\mu$, $O' JI'$ sont homothétiques par rapport à O et, conséquemment, que NH est parallèle à $I' J$, c'est-à-dire à $M_1 T_1$; d'où la construction : *Si la perpendiculaire élevée en N à MN coupe OM en H , μ se trouve sur la parallèle à $M_1 T_1$ menée par H .*

COURBES ADMETTANT POUR ADJOINTE INFINITÉSIMALE D'UNE CERTAINE ESPÈCE
UNE LIGNE DONNÉE.

25. Toutes les solutions qui précèdent, dérivées de la méthode purement géométrique de Mannheim, contribueront peut-être à attester une fois de plus la souplesse et la fécondité de cette méthode. Il semble bien que, pour la plupart des problèmes ainsi traités, l'emploi de la méthode analytique ne se prête guère, et encore au prix de calculs assez laborieux, qu'à la vérification *a posteriori* des résultats ci-dessus obtenus géométriquement; pour atteindre directement à des constructions aussi simples, dans des cas analogues, c'est donc la méthode géométrique telle qu'elle vient d'être employée qui paraît devoir être recommandée.

Mais il est un autre genre de problème, né de la considération des adjointes infinitésimales, qui peut donner lieu à d'intéressants exercices de calcul intégral; c'est le suivant : une certaine espèce d'adjointe infinitésimale étant définie par les équations du n° 2,

$$(1) \quad \begin{cases} F(x_1, y_1, x, y, dx, dy) = 0, \\ G(x_1, y_1, x, y, dx, dy) = 0, \end{cases}$$

dont la forme a été précisée pour chacun des types particuliers qui viennent d'être successivement envisagés, si l'on veut que l'adjointe infinitésimale (M_1) soit une certaine ligne définie par l'équation

$$(2) \quad H(x_1, y_1) = 0,$$

on doit, pour trouver toutes les courbes (M) correspondantes,

intégrer l'équation différentielle

$$(3) \quad E(x, y, dx, dy) = 0,$$

résultant de l'élimination de x_1 et y_1 entre les équations (1) et l'équation (2). Bien entendu, les cas les plus intéressants, en même temps que généralement les plus simples à traiter, sont ceux pour lesquels l'équation (2) représente une droite ou un cercle. Nous nous bornerons à donner quelques indications à ce sujet en ce qui concerne les deux dernières espèces d'adjointes infinitésimales qui viennent d'être examinées.

26. Soit, par exemple, l'adjointe infinitésimale du n° 23. Si l'on suppose qu'elle se confonde avec la droite

$$\frac{x_1}{a} + \frac{y_1}{b} = 1,$$

l'élimination de x_1 et y_1 entre cette équation et les équations (1) du n° 23 donne l'équation différentielle

$$[b(l+a)x + aly] dy + aby dx = 0,$$

équation homogène dont l'intégrale générale obtenue par la méthode classique consistant, par la substitution $y = ux$, à séparer les variables, peut, après des calculs dont nous supprimons le détail, s'écrire

$$y^{1-\frac{1}{n}} = C \left(\frac{x}{a} + \frac{y}{b} \right),$$

C étant la constante d'intégration. En particulier, pour $l = -a$ [auquel cas, le point O' est symétrique, par rapport à O , du point de rencontre de la droite (M_1) avec Ox], on a

$$y^2 = C \left(\frac{x}{a} + \frac{y}{b} \right),$$

parabole passant par O où sa tangente est parallèle à la droite (M_1) , ce qui montre que O' est le pôle de cette droite par rapport à la parabole. Autrement dit : *Si (M) est une parabole passant par O , et O' un point quelconque du diamètre de cette parabole passant par O , le point de rencontre M_1 de OM et de la parallèle*

à MT menée par O' décrit la polaire de O' par rapport à la parabole; théorème bien facile à démontrer directement. Dès lors, la construction donnée au n° 23 permet d'avoir le centre de courbure de la parabole.

27. Prenons maintenant pour adjointe (M₁) du type défini au n° 23 un cercle de centre O,

$$x_1^2 + y_1^2 = r^2.$$

Dans ce cas, l'élimination de x_1 et y_1 entre cette équation et les équations (1) du n° 23 donne

$$[(l^2 - r^2)x^2 + l^2y^2] dy^2 + 2r^2xy dx dy - r^2y^2 dx^2 = 0,$$

qui, par la substitution $y = ux$, se transforme en

$$\frac{dx}{x} + \frac{(l^2u^2 + l^2 - r^2) du}{lu[l(1+u^2) \mp r\sqrt{1+u^2}]} = 0$$

ou

$$\frac{dx}{x} + \frac{l du}{l(1+u^2) \mp r\sqrt{1+u^2}} + \frac{l^2r^2}{l} \cdot \frac{du}{u[l(1+u^2) \mp r\sqrt{1+u^2}]} = 0.$$

Faisons encore le changement de variable

$$1 + u^2 = z^2.$$

L'équation devient

$$\frac{dx}{x} + \frac{l dz}{lz \mp r} + \frac{l^2 - r^2}{l} \frac{dz}{(z^2 - 1)(lz \mp r)} = 0,$$

qui, par décomposition du dernier terme, se transforme en

$$\frac{2l dx}{x} + \frac{(l \pm r) dz}{z - 1} + \frac{(l \mp r) dz}{z + 1} = 0.$$

L'intégrale générale de celle-ci est

$$x^{2l} (z - 1)^{l \pm r} (z + 1)^{l \mp r} = C$$

ou

$$(\sqrt{x^2 + y^2} - x)^{l \pm r} (\sqrt{x^2 + y^2} + x)^{l \mp r} = C,$$

qu'on peut transformer (si l'on représente toujours par C une constante arbitraire pouvant ne pas garder la même valeur dans

les transformations successives) en

$$C^2 y \frac{\pm 2l}{r} + 2Cxy \frac{\pm l-r}{r} = 1.$$

D'après la Remarque finale du n° 23, la courbe (M) est alors la trajectoire d'un point animé d'une vitesse d'entraînement constante en grandeur et direction, de vecteur $O'O$, et d'une vitesse relative constante en grandeur et constamment dirigée vers le point O , courbe que j'ai précédemment appelée *courbe du nageur*.

En particulier, pour $l = r$ [auquel cas le cercle (M_1) de centre O passe par O'], on a les équations

$$\begin{aligned} C^2 + 2Cx &= y^2, \\ C^2 y^2 + 2Cx &= 1, \end{aligned}$$

la seconde étant d'ailleurs identique à la première lorsqu'on y change C en $-\frac{1}{C}$.

L'équation unique, donc ainsi obtenue, représente une parabole d'axe Ox et de foyer O . Si on lui applique la construction du centre de courbure du n° 23, on voit qu'ici les points M_1 et P'_1 étant diamétralement opposés dans le cercle (M_1) de centre O , si l'on abaisse de μ la perpendiculaire μG sur OM , le triangle $M\mu G$ est homothétique de $M_1 P'_1$ par rapport à O , et le point G , symétrique de M par rapport à O . On retrouve donc ainsi la construction classique du centre de courbure à la parabole : *μ se trouve sur la perpendiculaire au rayon vecteur, élevée par le symétrique du point M par rapport au foyer.*

28. Traitons les mêmes questions pour l'adjointe du n° 24. Si cette adjointe est la droite

$$\frac{x_1}{a} + \frac{y_1}{b} = 1,$$

l'élimination de x_1 et y_1 entre cette équation et les équations (1) du n° 24 donne l'équation différentielle

$$\left[\frac{b(a-l)}{a} x - ly \right] dx + by dy = 0,$$

qui, par la substitution $y = ux$, se transforme en

$$\frac{dx}{x} + \frac{u du}{u^2 - \frac{l}{b}u + \frac{a-l}{a}} = 0.$$

L'intégration de cette équation prend une forme simple lorsque le trinôme du second terme a ses racines réelles et inégales; soient λm et m . L'équation s'écrit alors, en effet,

$$(\lambda - 1) \frac{dx}{x} + \frac{\lambda du}{u - \lambda m} - \frac{du}{u - m} = 0,$$

dont l'intégrale générale est

$$x^{\lambda-1} \frac{(u - \lambda m)^\lambda}{u - m} = C$$

ou

$$(y - \lambda mx)^\lambda = C(y - mx).$$

En particulier, pour $\lambda = 2$, on a la parabole

$$(y - 2mx)^2 = C(y - mx),$$

qui passe par O, où $y - mx = 0$ est sa tangente, $y - 2mx = 0$ son diamètre, et qui est normale à OX en son second point de rencontre avec cet axe.

Les projections du point O' sur ces deux droites sont à l'intersection de leur système

$$(y - 2mx)(y - mx) = 0$$

et du cercle

$$x^2 + y^2 - lx = 0,$$

décrit sur OO' comme diamètre. Or, on a identiquement

$$x^2 + y^2 - lx - (y - 2mx)(y - mx) = x[3my - (2m^2 - 1)x - l],$$

et

$$3my - (2m^2 - 1)x - l = 0$$

n'est autre ici que la droite (M₁) qui, d'après sa définition même, passe par les pieds des normales menées de O' à la parabole; d'où ce théorème :

Si, sur une normale à une parabole, coupant cette courbe,

en dehors de son pied, au point O, on prend un point O' quelconque, les pieds des deux autres normales qu'on peut mener de O à la parabole se trouvent sur la droite qui joint les projections de O' sur le diamètre et sur la tangente en O à la parabole.

Considérons maintenant le cas particulier où $\lambda = -1$. On a cette fois, en remplaçant C par $\frac{1}{C}$,

$$y^2 - m^2 x^2 = C,$$

conique de centre O et d'axes OX et OY. Ainsi : *le lieu des points de rencontre des diamètres d'une conique et des parallèles à ses normales menées par un point quelconque pris sur l'un de ses axes est une perpendiculaire à cet axe.* Dès lors, la construction du centre de courbure μ , donnée au n° 24, montre que, si la perpendiculaire élevée en N à la normale MN coupe le diamètre OM en H, μ est sur la perpendiculaire abaissée de H sur OX. C'est la construction bien connue de Mannheim.

29. Si nous supposons maintenant que l'adjointe du n° 24 soit un cercle de centre O et de rayon r , l'équation différentielle est

$$l^2(x^2 + y^2) dx^2 = r^2(2 dx + y dy)^2,$$

qui, par la substitution $y = ux$, devient

$$\frac{dx}{x} + \frac{ru du}{r(u^2 + 1) \pm l \sqrt{u^2 + 1}} = 0,$$

ou, si nous faisons encore le changement de variable $u^2 + 1 = z^2$,

$$\frac{dx}{x} + \frac{r dz}{rz \pm l} = 0,$$

dont l'intégrale générale est

$$x(rz \pm l) = C$$

ou

$$x^2 + y^2 = \frac{(C \pm rz)^2}{r^2},$$

coniques de foyer O et d'axe OX. La construction du n° 24

montre ici que, si la perpendiculaire élevée en N à la normale MN coupe OM en I, μ est sur la perpendiculaire élevée en I à OM.

C'est la construction classique du centre de courbure des coniques, que Keill a fait connaître, dès 1708, dans les *Philosophical Transactions* (t. XXVI, p. 177).

30. Supposons enfin, toujours dans la même hypothèse, que (M_1) soit un cercle passant par O et ayant son centre sur OX,

$$(x_1 - a)^2 + y_1^2 = r^2.$$

L'équation différentielle se met alors, par la substitution $y = ux$, immédiatement sous la forme

$$\frac{dx}{x} = \frac{2au du}{(l - 2a)(1 + u^2)}$$

dont l'intégrale est

$$x = C(1 + u^2)^{\frac{a}{l-2a}},$$

ou

$$x = C(x^2 + y^2)^{\frac{a}{l}},$$

ou encore, si l'on pose $\frac{a}{l} = \frac{m-1}{2m}$,

$$\sqrt{x^2 + y^2} \left(\frac{x}{\sqrt{x^2 + y^2}} \right)^m = C,$$

c'est-à-dire, en coordonnées polaires,

$$\rho \cos^m \omega = C,$$

équation qui définit les courbes dites *potentielles* ⁽¹⁾, car si, construisant la courbe pour différentes valeurs entières de m , on désigne par ρ_m le rayon vecteur correspondant, on a, pour une même valeur de ω ,

$$\rho_1^m = C^{m-1} \rho_m.$$

⁽¹⁾ *Leçons de Statique graphique* de Favaro (trad. Terrier), t. II, p. 57.