

# BULLETIN DE LA S. M. F.

H. LÉAUTÉ

## **Théorème relative au déplacement d'une figure plane dans son plan**

*Bulletin de la S. M. F.*, tome 6 (1878), p. 170-172

[http://www.numdam.org/item?id=BSMF\\_1878\\_\\_6\\_\\_170\\_1](http://www.numdam.org/item?id=BSMF_1878__6__170_1)

© Bulletin de la S. M. F., 1878, tous droits réservés.

L'accès aux archives de la revue « Bulletin de la S. M. F. » (<http://smf.emath.fr/Publications/Bulletin/Presentation.html>) implique l'accord avec les conditions générales d'utilisation (<http://www.numdam.org/conditions>). Toute utilisation commerciale ou impression systématique est constitutive d'une infraction pénale. Toute copie ou impression de ce fichier doit contenir la présente mention de copyright.

NUMDAM

Article numérisé dans le cadre du programme  
Numérisation de documents anciens mathématiques  
<http://www.numdam.org/>

*Note sur un théorème relatif au déplacement d'une figure plane dans son plan; par M. H. LÉAUTÉ.*

(Séance du 10 avril 1878.)

Le théorème que nous voulons démontrer ici est le suivant :

*Lorsqu'une figure plane se déplace dans son plan suivant une loi quelconque, si l'on considère à un instant donné tous les points situés sur une droite quelconque issue du centre instantané de rotation, les diamètres des trajectoires que décrivent ces points à l'instant considéré enveloppent une conique inscrite dans le triangle rectangle formé par le diamètre de la circonférence des inflexions issu du centre instantané de rotation, par la droite considérée et par la perpendiculaire à cette droite menée par son point d'intersection avec la circonférence des inflexions.*

Soient C le centre instantané de rotation, O le centre de la circonférence des inflexions, A le point de cette circonférence diamétralement opposé à C, CM la droite considérée, M un point quelconque de cette droite, MP le diamètre de la trajectoire de M,  $\gamma$  l'angle que forme ce diamètre avec CM,  $m$  le point de rencontre de CM avec la circonférence des inflexions, P le point de rencontre du diamètre MP avec la perpendiculaire  $mA$  à CM,  $x$  la longueur Mm,  $\gamma$  la longueur mP,  $a$  le diamètre de la circonférence des inflexions,  $\rho$  le rayon de courbure en M de la trajectoire de M,  $s$  l'arc de cette trajectoire,  $r$  la longueur CM.

On a

$$\frac{r}{x} = \tan \gamma,$$

et comme, d'après une propriété connue,

$$\frac{d\rho}{ds} = 3 \tan \gamma,$$

on en déduit

$$\frac{r}{x} = \frac{1}{3} \frac{d\rho}{ds}.$$

Mais on sait que le rayon de courbure en un point M est donné par

$$\rho = \frac{r^2}{r - a \cos \theta};$$

on a donc

$$d\rho = \frac{r}{(r - a \cos \theta)^2} [(r - a \cos \theta) dr + r \cos \theta da - ra \sin \theta d\theta].$$

Il faut calculer les quantités  $dr$ ,  $da$  et  $d\theta$ .

Or, à l'instant qui suit l'instant considéré, le point O est venu en O', le point C en C'; la droite O'C' coupe la droite CA en un point B, et, si l'on représente par  $\alpha$  l'angle de OO' avec CC', par  $dc$  la longueur CC', par  $b$  la longueur CB, on a

$$dr = -dc \sin \theta,$$

$$\frac{da}{2} = OO' \sin \alpha = dc \frac{a + 2b}{2b} \tan \alpha,$$

$$d\theta = -(\angle CBC' + \angle M C C') = -dc \left( \frac{1}{b} + \frac{\cos \theta}{r} \right).$$

En portant ces valeurs dans l'expression de  $d\rho$ , on trouve

$$d\rho = \frac{r dc}{(r - a \cos \theta)^2} \times \left( 3a \sin \theta \cos \theta + r \frac{a - b}{b} \sin \theta + r \frac{a + 2b}{b} \cos \theta \tan \alpha \right),$$

Remarquons maintenant que l'angle dont tourne la figure pour passer de la position correspondant à C à la position correspondant à C' est  $\frac{dc}{a}$ , et que, par suite,

$$ds = r \frac{dc}{a};$$

on a alors

$$\frac{d\rho}{ds} = \frac{a}{(r - a \cos \theta)^2} \times \left( 3a \sin \theta \cos \theta + r \frac{a - b}{b} \sin \theta + r \frac{a + 2b}{b} \cos \theta \tan \alpha \right),$$

ou encore

$$\frac{d\rho}{ds} = \frac{a}{x^2} (A x + B),$$

en posant

$$A = \frac{a-b}{b} \sin \theta + \frac{a+2b}{b} \cos \theta \tan \alpha,$$

$$B = a \frac{a+2b}{b} \frac{\cos \theta \sin(\theta + \alpha)}{\cos \alpha}.$$

Les quantités  $A$  et  $B$  sont des constantes à l'instant considéré, car  $a$ ,  $b$  et  $\alpha$  sont les mêmes à cet instant pour tous les points de la figure, et  $\theta$  a la même valeur pour tous les points de la droite  $CM$ .

En portant cette valeur de  $\frac{d\rho}{ds}$  dans  $\frac{r}{x}$ , on a

$$\frac{xr}{a} = \frac{Ax + B}{3}.$$

Les points  $M$  et  $P$  décrivent, par conséquent, deux divisions homographiques, et, dès lors, le diamètre  $MP$  enveloppe une conique tangente aux deux droites  $CM$  et  $mP$ .

Si maintenant nous cherchons le diamètre de la trajectoire du point  $C$  considéré comme un point marqué de la figure mobile, c'est-à-dire si nous cherchons la valeur de  $\tan \gamma$  pour  $x$  égal à

$$- a \cos \theta,$$

nous avons, puisque  $r$  est nul,

$$\tan \gamma = \frac{1}{3} \frac{a}{a^2 \cos^2 \theta} 3a \sin \theta \cos \theta = \tan \theta;$$

le diamètre du point  $C$  est donc  $CA$ , et par suite la conique trouvée est tangente à cette droite  $CA$ , ce qui complète le théorème énoncé.