

BULLETIN DE LA S. M. F.

PAUL ERDÖS

JEAN-LOUIS NICOLAS

Répartition des nombres superabondants

Bulletin de la S. M. F., tome 103 (1975), p. 65-90

http://www.numdam.org/item?id=BSMF_1975__103__65_0

© Bulletin de la S. M. F., 1975, tous droits réservés.

L'accès aux archives de la revue « Bulletin de la S. M. F. » (<http://smf.emath.fr/Publications/Bulletin/Presentation.html>) implique l'accord avec les conditions générales d'utilisation (<http://www.numdam.org/conditions>). Toute utilisation commerciale ou impression systématique est constitutive d'une infraction pénale. Toute copie ou impression de ce fichier doit contenir la présente mention de copyright.

NUMDAM

Article numérisé dans le cadre du programme
Numérisation de documents anciens mathématiques
<http://www.numdam.org/>

RÉPARTITION DES NOMBRES SUPERABONDANTS

PAR

PAUL ERDÖS ET JEAN-LOUIS NICOLAS

[Budapest], [Limoges]

RÉSUMÉ. — Soit $\sigma(n)$ la somme des diviseurs de n . On dit que n est superabondant si, pour tout $m < n$, on a $\sigma(m)/m < \sigma(n)/n$. Si l'on appelle $Q(X)$ le nombre de nombres superabondants inférieurs à X , on démontre que, pour tout $c < 5/48$, $Q(X) > (\log X)^{1+c}$ pour $X > X_0(c)$. On donne également quelques résultats et conjectures sur des sujets voisins.

SUMMARY. — An integer n is called superabundant if $\sigma(n)/n > \sigma(m)/m$ for every $m < n$ ($\sigma(n)$ denotes the sum of divisors of n). Denote by $Q(X)$ the number of superabundants not exceeding X . The authors prove that for every $c < 5/48$, $Q(X) > (\log X)^{1+c}$ if $X > X_0(c)$. Several related results are proved and unsolved problems are stated.

1. Introduction

S. RAMANUJAN [14] a défini et étudié les nombres hautement composés. [Soit $d(n)$ le nombre de diviseurs de n , n est hautement composé si $(m < n) \Rightarrow (d(m) < d(n))$.] En particulier, il a étudié $Q_{h.c.}(X)$ = nombre de nombres hautement composés $\leq X$, et montré que

$$\lim_{X \rightarrow \infty} \frac{Q_{h.c.}(X)}{\log X} = +\infty.$$

P. ERDÖS a montré [5] que le quotient n'/n de deux nombres hautement composés consécutifs assez grands vérifie

$$\frac{n'}{n} \leq 1 + \frac{1}{(\log n)^c} \quad \text{avec } c > 0,$$

ce qui entraîne

$$Q_{h.c.}(X) \geq (\log X)^{1+c} \quad \text{pour } X \text{ assez grand.}$$

J.-L. NICOLAS a montré [12] que $Q_{h.c.}(X) \leq (\log X)^{c'}$, c' étant une constante calculable mais assez grande.

D'autre part, P. ERDÖS et L. ALAOGU ont défini, dans [4], les nombres superabondants.

DÉFINITION. — On dit que n est *superabondant* si

$$(m < n) \Rightarrow \left(\frac{\sigma(m)}{m} < \frac{\sigma(n)}{n} \right),$$

où $\sigma(n)$ est la somme des diviseurs de n .

On sait que σ est une fonction multiplicative, et que

$$\sigma(p^\alpha) = (p^{\alpha+1} - 1)/(p - 1)$$

pour p premier et $\alpha \geq 1$ (cf. [7], chap. XVI). P. ERDÖS et L. ALAOGU ont en particulier démontré le résultat suivant.

PROPOSITION 1. — Si la décomposition en facteurs premiers d'un nombre superabondant est $n = 2^{\alpha_2} 3^{\alpha_3} \dots q^{\alpha_q} \dots p^{\alpha_p}$, on a

$$(1) \quad \alpha_2 \geq \alpha_3 \geq \dots \geq \alpha_q \geq \dots \geq \alpha_p.$$

On a également $\alpha_p = 1$ sauf si $n = 4$ ou $n = 36$, et $q^{\alpha_q} \sim (p \log p)/\log q$ lorsque q , et donc n , tendent vers l'infini, p étant le plus grand nombre premier divisant n . On a enfin, lorsque $n \rightarrow \infty$,

$$(2) \quad p \sim \log n.$$

D'autre part, J.-L. NICOLAS ([11], p. 182) a montré que si n et n' sont deux nombres superabondants consécutifs, on avait, pour une infinité de n :

$$\frac{n'}{n} \geq 1 + \frac{1}{\sqrt{\log n}}.$$

Nous nous proposons de démontrer le théorème suivant.

THÉORÈME 1. — Soit $Q(X)$ le nombre de nombres superabondants $\leq X$; si $c < 5/48$, on a $Q(X) \geq (\log X)^{1+c}$ pour X assez grand.

La méthode de démonstration du théorème 1 ne permet pas (on le prouvera avec le théorème 2) de montrer que le quotient n'/n de deux nombres

superabondants consécutifs assez grands vérifie

$$(3) \quad \frac{n'}{n} \leq 1 + \frac{1}{(\log n)^c}.$$

Nous allons d'abord rappeler les propriétés des nombres colossalement abondants, qui sont des nombres superabondants privilégiés faciles à calculer (§ 2). Au paragraphe 3, on étudiera les propriétés des nombres superabondants compris entre deux nombres colossalement abondants consécutifs. Au paragraphe 4, on montrera, dans le lemme 4, que, pour presque tous les nombres N colossalement abondants, l'inégalité (3) est vérifiée pour n voisin de N , ce qui démontrera le théorème 1.

On utilisera constamment le lemme suivant dû à HOHEISEL, INGHAM et HUXLEY.

LEMME 1. — Soit $\pi(x)$ le nombre de nombres premiers $\leq x$; il existe $\tau < 1$ tel que

$$\pi(x+x^\tau) - \pi(x) \sim \frac{x+x^\tau}{\log(x+x^\tau)} - \frac{x}{\log x} \sim \frac{x^\tau}{\log x}.$$

Le meilleur résultat actuel est dû à HUXLEY [8] : l'équivalence précédente est vraie pour $\tau > 7/12$.

NOTATIONS. — Pour deux fonctions $f(x)$ et $g(x)$, la relation $f(x) \gg g(x)$ signifie que $g(x) = O(f(x))$.

Remarques. — Soit f une fonction additive. On définit n comme « f -hautement abondant » si $(m < n) \Rightarrow (f(m) < f(n))$. Dans l'article [4] (p. 466, n° 9), il est dit que « si $f(n) \neq c \log n$, alors les nombres f -hautement abondants ont pour densité 0 ». Cela n'est pas vrai si l'on choisit $f(p) = \log p$ et $f(p^k) = 0$ pour $k \geq 2$. Les nombres f -hautement abondants sont les nombres non divisibles par un carré, dont la densité est $6/\pi^2$ (cf. [7], chap. XVIII). Cela n'est pas vrai non plus si l'on choisit $f(n) = \log n$ pour n impair, et $f(n) = 0$ pour n pair.

MAUCLAIRE a remarqué, que l'on pouvait déduire immédiatement du théorème 12 de P. ERDÖS ([6], p. 18), le résultat suivant :

Si, pour tout c , on a

$$\sum_{f(p) \neq c \log p} \frac{1}{p} = \infty,$$

(c'est-à-dire si f est suffisamment différente de la fonction $c \log n$), alors les nombres f -hautement abondants ont pour densité 0.

Dans le même article, la table numérique des nombres « σ -hautement abondants » (p. 467) doit être modifiée pour $1800 \leq n \leq 2340$ par

n	facteurs de n				$\sigma(n)$
1 800.....	2^3	3^2	5^2		6 045
1 920.....	2^7	3	5		6 120
1 980.....	2^2	3^2	5	11	6 552
2 100.....	2^2	3	5^2	7	6 944
2 160.....	2^4	3^3	5		7 440
2 340.....	2^2	3^2	5	13	7 644

2. Nombres colossalement abondants

DÉFINITION. — On dit que N est *colossalement abondant*, s'il existe $\varepsilon > 0$, tel que la fonction $\sigma(n)/n^{1+\varepsilon}$ atteigne son maximum en N .

Remarque. — Cette définition est légèrement différente de celle de [4] (p. 455).

Si N est colossalement abondant, on a, pour tout n ,

$$(4) \quad \frac{\sigma(n)}{n^{1+\varepsilon}} \leq \frac{\sigma(N)}{N^{1+\varepsilon}}$$

PROPOSITION 2. — Pour tout $\varepsilon > 0$, il existe au moins un nombre colossalement abondant associé à ε , que l'on note N_ε . D'autre part, tout nombre colossalement abondant est superabondant.

Démonstration. — On sait que

$$\overline{\lim} \frac{\sigma(n)}{n \log \log n} = e^\gamma,$$

où γ est la constante d'Euler (cf. [7], chap. XVIII). Pour ε fixé, la fonction $\sigma(n)/n^{1+\varepsilon}$ tend vers zéro à l'infini, et a donc un maximum absolu qu'elle atteint en un ou plusieurs points N . Un tel nombre est colossalement abondant.

D'autre part, en utilisant (4), il vient

$$(n < N) \Rightarrow \left(\frac{\sigma(n)}{n} \leq \frac{\sigma(N)}{N} \left(\frac{n}{N} \right)^\varepsilon < \frac{\sigma(N)}{N} \right),$$

et N est superabondant.

PROPOSITION 3. — Soit N un nombre colossalement abondant associé à ε . On définit, pour p premier et α entier ≥ 1 :

$$F(p, \alpha) = \frac{\log(1 + (1/(p^\alpha + p^{\alpha-1} + \dots + p)))}{\log p} = \frac{\log((p^{\alpha+1} - 1)/(p^{\alpha+1} - p))}{\log p},$$

et pour $\alpha = 0$, $F(p, 0) = +\infty$. Alors si p est premier et divise N avec l'exposant $\alpha \geq 0$, on a

$$(5) \quad F(p, \alpha) \geq \varepsilon \geq F(p, \alpha + 1).$$

Démonstration. — Si $\alpha \geq 0$, on applique l'inégalité (4) avec $n = Np$. Il vient :

$$(6) \quad \frac{\sigma(Np)}{\sigma(N)} \leq \left(\frac{Np}{N}\right)^{1+\varepsilon} = p^{1+\varepsilon}.$$

D'autre part,

$$(7) \quad \frac{\sigma(Np)}{\sigma(N)} = \frac{\sigma(p^{\alpha+1})}{\sigma(p^\alpha)} = \frac{p^{\alpha+2} - 1}{p^{\alpha+1} - 1} = p \left(1 + \frac{1}{p^{\alpha+1} + \dots + p}\right).$$

En comparant (6) et (7), on obtient $\varepsilon \geq F(p, \alpha + 1)$. L'inégalité $F(p, \alpha) \geq \varepsilon$ est évidente si $\alpha = 0$. Si $\alpha \geq 1$, on la démontre en appliquant (4) avec $n = N/p$.

DÉFINITIONS. — On pose, pour p premier,

$$E_p = \{F(p, \alpha); \alpha \geq 1\},$$

$$E = \bigcup_{p \text{ premier}} E_p = \{\varepsilon_1, \varepsilon_2, \dots, \varepsilon_i, \dots\}.$$

Pour tout $\eta > 0$, il n'y a qu'un nombre fini d'éléments de E supérieurs à η , et l'on peut ranger les éléments de E en une suite décroissante

$$\varepsilon_1 > \varepsilon_2 > \dots > \varepsilon_i > \dots$$

On pose $\varepsilon_0 = +\infty$.

Pour $\varepsilon > 0$, on définit $x = x_1, y = x_2, x_k$, pour $k \geq 2$, comme fonctions de ε , par

$$(8) \quad \begin{cases} F(x, 1) = \frac{\log(1 + (1/x))}{\log x} = \varepsilon, \\ F(x_k, k) = \frac{\log(1 + (1/(x_k^k + \dots + x_k)))}{\log x_k} = \varepsilon. \end{cases}$$

Ces définitions ont un sens, car, pour $k \geq 1$, la fonction $t \mapsto F(t, k)$ est décroissante pour tout $t \geq 1$, et décroît de $+\infty$ à 0. On a de plus, pour k fixé, lorsque $\varepsilon \rightarrow 0$ (cf. démonstration du lemme 2) :

$$(9) \quad x_k \sim \sqrt[k]{kx}.$$

PROPOSITION 4 :

(a) Si $\varepsilon \notin E$, la fonction $\sigma(n)/n^{1+\varepsilon}$ atteint son maximum en un seul point N_ε dont la décomposition en facteurs premiers est

$$(10) \quad N_\varepsilon = \prod_p p^{\alpha_p(\varepsilon)} \quad \text{avec} \quad \alpha_p(\varepsilon) = \left[\frac{\log((p^{1+\varepsilon}-1)/(p^\varepsilon-1))}{\log p} \right] - 1,$$

ou, si l'on préfère,

$$(11) \quad \begin{cases} \alpha_p(\varepsilon) = k & \text{si } x_{k+1} < p < x_k \quad \text{avec } k \geq 1 \\ \text{et} \quad \alpha_p(\varepsilon) = 0 & \text{si } p > x = x_1. \end{cases}$$

(b) Soit $i \geq 1$; pour tout $\varepsilon \in]\varepsilon_{i-1}, \varepsilon_i[$, N_ε est constant et égal (par définition) à N_i . Les nombres N_i sont tous distincts.

(c) Si les ensembles E_p sont disjoints deux à deux, l'ensemble des nombres colossalement abondants est égal à l'ensemble des nombres N_i , $1 \leq i$: La fonction $\sigma(n)/n^{1+\varepsilon_i}$ atteint son maximum aux deux points N_i et N_{i+1} .

(d) Si les ensembles E_p ne sont pas disjoints, pour chaque $\varepsilon_i \in E_q \cap E_r$, la fonction $\sigma(n)/n^{1+\varepsilon_i}$ atteint son maximum en quatre points : N_i , $q N_i$, $r N_i$ et $N_{i+1} = qr N_i$. Les nombres $q N_i$ et $r N_i$ sont colossalement abondants.

Démonstration :

(a) Soit p un nombre premier fixé. Comme $\varepsilon \notin E$, alors $\varepsilon \notin E_p$ et, comme la suite $F(p, k)$ est strictement décroissante en k , il existe α unique, déterminé par la proposition 3 :

$$(12) \quad \frac{\log((p^{\alpha+1}-1)/(p^\alpha-1))}{\log p} = F(p, \alpha) > \varepsilon > F(p, \alpha+1).$$

En résolvant en α les inégalités (12), on trouve la formule (10), en désignant par $[x]$ la partie entière de x .

Si $x_{k+1} < p < x_k$, en tenant compte de (8) et (12), on a

$$\begin{aligned} F(x_{k+1}, \alpha) &> F(p, \alpha) > F(x_{k+1}, k+1) \\ &= \varepsilon = F(x_k, k) > F(p, \alpha+1) > F(x_k, \alpha+1), \end{aligned}$$

ce qui démontre (11).

(b) Les raisonnements précédents ne changent pas lorsque ε varie entre deux valeurs consécutives de l'ensemble E .

(c) Choisissons $\varepsilon = \varepsilon_i = F(q, \beta)$. Pour $p \neq q$, $\varepsilon \notin E_p$, et l'exposant de p est déterminé par (11) ou (12). D'après la proposition 3, l'exposant de q peut être choisi égal à β ou $\beta-1$. Dans le premier cas on trouve N_{i+1} , dans le second N_i , et la fonction $\sigma(n)/n^{1+\varepsilon_i}$ atteint son maximum en ces deux points.

(d) Soit $\varepsilon = F(p, \alpha) \in E$. Alors ε est irrationnel. Si l'on avait $\varepsilon = a/b$, a et b entiers, on aurait $p^a = (1 + (1/(p^\alpha + \dots + p)))^b$ avec p^a entier et $(1 + (1/(p^\alpha + \dots + p)))^b$ non entier. D'après le théorème de Gel'fond-Schneider (cf. [9], chap. 2), ε est même transcendant.

Du théorème 1 de LANG (cf. [10], et aussi [9], chap. 2), on déduit que, si p, q, r sont des nombres premiers distincts et si $p^\varepsilon, q^\varepsilon, r^\varepsilon$ sont algébriques, alors ε doit être rationnel. Mais si $\varepsilon \in E_p$, p^ε est rationnel, et on conclut que $E_p \cap E_q \cap E_r = \emptyset$.

S'il existe deux ensembles E_q et E_r non disjoints (ce qui est peu vraisemblable), et si l'on choisit

$$\varepsilon_i = F(q, \beta) = F(r, \gamma) \in E_q \cap E_r,$$

pour $p \neq q$ et $p \neq r$, l'exposant de p est déterminé par (11) ou (12). L'exposant de q peut être β ou $\beta-1$, celui de r, γ ou $\gamma-1$, d'après la proposition 3, ce qui donne les quatre possibilités annoncées.

TABLES NUMÉRIQUES. — Le tableau I donne les valeurs de $F(p, \alpha)$. Les valeurs non indiquées sont inférieures à 10^{-5} . Les colonnes « exposant = i » indiquent l'exposant de p dans N_ε . Ainsi, pour $\varepsilon = 0,005$, pour $p = 7$, on a

$$0,00129 < \varepsilon < 0,0910,$$

donc l'exposant de 7 dans N_ε est 2.

TABLEAU I

p	Exposants = 0	1	2	3	4	
	$\alpha = 1$	$\alpha = 2$	$\alpha = 3$	$\alpha = 4$	$\alpha = 5$	
2.....	0,584 96	0,222 39	0,099 54	0,047 31	0,023 08	
3.....	0,262 86	0,072 86	0,023 05	0,007 55	0,002 50	
5.....	0,113 28	0,020 37	0,004 00	0,000 79	0,000 16	
7.....	0,068 62	0,009 10	0,001 29	0,000 18	0,000 03	
11.....	0,036 29	0,003 15	0,000 29	0,000 03		
13.....	0,028 89	0,002 14	0,000 16	0,000 01		
17.....	0,020 17	0,001 15	0,000 07			

TABLEAU II

Exposants =	1	2	3	4	5
	$k = 1$	$k = 2$	$k = 3$	$k = 4$	$k = 5$
2....	3,29	5,44	9,08	15,36	
3....	6,72	15,38	36,3	88,57	
5....	16,8	60,50	230,4	920,5	
7....	31,4	153,9	812,8	4 531,5	
11....	73,4	554,9	4 580,6	40 080,3	
13....	100,9	897,2	8 743,5	90 404,7	
17....	168,8	1 951,4	24 842,7	335 898,5	

Exposants =	6	7	8	9	
	$k = 6$	$k = 7$	$k = 8$	$k = 9$	$k = 10$
$p = 2..$	26,3	45,7	80,2	142,4	255,4
$p = 3..$	221,7	567,6	1 480,4	3 919,7	10 507,9

Le tableau II donne dans sa k -ième colonne des valeurs de x en fonction de x_k (x et x_k étant définis par (8)), lorsque x_k est un nombre premier. Elle est obtenue à partir du tableau I par l'application v^{-1} si

$$v(x) = F(x, 1) = \log(1 + (1/x))/\log x.$$

L'ordre de ses termes est donc inversé par rapport à celui de la table 1. Elle permet de trouver les nombres colossalement abondants de plus grand facteur premier p donné. Pour avoir $p = 97$, on doit choisir $97 \leq x \leq 101 =$ nombre premier suivant 97, et l'on trouve

$$2^8.3^5.5^3.7^2.11^2.13.17\dots 97 \quad \text{pour } x < 100,9,$$

et

$$2^8.3^5.5^3.7^2.11^2.13^2.17\dots 97 \quad \text{pour } x > 100,9.$$

Le tableau III donne la suite des nombres colossalement abondants. On trouvera dans [4] une table des nombres superabondants.

TABLEAU III

	n	$\sigma(n)$	$\sigma(n)/n$
$\varepsilon_1 = 0,584\ 96$	1	1	1
$\varepsilon_2 = 0,262\ 86$	2	3	1,5
$\varepsilon_3 = 0,222\ 39$	2 3	12	2
$\varepsilon_4 = 0,113\ 28$	4 3	28	2,333
$\varepsilon_5 = 0,099\ 54$	4 3 5	168	2,8
$\varepsilon_6 = 0,072\ 86$	8 3 5	360	3
$\varepsilon_7 = 0,068\ 62$	8 9 5	1 170	3,25
$\varepsilon_8 = 0,047\ 31$	8 9 5 7	9 360	3,714 3
$\varepsilon_9 = 0,036\ 29$	16 9 5 7	19 344	3,838 1
$\varepsilon_{10} = 0,028\ 89$	16 9 5 7 11	232 128	4,187 0
$\varepsilon_{11} = 0,023\ 08$	16 9 5 7 11 13	3 249 792	4,509 1
$\varepsilon_{12} = 0,023\ 05$	32 9 5 7 11 13	6 604 416	4,581 8
$\varepsilon_{13} = 0,020\ 37$	32 27 5 7 11 13	20 321 280	4,699 3
$\varepsilon_{14} = 0,020\ 17$	32 27 25 7 11 13	104 993 280	4,855 9
	32 27 25 7 11 13 17	1 889 879 040	5,141 6

3. Étude des nombres superabondants compris entre deux nombres colossalement abondants consécutifs

PROPOSITION 5. — Soit N un nombre colossalement abondant associé à ε . On définit x et x_k par (8). Soient p le plus grand facteur premier de N , et P le nombre premier suivant p . Soit n un nombre superabondant compris entre N et NP , et soit λ_k le plus grand nombre premier divisant n avec

l'exposant k . On a

$$(13) \quad \pi(\lambda_k) - \pi(x_k) = O(\sqrt{x_k}) = O(x_k^{1/2}),$$

ce qui entraîne, d'après le lemme 1, pour $\tau > 7/12$,

$$(14) \quad \lambda_k = x_k + O(x_k^\tau).$$

Démonstration. — La démonstration est la même que celle de la proposition 4 de [12] (p. 120) : Pour un entier M quelconque, on définit le « bénéfice » de M , par rapport à N et à ε , par

$$\text{bén } M = \varepsilon \log \frac{M}{N} - \log \frac{\sigma(M)/M}{\sigma(N)/N},$$

et par (4), on a $\text{bén } M \geq 0$. Ensuite, on montre que, pour un nombre superabondant n compris entre N et NP , on a

$$\text{bén } n = O\left(\frac{1}{x}\right).$$

Enfin on montre que, si $\pi(\lambda_k) - \pi(x_k)$ était trop grand, $\text{bén } n$ serait trop grand, et on n'aurait pas $\text{bén } n = O(1/x)$.

Remarquons que le nombre colossalement abondant suivant N est $\leq NP$ et donc, pour tout nombre superabondant n , il existe au moins un N colossalement abondant tel que $N \leq n \leq NP$.

4. Démonstration du théorème 1

La démonstration du théorème 1 repose sur trois lemmes.

LEMME 2. — (*lemme technique*) :

(a) Il existe une seule fonction $y(x)$ vérifiant $y \geq 1$ pour $x \geq 1$ et définie par la relation implicite

$$(15) \quad u(y) \stackrel{\text{def}}{=} \frac{\log(1 + (1/(y^2 + y)))}{\log y} = \frac{\log(1 + (1/x))}{\log x} \stackrel{\text{def}}{=} v(x).$$

(b) Quand $x \rightarrow \infty$, on a $y \sim \sqrt{2x}$ et aussi

$$(16) \quad y(x) = \sqrt{2x} \left(1 - \frac{\log 2}{2 \log x} + \frac{\log 2(4 + 3 \log 2)}{8 (\log x)^2} + o\left(\frac{1}{(\log x)^2}\right) \right).$$

(c) La fonction $\theta(x)$, définie par

$$(17) \quad \theta(x) = \frac{\log y(x)}{\log x} = \frac{\log(1 + (1/(y^2 + y)))}{\log x},$$

est décroissante pour $x \geq 1$. On a, pour $x \rightarrow \infty$,

$$(18) \quad \theta'(x) \sim \frac{-\log 2}{2x(\log x)^2}$$

et

$$(19) \quad \theta(x) = \frac{1}{2} + \frac{1}{2} \frac{\log 2}{\log x} - \frac{\log 2}{2(\log x)^2} + o\left(\frac{1}{(\log x)^2}\right).$$

LEMME 3. — (lemme d'approximation diophantienne). — Soient $\alpha > 0$ et $\beta > 0$, tels que $2\alpha + \beta < 1$. Pour x_0 assez grand, il y a plus de $x_0/(3 \log x_0)$ nombres premiers p entre $x_0/2$ et x_0 vérifiant

$$(20) \quad \exists r/s \in \mathbf{Q}, \quad s \leq x_0^\alpha \quad \text{et} \quad \frac{x_0^\beta}{x_0} \leq \left| \theta(p) - \frac{r}{s} \right| \leq \frac{1}{sx_0^\alpha},$$

où $\theta(p)$ est défini par (17).

LEMME 4. — Soit p un nombre premier vérifiant le lemme 3 avec $\beta > (1+\tau)/2$. Soient $\varepsilon = (\log(1 + (1/p)))/\log p$ et $N = N_\varepsilon$ le nombre colossalement abondant associé à ε (donc le plus grand facteur premier de N est p) et soit P le nombre premier suivant p . Soient n et n' deux nombres superabondants consécutifs vérifiant $N \leq n \leq NP$. Il existe une constante $c > 0$ telle que

$$(21) \quad \frac{n'}{n} \leq 1 + \frac{1}{(\log n)^c}.$$

Démonstration du lemme 2 :

(a) Pour $y > 1$, la fonction $u(y)$ est strictement décroissante, comme quotient d'une fonction décroissante par une fonction croissante. Elle admet donc une fonction réciproque u^{-1} , définie sur $]0, +\infty[$. Comme $u(y) = v(x)$, on a

$$y = u^{-1}(v(x)).$$

(b) Quand $x \rightarrow \infty$, on a $\lim y(x) = +\infty$, $v(x) \sim 1/(x \log x)$ et $u(y) \sim 1/(y^2 \log y)$.

On doit donc avoir

$$(22) \quad y^2 \log y \sim x \log x,$$

ce qui entraîne $\log(y^2 \log y) \sim \log(x \log x)$, soit $\log y \sim 1/2 \log x$, et (22) donne alors $y \sim \sqrt{2x}$.

Pour trouver un développement limité de y , définissons $\zeta(x)$ par la relation

$$\zeta^2 \log \zeta = x \log x.$$

On a, pour $x \rightarrow \infty$, $\zeta(x) \sim \sqrt{2x}$ et

$$\begin{aligned} u(\zeta) &= \frac{\log(1 + (1/(\zeta^2 + \zeta)))}{\log \zeta} = \frac{1}{\zeta^2 \log \zeta} + O\left(\frac{1}{\zeta^3 \log \zeta}\right) \\ &= \frac{1}{x \log x} + O\left(\frac{1}{x^{3/2} \log x}\right) = v(x) + O\left(\frac{1}{x^{3/2} \log x}\right). \end{aligned}$$

On a donc

$$(23) \quad u(\zeta) - u(y) = O\left(\frac{1}{x^{3/2} \log x}\right).$$

On a d'autre part

$$(24) \quad u(\zeta) - u(y) = (\zeta - y)u'(\xi) \quad \text{avec } \xi \text{ entre } \zeta \text{ et } y,$$

et

$$\begin{aligned} (25) \quad u'(y) &= \frac{-[(2y+1)/((y^2+y+1)(y+1)) \log y + \log(1 + (1/(y^2+y)))]}{y(\log y)^2} \\ &\sim -\frac{2}{y^3 \log y}. \end{aligned}$$

Comme $y \sim \zeta \sim \sqrt{2x}$, (23) et (24) donnent

$$(26) \quad y(x) = \zeta(x) + O(1).$$

Le développement limité de $\zeta(x)$ s'obtient par itération :

$$\begin{aligned} \zeta(x) &= \sqrt{2x}(1 + o(1)), \\ \log \zeta &= \frac{1}{2} \log x + \frac{1}{2} \log 2 + o(1), \\ \zeta &= \sqrt{\frac{x \log x}{\log \zeta}} = \sqrt{2x/(1 + (\log 2/\log x) + o(1/\log x))} \\ &= \sqrt{2x} \left(1 - \frac{\log 2}{2 \log x} + o\left(\frac{1}{\log x}\right)\right). \end{aligned}$$

En itérant à nouveau, et en utilisant (26), on obtient (16).

(c) On a

$$(27) \quad \theta'(x) = \frac{x \log x (dy/dx) - y \log y}{xy (\log x)^2} \\ = \frac{(1/(x+1)) - ((2y+1)/(y+1)(y^2+y+1))}{|u'(y)| xy (\log x)^2},$$

la valeur de $u'(y)$ est donnée par (25), et le dénominateur de $\theta'(x)$ est équivalent à $(2x(\log x)^2)/(y^2 \log y) \sim 2 \log x$. Le numérateur vaut

$$\frac{1}{x+1} - \frac{2y+1}{(y+1)(y^2+y+1)} \\ = \frac{1}{x} + O\left(\frac{1}{x^2}\right) - \frac{2}{y^2} + O\left(\frac{1}{y^3}\right) \\ = \frac{1}{y^2} \left(\frac{y^2}{x} - 2 \right) + O\left(\frac{1}{x^{3/2}}\right) = \frac{-2 \log 2}{y^2 \log x} + O\left(\frac{1}{x(\log x)^2}\right),$$

en tenant compte de (16). Cela démontre (18).

Il reste à montrer que $\theta'(x) < 0$ pour $x > 1$. Par (27), on doit montrer $x > (y^2(y+2))/(2y+1)$, c'est-à-dire, comme v est une fonction décroissante, que

$$v(x) = u(y) < v\left(\frac{y^2(y+2)}{2y+1}\right)$$

c'est-à-dire

$$\frac{\log(1 + ((2y+1)/y^2)(y+2))}{\log(y^2((y+2)/(2y+1)))} - \frac{\log(1 + (1/(y^2+y)))}{\log y} > 0 \quad \text{pour } y > 1.$$

Posons

$$\varphi(y) = \log\left(1 + \frac{2y+1}{y^2(y+2)}\right) \log y - \log\left(1 + \frac{1}{y^2+y}\right) \log\left(y^2 \frac{y+2}{2y+1}\right).$$

En décomposant le dernier logarithme, et en regroupant les termes en $\log y$, il vient

$$\varphi(y) = \log\left(\frac{y^2+1}{y+2}\right) \log\left(1 + \frac{1}{y^2+y}\right) - \log y \log\left(1 + \frac{1}{(y+1)^3}\right).$$

Quand $y \in (1, +\infty[, 1 + 1/(y^2 + y) \in]1, 3/2)$ et, par la concavité de la fonction logarithme sur l'intervalle $(1, 3/2]$, on a

$$\log\left(1 + \frac{1}{y^2 + y}\right) \geq \frac{2 \log 3/2}{y^2 + y} \geq \frac{2\alpha}{y^2 + y},$$

avec $\alpha = 0,405$ qui est une valeur approchée par défaut de $\log 3/2$.

En utilisant les inégalités valables pour tout $u > -1$,

$$\frac{u}{1+u} \leq \log(1+u) \leq u,$$

on obtient

$$\log \frac{2y+1}{y+2} \geq \frac{y-1}{2y+1} \quad \text{et} \quad \log\left(1 + \frac{1}{(y+1)^3}\right) \leq \frac{1}{(y+1)^3},$$

ce qui donne, pour $\varphi(y)$, la minoration valable pour $y > 1$,

$$(28) \quad \varphi(y) \geq \left(\frac{y-1}{2y+1}\right) \left(\frac{2\alpha}{y^2+y}\right) - \frac{\log y}{(y+1)^3} = \frac{1}{(y+1)^3} \psi(y),$$

avec $\psi(y) = 2\alpha((y-1)(y+1)^2)/(y(2y+1)) - \log y$. En posant $y = 1+t$, il vient

$$\psi(y) = \psi(1+t) = \frac{2\alpha t(t+2)^2}{(t+1)(2t+3)} - \log(1+t).$$

En dérivant, on trouve

$$\psi'(1+t) = \frac{P(t)}{(t+1)^2(2t+3)^2},$$

avec

$$P(t) = 4\alpha t^4 + (20\alpha - 4)t^3 + (42\alpha - 16)t^2 + (48\alpha - 21)t + (24\alpha - 9).$$

Comme $\alpha = 0,405$, on a

$$P(t) = 1,62t^4 + 4,1t^3 + 1,01t^2 - 1,56t + 0,72.$$

Le trinôme $1,01t^2 - 1,56t + 0,72$ a un discriminant négatif, donc $P(t)$ est positif pour $t \geq 0$. On en déduit que $\psi(y)$ est croissante pour $y \geq 1$ et, comme $\psi(1) = 0$, que $\psi(y)$ est positive pour $y \geq 1$, et donc aussi $\varphi(y)$ par (28), ce qui achève la démonstration.

Démonstration du lemme 3. — D'après un lemme de Dirichlet (cf. [13], chap. 5, ou [7], chap. 11), étant donnés un réel ξ quelconque et un nombre $A > 1$, il existe une fraction r/s , avec $s \leq A$ telle que $|\xi - (r/s)| \leq 1/sA$. Posant ici $\xi = \theta(p)$ et $A = x_0^\alpha$, on obtient

$$\left| \theta(p) - \frac{r}{s} \right| \leq \frac{1}{sx_0^\alpha}.$$

D'après le lemme 2, la fonction $\theta(x)$ est décroissante. Pour chaque fraction r/s comprise entre $\theta(\infty) = 1/2$ et $\theta(1) = (\log 3/2)/(\log 2) = 0,585\dots$, il existe une seule valeur $x_{r,s}$ telle que $\theta(x_{r,s}) = r/s$. Soit $\beta' > \beta$ tel que $2\alpha + \beta' < 1$. Pour chaque fraction r/s telle que $s \leq x_0^\alpha$ et telle que $x_0/2 \leq x_{r,s} \leq x_0$, on retire, autour de $x_{r,s}$, une zone $|x - x_{r,s}| < x_0^{\beta'}$. En dehors de cette zone, on aura

$$\left| \theta(x) - \frac{r}{s} \right| \geq \frac{|x - x_{r,s}|}{|\theta'(\xi)|} \geq \frac{x_0^{\beta'}}{x_0(\log x_0)^2} \geq \frac{x_0^\beta}{x_0}.$$

Dans chaque zone $|x - x_{r,s}| < x_0^{\beta'}$, il y a au plus $x_0^{\beta'} + 1$ nombres premiers, et comme $s \leq x_0^\alpha$, il y a au plus $x_0^{2\alpha}$ zones. On retire donc $O(x_0^{2\alpha + \beta'})$ nombres premiers. Comme $2\alpha + \beta' < 1$, il reste donc plus de $x_0/(3 \log x_0)$ nombres premiers pour lesquels (20) est vérifié.

Démonstration du lemme 4. — Soient p_1 et q_1 les plus grands nombres premiers divisant n avec les exposants 1 et 2. Désignons les nombres premiers successifs entourant p_1 et q_1 par

$$\dots > p_3 > p_2 > p_1 < P_1 < P_2 < P_3 \dots$$

$$\dots < q_3 < q_2 < q_1 < Q_1 < Q_2 < Q_3 \dots$$

On applique la proposition 5 avec $\lambda_1 = p_1$, $\lambda_2 = q_1$ et $x = p$ (par (8)) :

$$(29) \quad p_1 = x + O(\sqrt{x}),$$

et, à cause de (8) et (15),

$$(30) \quad q_1 = x_2 + O(\sqrt{x_2}) = y + O(\sqrt{y}).$$

Si l'on choisit $r < x^\tau/\log x$, on aura, d'après le lemme 1,

$$(31) \quad P_r = p_1 + O(p_1^\tau) = x + O(x^\tau),$$

et

$$p_r = x + O(x^\tau).$$

De même, si l'on choisit $s < y^\tau/\log y$, on aura

$$q_s = y + O(y^\tau) \quad \text{et} \quad Q_s = y + O(y^\tau).$$

Avec la proposition 5, et comme par (9) $x_k \sim \sqrt[k]{kx}$, on voit que, pour $r < x^\tau/\log x$ et $s < y^\tau/\log y$, les nombres premiers $q_1 \dots q_s$ vont diviser n avec l'exposant 2, les nombres $Q_1 \dots Q_s, p_1 \dots p_r$ avec l'exposant 1.

On prend pour r et s les valeurs fournies par le lemme 3. Comme $\beta > (1+\tau)/2$, on a $\alpha < (1-\beta)/2 < (1-\tau)/4$, et comme $\tau > 1/3$, il s'ensuit que

$$s \leq x_0^\alpha \Rightarrow s < \frac{y^\tau}{\log y}.$$

Si $r/s > \theta(p)$, on considère

$$(32) \quad n_1 = n \frac{P_1 \dots P_r}{q_1 \dots q_s}.$$

Si $r/s < \theta(p)$, on considérerait de même $n_2 = n ((Q_1 \dots Q_s)/(p_1 \dots p_r))$; les raisonnements seraient tout à fait semblables. On va montrer que

$$(33) \quad \frac{\sigma(n_1)}{n_1} > \frac{\sigma(n)}{n}.$$

On a

$$\begin{aligned} \frac{\sigma(n_1)}{n_1} &= \frac{\sigma(n)}{n} \prod_{i=1}^r \left(1 + \frac{1}{P_i}\right) \prod_{i=1}^s \left(\frac{1}{1 + (1/(q_i^2 + q_i))}\right) \\ &= \frac{\sigma(n)}{n} \frac{(1 + (1/x))^r}{(1 + (1/(y^2 + y)))^s} \prod_{i=1}^r \left(\frac{1 + (1/P_i)}{1 + (1/x)}\right) \prod_{i=1}^s \left(\frac{1 + (1/(y^2 + y))}{1 + (1/(q_i^2 + q_i))}\right) \end{aligned}$$

et

$$\log \frac{\sigma(n_1)}{n_1} - \log \frac{\sigma(n)}{n} = S_1 + S_2 + S_3,$$

avec

$$S_1 = r \log \left(1 + \frac{1}{x}\right) - s \log \left(1 + \frac{1}{y^2 + y}\right) = s \log \left(1 + \frac{1}{x}\right) \left(\frac{r}{s} - \frac{\log y}{\log x}\right) \gg \frac{s x_0^\beta}{x_0^2},$$

compte tenu de (15) et de (20), car $x = p$;

$$S_2 = \sum_{i=1}^r \log \left(1 + \frac{1}{P_i} \right) - \log \left(1 + \frac{1}{x} \right) = - \sum_{i=1}^r \frac{P_i - x}{\xi_i^2 + \xi_i} = O \left(\frac{s}{x_0^{2-\tau}} \right)$$

en utilisant le théorème des accroissements finis, (31) et la relation $r < s$.
On a de même

$$S_3 = \sum_{i=1}^s \log \left(1 + \frac{1}{y^2 + y} \right) - \log \left(1 + \frac{1}{q_i^2 + q_i} \right) = O \left(\frac{sy^\tau}{y^3} \right) = O \left(\frac{s}{x_0^{(3-\tau)/2}} \right).$$

Les sommes S_2 et S_3 sont négatives, et $S_2 + S_3 = O(s/(x^{(3-\tau)/2}))$. Comme $\beta > (1+\tau)/2$, on a $S_1 + S_2 + S_3 > 0$, ce qui démontre (33).

Majorons maintenant n_1/n ,

$$\frac{n_1}{n} = \frac{P_1 \dots P_r}{q_1 \dots q_s} = \frac{x^r}{y^s} \left(\prod_{i=1}^r \left(\frac{P_i}{x} \right) \right) / \left(\prod_{i=1}^s \left(\frac{y}{q_i} \right) \right).$$

On a

$$\log \frac{n_1}{n} = S_4 + S_5 + S_6,$$

avec

$$S_4 = r \log x - s \log y = s \log x \left(\frac{r}{s} - \frac{\log y}{\log x} \right) \leq \frac{\log x_0}{x_0^\alpha},$$

$$S_5 = \sum_{i=1}^r \log \frac{P_i}{x} = \sum_{i=1}^r \log \left(1 + \frac{P_i - x}{x} \right) = O \left(\frac{sx_0^\tau}{x_0} \right) = O \left(\frac{x_0^\alpha}{x_0^{(1-\tau)/2}} \right),$$

$$\begin{aligned} S_6 &= - \sum_{i=1}^s \log \left(\frac{q_i}{y} \right) = - \sum_{i=1}^s \log \left(1 - \frac{y - q_i}{y} \right) \\ &= O \left(s \frac{y^\tau}{y} \right) = O \left(\frac{x_0^\alpha}{x_0^{(1-\tau)/2}} \right), \end{aligned}$$

ce qui donne

$$(34) \quad \log \frac{n_1}{n} = O \left(\frac{\log x_0}{x_0^\alpha} \right) + O \left(\frac{x_0^\alpha}{x_0^{(1-\tau)/2}} \right) = O \left(\frac{1}{x_0^c} \right),$$

pour tout $c < \min(\alpha, ((1-\tau)/2) - \alpha)$. En choisissant α légèrement inférieur à $(1-\tau)/4$, et β légèrement supérieur à $(1+\tau)/2$, on peut prendre, pour c , toute valeur inférieure à $(1-\tau)/4 = 5/48$.

Maintenant, par (33), on a $(\sigma(n_1))/n_1 > (\sigma(n))/n$; d'après la définition des nombres superabondants, cela entraîne $n < n' \leq n_1$, donc, par (34), que

$$\log \frac{n'}{n} = O\left(\frac{1}{x_0^c}\right).$$

Comme par (2) et (29), on a

$$\log n \sim p_1 \sim p = x < x_0,$$

on obtient (21), ce qui démontre le lemme 4.

Démonstration du théorème 1. — Soient X assez grand, et N_0 le nombre colossalement abondant précédent X . Soient ε_0 associé à N_0 , et x_0 défini par (8). Soient p_0 le plus grand facteur premier de N_0 , et P_0 le nombre premier suivant p_0 . On a

$$N_0 \leq X < N_0 P_0,$$

par (11) :

$$p_0 \leq x_0 < P_0,$$

et par (2) :

$$p_0 \sim P_0 \sim \log N_0.$$

On a donc

$$(35) \quad x_0 \sim \log N_0 \sim \log X.$$

On conserve les notations du lemme 4. Si p vérifie le lemme 3, on a

$$Q(NP) - Q(N) \gg (\log N)^c \gg x_0^c,$$

et

$$Q(X) \geq Q(N_0) \geq \sum_{p \text{ vérifiant le lemme 3}} [Q(NP) - Q(N)] \gg \frac{x_0}{3 \log x_0} x_0^c.$$

On en déduit par (35) :

$$Q(X) \gg \frac{(\log X)^{1+c}}{\log \log X}.$$

Comme cette inégalité est vraie pour tout $c < (1-\tau)/4$, on a aussi, pour tout $c < (1-\tau)/4$ et X assez grand,

$$Q(X) \geq (\log X)^{1+c},$$

ce qui démontre le théorème 1.

5. Nombres sans cube superabondants

DÉFINITION. — Soit $\sigma^*(n)$ la fonction multiplicative qui vaut $\sigma^*(p^\alpha) = \sigma(p^\alpha)$ si $\alpha \leq 2$, et $\sigma^*(p^\alpha) = 0$ si $\alpha \geq 3$. On dit que n est un nombre *sans cube superabondant* si

$$(36) \quad m < n \Rightarrow \frac{\sigma^*(m)}{m} < \frac{\sigma^*(n)}{n}.$$

Cette définition est équivalente à la suivante. Soit \mathcal{C} l'ensemble des nombres entiers non divisibles par un cube. On dit que n est un nombre « sans cube superabondant », si $n \in \mathcal{C}$ et si $m \in \mathcal{C}$,

$$m < n \Rightarrow \frac{\sigma(m)}{m} < \frac{\sigma(n)}{n}.$$

Les propriétés de ces nombres sont très voisines de celles des nombres superabondants. Si n^* est un nombre sans cube superabondant, et s'écrit $n^* = \prod p^{\alpha_p}$, on a (cf. proposition 1) :

$$2 \geq \alpha_2 \geq \alpha_3 \geq \dots \geq \alpha_p.$$

Un tel nombre dépend donc de deux nombres premiers, q (le plus grand tel que $\alpha_q = 2$) et p (le plus grand diviseur premier).

On définit sans difficultés les nombres « sans cube colossalement abondants ». Pour $\varepsilon > 0$, il existe N_ε^* en lequel la fonction $(\sigma^*(n))/(n^{1+\varepsilon})$ est maximale. Si T est l'application de $\mathbf{N} \rightarrow \mathcal{C}$, définie par

$$T\left(\prod p^{\alpha_p}\right) = \prod p^{\min(\alpha_p, 2)},$$

on a $N_\varepsilon^* = T(N_\varepsilon)$. Mais il n'est pas vrai que « n superabondant » \Rightarrow « $T(n)$ sans cube superabondant ». Enfin, la proposition 5 s'adapte aisément aux nombres sans cube superabondants. On pose :

$$Q^*(X) = \text{card} \{ n^* \leq X, n^* \text{ sans cube superabondant} \}.$$

La démonstration du théorème 1 est valable, puisqu'on ne considère que les nombres divisant le nombre superabondant n avec un exposant égal à 1 ou 2. On a donc

$$Q^*(X) \geq (\log X)^{1+c}.$$

THÉORÈME 2. — Soient n^* et n'^* deux nombres sans cube superabondants consécutifs, on a

$$\overline{\lim} \frac{n'^*}{n^*} \geq \sqrt[4]{2} = 1,19.$$

Démonstration. — Soit a entier ≥ 6 . Il existe, d'après le lemme 2, un nombre réel x tel que

$$(37) \quad \theta(x) = \frac{\log y}{\log x} = \frac{a+1}{2a}.$$

On choisit $\varepsilon = (\log(1+(1/x)))/\log x$, et N_ε^* un nombre sans cube colossalement abondant associé à ε . On désigne les nombres premiers successifs entourant x et y (définis par (15)) par

$$\dots p_3 < p_2 < p_1 \leq x < P_1 < P_2 < P_3 \dots,$$

$$\dots q_3 < q_2 < q_1 \leq y < Q_1 < Q_2 < Q_3 \dots$$

On a

$$N = N_\varepsilon^* = 2^2 3^2 \dots q_2^2 q_1^2 Q_1 Q_2 \dots p_1,$$

et les nombres sans cube superabondant n^* vérifiant $N \leq n^* < Nx$ sont de la forme

$$n_s = N \frac{Q_1 \dots Q_s}{p_1 \dots p_r} \quad \text{ou} \quad n'_s = N \frac{P_1 \dots P_r}{q_1 \dots q_s},$$

r étant déterminé en fonction de s par la condition $N \leq n_s < Nx$. On a, d'autre part, $s = O(\sqrt{y})$ par la proposition 5.

Si $s \geq 2a$, on a, avec (37),

$$x > \frac{n_s}{N} \geq \frac{y^s}{x^r} = \frac{y^{s-2a}}{x^{r-a-1}} \frac{y^{2a}}{x^{a+1}} = \frac{y^{s-2a}}{x^{r-a-1}},$$

d'où il vient

$$x^{r-a} > y^{s-2a} \geq 1,$$

et $r-a > 0$ c'est-à-dire $r \geq a+1$, ce qui entraîne que p_1, p_2, \dots, p_{a+1} ne divisent pas n_s . Considérons

$$n''_s = n_s \frac{p_1 \dots p_{a+1}}{Q_1 \dots Q_{2a}}.$$

On a, par (37),

$$(38) \quad n_s'' < n_s \frac{x^{a+1}}{y^{2a}} = n_s,$$

et

$$\frac{\sigma^*(n_s'')}{n_s''} = \frac{\sigma^*(n_s)}{n_s} \prod_{i=1}^{a+1} \left(1 + \frac{1}{p_i}\right) \prod_{i=1}^{2a} \left(\frac{1}{1 + (1/(Q_i^2 + Q_i))}\right),$$

d'où l'on tire, par (37) et (15) :

$$(39) \quad \frac{\sigma^*(n_s'')}{n_s''} > \frac{\sigma^*(n_s)}{n_s} \frac{(1 + (1/x))^{a+1}}{(1 + (1/(y^2 + y)))^{2a}} = \frac{\sigma^*(n_s)}{n_s}.$$

Si $s \geq 2a$, on voit, par (36), (38) et (39), que n_s n'est pas sans cube superabondant. On démontre la même chose pour n_s' , et il y a donc entre N et Nx au plus $4a$ nombres sans cube superabondants. En comparant (37) et (19), on a

$$a \sim \frac{\log x}{\log 2},$$

ce qui démontre le théorème 2.

6. Quelques conjectures

Il semble difficile de démontrer que l'on a, pour tout n superabondant (avec $n' =$ nombre superabondant suivant n),

$$\frac{n'}{n} < 1 + \frac{1}{(\log n)^c}.$$

Si le lemme 4 ne s'applique pas, on peut essayer d'utiliser les nombres premiers autour de $x_3 \sim \sqrt[3]{3}x$, mais il est difficile de voir si cela suffit à résoudre la question.

Il semble un peu plus facile de montrer que $Q(X) \leq (\log X)^{c'}$.

On peut s'intéresser aux nombres M_n où la fonction $(\sigma(n))/(n(\log n)^n)$ atteint son maximum. Les nombres M_n sont superabondants, mais il est difficile de les étudier, car la fonction $\log n$ n'est pas multiplicative. Il serait intéressant de savoir si les M_n sont colossalement abondants.

Les nombres superabondants, et les nombres hautement composés, sont des nombres qui ont beaucoup de diviseurs. On peut définir d'autres fonctions pour estimer si un nombre a beaucoup de diviseurs :

1° Soit d_n le plus petit diviseur de n pour lequel on a

$$(40) \quad \sum_{d|n, d \leq d_n} d \geq n.$$

On pose $f(n) = n/d_n$. Si n est déficient (c'est-à-dire si $\sigma(n) < 2n$), on a $d_n = n$ et $f(n) = 1$. On peut montrer que, pour $\varepsilon > 0$ et $n > n_0(\varepsilon)$, on a

$$f(n) \leq \exp(1 + \varepsilon) \frac{\log_2 n \log_3 n}{\log_4 n},$$

et qu'il y a une infinité de n vérifiant

$$f(n) \geq \exp(1 - \varepsilon) \frac{\log_2 n \log_3 n}{\log_4 n}.$$

Pour démontrer ces formules, on remarque que l'on a

$$\sum_{d|n, d \geq f(n)} \frac{1}{d} \geq 1,$$

ce qui entraîne

$$\sum_{f(n) \leq d \leq n} \chi_{\mathcal{M}}(d) \frac{1}{d} \geq 1,$$

où \mathcal{M} est l'ensemble des nombres qui ont mêmes facteurs premiers que n , et χ sa fonction caractéristique. On évalue cette dernière somme à l'aide du résultat de DE BRUIJN [1] : η étant donné, pour $x > x_0(\eta)$, le nombre d'entiers $d \leq x$, composés de nombres premiers $\leq x^{1/k}$, est compris entre $x/(k!)^{1-\eta}$ et $x/(k!)^{1+\eta}$, ceci pour $k = k(x) < \sqrt{\log x}$.

2° Soit

$$g(n) = \max_{1 \leq m \leq n} \frac{1}{m} \left(\sum_{d|n, d \leq m} d \right).$$

On a $g(n) \geq \sigma(n)/n$, avec égalité si n est une puissance de nombre premier.

Quel est l'ensemble des n pour lesquels $g(n) = \sigma(n)/n$? Il semble que cet ensemble ait pour densité 0, et que l'on ait $\lim_{X \rightarrow \infty} 1/X \sum_{n=1}^X g(n) = \infty$. Il est même probable que l'on ait $\lim_{X \rightarrow \infty} g(n)/n = \infty$ pour presque tout n (cf. [16]).

On peut introduire la fonction $\Delta(n)$, une des valeurs de m pour laquelle le maximum est réalisé :

$$g(n) = \frac{1}{\Delta(n)} (\sum_{d|n, d \leq \Delta(n)} d).$$

On a $\lim \Delta(n) = +\infty$, mais, pour tout $\varepsilon > 0$, $\lim \Delta(n)/n^\varepsilon = 0$. Probablement, la densité des entiers vérifiant $\Delta(n) < n^\alpha$ est une fonction de α .

La fonction g est supermultiplicative :

$$((n_1, n_2) = 1) \Rightarrow (g(n_1 n_2) \geq g(n_1) g(n_2)).$$

Pour obtenir de grandes valeurs de $g(n)$, il faut choisir des nombres n ayant beaucoup de diviseurs entre $m/2$ et m . On a en effet :

$$\frac{1}{2} g(n) \leq \max_{1 \leq m \leq n} \frac{1}{m} (\sum_{d|n, m/2 < d \leq m} d) \leq g(n).$$

Soit $d(n)$ le nombre de diviseurs de n . Pour un certain m , il y a au moins $(d(n) \log 2)/\log n$ diviseurs de n entre $m/2$ et m , et cela montre que

$$g(n) \geq \frac{\log 2}{2} \frac{d(n)}{\log n}.$$

Soit $n = 2, 3, \dots, p_k$ le produit des k premiers nombres premiers. On sait que $k \sim \log n / \log \log n$. Si d est un diviseur de n , $\log d$ est la somme de k variables aléatoires prenant les valeurs 0 ou $\log p_i$; d'après le théorème central limite des probabilités, il y a plus de $c_1 d(n)$ diviseurs de n dans l'intervalle

$$\sqrt{n} e^{c_2 \sqrt{\log n \log \log n}}, \quad \sqrt{n} e^{c_2 \sqrt{\log n \log \log n}},$$

et, en reprenant le raisonnement précédent, on en déduit que

$$g(n) \geq \frac{c d(n)}{\sqrt{\log n \log \log n}}.$$

D'autre part, le théorème de Sperner dit (cf. [15], et [3], tome 2, p. 114) : dans un ensemble à n éléments, si des parties A_1, \dots, A_h sont telles

qu'aucune d'entre elles n'en contient une autre, leur nombre h vérifie :
 $h \leq \binom{n}{[n/2]}$. Le nombre maximal de diviseurs de $n = 2, 3, \dots, p_k$ compris entre $m/2$ et m est donc majoré par $\binom{k}{[k/2]}$, cela montre que

$$g(n) \leq c' d(n) \sqrt{\frac{\log \log n}{\log n}}.$$

Le théorème de SPERNER a été généralisé par DE BRUIJN [2], si $n = p_1^{\alpha_1} p_2^{\alpha_2} \dots p_k^{\alpha_k}$ la plus grande famille de diviseurs de n , tels qu'aucun d'entre eux n'en divise un autre, est obtenu en considérant les nombres

$$\prod_{i=1}^k p_i^{\beta_i}, \quad 0 \leq \beta_i \leq \alpha_i \quad \text{et} \quad \sum_{i=1}^k \beta_i = \left\lfloor \frac{1}{2} \sum_{i=1}^k \alpha_i \right\rfloor.$$

3° Soit $h(n) = \sum_{d|n, d < \sqrt{n}} d$. On a $h(n) \leq (d(n)/2) \sqrt{n}$, et on peut montrer que $h(n) = o(d(n) \sqrt{n})$ avec le théorème de SPERNER ou sa généralisation. Pour tout $\varepsilon > 0$, on a, pour $n = 2, 3, \dots, p_k$ assez grand :

$$\frac{h(n)}{\sqrt{n}} \geq 2^{(1-\varepsilon)(\log n / \log \log n)}$$

Montrons un résultat un peu faible :

Soit p un nombre premier assez grand, et soit $p_1 = p, p_2, p_3, \dots, p_{2k} = q$ les nombres premiers suivant p . On choisit $k = [p^{1/3}/2 \log p]$. On a, d'après le lemme 1, $q \leq p + p^\tau$, ce qui entraîne $q^k \sim p^k$. On pose : $n = p_1 p_2 \dots p_{2k}$. Il y a $\frac{1}{2} \binom{2k}{k}$ façons d'écrire $n = uv$, $u < v$, u et v ayant chacun k facteurs premiers, et l'on a toujours

$$\frac{u}{\sqrt{n}} \geq \frac{p^k}{q^k} \geq \frac{1}{2} \quad \text{pour } p \text{ assez grand.}$$

On a

$$h(n) \geq \frac{1}{2} \binom{2k}{k} \frac{\sqrt{n}}{2}, \quad n \sim p^{2k},$$

d'où

$$p \sim (\log n)^3, \quad k \sim \frac{\log n}{6 \log \log n}$$

et $h(n) \geq 2^{(1/3 - \varepsilon) \log n / (\log \log n)}$ pour n assez grand.

L'étude des grandes valeurs de $f(n)$, $g(n)$, $h(n)$ nous amène à considérer les nombres f , g ou h hautement abondants (voir Introduction). On peut espérer montrer qu'à partir d'un certain rang, ces nombres sont divisibles par n'importe quelle puissance de nombres premiers, mais il semble difficile d'en dire plus.

On peut étudier les nombres pour lesquels l'inégalité (40) est une égalité, c'est-à-dire les nombres n tels qu'il existe m avec

$$\sum_{d|n, d \leq m} d = n \quad \text{ou encore} \quad \sum_{d|n, d \leq m'} \frac{1}{d} = \frac{\sigma(n)}{n} - 1.$$

Lorsque $m' = 1$, on trouve les nombres parfaits ($\sigma(n) = 2n$). Les autres nombres de ce type inférieurs à 10^6 sont, avec entre parenthèses la valeur correspondante de $\sigma(n)/n$, 24 (5/2); 2 016 (13/4); 8 190 (16/5); 42 336 (85/28); 45 864 (85/28); 392 448 (37/12) et 714 240 (143/40).

BIBLIOGRAPHIE

- [1] BRUIJN (N. G. De). — On the number of positive integers $\leq x$ and free of prime factors $> y$, *Indag. Math.*, t. 13, 1951, p. 50-60.
- [2] BRUIJN (N. G. De), TENGBERGEN (C. Van E.) and KRUYSWIJK (D.). — On the set of divisors of a number, *Nieuw Arch. f. Wisk.*, Ser. 2, t. 23, 1949-1951, p. 191-193.
- [3] COMTET (L.). *Analyse combinatoire*, Volumes 1 et 2. — Paris, Presses Universitaires de France, 1970 (*Collection SUP. « Le mathématicien », 4 et 5*).
- [4] ERDÖS (P.) and ALAOGU (L.). — On highly composite and similar numbers, *Trans. Amer. math. Soc.*, t. 56, 1944, p. 448-469.
- [5] ERDÖS (P.). — On highly composite numbers, *J. of London math. Soc.*, t. 19, 1944, p. 130-134.
- [6] ERDÖS (P.). — On the distribution function of additive functions, *Annals of Math.*, t. 47, 1946, p. 1-20.
- [7] HARDY (G. H.) and WRIGHT (E. M.). — *An introduction to the theory of numbers*, 4th edition. — Oxford, The Clarendon Press, 1960.
- [8] HUXLEY (M. N.). *The distribution of prime numbers. Large sieves and zero density theorems*. — Oxford, at the Clarendon Press, 1972 (*Oxford mathematical Monographs*).
- [9] LANG (S.). — *Introduction to transcendental numbers*. — New York, Addison-Wesley, 1966 (*Addison-Wesley Series in Mathematics*).
- [10] LANG (S.). — Nombres transcendants, Séminaire Bourbaki, 18^e année, 1965-1966, n° 305, 8 p.
- [11] NICOLAS (J.-L.). — Ordre maximal d'un élément du groupe S_n des permutations et « highly composite numbers », *Bull. Soc. math. France*, t. 97, 1969, p. 129-191 (*Thèse Sc. math., Paris, 1968*).

- [12] NICOLAS (J.-L.). — Répartition des nombres hautement composés de Ramanujan, *Canad. J. of Math.*, t. 23, 1971, p. 116-130.
- [13] RADEMACHER (H.). — *Lectures on elementary number theory*. — New York, Blaisdell Publishing Company, 1964.
- [14] RAMANUJAN (S.). — Highly composite numbers, *Proc. London math. Soc.*, Series 2, t. 14, 1915, p. 347-409; and "*Collected papers*", p. 78-128. — Cambridge, at the University Press, 1927.
- [15] SPERNER (E.). — Ein Satz über Untermengen einer endlichen Menge, *Math. Z.*, t. 27, 1928, p. 544-548.
- [16] Problèmes et solutions, *Can. math. Bull.*, t. 16, 1973, p. 463.

(Texte reçu le 21 janvier 1974.)

Paul ERDÖS,
Magyar Tudományok Akadémia,
Matematikai Kutató Intézet,
Réáltanoda u. 13-15,
Budapest V (Hongrie)

et

Jean-Louis NICOLAS,
Département de Mathématiques,
U. E. R. des Sciences de Limoges,
123, rue Albert-Thomas,
87100 Limoges.