

LUCIEN GODEAUX

**Mémoire sur les surfaces algébriques doubles ayant un nombre fini de points de diramation**

*Annales de la faculté des sciences de Toulouse 3<sup>e</sup> série*, tome 5 (1913), p. 289-312

[<http://www.numdam.org/item?id=AFST\\_1913\\_3\\_5\\_289\\_0>](http://www.numdam.org/item?id=AFST_1913_3_5_289_0)

© Université Paul Sabatier, 1913, tous droits réservés.

L'accès aux archives de la revue « Annales de la faculté des sciences de Toulouse » (<http://picard.ups-tlse.fr/~annales/>) implique l'accord avec les conditions générales d'utilisation (<http://www.numdam.org/conditions>). Toute utilisation commerciale ou impression systématique est constitutive d'une infraction pénale. Toute copie ou impression de ce fichier doit contenir la présente mention de copyright.

NUMDAM

Article numérisé dans le cadre du programme  
Numérisation de documents anciens mathématiques  
<http://www.numdam.org/>

---

# MÉMOIRE SUR LES SURFACES ALGÈBRIQUES DOUBLES

## AYANT UN NOMBRE FINI DE POINTS DE DIRAMATION

PAR LUCIEN GODEAUX,

à Liège.

---

Dans plusieurs Mémoires publiés récemment, j'ai étudié les involutions douées d'un nombre fini de points de coïncidence, appartenant à des surfaces algébriques<sup>(1)</sup>; j'ai précisément construit des surfaces normales représentant ces involutions et déterminé les singularités de ces surfaces aux points de diramation. Lorsqu'il s'agit de surfaces de genres un ( $p_a = P_a = 1$ ) ou de surfaces de genres zéro et de bigenre un ( $p_a = P_a = 0$ ,  $P_g = 1$ ), j'ai également montré que l'on pouvait déterminer l'ordre des involutions.

Si l'on considère une involution d'ordre deux appartenant à une surface de genres un ( $p_a = P_a = 1$ ) et n'ayant qu'un nombre fini ( $> 0$ ) de points unis, il résulte de mes recherches qu'une surface normale, représentant cette involution (c'est-à-dire dont les points correspondent birationnellement aux groupes de l'involution), est de genres un et possède huit points doubles coniques qui sont huit points de diramation. Mais on peut voir tout de suite que la présence de ces huit points doubles coniques ne suffit pas pour que la surface représente une involution d'ordre deux appartenant à une surface de genres un. Il suffit de remarquer qu'il existe deux

---

<sup>(1)</sup> *Mémoire sur les involutions de genres un appartenant à une surface de genres un* (Annales de l'École Normale supérieure, 1914, [3], XXXI). — *Sur les involutions appartenant à une surface de genres  $p_a = p_g = 0$ ,  $P_a = 1$*  (Bulletin de la Société mathématique de France, 1913, XLI). — *Classification des transformations rationnelles existant entre deux surfaces de genres  $p_a = p_g = 0$ ,  $P_a = 1$*  (Bulletin de l'Académie roumaine, 1913, II). — *Sur les involutions douées d'un nombre fini de points unis, appartenant à une surface algébrique* (Rendiconti della R. Accademia dei Lincei, 1<sup>o</sup> sem. 1914, [5], XXIII). — Voir aussi différentes notes parues dans les C. R. : 12 août 1912, 28 avril 1913, 9 juin 1913, 23 mars 1914, 4 mai 1914).

types de surfaces du quatrième ordre ayant huit points doubles coniques, déterminés par Cayley; un seul de ces types est l'image d'une involution d'ordre deux appartenant à une surface de genres un.

Dans ce travail, je me propose de déterminer les conditions nécessaires et suffisantes pour qu'une surface algébrique donnée représente une involution d'ordre deux, n'ayant qu'un nombre fini de points unis, appartenant à une surface algébrique. En d'autres termes, je déterminerai les conditions d'existence des surfaces doubles (c'est-à-dire des surfaces composées de deux feuilletés superposés) ayant un nombre fini de points de diramation. Je parviendrai ainsi au théorème suivant :

*Soit  $\Phi$  une surface algébrique, de genre arithmétique  $\pi_a \geq -1$ , qui puisse être considérée comme une surface double ayant un nombre fini de points de diramation. On peut toujours transformer birationnellement  $\Phi$  en une surface  $\Phi_0$ , normale, simple, dépourvue de courbes exceptionnelles, d'ordre  $n$ , à sections planes ou hyperplanes de genre  $\pi$ , située dans un espace linéaire à  $\varphi = n - \pi + \pi_a + 1 (\geq 3)$  dimensions, telle que  $n - \pi > \pi_a + 1$ , et possédant un point double conique en chaque point de diramation.*

*Pour que la surface double existe, il faut et il suffit que :*

1° *Le nombre  $\sigma$  des points de diramation soit multiple de quatre.*

2° *Il y ait, parmi les hypersurfaces découpant sur  $\Phi_0$ , en dehors des courbes multiples éventuelles, le système double de celui des sections hyperplanes, certaines passant par les  $\sigma$  points de diramation et touchant  $\Phi_0$  en chaque point de leur courbe d'intersection avec cette surface. Ces courbes de contact sont d'ordre  $n$ , de genre  $\pi - \frac{\sigma}{4}$  et forment un système linéaire complet de degré  $n - \frac{\sigma}{2}$ .*

*Dans ces conditions, les genres arithmétique  $p_a$  et linéaire  $p^{(1)}$  de la surface double sont donnés, en fonction des genres arithmétique  $\pi_a$  et linéaire  $\pi^{(1)}$  de  $\Phi$ , par les formules*

$$\begin{aligned} p_a &= 2\pi_a + 1 - \frac{\sigma}{4}, \\ p^{(1)} &= 2\pi^{(1)} - 1. \end{aligned}$$

Si nous désignons par  $|\Gamma|$  le système des sections hyperplanes de  $\Phi_0$ , par  $|\Gamma_0|$  le système des courbes dont il est question dans le 2° de l'énoncé, enfin par  $\Gamma_1, \Gamma_2, \dots, \Gamma_r$  respectivement les courbes rationnelles de degré  $-2$  auxquelles sont équivalents les points doubles coniques de  $\Phi_0$  au point de vue des transformations birationnelles, nous avons :

$$2\Gamma_0 + \Gamma_1 + \Gamma_2 + \dots + \Gamma_r \equiv 2\Gamma.$$

Soient, en coordonnées cartésiennes non homogènes,

$$\varphi_1(x_1, x_2, \dots, x_r) = 0, \quad \varphi_2(x_1, x_2, \dots, x_r) = 0, \quad \dots, \quad \varphi_{r-2}(x_1, x_2, \dots, x_r) = 0$$

les équations de la surface  $\Phi_0$ ,

$$f(x_1, x_2, \dots, x_r) = 0$$

l'équation d'une hypersurface touchant  $\Phi_0$  le long d'une courbe  $\Gamma_0$  et appartenant à la famille des surfaces découpant sur  $\Phi_0$  le système  $|2\Gamma|$ ; la surface double a pour équations :

$$\varphi_1 = 0, \quad \varphi_2 = 0, \quad \dots, \quad \varphi_{r-2} = 0, \quad x_{r+1} = \sqrt{f}.$$

Dans la suite de ce travail, j'appliquerai le théorème qui vient d'être énoncé à certaines surfaces particulières : aux surfaces  $\Phi$  possédant une involution d'ordre deux ayant une courbe lieu de points de coïncidence, aux surfaces de genres un ( $p_a = P_a = 1$ ) et aux surfaces de genres zéro et de bigenre un ( $p_a = P_a = 0, P_s = 1$ ). J'établirai notamment les théorèmes suivants :

I. *Les problèmes :*

a) *Déterminer les plans doubles de genres un ( $p_a = P_a = 1$ ) qui représentent des involutions d'ordre deux appartenant à une surface de genres un;*

b) *Déterminer les surfaces de genres un possédant deux involutions rationnelles d'ordre deux engendrées par deux transformations birationnelles permutables de la surface en elle-même, le produit de ces transformations engendrant une involution de genres un;*

*Sont équivalents.*

Le même théorème s'applique également aux surfaces de genres zéro et de bigenre un ( $p_a = P_a = 0, P_s = 1$ ).

II. *Si une surface du quatrième ordre dépourvue de lignes multiples représente une involution d'ordre deux appartenant à une surface de genres un, elle est l'enveloppe d'une série d'indice deux de quadriques ayant huit points communs.*

III. *Si une surface d'ordre six, à sections hyperplanes de genre quatre, de  $S_4$ , représente une involution d'ordre deux appartenant à une surface de genres un, celle-ci possède deux autres involutions d'ordre deux, l'une rationnelle, l'autre de genres zéro et de bigenre un.*

**Conditions d'existence des surfaces doubles douées d'un nombre fini  
de points de diramation<sup>(1)</sup>.**

[1] Soit  $\Phi$  une surface algébrique dont le genre arithmétique  $\pi_a$  est au moins égal à  $-1$ . Considérons, sur cette surface  $\Phi$ , un système linéaire régulier  $|\Gamma|$ , simple, de degré  $n$ , de genre  $\pi$ , dépourvu de points-base et tel que

$$n - \pi > \pi_a + 1.$$

Le système  $|\Gamma|$  a, d'après le théorème de Riemann-Roch, la dimension

$$\rho = n - \pi + \pi_a + 1.$$

On supposera cette dimension au moins égale à trois; ceci n'est pas en réalité une condition nouvelle imposée à  $|\Gamma|$ , ce système ayant été supposé simple.

Il est toujours possible de trouver un système tel que  $|\Gamma|$ . Considérons en effet une transformée birationnelle de  $\Phi$  située dans un espace linéaire à trois dimensions; il suffit de prendre pour  $|\Gamma|$  le système correspondant à celui qui est découpé par les adjointes d'ordre suffisamment élevé sur cette transformée<sup>(2)</sup>.

Nous allons rechercher quelles sont les conditions auxquelles  $\Phi$  doit satisfaire pour qu'il existe une surface  $\Phi$  double douée d'un nombre fini de points de diramation. En d'autres termes, nous allons supposer que la surface  $\Phi$  est l'image d'une involution  $I_\lambda$ , d'ordre deux, ayant un nombre fini de points de coïncidence, appartenant à une surface algébrique  $F$ , et chercher les conditions d'existence de cette surface  $F$ .

Entre  $\Phi$  et  $F$ , nous aurons, par hypothèse, une correspondance  $(1,2)$ .

(<sup>1</sup>) Il est peut-être utile de rappeler la terminologie employée ici. Par *involution d'ordre  $n$*  appartenant à une surface algébrique  $F$ , on entend une variété  $\infty^2$  de groupes de  $n$  points de  $F$  telle qu'un point de la surface n'appartienne, en général, qu'à un seul de ces groupes. Un point de  $F$  est dit *point uni* ou *point de coïncidence* s'il doit être compté plusieurs fois dans le groupe dont il fait partie. Un système de courbes est *composé* avec une involution si les courbes de ce système passant par un point  $P$  passent en conséquence par les autres points du groupe de l'involution auquel  $P$  appartient. Un système de courbes qui n'est composé avec aucune involution est dit *simple*. Une surface  $\Phi$  représente (ou est l'image) d'une involution appartenant à une surface  $F$  s'il existe une correspondance birationnelle entre les points de  $\Phi$  et les groupes de l'involution. Un point de  $\Phi$  auquel correspond un groupe contenant un point uni (au moins) est dit *point de diramation* (de l'italien *diramazione*). Il existe en général  $\infty^4$  points de diramation formant la *courbe de diramation* et  $\infty^4$  points unis formant la *courbe unie*.

(<sup>2</sup>) F. ENRIQUES, *Introduzione alla Geometria sopra una superficie algebrica* (Memorie della Società Italiana delle Scienze, 1896, [3], X).

Désignons par  $C$  les courbes de  $F$  qui correspondent aux courbes  $\Gamma$ . Les courbes  $C$  appartiennent à un système linéaire complet  $|C|$  de degré  $2n$ .

Nous supposons le système  $|\Gamma|$  choisi de telle manière que ses courbes ne passent pas, en général, par un point de diramation de  $\Phi$ . Alors, le système  $|C|$  a le genre  $2\pi - 1$ .

Si  $p_a$  désigne le genre arithmétique de  $F$ , la dimension  $r$  de  $|C|$  est, d'après le théorème de Riemann-Roch,

$$r \geq 2n - 2\pi + p_a + 2 - i,$$

$i$  désignant l'indice de spécialité de  $|C|$ .

Observons que d'après un théorème de M. Enriques<sup>(1)</sup>, une courbe canonique de  $\Phi$  se transforme en une courbe canonique de  $F$ . Par conséquent, une courbe non-spéciale de  $\Phi$  se transforme en une courbe non-spéciale de  $F$ . Or, les courbes  $\Gamma$  ne sont pas spéciales, puisque  $|\Gamma|$  est régulier; donc les courbes  $C$  ne sont pas spéciales et  $i = 0$ .

Cela étant, pour que la dimension  $r$  de  $|C|$  soit supérieure à celle  $\rho$  de  $|\Gamma|$ , on doit avoir :

$$n - \pi > \pi_a - p_a - 1.$$

Cette inégalité est toujours vérifiée pour  $p_a \geq -1$ , d'après nos hypothèses. Si  $p_a$  est inférieur à  $-1$ ,  $F$  est réglée (ou réféable à une réglée) d'après un théorème de M. Castelnuovo<sup>(2)</sup>. Mais alors, à une génératrice de  $F$  correspond une courbe rationnelle sur  $\Phi$ . Cette surface est donc aussi réglée; c'est de plus, puisque  $\pi_a \geq -1$  par hypothèse, une réglée rationnelle ou elliptique. Il est aisé de voir que pour qu'entre les deux réglées  $\Phi$ ,  $F$ , on ait une correspondance  $(1, 2)$  sans courbe de diramation sur  $\Phi$ , ces réglées doivent être toutes deux elliptiques. On a donc  $p_a \geq -1$  et  $|C|$  a alors une dimension supérieure à celle de  $|\Gamma|$ .

Rapportons projectivement les courbes de  $|\Gamma|$  aux hyperplans d'un espace linéaire  $S_\rho$  à  $\rho$  dimensions. La surface  $\Phi$  se transforme birationnellement en une surface  $\Phi_0$ , simple, d'ordre  $n$ . Nous désignerons encore par  $|\Gamma|$  le système des sections hyperplanes de  $\Phi_0$ .

[2] Nous allons montrer qu'en chaque point de diramation,  $\Phi$  possède un point double conique.

Soit  $P$  un point de coïncidence de l'involution  $I_2$  sur  $F$ ; soit  $P'$  le point de diramation correspondant sur  $\Phi$ .

Le point  $P$  est un point de *coïncidence parfaite*, c'est-à-dire que, dans le domaine

(1) F. ENRIQUES, *Ricerche di Geometria sopra una superficie algebrica* (Memorie della R. Accademia di Torino, 1893, [2], XLIV).

(2) G. CASTELNUOVO, *Sulle superficie aventi il genere aritmetico negativo* (Rendiconti del Circolo Matem. di Palermo, 1905, XX).

de  $P$  sur la surface  $F$ , l'involution  $I_2$  opère comme l'identité. En d'autres termes, tout point de  $F$  infiniment voisin de  $P$ , compté deux fois, forme un groupe de  $I_2$ .

Supposons, en effet, qu'il n'en soit pas ainsi. Considérons sur la surface  $F$  un système linéaire simple, sans points-base  $|C_1|$ , et soit  $|C_2|$  son transformé au moyen de la correspondance birationnelle entre les points de  $F$  définie par  $I_2$ . Désignons par  $|C'|$  le système linéaire (en général incomplet)  $|C_1 + C_2|$  composé avec  $I_2$ . Si le point  $P$  n'est pas un point de coïncidence parfaite, une courbe  $C_1$  assujettie à la seule condition de passer par  $P$  est transformée par  $I_2$  en une courbe  $C_2$  passant par  $P$ , mais ne touchant pas en général  $C_1$  en ce point. Par conséquent, les courbes  $C'$  passant par  $P$  ont en général un point double à tangentes distinctes en  $P$ . Ces courbes contiennent une  $\gamma'_2$ , déterminée par  $I_2$  et représentée sur  $\Phi$  par une courbe d'un certain genre  $\gamma_1$ . Cette  $\gamma'_2$  n'ayant pas de points de coïncidence (puisque à un point infiniment voisin de  $P$  sur une branche d'une courbe  $C'$  correspond le point infiniment voisin de  $P$  sur l'autre branche), la formule de Zeuthen donne, pour le genre des  $C'$ ,  $2\gamma_1 - 1$ . Les courbes  $C'$  passant par  $P$  ont donc le genre virtuel  $2\gamma_1$  et les courbes  $C'$  ne passant pas par  $P$  ont le genre effectif  $2\gamma_1$ . Mais ces dernières courbes possèdent également une  $\gamma'_2$ , sans points de coïncidence, d'un certain genre  $\gamma'_1$ . La formule de Zeuthen donne  $4(\gamma'_1 - 1) = 2(2\gamma_1 - 1)$ , ce qui est absurde<sup>(1)</sup>.

Donc un point de coïncidence de  $I_2$  est un point de coïncidence parfaite.

Retournons aux systèmes  $|\Gamma|$  et  $|C|$  que nous avons construits plus haut. Soit  $\Gamma'$  une courbe  $\Gamma$  passant par  $P'$ ,  $C'$  la courbe correspondante sur  $F$ .

La courbe  $C'$  passe un nombre pair de fois par  $P$ , car, sur cette courbe, il y a une involution  $\gamma'_2$  déterminée par  $I_2$ , et une pareille involution a toujours un nombre pair de points de coïncidence. Soit  $2\varepsilon$  la multiplicité de  $P$  pour  $C'$ .

Chaque point de  $C'$  infiniment voisin de  $P$ , compté deux fois, forme un groupe de  $I_2$ . Il lui correspond donc, sur  $\Gamma'$ , un point infiniment voisin de  $P'$ . Par conséquent, la courbe  $\Gamma'$  aura, en  $P'$ , un point multiple d'indice  $2\varepsilon$  à tangentes distinctes. De plus, ces tangentes sont variables avec  $\Gamma'$ , car  $P$  est un point multiple à tangentes variables de  $C'$ ; donc  $\Phi_0$  a en  $P'$  un point multiple conique d'indice  $2\varepsilon$ . La courbe  $C'$  a le genre  $2\pi - \varepsilon(2\varepsilon - 1)$ , la courbe  $\Gamma'$  le genre  $\pi - 2\varepsilon + 1$ , car le point  $P'$  doit être considéré, au point de vue des transformations birationnelles, comme une courbe rationnelle de degré  $-2\varepsilon$ . Entre  $\Gamma'$  et  $C'$ , nous avons une correspondance  $(1, 2)$  ayant  $2\varepsilon$  coïncidences aux points de  $C'$  infiniment voisins de  $P$ . La formule de Zeuthen donne

$$4(\pi - 2\varepsilon) + 2\varepsilon = 4\pi - 4 - 2\varepsilon(2\varepsilon - 1).$$

On en déduit  $\varepsilon = 1$ . Par suite :

*En chaque point de diramation, la surface  $\Phi_0$  possède un point double conique.*

---

<sup>(1)</sup> Ce raisonnement a été employé par MM. ENRIQUES et SEVERI. Voir F. SEVERI, *Sulle superficie algebriche che ammettono...* (Atti Istituto Veneto, 1907, LXVII).

[3] Désignons par  $\sigma$  le nombre des points de diramation de  $\Phi_0$ . Chacun de ces points devant être considéré comme une courbe rationnelle de degré  $-2$ , nous désignerons respectivement par  $\Gamma_1, \Gamma_2, \dots, \Gamma_\sigma$  ces courbes.

La correspondance  $(1, 2)$  existant entre  $\Phi_0$  et  $F$  peut donc être considérée comme ayant, sur  $\Phi_0$ , une courbe de diramation  $\Gamma_1 + \Gamma_2 + \dots + \Gamma_\sigma$  composée de  $\sigma$  courbes rationnelles infiniment petites. Cette courbe a donc le genre  $1 - \sigma$  et le degré  $-2\sigma$ . Appliquons les formules de M. Severi à cette correspondance <sup>(1)</sup>, nous trouvons

$$\begin{aligned}\sigma &= 4(2\pi_a - p_a + 1), \\ p^{(a)} - 1 &= 2(\pi^{(a)} - 1),\end{aligned}$$

$p^{(a)}$  et  $\pi^{(a)}$  désignant respectivement les genres linéaires de  $F$  et de  $\Phi_0$ .

[4] Le système complet  $|C|$  est simple. En effet, par construction, il est plus ample que  $|\Gamma|$  et n'est donc pas composé avec  $I_1$ . D'autre part, s'il était composé avec une autre involution,  $|\Gamma|$  serait également composé avec une involution, ce qui est contre l'hypothèse.

Par conséquent, si nous rapportons projectivement les courbes de  $|C|$  aux hyperplans d'un espace linéaire  $S_r$  à  $r$  dimensions, la surface  $F$  se transformera en une surface simple, d'ordre  $2n$ , de cet  $S_r$ . Nous désignerons toujours cette surface par  $F$  et ses sections hyperplanes seront appelées  $C$ .

L'involution  $I_1$  transforme une courbe  $C$  en une courbe  $C$  en général distincte de la première. Par conséquent  $I_1$  est engendrée sur  $F$  par une homographie involutive de  $S_r$  laissant cette surface invariante. Cette homographie involutive possède deux espaces linéaires unis,  $A_1, A_2$ , dont les dimensions  $r_1, r_2$  respectives vérifient l'égalité

$$r_1 + r_2 = r - 1.$$

Les hyperplans de  $S_r$  passant par l'un de ces espaces, par exemple par  $A_1$ , découpent sur  $F$  les courbes  $C$  homologues des courbes de  $|\Gamma|$ . On doit donc avoir, le système complet  $|\Gamma|$  ayant la dimension  $\varphi$ ,  $r_1 = r - \varphi - 1$ . De plus,  $A_1$  ne peut pas rencontrer la surface  $F$ , car les courbes  $\Gamma$  ne passent pas, en général, par des points de diramation de  $\Phi_0$ .

L'espace  $A_2$  est de dimension  $r_2 = \varphi$  et tous les points unis de  $I_1$  doivent lui appartenir; il s'appuie donc en  $\sigma = 4(2\pi_a - p_a + 1)$  points sur  $F$ . Les hyperplans passant par  $A_2$  découpent sur  $F$  un système (incomplet) de genre  $2\pi - 1$ , possédant  $\sigma$  points-base et composé avec l'involution  $I_1$ .

Aux courbes de ce système correspondent, sur  $\Phi_0$ , certaines courbes  $\Gamma_0$  formant

---

<sup>(1)</sup> F. SEVERI, *Sulle relazioni che legano i caratteri invarianti...* (Rend. R. Istituto Lombardo, 1903, [2], XXXVI).



un système linéaire  $|\Gamma_0|$  de dimension  $r - \rho - 1$  égale au nombre d'hyperplans passant par  $A_1$ .

Entre une courbe  $\Gamma_0$  et sa transformée, nous avons une correspondance  $(1, 2)$  ayant  $\sigma$  points de coïncidence. Ces courbes  $\Gamma_0$  ont donc, d'après la formule de Zeuthen, le genre  $\pi = (2\pi_a - p_a + 1)$ .

Le système découpé sur  $F$  par les hyperplans contenant  $A_1$  étant de degré  $2n$  et ayant  $\sigma$  points-base,  $|\Gamma_0|$  a le degré  $n - 2(2\pi_a - p_a + 1)$ . De plus, les courbes  $\Gamma_0$  sont d'ordre  $n$ , car elles rencontrent chaque section hyperplane  $\Gamma$  de  $\Phi_0$  en  $n$  points.

A une courbe  $C$  non homologue d'une courbe  $\Gamma$  ou d'une courbe  $\Gamma_0$  correspond, sur  $\Phi_0$ , une courbe  $D$  de genre effectif  $2\pi - 1$ . A chacun des  $n$  groupes de  $I_2$  situés sur cette courbe  $C$  correspond un point double de cette courbe  $D$  de  $\Phi_0$ . Elle a donc  $n$  points doubles et son genre virtuel est par suite  $2\pi + n - 1$ .

Faisons varier la courbe  $C$  considérée de manière à ce que l'hyperplan qui la contient passe par  $A_1$ . La courbe  $D$  se réduit alors à la courbe  $2\Gamma$ . Donc les courbes de  $\Phi_0$  qui correspondent aux courbes génériques de  $|C|$  appartiennent au système  $|2\Gamma|$ .

Considérons encore une courbe  $C$  non homologue d'une courbe  $\Gamma$  et  $\Gamma_0$  et faisons-la varier de manière à ce qu'elle vienne coïncider avec une courbe  $C$  dont l'hyperplan contient  $A_1$ . La courbe  $D$  correspondante sur  $\Phi_0$  se réduit à

$$2\Gamma_0 + \Gamma_1 + \Gamma_2 + \dots + \Gamma_\sigma.$$

On a donc

$$2\Gamma_0 + \Gamma_1 + \Gamma_2 + \dots + \Gamma_\sigma \equiv 2\Gamma.$$

[5] Pour établir que l'existence des  $\sigma$  points doubles coniques et du système  $|\Gamma_0|$  est suffisante pour que,  $\Phi_0$  étant donnée,  $F$  existe, il faut tout d'abord faire une remarque bien simple de géométrie projective.

Considérons les hypersurfaces  $V$  de  $S_\rho$  découpant, sur  $\Phi_0$ , les courbes du système complet  $|2\Gamma|$  <sup>(1)</sup>. Exprimer qu'une courbe de  $|2\Gamma|$  a une partie double, c'est dire qu'elle est découpée sur  $\Phi_0$  par une hypersurface touchant  $\Phi_0$  en chaque point de cette partie double. Ainsi, une courbe de  $|2\Gamma|$  se réduisant à une section hyperplane  $\Gamma$  comptée deux fois est découpée sur  $\Phi_0$  par une hyperquadrique réductible en un hyperplan double; cette hyperquadrique doit donc être considérée comme touchant  $\Phi_0$  en chaque point de la courbe d'intersection.

D'après cela, une courbe  $\Gamma_0$  quelconque sera découpée par une des hypersurfaces  $V$  considérées, passant par les  $\sigma$  points doubles et touchant  $\Phi_0$  en chaque point de la courbe  $\Gamma_0$ .

---

(1) Si  $\Phi_0$  est dépourvue de lignes multiples, les  $V$  sont des hyperquadriques.

Soient

$$\varphi_1(x_1, x_2, \dots, x_r) = 0, \quad \varphi_2(x_1, x_2, \dots, x_r) = 0, \quad \dots, \quad \varphi_{r-2}(x_1, x_2, \dots, x_r) = 0$$

les équations de la surface  $\Phi_0$ ,

$$f(x_1, x_2, \dots, x_r) = 0$$

l'équation d'une des hypersurfaces  $V$  considérée, touchant  $\Phi_0$  le long d'une courbe  $\Gamma_0$ , les  $x_1, x_2, \dots, x_r$  désignant les coordonnées cartésiennes de  $S_r$ .

Considérons la surface représentée par les équations

$$(1) \quad \varphi_1 = 0, \quad \varphi_2 = 0, \quad \dots, \quad \varphi_{r-2} = 0, \quad x_{r+1}^2 = f,$$

et rappelons que les composantes doubles de la courbe de diramation d'une surface double doivent être défalquées de cette courbe.

La courbe de diramation de la surface double (1) est la courbe intersection de la surface  $\Phi_0$  et de l'hypersurface  $f = 0$ . Or, le polynôme  $f$  a été choisi de telle sorte que cette intersection est

$$2\Gamma_0 + \Gamma_1 + \Gamma_2 + \dots + \Gamma_\sigma.$$

Par conséquent, il n'y a diramation que dans les domaines des  $\sigma$  points doubles coniques de  $\Phi_0$ .

En d'autres termes, la surface double (1), irréductible, ne possède qu'un nombre fini de points de diramation. On voit donc que l'existence des  $\sigma$  points doubles et du système  $|\Gamma_0|$  est suffisante.

[6] Nous allons faire subir une petite modification au théorème précédent, modification qui nous sera utile dans la suite.

Considérons une transformée birationnelle  $\Phi'$  de la surface  $\Phi_0$  qui soit dépourvue de points multiples. On sait que cela est toujours possible pourvu que la surface  $\Phi'$  se trouve dans un espace linéaire ayant au moins cinq dimensions.

Sur la surface  $\Phi'$ , aux  $\sigma$  points doubles coniques de diramation correspondent  $\sigma$  courbes rationnelles de degré  $-2$ , sans points communs, que nous désignerons toujours par respectivement  $\Gamma'_1, \Gamma'_2, \dots, \Gamma'_\sigma$ .

Considérons, sur la surface  $\Phi'$ , un système linéaire complet  $|\Gamma'|$ , de degré  $n'$  et de genre  $\pi'$ , quelconque, mais dont les courbes ne rencontrent pas, en général, les courbes  $\Gamma'_1, \Gamma'_2, \dots, \Gamma'_\sigma$ . Soit  $|C'|$  le système linéaire complet, de degré  $2n'$  et de genre  $2\pi' - 1$ , comprenant les transformées des courbes  $\Gamma'$  sur  $F$ .

On pourra toujours trouver un entier  $k \geq 1$  tel que le système complet  $|kC'|$  soit

plus ample que le système  $|k\Gamma'|$ . Il suffit de prendre  $k$  suffisamment grand pour que la dimension effective de  $|k\Gamma'|$  soit égale à sa dimension virtuelle

$$\frac{1}{2}k(k+1)n' - (k-1)\pi' + \pi_a,$$

et que l'on ait en plus

$$\frac{1}{2}k(k+1)n' - (k-1)\pi' > \pi_a + 2.$$

Alors, d'après le théorème de Riemann-Roch, le système  $|kC'|$  a une dimension au moins égale à

$$k(k+1)n' - (k-1)(2\pi' - 1) + p_a,$$

par conséquent supérieure à celle de  $|k\Gamma'|$ .

L'involution  $I_2$  change en lui-même le système  $|kC'|$  sans cependant changer en elles-mêmes toutes les courbes de ce système. Dans le système  $|kC'|$ , où l'on considère les courbes comme éléments,  $I_2$  engendre donc une homographie involutive. Il y aura donc deux systèmes linéaires partiels, dans  $|kC'|$ , composé avec  $I_2$  : l'un est formé par les courbes  $kC'$  homologues des courbes  $k\Gamma'$  et n'a donc, pour point-base, aucun point uni de  $I_2$ ; l'autre a les points unis de  $I_2$  pour points-base et il lui correspond sur  $\Phi'$  un système linéaire  $|\Gamma'_{ok}|$ . On démontrerait comme précédemment que l'on a

$$2\Gamma'_{ok} + \Gamma_1 + \Gamma_2 + \dots + \Gamma_\sigma \equiv 2k\Gamma'.$$

Cela signifie que parmi les hypersurfaces découpant sur  $\Phi'$  le système  $|2k\Gamma'|$ , il y en a qui passent (un nombre impair de fois) par les courbes  $\Gamma_1, \Gamma_2, \dots, \Gamma_\sigma$  et qui touchent  $\Phi'$  en chaque point de leur intersection  $\Gamma'_{ok}$  avec cette surface.

En particulier, soit  $|\Gamma'|$  un système dépourvu de points-base, simple, tel que le système  $|C'|$  ne soit pas plus ample que  $|\Gamma'|$ . En rapportant projectivement les courbes  $\Gamma'$  aux hyperplans d'un espace linéaire (dont la dimension  $\varphi'$  égale celle de  $|\Gamma'|$ ),  $\Phi'$  se transforme en une surface  $\Phi'_0$  ayant  $\sigma$  points doubles coniques. Soient

$$\psi'_1(x_1, x_2, \dots, x_{\varphi'}) = 0, \quad \dots, \quad \psi'_{\varphi'-2}(x_1, x_2, \dots, x_{\varphi'}) = 0$$

les équations de  $\Phi'_0$ . La surface  $F$  a pour équations

$$z'_1 = 0, \quad z'_2 = 0, \quad \dots, \quad z'_{\varphi'-2} = 0, \quad x_{\varphi'+1}^2 = f'_k(x_1, x_2, \dots, x_{\varphi'}),$$

$f'_k(x_1, x_2, \dots, x_{\varphi'}) = 0$  étant une hypersurface passant par les points doubles et touchant  $\Phi'_0$  le long d'une courbe  $\Gamma'_{ok}$ . On voit donc que :

*Pour qu'une surface simple, normale, représente une involution d'ordre deux, douée d'un nombre fini de points unis, appartenant à une certaine surface algébrique, il faut et il suffit que :*

- 1° La surface possède en chaque point de diramation un point double conique ;  
 2° Le nombre de ces points de diramation soit multiple de quatre ;  
 3° Parmi les hypersurfaces découpant le système  $2k$  — uple du système des sections hyperplanes, il y en ait qui passent par les points de diramation et touchent la surface en chaque point d'intersection.

[7] Retournons à la surface  $\Phi_0$  du n° 5 et supposons que cette surface possède une involution  $I'_2$  d'ordre deux. Cette involution sera engendrée sur  $\Phi_0$  par une transformation birationnelle de cette surface en elle-même. Soient

$$x'_i = \gamma_i(x_1, x_2, \dots, x_r) \quad (i = 1, 2, \dots, r)$$

les formules qui définissent cette transformation ; les  $\gamma_i$  sont donc des fonctions rationnelles réversibles de leurs arguments.

La surface F, dont les équations sont (n° 5)

$$\varphi_1 = 0, \quad \varphi_2 = 0, \quad \dots, \quad \varphi_{r-2} = 0, \quad x_{r+1}^2 = f,$$

admet trois transformations birationnelles en elle-même, à savoir :

$$\begin{aligned} \text{(I)} \quad & x'_i = x_i, \quad x'_{r+1} = -x_{r+1}; \\ \text{(II)} \quad & x'_i = \gamma_i, \quad x'_{r+1} = +x_{r+1}; \\ \text{(III)} \quad & x'_i = \gamma_i, \quad x'_{r+1} = -x_{r+1}; \\ & (i = 1, 2, \dots, r). \end{aligned}$$

La première de ces transformations engendre l'involution  $I_2$ , les autres engendrent respectivement des involutions d'ordre deux que nous désignerons par  $I_2^{(1)}$ ,  $I_2^{(2)}$ .

Les trois transformations qui viennent d'être définies sont deux à deux permutable. Elles engendrent une involution d'ordre quatre à chaque groupe de laquelle correspond, sur  $\Phi_0$ , un groupe de  $I'_2$ .

La remarque que nous voulons faire ici concerne le cas où les involutions  $I_2^{(1)}$ ,  $I_2^{(2)}$  ont toutes deux une infinité de points de coïncidence formant des courbes que nous désignerons respectivement par  $D_1$ ,  $D_2$ .

Remarquons tout d'abord que :

1° Si un point de F est uni pour deux des trois involutions  $I_2$ ,  $I_2^{(1)}$ ,  $I_2^{(2)}$ , il l'est pour la troisième et il lui correspond, sur  $\Phi_0$ , un point uni de  $I'_2$ .

2° Si un point de F est uni pour  $I_2$  mais non pour  $I_2^{(1)}$ ,  $I_2^{(2)}$ , ces involutions le transforment en un même point uni pour  $I_2$ .

3° Si un point de F est uni pour  $I_2^{(1)}$  (ou  $I_2^{(2)}$ ) mais non pour  $I_2$  et  $I_2^{(2)}$  (ou  $I_2^{(1)}$ ),  $I_2$  et  $I_2^{(2)}$  (ou  $I_2^{(1)}$ ) transportent ce point en un point uni pour la même involution. Par conséquent  $D_1$ ,  $D_2$  sont transformées en elles-mêmes par  $I_2$ .

Soient  $\Delta_1, \Delta_2$  les courbes qui correspondent sur  $\Phi_0$  à  $D_1, D_2$  respectivement. Des trois remarques qui précèdent, on déduit que :

- 1° L'involution  $I'_2$  a comme courbe de coïncidence la courbe  $\Delta_1 + \Delta_2$ ;
- 2° Les points communs à ces deux courbes sont des points de diramation de  $\Phi_0$ ;
- 3° Les points de diramation de  $\Phi_0$  non situés sur  $\Delta_1, \Delta_2$  se groupent en couples conjugués par rapport à  $I'_2$ ;
- 4° Le nombre des points de diramation de  $\Phi_0$  étant pair,  $\Delta_1$  et  $\Delta_2$  ont un nombre pair d'intersections.

Considérons, dans un espace linéaire  $S_v$  à  $v$  dimensions ( $v \geq 2$ ), une surface normale  $\Psi$  image de l'involution  $I'_2$ . Supposons qu'aux sections hyperplanes de  $\Psi$  correspondent sur  $\Phi_0$  des courbes ne passant pas, en général, par les  $\sigma$  points doubles de diramation.

Désignons par  $\Delta_1^c, \Delta_2^c$  les courbes qui correspondent sur  $\Psi$  aux courbes  $\Delta_1, \Delta_2$  respectivement et soit  $2\tau$  le nombre de points communs à ces deux courbes ( $2\tau \leq \sigma$ ).

Aux  $\sigma$  points de diramation de  $\Phi_0$  correspondent, sur  $\Psi$  :

1°  $2\tau (\leq \sigma)$  points communs à  $\Delta_1^c, \Delta_2^c$ , c'est-à-dire  $2\tau$  points doubles de la courbe diramation  $\Delta_1^c + \Delta_2^c$  de  $\Phi_0$  considérée comme surface  $\Psi$  double.

2°  $\frac{1}{2}\sigma - \tau$  points doubles coniques de  $\Psi$ .

Pour notre objet, nous supposons  $2\tau = \sigma$ . Soient alors

$$\psi_1(x_1, x_2, \dots, x_v) = 0, \quad \psi_2(x_1, x_2, \dots, x_v) = 0, \quad \dots, \quad \psi_{v-2}(x_1, x_2, \dots, x_v) = 0$$

les équations de la surface  $\Psi$  en coordonnées cartésiennes,

$$f_1(x_1, x_2, \dots, x_v) = 0, \quad f_2(x_1, x_2, \dots, x_v) = 0$$

les équations de deux hypersurfaces découpant respectivement  $\Delta_1^c, \Delta_2^c$  sur la surface  $\Psi$ .

La surface  $\Phi_0$  a pour équations

$$\psi_1 = 0, \quad \psi_2 = 0, \quad \dots, \quad \psi_{v-2} = 0, \quad x_{v+1}^2 = f_1 f_2,$$

et la surface  $F$ ,

$$\psi_1 = 0, \quad \psi_2 = 0, \quad \dots, \quad \psi_{v-2} = 0, \quad x_{v+1}^2 = f_1, \quad x_{v+2}^2 = f_2.$$

Inversement :

*Si une surface double possède une courbe de diramation formée de deux parties  $\Delta_1^c, \Delta_2^c$ , elle est l'image d'une involution d'ordre deux douée d'un nombre fini de points*

de coïncidence, appartenant à une surface algébrique. Le nombre des points de coïncidence est égal au nombre des intersections de  $\Delta_1^o, \Delta_2^o$ .

En particulier, si  $\Psi$  est un plan, on a nécessairement  $2\tau = \tau$ , car un plan ne peut évidemment pas avoir de points doubles. On obtient ainsi le théorème dont nous ferons usage dans la suite :

*Un plan double dont la courbe de diramation se scinde en deux parties :*

$$z^2 = f_1(x, y)f_2(x, y),$$

*est l'image d'une involution d'ordre deux, ayant un nombre fini de points unis, appartenant à la surface*

$$z^2 = f_1(x, y), \quad u^2 = f_2(x, y).$$

Notons que la courbe  $f_1(x, y)f_2(x, y)$  est d'ordre pair et que les courbes  $f_1 = 0, f_2 = 0$  ne peuvent avoir de partie commune (à cause de l'hypothèse faite sur les sections hyperplanes de  $\Psi$ ), ces deux courbes ont donc l'ordre pair.

### Surfaces de genres un doubles douées d'un nombre fini de points de diramation.

[8] Supposons que la surface  $\Phi$  soit une surface de genres un. Cette surface est caractérisée par deux conditions<sup>(1)</sup> :

1° Son genre arithmétique est  $\pi_a = 1$  ;

2° Son quadrigenre est  $\Pi_4 = 1$ .

Toute courbe de genre virtuel  $\pi$ , tracée sur  $\Phi$ , appartient totalement à un système linéaire de degré  $2\pi - 2$  et de dimension  $\pi$ , dépourvu de points-base. Ce système est son propre adjoint.

Les courbes canoniques et pluricanoniques de  $\Phi$  sont d'ordre zéro.

Il résulte de ceci qu'une surface normale  $\Phi_0$  birationnellement identique à  $\Phi$  est d'ordre  $2\pi - 2$ , située dans un espace  $S_\pi$  et que ses sections hyperplanes sont de genre  $\pi$ .

Nous allons voir que la surface  $F$  qui, par hypothèse, contient une involution d'ordre deux douée d'un nombre fini de points unis, dont  $\Phi$  est une image, est une surface hyperelliptique de Picard ( $p_a = -1, p_g P_4 = 1$ ) ou une surface de genres un ( $p_a = P_4 = 1$ ).

---

<sup>(1)</sup> F. ENRIQUES, *Intorno alle superficie algebriche di genere lineare  $p^{(u)} = 1$*  (Rend. R. Accad. di Bologna, 1906).

En effet, il résulte d'un théorème de M. Enriques déjà invoqué plusieurs fois (n° 1, 2) qu'une courbe  $i$  — canonique de  $\Phi$  se transforme en une courbe  $i$  — canonique de  $F$ . Or,  $\Phi$  possède une seule courbe  $i$  — canonique d'ordre zéro, donc la courbe  $i$  — canonique de  $F$  est unique et d'ordre zéro; par suite, on a :

$$p_g = P_1 = P_2 = P_3 = \dots = P_i = \dots = 1.$$

Il en résulte  $p_a = \pm 1$  <sup>(1)</sup>.

Si  $p_a = -1$ ,  $F$  est une surface hyperelliptique (de Picard ou, en particulier, de Jacobi) et  $\Phi_0$  est une surface de Kummer généralisée. On a  $\sigma = 16$ .

Si  $p_a = +1$ ,  $F$  est une surface de genres un. On a  $\sigma = 8$ .

[9] Envisageons le cas où  $F$  est une surface de Picard ou, en particulier, une surface de Jacobi ( $p_a = -1$ ,  $p_g P_1 = 1$ ). La surface  $\Phi_0$  est alors une surface d'ordre  $2\pi - 2$ , de  $S_\pi$ , à sections hyperplanes de genre  $\pi$  ( $\pi \geq 3$ ), possédant seize points doubles coniques.

Soit  $|\Gamma|$  le système des sections hyperplanes de  $\Phi_0$  et soit  $|C|$  le système de  $F$  comprenant les transformées des courbes  $\Gamma$ .  $|C|$  a le degré  $4\pi - 4$ , le genre  $2\pi - 1$  et la dimension  $2\pi - 3$  <sup>(2)</sup>. Par conséquent, sauf pour  $\pi = 3$ ,  $|C|$  est plus ample que  $|\Gamma|$ . On pourra donc appliquer le théorème établi au n° 5 aux surfaces  $\Phi_0$  pour lesquelles  $\pi > 3$  et le théorème du n° 6 aux surfaces  $\Phi_0$  pour lesquelles  $\pi = 3$ .

Les conditions nécessaires et suffisantes pour qu'une surface algébrique d'ordre  $2\pi - 2$ , de  $S_\pi$ , à sections hyperplanes de genre  $\pi$  ( $\pi \geq 4$ ), représente une involution d'ordre deux appartenant à une surface de Picard, sont :

1° Que cette surface possède seize points doubles coniques;

2° Qu'il y ait des hyperquadriques passant par ces seize points doubles et touchant la surface en chaque point de la courbe d'intersection.

Ce théorème n'est pas nouveau, il a été établi par MM. Enriques et Severi d'une manière plus précise, permettant notamment de déterminer la valeur du diviseur de la surface de Picard <sup>(3)</sup>.

Pour le cas  $\pi = 3$ , on a ce théorème :

Les conditions nécessaires et suffisantes pour qu'une surface d'ordre quatre représente une involution d'ordre deux appartenant à une surface de Picard sont que :

<sup>(1)</sup> ENRIQUES, *Intorno...* (*loc. cit.*).

<sup>(2)</sup> ENRIQUES et SEVERI, *Mémoire sur les surfaces hyperelliptiques* (Acta Mathematica, 1909, XXXII, XXXIII).

<sup>(3)</sup> ENRIQUES et SEVERI, *Surfaces hyperelliptiques* (*loc. cit.*, 1<sup>re</sup> partie, nos 50, 51, 52 et 53).

1° Elle ait seize points doubles coniques :

2° Il y ait des surfaces du quatrième ordre passant par les seize points doubles et touchant la surface en chaque point de la courbe d'intersection (d'ordre huit et de genre cinq).

On sait qu'actuellement la surface de Picard est de diviseur un (surface de Jacobi) et que la deuxième condition est une conséquence nécessaire de la première<sup>(1)</sup>.

Nous ne nous arrêterons pas plus longtemps sur ces propriétés bien connues.

[10] Passons au cas où  $F$  est une surface de genres un ( $p_a = P_a = 1$ ). On a  $\sigma = 8$  et la surface  $\Phi_0$  est une surface d'ordre  $2\pi - 2$ , à sections de genre  $\pi (\geq 3)$ , de  $S_\pi$ .

Le système linéaire comprenant les transformées des sections hyperplanes de  $\Phi_0$  sur  $F$  a le degré  $4\pi - 4$ , le genre  $2\pi - 1$  et la dimension  $2\pi - 1$  toujours supérieure à celle,  $\pi$ , du système des sections hyperplanes de  $\Phi_0$ . Par conséquent :

*Les conditions nécessaires et suffisantes pour qu'une surface normale de genres un représente une involution d'ordre deux appartenant à une surface de genres un, sont que :*

1° La surface possède huit points doubles coniques, et que :

2° Il y ait des hyperquadrriques passant par ces huit points doubles et touchant la surface en chaque point de leur courbe d'intersection.

Si nous désignons comme d'habitude par  $|\Gamma|$  le système des sections hyperplanes de  $\Phi_0$  et par  $|\Gamma_0|$  le système découpé par les hyperquadrriques tangentes à  $\Phi_0$ ,  $|\Gamma|$  a le degré  $2\pi - 6$ , le genre et la dimension  $\pi - 2$ , et on a :

$$2\Gamma_0 + \Gamma_1 + \Gamma_2 + \dots + \Gamma_s \equiv 2\Gamma.$$

Nous appliquerons ce théorème successivement dans les cas  $\pi = 3$ ,  $\pi = 4$  : nous nous occuperons ensuite des plans doubles de genres un. Rappelons que nous avons déjà construit une surface de genres un possédant une involution d'ordre deux et de genres un, correspondant au cas  $\pi = 6$ <sup>(2)</sup>.

[11] Une surface du quatrième ordre  $\Phi_0$ , sans lignes multiples, pour pouvoir représenter une involution d'ordre deux appartenant à une surface de genres un (une section plane n'ayant pas, en général, de diramation) doit posséder huit points doubles coniques et il doit y avoir  $\infty^1$  quadriques passant par ces huit points et touchant  $\Phi_0$  le long de quartiques gauches elliptiques  $\Gamma_0$ .

<sup>(1)</sup> ENRIQUES et SEVERI, *Surfaces hyperelliptiques* (loc. cit., 1<sup>re</sup> partie, nos 46, 47, 48, 49).

<sup>(2)</sup> L. GODEAUX, *Sur la surface du quatrième ordre contenant une sextique gauche de genre trois* (Bull. de l'Acad. des Sc. de Cracovie, 1913).



Par une quartique  $\Gamma_0^3$  passent  $\infty^1$  quadriques dont une touche  $\Phi_0$ . Ces quadriques découpent, sur  $\Phi_0$ , le faisceau  $|\Gamma_0^3|$ . En effet, les quadriques passant par  $\Gamma_0^3$  découpent sur  $\Phi_0$  un faisceau de quartiques elliptiques, l'une de celles-ci est  $\Gamma_0^3$ ; une surface de genres un ne pouvant posséder deux faisceaux de courbes elliptiques ayant une courbe commune (car alors on obtiendrait un réseau de genre 1), notre assertion s'en suit.

A chaque  $\Gamma_0^3$  est donc attaché un faisceau de quadriques et tous ces faisceaux sont nécessairement différents. Par suite, les huit points doubles de  $\Phi_0$  appartiennent à  $\infty^2$  quadriques, ils sont les points-base d'un réseau de quadriques.

Cette dernière propriété n'est pas une conséquence de l'existence des huit points doubles arbitraires<sup>(1)</sup>.

Les surfaces du quatrième ordre ayant huit points doubles coniques  $P_1, P_2, \dots, P_8$ , communs à  $\infty^2$  quadriques, sont  $\infty^5$ . En effet, si nous désignons par  $P_1, P_2, \dots, P_8$  les huit points doubles de  $\Phi_0$ , les surfaces d'ordre quatre ayant ces mêmes points doubles découpent, sur  $\Phi_0$ , le système  $|4\Gamma_0^3|$ , réductible,  $\infty^4$ .

D'autre part, l'enveloppe d'un système d'indice deux de quadriques passant par  $P_1, P_2, \dots, P_8$  est une surface d'ordre quatre, ayant des points doubles coniques en  $P_1, P_2, \dots, P_8$ . Dans le réseau des quadriques ayant les points-base  $P_1, P_2, \dots, P_8$ , il y a  $\infty^5$  séries d'indice deux.

Observons que la surface  $\Phi_0$  ne possède qu'un faisceau de quartiques elliptiques et que l'enveloppe d'une série d'indice deux de quadriques passant par  $P_1, P_2, \dots, P_8$  jouit de la même propriété, c'est-à-dire qu'elle ne peut, en général, être obtenue que d'une façon par ce procédé. Par suite,  $\Phi_0$  est l'enveloppe d'une série d'indice deux de quadriques.

*Si une surface du quatrième ordre représente une involution d'ordre deux appartenant à une surface de genres un (de manière qu'une section plane n'ait pas, en général, de points de diramation), elle est l'enveloppe d'une série d'indice deux de quadriques ayant huit points communs (et huit seulement).*

[12] Considérons une surface  $\Phi_0$  d'ordre six, de  $S_4$  à sections hyperplanes  $\Gamma$  de genre quatre. Pour qu'elle représente une involution d'ordre deux appartenant à une surface  $F$  de genres un, il faut qu'elle ait huit points doubles coniques  $P_1, P_2, \dots, P_8$  et qu'il y ait  $\infty^2$  hyperquadriques passant par  $P_1, P_2, \dots, P_8$  et touchant  $\Phi_0$  le long de courbes  $\Gamma_0^3$  de genre deux.

Le système  $|\Gamma_0^3|$ , de genre deux, a le degré deux. Il définit donc une transformation birationnelle de  $\Phi_0$  en elle-même.

---

<sup>(1)</sup> Voir par exemple K. ROHS, *Ueber Flächen 4. Ordnung mit acht bis sechzehn Knotenpunkten* (Berichte K. Gesellsch. zu Leipzig, 1884, XXXVI).

Soient

$$\varphi_1(x_0, x_1, x_2, x_3, x_4) = 0, \quad \varphi_2(x_0, x_1, x_2, x_3, x_4) = 0$$

les équations de  $\Phi_0$  en coordonnées homogènes,

$$f(x_0, x_1, x_2, x_3, x_4) = 0$$

l'équation d'une hyperquadrique touchant  $\Phi_0$  le long d'une courbe  $\Gamma_0$ . On sait que la surface  $\Phi_0$  est l'intersection d'une hyperquadrique et d'une hypersurface cubique :  $\varphi_1$  sera donc du deuxième,  $\varphi_2$  du troisième degré.

Soient

$$x'_0 : x'_1 : x'_2 : x'_3 : x'_4 = \gamma_0(x_0, x_1, x_2, x_3, x_4) : \gamma_1 : \gamma_2 : \gamma_3 : \gamma_4$$

les équations de la transformation birationnelle de  $\Phi_0$  en elle-même. Cette transformation change en elle-même toute courbe  $\Gamma_0$ , c'est-à-dire le système des solutions communes aux équations  $\varphi_1 = 0$ ,  $\varphi_2 = 0$ ,  $f = 0$ .

La surface F peut être représentée par les équations

$$\begin{aligned} \gamma_0 = x_0, \quad \gamma_1 = x_1, \quad \gamma_2 = x_2, \quad \gamma_3 = x_3, \quad \gamma_4 = x_4, \quad \varphi_1 = 0, \quad \varphi_2 = 0, \\ \gamma_5^2 = f(\gamma_0, \gamma_1, \gamma_2, \gamma_3, \gamma_4). \end{aligned}$$

Cette surface admet trois transformations birationnelles en elle-même, à savoir :

$$\begin{aligned} \text{(I)} \quad & \gamma'_0 : \gamma'_1 : \gamma'_2 : \gamma'_3 : \gamma'_4 : \gamma'_5 = \gamma_0 : \gamma_1 : \gamma_2 : \gamma_3 : \gamma_4 : -\gamma_5; \\ \text{(II)} \quad & \gamma'_0 : \gamma'_1 : \gamma'_2 : \gamma'_3 : \gamma'_4 : \gamma'_5 = \gamma_0 : \gamma_1 : \gamma_2 : \gamma_3 : \gamma_4 : \gamma_5; \\ \text{(III)} \quad & \gamma'_0 : \gamma'_1 : \gamma'_2 : \gamma'_3 : \gamma'_4 : \gamma'_5 = \gamma_0 : \gamma_1 : \gamma_2 : \gamma_3 : \gamma_4 : -\gamma_5. \end{aligned}$$

Ces trois transformations sont deux à deux permutable.

La première engendre l'involution  $I_1$  dont  $\Phi_0$  est l'image; elle admet donc huit points invariants (unis de  $I_1$ ).

La transformation (II) engendre une involution  $I'_2$  d'ordre deux et laisse invariants tous les points pour lesquels on a

$$\begin{aligned} \frac{\gamma_0}{\gamma_0(\gamma_0, \gamma_1, \gamma_2, \gamma_3, \gamma_4)} = \frac{\gamma_1}{\gamma_1} = \frac{\gamma_2}{\gamma_2} = \frac{\gamma_3}{\gamma_3} = \frac{\gamma_4}{\gamma_4}, \\ \varphi_1(\gamma) = 0, \quad \varphi_2(\gamma) = 0, \quad \gamma_5^2 = f(\gamma). \end{aligned}$$

Ces points sont en nombre infini; ils correspondent, sur F, aux points de la jacobienne  $\Delta$  du réseau de genre deux  $|\Gamma_0|$ .

La transformation (III) ne peut laisser invariant aucun point de F en dehors des points invariants pour (I) ou (II). On sait d'ailleurs que si un point est invariant pour (III) et pour l'une des transformations (I), (II), il l'est pour l'autre. Les points invariants pour (III) sont donc des points unis de  $I_1$ .

Remarquons que si un point uni de  $I_2$  est invariant pour la transformation (II), la jacobienne  $\Delta$  de  $|\Gamma_0|$  passe par le point de diramation correspondant de  $\Phi_0$ . En d'autres termes, si  $\Gamma_1, \Gamma_2, \Gamma_3$  désignent les courbes rationnelles de degré  $-2$  équivalentes aux points doubles de  $\Phi_0$ ,  $\Delta$  contient comme partie l'une de ces courbes. Or,  $\Delta$  rencontre en six points chaque courbe  $\Gamma_0$  (de degré deux) et chaque courbe  $\Gamma_0$  rencontre en un point chacune des courbes  $\Gamma_1, \Gamma_2, \dots, \Gamma_8$ . On en conclut que la transformation (III) laisse au plus six points unis de  $I_2$  invariants.

La transformation (III) engendre une involution  $I_2''$  d'ordre deux. Cette involution possède, d'après ce que nous venons de voir, un certain nombre  $\tau$  de points unis ( $0 \leq \tau \leq 6$ ). Si  $\pi'_a$  désigne le genre arithmétique d'une surface image de l'involution  $I_2''$ , nous avons, d'après ce qui a été établi dans la première partie,  $\tau = 8\pi'_a$ . Par conséquent, on a  $0 \leq 8\pi'_a \leq 6$ , c'est-à-dire  $\pi'_a = 0$ ,  $\tau = 0$ . Ainsi, l'involution  $I_2''$  ne possède aucun point uni et, par conséquent, la jacobienne  $\Delta$  de  $|\Gamma_0|$  ne passe par aucun des points  $P_1, P_2, \dots, P_8$ .

Observons que les transformations (II) et (III) transportent un point uni de  $I_2$  en un autre point uni de  $I_2$ . Par conséquent, la transformation de  $\Phi_0$  en elle-même définie par le réseau de degré deux  $|\Gamma_0|$  fait correspondre quatre des courbes  $\Gamma_1, \Gamma_2, \dots, \Gamma_8$  aux quatre autres. Pour fixer les idées, nous supposons que les courbes  $\Gamma_3, \Gamma_6, \Gamma_7, \Gamma_8$  correspondent respectivement aux courbes  $\Gamma_1, \Gamma_2, \Gamma_5, \Gamma_4$ .

Rapportons projectivement les courbes  $\Gamma_0$  aux droites d'un plan  $\alpha$ . La surface  $\Phi_0$  se transforme en un plan  $\alpha$  double dont la courbe de diramation  $D$  est du sixième ordre et correspond à la jacobienne  $\Delta$  de  $|\Gamma_0|$ .

Aux couples de courbes  $\Gamma_1, \Gamma_5; \Gamma_2, \Gamma_6; \Gamma_3, \Gamma_7; \Gamma_4, \Gamma_8$  correspondent respectivement des droites  $D_1, D_2, D_3, D_4$ . Comme deux des courbes  $\Gamma_1, \Gamma_2, \dots, \Gamma_8$  ne peuvent avoir de points communs, il faut nécessairement que la courbe  $D$  passe deux fois par chaque sommet du quadrilatère complet formé par les quatre droites  $D_1, D_2, D_3, D_4$ .

*Si une surface d'ordre six, de  $S_4$ , à sections hyperplanes de genre un, représente une involution d'ordre deux appartenant à une surface de genres un, de manière qu'une section hyperplane n'ait généralement aucun point de diramation, on peut la transformer birationnellement en un plan double dont la courbe de diramation, d'ordre six, possède six points doubles qui sont les sommets d'un quadrilatère complet.*

Il est aisé de former l'équation de ce plan double. Soient

$$z_i(x, y) \equiv a_i x + b_i y + c_i = 0 \quad (i = 1, 2, 3, 4)$$

les équations des quatre droites  $D_1, D_2, D_3, D_4$ . La courbe  $D$  a pour équation

$$\psi_1(z_2 z_3 z_4, z_3 z_4 z_1, z_4 z_1 z_2, z_1 z_2 z_3) + z_1 z_2 z_3 z_4 \psi_2(z_1, z_2, z_3, z_4) = 0,$$

$\psi_1$  et  $\psi_2$  étant des polynômes homogènes de degré deux. Le plan double est donné par

$$z^2 = \psi_1 + z_1 z_2 z_3 z_4 \psi_2.$$

[13] Nous déterminerons actuellement les plans doubles de genres un représentant une involution d'ordre deux, appartenant à une surface de genres un, de telle manière qu'une droite générique du plan soit dépourvue de diramations.

Rappelons tout d'abord qu'il y a quatre types birationnellement irréductibles, de plans doubles de genres un, déterminés par M. Enriques<sup>(1)</sup>; ce sont :

I. Plan double dont la courbe de diramation est d'ordre six.

II. Plan double dont la courbe de diramation est d'ordre huit et possède deux points quadruples distincts ou infiniment voisins.

III. Plan double dont la courbe de diramation est d'ordre dix et possède un point multiple d'indice sept ayant deux points triples infiniment voisins distincts.

IV. Plan double dont la courbe de diramation est d'ordre douze et possède un point multiple d'indice neuf ayant trois points triples infiniment voisins distincts.

Soit  $\Phi_0$ , d'équation

$$z^2 = f(x, y),$$

un de ces plans doubles. Désignons par F la surface de genres un à laquelle appartient l'involution  $I_2$  dont  $\Phi_0$  est, par hypothèse, l'image. Une droite du plan  $\Phi_0$  ne possède pas, en général, de points de diramation pour la correspondance (1, 2) définie par  $I_2$  entre  $\Phi_0$  et F (par hypothèse).

Nous savons (n° 7) que la courbe de diramation du plan double se décompose en deux courbes  $f_1(x, y) = 0$ ,  $f_2(x, y) = 0$  d'ordres pairs. La surface F a pour équation

$$z^2 = f_1(x, y), \quad u^2 = f_2(x, y),$$

et les deux courbes  $f_1(x, y) = 0$ ,  $f_2(x, y) = 0$  ont huit points communs<sup>(2)</sup>.

La surface F possède trois transformations birationnelles involutives en elle-même, à savoir :

$$(T_1) \quad x' = x, \quad y' = y, \quad z' = -z, \quad u' = -u;$$

$$(T_2) \quad x' = x, \quad y' = y, \quad z' = -z, \quad u' = u;$$

$$(T_3) \quad x' = x, \quad y' = y, \quad z' = z, \quad u' = -u.$$

Ces trois transformations sont deux à deux permutable.  $T_1$  engendre l'involution  $I_2$  représentée par  $\Phi_0$ ;  $T_2$  et  $T_3$  engendrent des involutions  $I_2'$ ,  $I_2''$  ayant respecti-

<sup>(1)</sup> F. ENRIQUES, *Sui piani doppi di genere uno* (Memorie della Società ital. delle Scienze, 1896, [3], X).

<sup>(2)</sup> Dans l'évaluation du nombre des points d'intersection des deux courbes  $f_1 = 0$ ,  $f_2 = 0$ , on tiendra compte du principe suivant : un point d'intersection n'entre en ligne de compte que s'il est de multiplicité impaire pour chacune des courbes.

vement les courbes de coïncidence découpées sur  $F$  par  $f_1 = 0$ ,  $f_2 = 0$ . Ces involutions  $I'_2$ ,  $I''_2$  sont donc rationnelles. Par conséquent, le plan double

$$z^2 = f_2(x, y),$$

qui représente  $I'_2$ , et le plan double

$$z^2 = f_1(x, y),$$

qui représente  $I''_2$ , sont rationnels. Il en résulte que les courbes  $f_1(x, y) = 0$ ,  $f_2(x, y) = 0$  peuvent se ramener, d'après un théorème de M. Nöther<sup>(1)</sup>, par une transformation birationnelle, à :

- 1° Une quartique plane ;
- 2° Une sextique ayant deux points triples infiniment voisins ;
- 3° Une courbe d'ordre  $m$  ayant un point multiple d'indice  $m - 2$ .

La détermination de la courbe de diramation des plans doubles cherchés est alors très simple ; nous nous contenterons d'énoncer les résultats.

*Les plans doubles de genres un qui sont images d'involution d'ordre deux appartenant à une surface de genres un, de manière qu'en général une droite du plan ne possède pas de point de diramation (relatif à cette involution), sont les suivants :*

I. *Plan double dont la courbe de diramation se compose d'une quartique et d'une conique.*

II. *Plan double dont la courbe de diramation se compose de deux quartiques ayant deux points doubles en commun.*

III. *Plan double dont la courbe de diramation se compose d'une courbe d'ordre six, ayant deux points triples infiniment voisins, et d'une conique passant par ces points triples.*

IV. *Plan double dont la courbe de diramation se compose d'une sextique ayant un point quadruple  $P$  auquel sont infiniment voisins deux points doubles distincts  $P_1$ ,  $P_2$ , et d'une quartique ayant un point triple en  $P$  dont deux branches passent par  $P_1$ ,  $P_2$ .*

V. *Plan double dont la courbe de diramation se compose d'une courbe du huitième ordre ayant un point sextuple  $P$  auquel sont infiniment voisins trois points doubles distincts  $P_1$ ,  $P_2$ ,  $P_3$ , et d'une quartique ayant un point triple en  $P$  dont les branches passent par  $P_1$ ,  $P_2$ ,  $P_3$ .*

Le problème que nous venons de résoudre est identique à celui dans lequel on se propose de déterminer toutes les surfaces de genres un possédant deux transfor-

---

<sup>(1)</sup> Voir CASTELNUOVO et ENRIQUES, *Sulle condizioni di razionalità dei piani doppi* (Rendiconti del Circolo Matem. di Palermo, 1900, XIV).

mations birationnelles en elle-même engendrant des involutions rationnelles d'ordre deux et dont le produit engendre une involution d'ordre deux et de genres un. Soit en effet  $F$  une surface de genres un possédant deux transformations birationnelles en elle-même.  $T_1, T_2$  engendrant respectivement des involutions  $I'_2, I''_2$ , d'ordre deux et rationnelles. Supposons que le produit  $T_1 = T_1 T_2$  engendre une involution  $I_2$  d'ordre deux et de genres un. Soit  $\Phi$  une surface représentative de  $I_2$ .

Les transformations  $I_1, I_2$  engendrent, sur  $F$ , une involution  $I_4$ , d'ordre quatre, qui est rationnelle. Aux groupes de  $I_4$  correspondent, sur  $\Phi$ , des couples de points engendrant une involution rationnelle.  $\Phi$  est donc un plan double de genres un, et sa détermination a été faite en résolvant le problème précédent.

*La détermination des surfaces de genres un possédant deux transformations birationnelles en elle-même engendrant des involutions rationnelles d'ordre deux et dont le produit engendre une involution d'ordre deux et de genres un, se ramène à la détermination des plans doubles de genres un, image d'involutions d'ordre deux appartenant à une surface de genres un<sup>(1)</sup>.*

### Surfaces de genres zéro et de bigenre un doubles, douées d'un nombre fini de points de diramation.

[14] Soit  $\Phi$  une surface algébrique de genres zéro et de bigenre un. Elle est caractérisée par les conditions suivantes<sup>(2)</sup> :

- 1° Son genre arithmétique est nul ( $\pi_a = 0$ );
- 2° Son bigenre est égal à l'unité ( $\Pi_1 = 1$ );
- 3° Son trigenre est nul ( $\Pi_2 = 0$ ).

Une courbe de genre virtuel  $\pi$ , tracée sur  $\Phi$ , a le degré  $2\pi - 2$  et appartient à un système linéaire de dimension  $\pi - 1$ . On peut toujours transformer  $\Phi$  en :

- 1° Une surface d'ordre six, de  $S_3$ , passant doublement par les arêtes d'un tétraèdre ou en :
- 2° Un plan double dont la courbe de diramation se compose : a) d'une sextique douée de deux tacnodes et d'un point double au point d'intersection des deux tangentes tacnodales; b) de ces deux tangentes.

<sup>(1)</sup> Voir à ce sujet notre note : *Recherches sur les surfaces de genres un (première note)* (Bull. de l'Acad. roumaine, 1914, II).

<sup>(2)</sup> F. ENRIQUES, *Sopra le superficie algebriche di bigenere uno* (Memorie della Società ital. delle Scienze, 1909, [3], XIV).

Concernant les surfaces de genres zéro et de bigenre un, voir aussi : G. FANO, *Superficie algebriche di genere zero e bigenere uno, e loro casi particolari* (Rendiconti del Circolo Matematico di Palermo, 1910, XXIX).

Supposons que  $\Phi$  soit l'image d'une involution d'ordre deux, appartenant à une surface  $F$ , cette involution n'ayant qu'un nombre fini de points unis. En raisonnant comme nous l'avons fait plus haut (n° 8), on trouve que  $F$  est, *a priori*, de l'un des types suivants :

- a) Surface de Picard (ou, en particulier, de Jacobi) ( $p_a = -1$ ,  $p_a P_4 = 1$ );
- b) Surface de genres un ( $p_a = P_4 = 1$ );
- c) Surface de genres zéro et de bigenre un ( $p_a = P_3 = 0$ ,  $P_2 = 1$ ).

Cependant, MM. Bagnera et De Franchis ont démontré que les involutions de genres zéro et de bigenre un appartenant à une surface de Picard sont d'ordre quatre ou huit<sup>(1)</sup>;  $F$  ne pourra donc pas être, actuellement, une surface de Picard.

[15] Supposons en premier lieu que la surface  $F$  soit une surface de genres un ( $p_a = P_4 = 1$ ). On a alors  $\tau = 0$ .

Prenons pour modèle projectif de  $\Phi$  la surface  $\Gamma_0$  d'ordre six, de  $S_3$ , passant doublement par les arêtes d'un tétraèdre  $T$ , à sections planes  $\Gamma$  de genre quatre. Remarquons que le système  $|2\Gamma|$  est découpé, sur  $\Phi_0$ , par les surfaces du quatrième ordre circonscrites au tétraèdre  $T$ .

Pour que  $\Phi_0$  représente une involution d'ordre deux appartenant à une surface de genres un, il faut, d'après le théorème établi dans la première partie, qu'il y ait  $\infty^3$  surfaces du quatrième ordre circonscrites au tétraèdre  $T$ , qui touchent  $\Phi_0$  le long de courbes  $\Gamma_0$  de genre quatre et d'ordre six.

De telles surfaces existent certainement, il suffit par exemple de prendre la surface du quatrième ordre composée des quatre faces du tétraèdre  $T$  pour avoir l'une d'elles. On en conclut que :

*Toute surface de genres zéro et de bigenre un représente une involution d'ordre deux appartenant à une surface de genres un.*

C'est là un théorème bien connu, dû à M. Enriques<sup>(2)</sup>. J'ai ajouté récemment que la surface de genres un possède, en outre, une involution rationnelle d'ordre deux et une involution d'ordre deux et de genres un<sup>(3)</sup>. Ces trois involutions sont engendrées par trois transformations birationnelles deux à deux permutables.

<sup>(1)</sup> G. BAGNERA et M. DE FRANCHIS, *Le superficie algebriche le quali ammettono una rappresentazione...* (Memorie della Soc. ital. delle Scienze, 1908, [3], XV).

<sup>(2)</sup> F. ENRIQUES, *Un'osservazione relativa alle superficie di bigenere uno* (Rendiconto della R. Accad. di Bologna, Gennaio, 1908).

<sup>(3)</sup> L. GODEAUX, *Sur les surfaces de genres zéro et de bigenre un* (Rendiconti della R. Accad. dei Lincei, 1<sup>o</sup> sem. 1914, [5], XXIII).

La surface de genres un peut se ramener au plan double

$$z^2 = f(x, y),$$

$f(x, y) = 0$  étant une courbe huit, ayant deux points quadruples en  $(0, \infty)$ ,  $(\infty, 0)$ , invariante

Remarquons qu'une involution d'ordre deux, dépourvue de points unis, appartenant à une surface de genres un, est nécessairement de genres zéro et de bigenre un, et retournons aux surfaces étudiées au n° 12. Nous concluons que :

*Si une surface de genres un possède une involution d'ordre deux et de genres un représentable sur une surface d'ordre six, de  $S_4$  (de manière qu'une section hyperplane de celle-ci ne possède aucun point de diramation, en général), elle possède deux autres involutions d'ordre deux, l'une rationnelle, l'autre de genres zéro et de bigenre un. Ces trois involutions sont engendrées par des transformations birationnelles deux à deux permutable.*

[16] Supposons actuellement que la surface  $F$  est de genres zéro et de bigenre un ( $p_a = P_3 = 0$ ,  $P_2 = 1$ ). On a maintenant  $\sigma = 4$ .

Prenons comme modèle projectif de  $\Phi$  le plan double  $\Phi_0$  dont la courbe de diramation se compose de :

- a) Deux droites  $D_1, D_2$ ;
- b) Une courbe d'ordre six  $D$  ayant un tacnode sur chacune des droites  $D_1, D_2$  et un point double en leur intersection  $P$ .

Il existe, sur  $\Phi$ , une infinité (discontinue) de réseau de courbes hyperelliptiques de genre trois<sup>(1)</sup>; nous pourrions donc en choisir un dont la courbe générique soit dépourvue de diramation pour la correspondance  $(1, 2)$  existant entre  $\Phi$  et  $F$ . En rapportant projectivement les courbes de ce réseau aux droites d'un plan, nous obtiendrions un plan double du type de  $\Phi_0$ <sup>(2)</sup>. Nous pourrions donc supposer que  $\Phi_0$  est précisément ce plan double et que les droites de ce plan n'ont en général pas de diramation pour la correspondance  $(1, 2)$  entre  $\Phi_0$  et  $F$ . On en conclut (n° 7) que la courbe  $D + D_1 + D_2$  doit se décomposer en deux parties d'ordres pair. Nous désignerons par  $B_1, B_2$  ces parties.

Trois cas peuvent se présenter :

A)  $B_1$  se compose de la droite  $D_1$  et d'une cubique passant par le point  $P$  commun à  $D_1, D_2$  et touchant  $D_1$  et  $D_2$  en deux points  $P_1, P_2$ ;  $B_2$  se compose de la droite  $D_2$  et d'une cubique passant par  $P$  et touchant  $D_1$  en  $P_1, D_2$  en  $P_2$ .

B)  $B_1$  se compose d'une conique touchant  $D_1$  en  $P_1, D_2$  en  $P_2$ ;  $B_2$  se compose des droites  $D_1, D_2$  et d'une quartique ayant un point double en  $P$  et touchant  $D_1$  en  $P_1, D_2$  en  $P_2$ .

pour la transformation  $x' = \frac{1}{x}, y' = \frac{1}{y}$ , et ne passant pas par les points  $x^2 - 1 = 0, y^2 - 1 = 0$ . Ou encore, si l'on représente par  $\varphi(x, y) = 0$  une courbe d'ordre six ayant un point double à l'origine et deux tacnodes, un sur chaque axe, la surface de genres un a pour équations :

$$z^2 = \varphi(x, y), \quad u^2 = xy.$$

<sup>(1)</sup> ENRIQUES, *Superficie di bigenere uno...* (loc. cit.).

<sup>(2)</sup> ENRIQUES, *Superficie di bigenere uno...* (loc. cit.).



C)  $B_1$  se compose d'une conique touchant  $D_1$  en  $P_1$ ,  $D_2$  en  $P_2$ , et des deux droites  $D_1$ ,  $D_2$ ;  $B_2$  se compose d'une quartique ayant un point double en  $P$  et touchant  $D_1$  en  $P_1$ ,  $D_2$  en  $P_2$ .

En tenant compte de ce que toute surface de genres zéro et de bigenre un peut se ramener, par une transformation birationnelle, à un plan double du type indiqué plus haut, on voit que :

*Une surface de genres zéro et de bigenre un qui représente une involution d'ordre deux appartenant à une surface de genres zéro et de bigenre un, peut se ramener, par une transformation birationnelle, à un plan double dont la courbe de diramation est formée par :*

1° Deux cubiques planes tangentes en deux points et les deux droites touchant ces cubiques en ces points, ces droites se rencontrant de plus en un point commun aux deux cubiques; ou par :

2° Une conique et une quartique ayant deux points de contact, jointes aux deux droites touchant ces courbes en ces points, le point de rencontre de ces droites étant de plus double pour la quartique.

En répétant le raisonnement fait à la fin du n° 13, on verrait que l'on a, en même temps, déterminé les surfaces de genres zéro et de bigenre un ayant deux transformations birationnelles involutives permutable en elle-même, ces transformations engendrant des involutions d'ordre deux rationnelles et leur produit engendrant une involution de genres zéro, de bigenre un et d'ordre deux.

Si  $\varphi(x, y) = 0$ ,  $\psi(x, y) = 0$  sont respectivement les équations des courbes (décomposables)  $B_1$ ,  $B_2$ , les surfaces possédant cette dernière propriété ont pour équations :

$$z^2 = \varphi(x, y), \quad u^2 = \psi(x, y).$$

Les deux involutions rationnelles sont engendrées par les transformations  $(x' = x, y' = y, z' = -z, u' = u)$ ,  $(x' = x, y' = y, z' = z, u' = -u)$ ; l'involution de genres zéro et de bigenre un est engendrée par la transformation

$$(x' = x, \quad y' = y, \quad z' = -z, \quad u' = -u).$$

