

ANNALI DELLA
SCUOLA NORMALE SUPERIORE DI PISA
Classe di Scienze

IACOPO BARSOTTI

Errata

Annali della Scuola Normale Superiore di Pisa, Classe di Scienze 3^e série, tome 20, n° 1 (1966), p. 137

http://www.numdam.org/item?id=ASNSP_1966_3_20_1_137_0

© Scuola Normale Superiore, Pisa, 1966, tous droits réservés.

L'accès aux archives de la revue « *Annali della Scuola Normale Superiore di Pisa, Classe di Scienze* » (<http://www.sns.it/it/edizioni/riviste/annaliscienze/>) implique l'accord avec les conditions générales d'utilisation (<http://www.numdam.org/conditions>). Toute utilisation commerciale ou impression systématique est constitutive d'une infraction pénale. Toute copie ou impression de ce fichier doit contenir la présente mention de copyright.

NUMDAM

Article numérisé dans le cadre du programme
Numérisation de documents anciens mathématiques
<http://www.numdam.org/>

E R R A T A

(altra errata è alla fine del Cap. 5)

- Cap. 1, p. 6, formula 1.6: leggasi $f_0(Y_0)$ in luogo di $f_0(Y)$
- Cap. 1, p. 11, riga 12: leggasi $\varphi'_{n-i}(x_{-i-1}, \dots$ in luogo di $\varphi'_{n-i}(x_{-i-i}, \dots$
- Cap. 2, p. 22, riga 5 della dim. del 2.8: leggasi $(i!)^{-1}x^i \in U_0$ in luogo di $(i!)^{-1} \in U_0$
- Cap. 2, p. 23, punto 3 della dim. del 2.10: la frase che inizia con « Pongasi » va sostituita con la seguente: Ogni componente di $1 - \{x\}$ è divisibile per $1 - x$; quindi ogni componente di $z_{(i)} = i^{-1}(1 - \{x\})^i$ ha la stessa proprietà; pertanto, e dato che $\lim_{i \rightarrow \infty} (1 - x)^i = 0$, i bivettori $z_{(i)}$ soddisfano uniformemente alla condizione dell'1.5, e ciò prova, per 2.1, che $y \in \text{biv } R$.
- Cap. 3, p. 290, ultima riga del 3.18: prima di « esiste » si aggiunga la frase: e se la $x \rightarrow dx$ è continua per ogni $d \in D$,
- Cap. 3, p. 290, riga 3 del 3.20: leggasi d per ogni $y \in R$ in luogo di y per ogni $d \in D$
- Cap. 3, p. 293, dim. del 3.25: leggasi y_i ovunque è scritto x_i ; e leggasi μ^{p-1} , e risp. \mathbf{P}^{p-1} ovunque è scritto μ^p , e risp. \mathbf{P}^p
- Cap. 3, p. 295, ultime due righe, e p. 296, riga 6: leggasi μ^{p-1} in luogo di μ^p , e \mathbf{P}^{p-1} in luogo di \mathbf{P}^p
- MC, p. 309: si sostituisca la frase nelle ultime tre righe della dim. dell'1.2 con la seguente: Se $a_1 \neq 0$ e $v(a_1) \geq n$, si ripeta il processo su a_1 , ottenendo a_2, a_3, \dots ; se questa successione è infinita, essa tende a 0, e il risultato è provato; se è finita, e per es. $a_l = 0$, il risultato è provato; se invece $a_l \neq 0$ ma $v(a_l) < n$, si ripeta su a_l tutto il processo applicato ad a , ecc., C.V.D..
- MC, p. 311, riga 14: leggasi $s \leq h$ in luogo di $\leq h$
- MC, p. 327, riga — 7: leggasi $\dim P - \dim \sigma M$ in luogo di $\dim P - \dim M$
- MC, p. 329, riga 4 della dim. del 3.1: leggasi $Kt^r x$ in luogo di $Tt^r x$
- MC, p. 334, riga 6 del 3.5: leggasi \mathcal{K} in luogo di K
- MC, p. 344, riga 2: leggasi $= \sigma$ in luogo di $= 0$
- MC, p. 346, riga — 6: leggasi $\sum_i \zeta_i(y_i \eta)$ in luogo di $\sum_i \zeta_i(y \eta)$
- MC, p. 346, penultima riga: leggasi $(y_i \circ \eta)$ in luogo di $y_i \eta$
- MC, p. 353, riga 7: leggasi $\sum_1^r \alpha_i \mu y_i$ in luogo di $\sum_1^r \alpha_i \mu y_i$
- MC, p. 364, riga 4: leggasi w_j in luogo di $w^{(j)}$
- MC, p. 368, riga 3: aggiungasi la parola « chiuso » dopo la parola « sottoanello »
- MC, p. 371, riga 3 del capovero « Si noti ... »: leggasi ζ_0 in luogo di ξ_0