

Astérisque

JÜRGEN NEUKIRCH

**Über die Absoluten Galoisgruppen Algebraischer
Zahlkörper**

Astérisque, tome 41-42 (1977), p. 67-79

http://www.numdam.org/item?id=AST_1977__41-42__67_0

© Société mathématique de France, 1977, tous droits réservés.

L'accès aux archives de la collection « Astérisque » (<http://smf4.emath.fr/Publications/Asterisque/>) implique l'accord avec les conditions générales d'utilisation (<http://www.numdam.org/conditions>). Toute utilisation commerciale ou impression systématique est constitutive d'une infraction pénale. Toute copie ou impression de ce fichier doit contenir la présente mention de copyright.

NUMDAM

Article numérisé dans le cadre du programme
Numérisation de documents anciens mathématiques
<http://www.numdam.org/>

ÜBER DIE ABSOLUTEN GALOISGRUPPEN ALGEBRAISCHER ZAHLKÖRPER
Jürgen NEUKIRCH (Regensburg)

Einleitung. Die vorliegenden Ausführungen betreffen die Ergebnisse einer früheren Arbeit (vgl. [6], [7]) die durch jüngste Resultate von Ikeda, Iwasawa und Uchida in ein neues Licht gerückt wurden. In jener Arbeit wurde gezeigt, daß zwei normale endliche algebraische Zahlkörper K_1 und K_2 isomorph sind, wenn ihre absoluten Galoisgruppen G_{K_1} und G_{K_2} als abstrakte pro-endliche Gruppen isomorph sind. An diesen Satz knüpfte sich die Vermutung, daß die absolute Galoisgruppe $G_{\mathbb{Q}}$ über dem Körper $\mathbb{Q}$ der rationalen Zahlen nur innere Automorphismen besitzt. Diese Vermutung gründete sich auf die Tatsache, daß sie sich über das sogenannte Einbettungsproblem auf eine rein gruppentheoretische Aufgabe zurückführen ließ (vgl. [7]). Diese Aufgabe wurde nach Vorarbeiten von Kanno [4] und Komatsu [5] von Uchida [13] in einer sogar weitergreifenden Weise gelöst, die zu dem folgenden Resultat führte:

Satz: Seien K_1 und K_2 zwei endliche algebraische Zahlkörper und $\sigma: G_{K_1} \rightarrow G_{K_2}$ ein topologischer Isomorphismus. Dann wird σ durch einen inneren Automorphismus von $G_{\mathbb{Q}}$ induziert.

Gleichzeitig und unabhängig davon gelang auch Ikeda ein Beweis der oben erwähnten Vermutung, der allerdings auf sehr viel komplizierteren zahlentheoretischen Überlegungen beruhte (vgl. [2]). Dieser Beweis wurde von Iwasawa [3] stark vereinfacht, der i.w. die gleichen Resultate erhielt wie Uchida. Alle Beweise jedoch gründen sich auf den Anfangs erwähnten Satz über normale Zahlkörper mit isomorphen absoluten Galoisgruppen. In der vorliegenden Note sollen die auf mehrere Arbeiten verteilten Argumentationen zu einem vollständigen und in seinem zahlentheoretischem Teil vereinfachten Beweis des Satzes von Uchida und Iwasawa zusammengefaßt werden.

Wir betrachten im folgenden die (nicht notwendig endlichen) algebraischen Erweiterungen K des Körpers $\mathbb{Q}$ der rationalen Zahlen und unter diesen die henselschen Körper, d.h. die Körper, die eine im

algebraischen Abschluß unzerlegte nicht-archimedische Bewertung besitzen. Jeder solche Henselkörper K enthält einen kleinsten Henselkörper K_0 . Dieser ist isomorph zum Körper $\mathbb{Q}_p^a$ aller algebraischen p -adischen Zahlen, wenn p die Restkörpercharakteristik von K ist. Wir nennen $n(K) = [K:K_0]$ den lokalen Grad von K .

Für jede Primzahl l definieren wir die l -Charakteristik der absoluten Galoisgruppe G_K durch

$$\chi_l(G_K) = \sum_{q=0}^2 (-1)^q \dim_{\mathbb{F}_l} H^q(G_K, \mathbb{F}_l) \text{ oder } \chi_l(G_K) = -\infty,$$

je nachdem $\dim H^1(G_K, \mathbb{F}_l)$ endlich oder unendlich ist. Mit μ_l bezeichnen wir die Gruppe der l -ten Einheitswurzeln und setzen $\mu_l(K) = \mu_l \cap K$.

Lemma 1: Sei K ein Henselkörper mit der Restkörpercharakteristik p . Geht die Primzahl l im lokalen Grad $n(K)$ nur endlich oft auf, so ist

$$\chi_l(G_K) = 0 \text{ für } l \neq p, \quad \chi_l(G_K) = -n(K) \text{ für } l = p,$$

und $H^2(G_K, \mathbb{F}_l) \cong \mathbb{F}_l$ oder $= 0$, je nachdem $\mu_l(K) = \mu_l$ oder $= 1$. Geht l unendlich oft im Grad $n(K)$ auf, so ist $H^2(G_K, \mathbb{F}_l) = 0$.

Beweis: Identifizieren wir den kleinsten in K enthaltenen Henselkörper K_0 mit $\mathbb{Q}_p^a$, und setzen wir $K' = K \cdot \mathbb{Q}_p$, so ist $G_K \cong G_{K'}$, und $n(K) = [K:\mathbb{Q}_p^a] = [K':\mathbb{Q}_p]$. Es genügt daher das Lemma für den Fall der algebraischen Erweiterungen K des Körpers $\mathbb{Q}_p$ der p -adischen Zahlen zu beweisen.

Wir stellen dazu K als Vereinigung $K = \bigcup_i K_i$ seiner endlichen Teilerweiterungen $K_i/\mathbb{Q}_p$ dar und erhalten

$$H^q(G_K, \mathbb{F}_l) = \varinjlim_i H^q(G_{K_i}, \mathbb{F}_l).$$

Sei $l^\infty \nmid [K:\mathbb{Q}_p]$ und i_0 so gewählt, daß $l \nmid [K:K_{i_0}]$ und

$\mu_l(K) = \mu_l(K_{i_0})$. Dann werden die Homomorphismen

$$(*) \quad H^q(G_{K_i}, F_1) \xrightarrow{\text{Res}} H^q(G_{K_j}, F_1)$$

für $j \geq i \geq i_0$ injektiv. Mit Hilfe des Dualitätssatzes von Tate und Poitou erhalten wir

$$H^0(G_{K_i}, F_1) \cong F_1,$$

$$H^1(G_{K_i}, F_1) \cong H^1(G_{K_i}, \mu_1)^\wedge = (K_i^*/K_i^{*1})^\wedge,$$

$$H^2(G_{K_i}, F_1) \cong H^0(G_{K_i}, \mu_1)^\wedge = \mu_1(K_i)^\wedge = \mu_1(K)^\wedge$$

wobei $^\wedge$ das Pontrjagin dual andeutet. Nun ist aber bekanntlich

$$(K_i^*/K_i^{*1}) = 1 \cdot \# \mu_1(K) \text{ falls } 1 \neq p \text{ und}$$

$$(K_i^*/K_i^{*1}) = 1^{[K_i:\mathbb{Q}_p]+1} \cdot \# \mu_1(K) \text{ falls } 1 = p.$$

Wegen der Injektivität der Homomorphismen (*) ergibt sich hieraus

$$\dim H^0(G_K, F_1) = 1$$

$$\dim H^1(G_K, F_1) = 1 + \dim \mu_1(K) \text{ für } 1 \neq p$$

$$\dim H^1(G_K, F_1) = [K:\mathbb{Q}_p]+1 + \dim \mu_1(K) \text{ für } 1 = p$$

$$\dim H^2(G_K, F_1) = \dim \mu_1(K).$$

Hieraus ergibt sich das Lemma bis auf die letzte Aussage. Diese aber folgt aus der Tatsache, daß die Homomorphismen

$$(*) \quad \text{Res}: H^2(G_{K_i}, F_1) \rightarrow H^2(G_{K_j}, F_1), \quad j \geq i \geq i_0,$$

bei der Isomorphie $H^2(G_{K_i}, F_1) \cong \mu_1(K)^\wedge$ denjenigen Abbildungen $\text{Cor}^\wedge: \mu_1(K_i)^\wedge \rightarrow \mu_1(K_j)^\wedge$ entsprechen, die durch die Normenbildung $N_{K_j|K_i}: \mu_1(K_j) \rightarrow \mu_1(K_i)$, also wegen $\mu(K_j) \subseteq K_i$ durch die Zuordnung $\zeta \mapsto \zeta^{[K_j:K_i]}$ induziert werden. Daher ist (*) die Nullabbildung wann immer $1 \nmid [K_j:K_i]$, also im Fall $1 \nmid [K:\mathbb{Q}_p]$ zu oft, um etwas von $H^2(G_K, F_1) = \varinjlim H^2(G_{K_i}, F_1)$ übrigzulassen.

Lemma 2: Sei $K|\mathbb{Q}$ ein (endlicher oder unendlicher) algebraischer Zahlkörper und K_p seine Henselisierungen. ¹⁾ Dann ist der Homomorphismus

1) Hier sind ausnahmsweise die archimedischen "Henselisierungen" mit aufgenommen.

$$H^2(G_K, \mathbb{F}_1) \rightarrow \prod_{\mathcal{S}} H^2(G_{K_{\mathcal{S}}}, \mathbb{F}_1)$$

injektiv, und der Homomorphismus

$$H^2(G_K, \mathbb{F}_1) \rightarrow \prod_{\mathcal{S} \in S} H^2(G_{K_{\mathcal{S}}}, \mathbb{F}_1)$$

für jede endliche Primstellenmenge S von K surjektiv.

Beweis: Beide Aussagen ergeben sich durch einen unmittelbaren Aufstiegsprozeß aus dem Fall, daß K ein endlicher algebraischer Zahlkörper ist. Nehmen wir dies an, so ergibt sich die Injektivität der ersten Abbildung nach dem Dualitätssatz von Tate und Poitou aus der Injektivität der Abbildung $H^1(G_K, \mu_1) \rightarrow \prod_{\mathcal{S}} H^1(G_{K_{\mathcal{S}}}, \mu_1)$, die ja nicht; anderes als die Abbildung $K^*/K^{*1} \rightarrow \prod_{\mathcal{S}} K_{\mathcal{S}}^*/K_{\mathcal{S}}^{*1}$ ist. Weiter liefert der Dualitätssatz die exakte Sequenz

$$H^2(G_K, \mathbb{F}_1) \xrightarrow{\rho} \prod_{\mathcal{S}} H^2(G_{K_{\mathcal{S}}}, \mathbb{F}_1) \rightarrow H^0(G_K, \mu_1)^{\wedge} \rightarrow 0.$$

Im Fall $H^0(G_K, \mu_1) = \mu_1(K) = 1$ ist sogar die ganze Abbildung ρ surjektiv. Im Fall $\mu_1(K) = \mu_1$ ist für irgendeine nicht-archimedische Primstelle $\mathcal{S}_0 \notin S$ der Homomorphismus $H^2(G_{K_{\mathcal{S}_0}}, \mathbb{F}_1) \cong H^0(G_{K_{\mathcal{S}_0}}, \mu_1)^{\wedge} = \mu_1^{\wedge} \rightarrow H^0(G_K, \mu_1)^{\wedge} = \mu_1^{\wedge}$ bijektiv, so daß sich die Abbildung $H^2(G_K, \mathbb{F}_1) \rightarrow \prod_{\mathcal{S} \neq \mathcal{S}_0} H^2(G_{K_{\mathcal{S}}}, \mathbb{F}_1)$ als surjektiv erweist.

Lemma 3: Ist K eine beliebige algebraische Erweiterung von $\mathbb{Q}$, so gilt

$$G_K \cong G_{\mathbb{Q}_p^a} \implies K \cong \mathbb{Q}_p^a.$$

Beweis: Wir zeigen zunächst, daß K ein Henselkörper ist. Sei dazu l eine von 2 und p verschiedene Primzahl und $K_2 = \mathbb{Q}_p^a(\mu_l)$. Durch die Isomorphie $G_K \cong G_{\mathbb{Q}_p^a}$ erhalten wir eine Isomorphie $G_{K_1} \cong G_{K_2}$,

wobei $K_1|K$ eine endliche normale Erweiterung ist. Es genügt nun zu zeigen, daß K_1 henselsch ist. Ist nämlich v_1 eine henselsche Bewertung von K_1 und v die Einschränkung von v_1 auf K , so ergeben

sich die Fortsetzungen von v auf K_1 aus v_1 durch Automorphismen von K_1 und sind daher ebenso wie v_1 sämtlich henselsch. Da aber nach einem bekannten Satz von F.K. Schmidt (vgl. [9]) ein nicht-separabel abgeschlossener Körper höchstens eine henselsche Bewertung haben kann, ist v_1 die einzige Fortsetzung von v auf K . Daher ist mit K_1 auch K henselsch.

Für eine beliebige endliche Erweiterung L_1 von K_1 ergibt sich aus der Isomorphie $G_{K_1} \cong G_{K_2}$ eine Isomorphie $G_{L_1} \cong G_{L_2}$, wobei L_2 eine endliche Erweiterung von K_1 ist. Wegen Lemma 1 und wegen $\mu_1(L_2) = \mu_1$ haben wir daher für jedes solche L_1 (insbesondere für $L_1 = K_1$):

$$H^2(G_{L_1}, \mathbb{F}_1) \cong H^2(G_{L_2}, \mathbb{F}_1) \cong \mathbb{F}_1.$$

Wegen der Injektivität von

$$H^2(G_{K_1}, \mathbb{F}_1) \rightarrow \prod_{\mathcal{P}} H^2(G_{K_{1\mathcal{P}}}, \mathbb{F}_1)$$

ist weiter $H^2(G_{K_{1\mathcal{P}}}, \mathbb{F}_1) \cong \mathbb{F}_1$ für mindestens eine Primstelle $\mathcal{P}$ von K_1 , die wegen $1 \nmid 2$ nicht-archimedisch sein muß. Wir zeigen jetzt, daß $K_1 = K_{1\mathcal{P}}$, d.h. daß K_1 und damit K henselsch ist. Wäre dies nicht der Fall, so gäbe es eine endliche Erweiterung $L|K_1$, auf die die Primstelle $\mathcal{P}$ zwei verschiedene Fortsetzungen $\mathcal{P}_1$ und $\mathcal{P}_2$ besitzt. Die Henselisierungen $L_{\mathcal{P}_1}$ und $L_{\mathcal{P}_2}$ von L sind endliche Erweiterungen der Henselisierung $K_{1\mathcal{P}}$ von K_1 . Wegen $H^2(G_{K_{1\mathcal{P}}}, \mathbb{F}_1) \neq 0$ gilt nach Lemma 1 $1^\infty \nmid n(K_{1\mathcal{P}})$, so daß auch $1^\infty \nmid n(L_{\mathcal{P}_i})$ und somit - wiederum nach Lemma 1 - $H^2(G_{L_{\mathcal{P}_i}}, \mathbb{F}_1) \cong \mathbb{F}_1$ ist, $i = 1, 2$. Nun ist aber nach Lemma 2 der Homomorphismus

$$\mathbb{F}_1 \cong H^2(G_L, \mathbb{F}_1) \rightarrow H^2(G_{L_{\mathcal{P}_1}}, \mathbb{F}_1) \times H^2(G_{L_{\mathcal{P}_2}}, \mathbb{F}_1) \cong \mathbb{F}_1 \times \mathbb{F}_1$$

surjektiv. Wir erhalten also einen Widerspruch, d.h. K_1 ist henselsch, und damit auch K .

Wegen $H^2(G_{K_1}, \mathbb{F}_1) \cong H^2(G_{K_2}, \mathbb{F}_1) \neq 0$ muß nach Lemma 1 weiter

$1^\infty \nmid n(K_1)$, also $1^\infty \nmid n(K)$ gelten. Ferner folgt aus

$$\chi_p(G_K) = \chi_p(G_{\mathbb{Q}_p^a}) = -n(\mathbb{Q}_p^a) = -1,$$

daß p die Restkörpercharakteristik von K ist, weil ja sonst nach Lemma 1 $\chi_p(G_K) = 0$ wäre. Dies liefert gleichzeitig

$$n(K) = -\chi_p(G_K) = -\chi_p(G_{\mathbb{Q}_p^a}) = 1,$$

also $K \cong \mathbb{Q}_p^a$.

Lemma 4 : Sind K_1 und K_2 zwei endliche algebraische Zahlkörper und ist $K_1 | \mathbb{Q}$ normal, so gilt

$$G_{K_1} \cong G_{K_2} \implies K_1 = K_2.$$

Beweis : Mit K_1 ist auch K_2 normal. Zum Beweis sei p eine in $K_1 \cdot K_2$ unverzweigte Primzahl und $p = \vartheta_1 \dots \vartheta_r$ ihre Primzerlegung in K_2 . Wir nehmen an, daß ϑ_1 vom Grad 1 ist, d.h. $K_{2\vartheta_1} \cong \mathbb{Q}_p^a$. Sei $K_{1\vartheta_i} \supseteq K_1$ derjenige Körper, für den $G_{K_{1\vartheta_i}} \cong G_{K_{2\vartheta_i}}$ vermöge $G_{K_1} \cong G_{K_2}$ ist. Da $K_{2\vartheta_i}$ henselsch ist, ist aufgrund des Beweises zu Lemma 3 auch $K_{1\vartheta_i}$ henselsch. Wegen $G_{K_{1\vartheta_1}} \cong G_{\mathbb{Q}_p^a}$ ist sogar

$\mathbb{Q}_p^a \cong K_{1\vartheta_1} \supseteq K_1$. Dies bedeutet, daß p voll zerlegt ist im normalen Körper K_1 . Daher gilt $K_{1\vartheta_i} \supseteq k_{1i} \supseteq K_1$ mit $k_{1i} \cong \mathbb{Q}_p^a$. Die Isomorphie $G_{K_1} \cong G_{K_2}$ liefert nun $K_{2\vartheta_i} \supseteq k_{2i} \supseteq K_2$ mit $G_{k_{2i}} \cong G_{k_{1i}} \cong G_{\mathbb{Q}_p^a}$, und aus Lemma 3 folgt $k_{2i} \cong \mathbb{Q}_p^a$, so daß $K_{2\vartheta_i} = k_{2i} \cong \mathbb{Q}_p^a$ ist für alle $i = 1, \dots, r$. Dies zeigt daß die Primzahl p voll zerlegt ist in K_2 , wenn sie nur einen Linearfaktor abspaltet, was bekanntlich die Normalität von K_2 bedeutet (vgl. [1], Teil II, § 25). Für jede Primzahl p wählen wir jetzt eine zu p gehörige Zerlegungsgruppe $G_p \subseteq G_{\bar{\mathbb{Q}}}$ der algebraisch abgeschlossenen Hülle $\bar{\mathbb{Q}}$ über $\mathbb{Q}$ aus. Die Menge $P(K_1) = \{p | G_p \subseteq G_{K_1}\}$ besteht dann aus allen in K_1 voll zerlegten Primzahlen. Sie besitzt die Dirichlet-Dichte $d(P(K_1)) = \frac{1}{[K_1 : \mathbb{Q}]}$ (vgl. [1], Teil II, § 25, S. 139). Sei $L \supseteq K_1 \supseteq \mathbb{Q}$ eine weitere endliche normale Erweiterung von $\mathbb{Q}$ mit $G_p \subseteq G_L$ für alle $p \in P(K_1)$.

Dann ist $P(K_1) \subseteq P(L)$, also

$$\frac{1}{[K_1:\mathbb{Q}]} = d(P(K_1)) \leq d(P(L)) = \frac{1}{[L:\mathbb{Q}]},$$

d.h. $[K_1:\mathbb{Q}] \geq [L:\mathbb{Q}]$ und daher $K_1 = L$. Dies zeigt, daß G_{K_1} durch die Gruppen G_p , $p \in P(K_1)$, und alle ihre Konjugierten in $G_{\mathbb{Q}}$ topologisch erzeugt wird.

Sei jetzt $\sigma : G_{K_1} \rightarrow G_{K_2}$ ein Isomorphismus und $G_p = G_{k_1}$, $\sigma(G_p) = G_{k_2}$,

wobei k_1 und k_2 algebraische Erweiterungen von $\mathbb{Q}$ sind. Da

$k_1 \cong \mathbb{Q}_p^a$ und $G_{k_1} \cong G_{k_2}$, gilt nach Lemma 3 $k_2 \cong \mathbb{Q}_p^a$; k_1 und k_2 sind also über $\mathbb{Q}$ konjugiert, so daß G_p und $\sigma(G_p)$ in $G_{\mathbb{Q}}$ konjugiert sind. Es folgt, daß der Normalteiler G_{K_2} von $G_{\mathbb{Q}}$ mit den $\sigma(G_p)$ auch die G_p und alle ihre Konjugierten für alle $p \in P(K_1)$ enthält. Da G_{K_1} durch diese Gruppen erzeugt wird, erhalten wir

$G_{K_1} \subseteq G_{K_2}$, und aus Symmetriegründen $G_{K_1} = G_{K_2}$, also $K_1 = K_2$.

Lemma 5 : Seien $N \supseteq \mathbb{Q}$ endliche algebraische Zahlkörper, $N|\mathbb{Q}$ normal und $N|K_1$ zyklisch. Dann gilt :

$$G_{K_1} \cong G_{K_2} \implies K_1 \cong K_2.$$

Beweis : Nach dem Tschebotareffschen Dichtigkeitssatz gibt es eine in N unverzweigte Primzahl p , so daß K_1 ein zu p gehöriger Zerlegungskörper von $N|\mathbb{Q}$ ist. Mit anderen Worten : Es gibt eine zu p gehörige Zerlegungsgruppe $G_p \subseteq G_{\mathbb{Q}}$ von $\bar{\mathbb{Q}}|\mathbb{Q}$, die unter dem Homomorphismus $G_{\mathbb{Q}} \rightarrow G(N|\mathbb{Q})$ surjektiv auf $G(N|K_1)$ abgebildet wird. Ist nun $\sigma : G_{K_1} \rightarrow G_{K_2}$ ein Isomorphismus, so $\sigma(G_N) = G_{N'}$, $\cong G_N$ d.h. $N = N'$ und somit $\sigma(G_N) = G_N$ nach Lemma 4. Daher induziert σ einen Isomorphismus $\bar{\sigma} : G(N|K_1) \rightarrow G(N|K_2)$. Unter der Projektion $G_{\mathbb{Q}} \rightarrow G(N|\mathbb{Q})$ wird G_p surjektiv auf $G(N|K_1)$ und somit $\sigma(G_p)$ surjektiv auf $G(N|K_2)$ abgebildet. Wie schon im Beweis zu Lemma 4 dargelegt, folgt aber aus Lemma 3, daß G_p und $\sigma(G_p)$ in $G_{\mathbb{Q}}$ konjugiert sind. Daher sind $G(N|K_1)$ und $G(N|K_2)$ in $G(N|\mathbb{Q})$ konjugiert, K_1

und K_2 also konjugiert über $\mathbb{Q}$.

Lemma 6: Sei G eine endliche Gruppe der Ordnung n und κ ein Körper von n teilerfremder Charakteristik, der die n -ten Einheitswurzeln enthält. Dann wird der Gruppenring $\kappa[G]$ als κ -Vektorraum durch seine Idempotenten erzeugt.

Beweis: Da $\kappa[G]$ durch die Unterräume $\kappa[(g)]$ erzeugt wird, wenn (g) die zyklischen Untergruppen von G durchläuft, können wir annehmen, daß G zyklisch ist. Als halbeinfache Algebra hat $\kappa[G]$ die Zerlegung

$$\kappa[G] = \bigoplus_{i=1}^r \alpha_i$$

wobei $\alpha_i = \kappa[G] \cdot \varepsilon_i$ minimale Linksideale und ε_i Idempotenten sind. Nun besitzt aber G als zyklische Gruppe nur 1-dimensionale irreduzible Darstellungen, so daß die G -Moduln α_i 1-dimensional sind und somit

$$\kappa[G] = \bigoplus_{i=1}^r \kappa \cdot \varepsilon_i$$

ist.

Wir sind jetzt in der Lage, das folgende von Uchida und Iwasawa angegebene Theorem zu beweisen, wobei wir uns nach Uchida [13] richten.

Theorem: Seien K_1 und K_2 endliche algebraische Zahlkörper und $\sigma: G_{K_1} \rightarrow G_{K_2}$ ein topologischer Isomorphismus.

Dann wird σ durch einen inneren Automorphismus von $G_{\mathbb{Q}}$ induziert.

Beweis: Sei $N|\mathbb{Q}$ eine beliebige endliche normale Erweiterung, die K_1 und K_2 enthält. Es ist dann $\sigma(G_N) = G_N$, mit einem endlichen Normalkörper N' . Wegen $G_N \cong G_{N'}$, ergibt sich aus Lemma 4 $N = N'$, also $\sigma(G_N) = G_N$. σ induziert somit einen Isomorphismus $\sigma_N: G(N|K_1) \rightarrow G(N|K_2)$. Es genügt nun zu zeigen, daß σ_N für jedes N durch einen inneren Automorphismus von $G(N|\mathbb{Q})$ induziert wird. In der Tat, bedeutet i_g für $g \in G(N|\mathbb{Q})$ den durch g gegebenen inneren Automorphismus, so stellen die endlichen Mengen

$$I_N = \{g \in G(N|\mathbb{Q}) \mid i_g|_{G(N|K_1)} = \sigma_N\}$$

bei laufendem N ein projektives System dar. Sind die I_N nicht leer, so ist auch der Limes $I = \varprojlim_N I_N \subseteq G_Q$ nicht leer, und der durch ein Element $g \in I$ gegebene innere Automorphismus i_g von G_Q induziert den Isomorphismus σ .

Sei nun $G = G(N|\mathbb{Q})$, $G_1 = G(N|K_1)$ und $G_2 = G(N|K_2)$. Sei $n = \#G$ und p eine Primzahl $\equiv 1 \pmod n$, so daß der Körper $\mathbb{F}_p$ die n -ten Einheitswurzeln enthält. Wir betrachten dann den Gruppenring

$$A = \mathbb{F}_p[G] = \left\{ \sum_{g \in G} a_g \bar{g} \mid a_g \in \mathbb{F}_p \right\},$$

wobei wir zur Unterscheidung die den Elementen $g \in G$ entsprechenden Elemente aus A mit $\bar{g}$ bezeichnen. Ferner betrachten wir die zerfallende Gruppenringweiterung

$$1 \rightarrow A \rightarrow E \rightarrow G \rightarrow 1,$$

wobei G auf A durch $\alpha^g = \bar{g} \cdot \alpha$ operiert. Dabei schreiben wir A im Gegensatz zu E und G additiv; insbesondere darf also das Element $\bar{1} \in A$ nicht mit dem Einselement 1 von E verwechselt werden. Nach einem Satz von Scholz (vgl. [11]) gibt es eine Körpererweiterung

$M \supseteq N \supseteq \mathbb{Q}$, so daß $M|\mathbb{Q}$ die Gruppe E , und $M|N$ die Gruppe A als Galoisgruppe besitzt.

Wie wir oben gesehen haben, überführt der Isomorphismus σ die Normalteiler G_N und G_M von G_Q in sich selbst und induziert daher einen Isomorphismus $\sigma_M: G(M|K_1) \rightarrow G(M|K_2)$ und einen Automorphismus

$$\sigma_M: A \rightarrow A$$

von $A = G(M|N)$. Diesen Automorphismus wollen wir explizit beschreiben. Seien L_1, L_2 die Fixkörper der Elemente $\bar{1}$, $\sigma_M(\bar{1}) \in A \subseteq E = G(M|\mathbb{Q})$. σ induziert dann einen Isomorphismus $G_{L_1} \rightarrow G_{L_2}$. Nach Lemma 5 sind daher die Körper L_1 und L_2 konjugiert, so daß die zyklischen Gruppen $\langle \bar{1} \rangle$ und $\langle \sigma_M(\bar{1}) \rangle$ der Ordnung p in E konjugiert sind. Die zu $\bar{1}$ konjugierten Elemente sind aber gerade die Elemente $\bar{1}^g = \bar{g} \cdot \bar{1} = \bar{g}$, $g \in G$. Daher ist $\sigma_M(\bar{1}) = r \cdot \bar{g}_0$ mit einem $g_0 \in G$ und einem $r \in \mathbb{F}_p$, $r \neq 0$. Wir behaupten nun, daß allgemein

$$(*) \quad \sigma_M(\alpha) = r \cdot \bar{g}_O \cdot \alpha \text{ für alle } \alpha \in A$$

gilt. Dies braucht nur für die Idempotenten von A gezeigt zu werden, da A nach Lemma 6 von diesen erzeugt wird. Sei also ε ein Idempotent. Da $A \cdot \varepsilon$ ein Normalteiler von $E = G(M|\mathbb{Q})$ ist, wird $A\varepsilon$ aus dem gleichen Grund wie A durch σ_M in sich überführt. Es ist also

$$\sigma_M(\varepsilon) = \beta \cdot \varepsilon$$

mit einem $\beta \in A$, und da mit ε auch $\bar{1} - \varepsilon$ ein Idempotent ist, gilt auch

$$\sigma_M(\bar{1} - \varepsilon) = \gamma(\bar{1} - \varepsilon)$$

mit einem $\gamma \in A$. Wir erhalten also

$$\sigma_M(\bar{1}) = \sigma_M(\varepsilon) + \sigma_M(\bar{1} - \varepsilon) = \beta\varepsilon + \gamma(\bar{1} - \varepsilon)$$

und nach Multiplikation mit ε von rechts

$$\sigma_M(\varepsilon) = \beta\varepsilon = \sigma_M(\bar{1}) \cdot \varepsilon = r \cdot \bar{g}_O \cdot \varepsilon.$$

Wir bilden nun den Unterring $A_1 = \{ \sum_{g \in G_1} a_g \bar{g} \mid a_g \in \mathbb{F}_p \}$ von A

und betrachten neben der Abbildung $\sigma_M: A_1 \rightarrow A$ die Abbildung

$$\sigma_N: A_1 \rightarrow A$$

mit $\sigma_N(\sum_{g \in G_1} a_g \bar{g}) = \sum_{g \in G_1} a_g \overline{\sigma_N(g)}$; insbesondere ist also

$\sigma_N(\bar{g}) = \overline{\sigma_N(g)}$ für $g \in G_1$. Zwischen σ_M und σ_N besteht die Beziehung

$$\sigma_M(\bar{g}) = \sigma_N(\bar{g}) \cdot \sigma_M(\bar{1}), \text{ für } g \in G_1,$$

denn es ist ja

$$\sigma_M(\bar{g}) = \sigma_M(\bar{1}^g) = \sigma_M(\bar{1})^{\sigma_N(g)} = \overline{\sigma_N(g)} \cdot \sigma_M(\bar{1}) = \sigma_N(\bar{g}) \cdot \sigma_M(\bar{1}).$$

Mit (*) erhalten wir also

$$r \cdot \bar{g}_O \cdot \bar{g} = r \cdot \sigma_N(\bar{g}) \cdot \bar{g}_O,$$

d.h. $\sigma_N(\bar{g}) = \bar{g}_O \bar{g} \bar{g}_O^{-1}$ für alle $g \in G_1$ im Ring A und somit $\sigma_N(g) = g_O g g_O^{-1}$ in der Gruppe G . In der Tat wird also σ_N durch einen inneren Automorphismus von G induziert.

Korollar 1: Sind K_1 und K_2 endliche algebraische Zahlkörper, so gilt

$$G_{K_1} \cong G_{K_2} \iff K_1 \cong K_2.$$

In der Tat sind ja nach dem Theorem die Gruppen G_{K_1} und G_{K_2} unter der Voraussetzung $G_{K_1} \cong G_{K_2}$ in G_Q konjugiert, so daß auch die Körper K_1 und K_2 konjugiert sind.

Korollar 2: Für jeden endlichen algebraischen Zahlkörper K ist in kanonischer Weise

$$\text{Aut}(G_K)/\text{Inn}(G_K) \cong \text{Aut}(K).$$

Dabei ist $\text{Inn}(G_K)$ die Gruppe der inneren und $\text{Aut}(G_K)$ die Gruppe aller topologischen Automorphismen von G_K .

Beweis: Für $g \in G_Q$ bedeute i_g den durch g gegebenen inneren Automorphismus. Genau dann ist $i_g(G_K) = G_K$, wenn g im Normalisator

$N_{G_Q}(G_K)$ von G_K in G_Q liegt. Durch die Zuordnung $g \rightarrow i_g|_{G_K}$ erhalten wir einen Homomorphismus

$$N_{G_Q}(G_K) \rightarrow \text{Aut}(G_K),$$

bei dem G_K auf $\text{Inn}(G_K)$ abgebildet wird. Dieser Homomorphismus ist surjektiv nach dem Theorem. Er ist aber auch injektiv. Ist nämlich $i_g|_{G_K} = \text{id}_{G_K}$, so ist $g h g^{-1} = h$ für alle $h \in G_K$. g liegt daher im Zentrum der durch G_K und g erzeugten offenen Untergruppe von G_Q . Nach einem Satz von F.K. Schmidt (vgl. [10]) ist aber das Zentrum einer offenen Untergruppe von G_Q trivial, d.h. $g = 1$. Wir erhalten somit

$$\text{Aut}(G_K)/\text{Inn}(G_K) \cong N_{G_Q}(G_K)/G_K \cong \text{Aut}(K).$$

Für einen galoisschen endlichen Zahlkörper K erhält man hiernach die Galoisgruppe von $K|\mathbb{Q}$ aus der Galoisgruppe von $\bar{\mathbb{Q}}|K$ durch die einfache Formel

$$\text{Aut}(G_K)/\text{Inn}(G_K) \cong G(K|\mathbb{Q}).$$

Korollar 3: Die Gruppe $G_{\mathbb{Q}}$ besitzt nur innere Automorphismen. Es ist sogar

$$\text{Aut}(G_{\mathbb{Q}}) \cong G_{\mathbb{Q}}.$$

In der Tat ist $\text{Aut}(G_{\mathbb{Q}}) = \text{Inn}(G_{\mathbb{Q}}) \cong G_{\mathbb{Q}}$, ersteres wegen $\text{Aut}(\mathbb{Q}) = 1$, letzteres wegen der Tatsache, daß das Zentrum von $G_{\mathbb{Q}}$ nach dem erwähnten Satz von F.K. Schmidt [10] trivial ist.

Bemerkung: Betrachten wir anstelle der absoluten Galoisgruppe G_K eines Körpers K die Galoisgruppe $\tilde{G}_K$ der maximal auflösbaren Erweiterung $\tilde{K}|K$, oder allgemeiner - wie dies bei Iwasawa geschieht - durch die Galoisgruppe einer beliebigen Erweiterung $N|K$, die ihrerseits keine echte abelsche Erweiterung besitzt, so lassen sich alle Beweise fast wörtlich auf diesen Fall übertragen. In dem Theorem und seinen Korollaren kann man also G_K durch $\tilde{G}_K$ ersetzen.

-:-:-:-

Literatur

- [1] Hasse, H.: Bericht über neuere Untersuchungen und Probleme aus der Theorie der algebraischen Zahlkörper. Jahresber. der D. Math. Ver. 35 (1926), 36 (1930).
- [2] Ikeda, M.: Completeness of the absolute Galois group of the rational number field. Unveröffentlicht.
- [3] Iwasawa, K.: On the automorphisms of Galois groups. Erscheint demnächst.
- [4] Kanno, T.: Automorphisms of the Galois group of the algebraic closure of the rational number field. Kodai Math. Sem. Rep. 25 (1973) S. 446-448
- [5] Komatsu, K.: A remark of a Neukirch's conjecture. Proc. Akad. Japan 50 (1974), 253-255

- [6] Neukirch, J.: Kennzeichnung der p-adischen und der endlichen algebraischen Zahlkörper.
Inv. Math. 6 (1969), 296-314.
- [7] Neukirch, J.: Kennzeichnung der endlich-algebraischen Zahlkörper durch die Galoisgruppe der maximalen auflösbaren Erweiterungen. J. reine angew. Math. 238 (1970), 135-147.
- [8] Poitou, G.: Cohomologie Galoisienne des Modules finis.
Paris: Dunod 1967
- [9] Schmidt, F.K.: Mehrfach perfekte Körper. Math. Annalen 108, (1933)
- [10] Schmidt, F.K.: Körper, über denen jede Gleichung durch Radikale auflösbar ist. Sitzber. Heidelb. Akad. Wiss. 1933, S. 37-47.
- [11] Scholz, A.: Über die Bildung algebraischer Zahlkörper mit auflösbarer galoisscher Gruppe. Math. Z. 30 (1929), S 332-356.
- [12] Serre: Cohomologie Galoisienne. Lecture Notes in Math. 5, Berlin-Göttingen-Heidelberg: Springer 1964 (4th-edition, 1973).
- [13] Uchida, K.: Isomorphisms of Galois groups. Erscheint demnächst.

Jürgen NEUKIRCH
 Universität Regensburg
 Fachbereich Mathematik
 D - 8400 REGENSBURG
 Universitätsstr. 31
 (Bundesrepublik Deutschland)