

JOURNÉES ÉQUATIONS AUX DÉRIVÉES PARTIELLES

RICHARD BEALS

R. COIFMAN

Scattering, scattering inverse et équations d'évolutions non linéaires

Journées Équations aux dérivées partielles (1981), p. 1-6

http://www.numdam.org/item?id=JEDP_1981____A16_0

© Journées Équations aux dérivées partielles, 1981, tous droits réservés.

L'accès aux archives de la revue « Journées Équations aux dérivées partielles » (<http://www.math.sciences.univ-nantes.fr/edpa/>) implique l'accord avec les conditions générales d'utilisation (<http://www.numdam.org/conditions>). Toute utilisation commerciale ou impression systématique est constitutive d'une infraction pénale. Toute copie ou impression de ce fichier doit contenir la présente mention de copyright.

NUMDAM

Article numérisé dans le cadre du programme
Numérisation de documents anciens mathématiques
<http://www.numdam.org/>

SCATTERING, SCATTERING INVERSE, ET
EQUATIONS D'EVOLUTION NON LINEAIRES

par R. BEALS et R. COIFMAN

Nous nous proposons d'esquisser une méthode de résolution de certaines classe d'équations d'évolution non linéaires.

Commençons par l'exemple étudié en 72 par Zaharov et Sabat [2] de l'équation d'évolution non linéaire de Schrödinger

$$(1) \quad \frac{\partial u}{\partial t} = \frac{1}{i} \left[\frac{\partial^2 u}{\partial x^2} + 2|u|^2 u \right], \quad u|_{t=0} = u_0.$$

On résout le problème par l'intermédiaire d'une transformation spectrale (analogue à la transformée de Fourier) qui le linéarise. Premièrement nous associons à u le problème "spectral" suivant :

$$(2) \quad \begin{aligned} \frac{d\psi}{dx} &= (\xi \mathcal{J} + Q)\psi & \psi &= \begin{pmatrix} \psi_1(x, \xi) \\ \psi_2(x, \xi) \end{pmatrix} \\ \mathcal{J} &= \begin{pmatrix} -i/2 & 0 \\ 0 & 1/2 \end{pmatrix} & Q &= \begin{pmatrix} 0 & i\bar{u} \\ u & 0 \end{pmatrix} \end{aligned}$$

Si l'on suppose pour simplifier que Q est à support compact et intégrable. Alors toute solution ψ de (2) est nécessairement de la forme

$$\psi = \begin{cases} \begin{pmatrix} a_1 e^{-i/2 x \xi} \\ a_2 e^{i/2 x \xi} \end{pmatrix} & x \ll 0 \\ \begin{pmatrix} b_1 e^{-i/2 x \xi} \\ b_2 e^{i/2 x \xi} \end{pmatrix} & x \gg 0 \end{cases}$$

La matrice $S(\xi)$ définie par

$$\begin{pmatrix} b_1 \\ b_2 \end{pmatrix} = S(\xi) \begin{pmatrix} a_1 \\ a_2 \end{pmatrix}$$

est la matrice de "Scattering" associée au potentiel Q et au problème "spectral" (2).

Nous obtenons le

Théorème 1 : Soit

$$\Sigma = \{ \xi \in \mathbb{C} : \exists j \neq k \text{ tel que } \operatorname{Re} \xi (\lambda_j - \lambda_k) = 0 \}$$

Il existe une solution unique de (5) vérifiant les propriétés suivantes.

1) \mathcal{M} est méromorphe en ξ dans $\mathbb{C} \setminus \Sigma$ et x fixé et \mathcal{M} a un nombre de pôles fini dont la position ne dépend pas de x .

2)
$$\lim_{x \rightarrow -\infty} \mathcal{M}(x, \xi) = I = \lim_{|\xi| \rightarrow \infty} \mathcal{M}(x, \xi) .$$

Nous dirons que le potentiel Q est générique si dans chaque secteur de $\mathbb{C} \setminus \Sigma$, \mathcal{M} a une extension continue au bord, et les pôles de \mathcal{M} sont simples.

On démontre que les potentiels génériques forment un ouvert dense dans L^1 , dorénavant nous considérons que des potentiels génériques.

Pour définir la "transformée spectrale" de Q (relative à J) nous remarquons d'abord que si $\mathcal{M}_1, \mathcal{M}_2$ sont des solutions de (5) et \mathcal{M}_1 est inversible, alors :

$$\mathcal{M}_2 = \mathcal{M}_1 W^x \quad \text{où} \quad W^x(\xi) = e^{x\xi J} W(\xi) e^{-x\xi J}$$

d'autre part si \mathcal{M} est la solution du théorème 1, alors $\frac{\partial}{\partial \xi} \mathcal{M}(x, \xi)$ vérifie l'équation (5) (formellement) d'où

$$\frac{\partial}{\partial \xi} \mathcal{M} = \mathcal{M} W^x$$

et W est portée par l'ensemble $\Sigma \cup \{\text{pôles}\}$.

En outre \mathcal{M} vérifie l'équation, (en résolvant $\frac{\partial}{\partial \xi}$)

$$(6) \quad \mathcal{M}(x, \xi) = I + \frac{1}{2\pi i} \int_{\Sigma} \frac{\mathcal{M} W^x}{\eta - \xi} d\eta + \sum_{\text{pôles}} \frac{\mathcal{M}(x, \xi_{\nu})}{\xi_{\nu} - \xi} W^x(\xi_{\nu}) .$$

Ceci nous conduit au théorème

Théorème 2 : L'application $Q \rightarrow W$ est injective .

Nous appellerons W la "transformée spectrale" de Q (liée au problème spectral (5)). L'équation (6) nous fournit une méthode pour reconstruire Q à partir de W .

Remarquons que lorsque $J + J^* = 0$ nous pouvons lier la matrice de scattering S (qui est bien définie pour $\xi \in \mathbb{R}$) avec W par le procédé suivant :

On cherche V_+, V_- telle que

SV_+ est sous diagonale, SV_- surdiagonale et $V_+(\xi) = \begin{pmatrix} 1 & * \\ & 1 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$

$$V_-(\xi) = \begin{pmatrix} 1 & & & \\ & 1 & & \\ * & & & \\ & & & 1 \end{pmatrix} .$$

N est alors donnée par $W|_{\Sigma} = I - V_+^{-1} V_-$.

Pour décrire la relation entre l'évolution de W et celle de Q , nous commençons par observer que \mathcal{M} admet un développement asymptotique

$$\mathcal{M}(x, \xi) = \sum \mathcal{M}_k(x) \xi^{-k-1}$$

(Ceci découle de 6 en ignorant pour simplifier la contribution des pôles), d'où

$$\left(\frac{d}{dx} - Q\right) \mathcal{M}_k = \mathcal{J} \mathcal{M}_{k+1}$$

et

$$\mathcal{M}_{-1} = I$$

ainsi

$$\begin{aligned} Q &= -\mathcal{J} \mathcal{M}_0 = -\lim_{\xi \rightarrow \infty} \xi \mathcal{J}(\mathcal{M}(x, \xi)) - I \\ &= -\lim_{\xi \rightarrow \infty} \xi \mathcal{J} \mathcal{M}(x, \xi) \end{aligned}$$

d'où

$$\begin{aligned} \dot{Q} &= -\lim_{\xi \rightarrow \infty} \xi \mathcal{J} \dot{\mathcal{M}} \quad (\cdot \text{ est la dérivée par rapport à } t) \\ &= -\lim_{\xi \rightarrow \infty} \xi \mathcal{J} \dot{\mathcal{M}} \mathcal{M}^{-1} . \end{aligned}$$

pour $k = 2$ et $\mu = J$

$$\dot{Q} = J^{-1} D^2 Q - [Q, J^{-1} DQ]' - \frac{1}{2} [Q, [Q, J^{-1} Q]]^{\circ},$$

(ou $A^{\circ} = \text{diag } A$ et $A' = A - A^{\circ}$).

REFERENCES

- [1] Ablowitz, M. J., D. J. Kaup, A. C. Newell et H. Segur : The Inverse scattering transform-Fourier analysis for non linear problems. Stud. Appl. Math. 53, 1974, 249-315.
- [2] Zakharov, V. E. et A. B. Shabat : Exact theory of two dimensional self-focusing and one dimensional self-modulation of waves in non linear media. Sov. Phys. 1972, J. E. T. P. 34, 62-69.

*
*
*