

JOURNAL
DE
MATHÉMATIQUES
PURES ET APPLIQUÉES

FONDÉ EN 1836 ET PUBLIÉ JUSQU'EN 1874

PAR JOSEPH LIOUVILLE

J.-A. SERRET

**Mémoire sur les surfaces dont toutes les lignes de courbure
sont planes ou sphériques**

Journal de mathématiques pures et appliquées 1^{re} série, tome 18 (1853), p. 113-162.

http://www.numdam.org/item?id=JMPA_1853_1_18__113_0



NUMDAM

Article numérisé dans le cadre du programme
Gallica de la Bibliothèque nationale de France
<http://gallica.bnf.fr/>

et catalogué par Mathdoc
dans le cadre du pôle associé BnF/Mathdoc
<http://www.numdam.org/journals/JMPA>

~~~~~

**MÉMOIRE**

**SUR LES SURFACES DONT TOUTES LES LIGNES DE COURBURE**

**SONT PLANES OU SPHÉRIQUES;**

**PAR M. J.-A. SERRET.**

—————

M. Bonnet a présenté à l'Académie des Sciences, dans la séance du 10 janvier 1853, un Mémoire ayant pour objet la recherche des surfaces dont toutes les lignes de courbure sont planes. La méthode suivie par M. Bonnet consiste à former d'abord l'équation aux différentielles partielles du deuxième ordre, qui représente les surfaces dont il s'agit; il obtient ensuite l'équation sous forme finie au moyen des méthodes d'intégration développées par l'illustre Monge dans son *Application de l'Analyse à la Géométrie*.

Dès que j'eus pris connaissance de l'extrait du Mémoire de M. Bonnet, imprimé dans les *Comptes rendus des séances de l'Académie des Sciences*, je pensai que la solution de la question qu'il avait traitée, devait découler sans effort d'un théorème remarquable découvert par M. Joachimsthal et publié dans le tome XXX du Journal de M. Crelle. Effectivement, le théorème de M. Joachimsthal, dans la recherche dont il s'agit ici, donne immédiatement les intégrales du problème et joue un rôle analogue à celui des principes des forces vives et des aires dans les questions de Mécanique. Je cherchai donc à étudier, à ce nouveau point de vue, les détails du problème posé par M. Bonnet, et je communiquai à l'Académie le résultat de mes recherches, dans la séance du 24 janvier 1853.

Quelque temps après, mon ami M. Liouville m'engagea à essayer la recherche des surfaces à lignes de courbure sphériques, d'après la méthode que j'avais suivie pour les surfaces à lignes de courbure

planes, en y ajoutant les considérations que peut fournir ici naturellement la *transformation par rayons vecteurs réciproques*. La solution de ce nouveau problème est effectivement identique à celle du premier; je la communiquai à l'Académie dans la séance du 21 février; j'ajoutai ensuite quelques détails à la séance suivante [\*].

Je me propose de réunir dans ce Mémoire, avec quelques développements, les résultats divers que j'ai successivement présentés à l'Académie.

## PREMIÈRE PARTIE.

DES SURFACES DONT TOUTES LES LIGNES DE COURBURE SONT PLANES.

### § 1<sup>er</sup>.

Le théorème de M. Joachimsthal, cité plus haut, consiste en ce que :

*Si une surface a une ligne de courbure plane, le plan de cette ligne coupe la surface partout sous le même angle; réciproquement, si un plan coupe une surface partout sous le même angle, l'intersection est une ligne de courbure de la surface.*

D'après ce théorème, si une surface est telle, que les lignes de courbure de l'un des systèmes soient planes, on aura

$$\begin{aligned} (1) \quad & ax + by + cz = u, \\ (2) \quad & -ap - bq + c = l\sqrt{1 + p^2 + q^2}. \end{aligned}$$

Dans ces équations,  $x$ ,  $y$ ,  $z$  désignent les coordonnées rectangulaires de la surface;  $p$  et  $q$  sont mis au lieu de  $\frac{dz}{dx}$  et  $\frac{dz}{dy}$ . Enfin, les quantités  $a$ ,  $b$ ,  $c$ ,  $u$  et  $l$  sont constantes pour une même ligne de cour-

---

[\*] Dans le même temps, M. Bonnet s'occupait de la même question qu'il traitait également par la méthode que j'avais fait connaître après la publication de son premier Mémoire. On trouvera dans le tome XXXVI des *Comptes rendus des séances de l'Académie des Sciences*, les Notes de M. Bonnet et les observations que j'ai cru devoir présenter à l'occasion de ces Notes.

bure; mais comme elles varient d'une ligne à une autre, il faut les considérer comme des fonctions d'un paramètre  $t$ .

Si l'on imagine que  $t$  soit éliminé des équations (1) et (2), on aura une équation différentielle partielle du premier ordre, qui sera celle des surfaces dont les lignes de courbure de l'un des systèmes sont planes. Cette équation ne renfermera que trois fonctions arbitraires, car on peut élever l'une des cinq quantités  $a, b, c, u, l$  à l'unité, et l'une des quatre autres au paramètre  $t$ : il s'ensuit que l'équation intégrale renfermera quatre fonctions arbitraires. L'élimination de  $t$  n'est possible que si l'on a fixé les fonctions arbitraires; mais si l'on suppose que  $x$  et  $t$  soient prises pour variables indépendantes, on déduira facilement des équations (1) et (2) une équation différentielle partielle entre  $y, x$  et  $t$ . L'équation intégrale de celles-ci et l'équation (1) serviront à représenter les surfaces dont les lignes de courbure de l'un des systèmes sont planes.

Mais si l'on ajoute la condition que les lignes de courbure du second système soient planes, on aura, outre les équations (1) et (2),

$$(3) \quad \alpha x + \epsilon y + \gamma z = v,$$

$$(4) \quad -\alpha p - \epsilon q + \gamma = \lambda \sqrt{1 + p^2 + q^2},$$

$\alpha, \epsilon, \gamma, v$  et  $\lambda$  étant des fonctions d'un second paramètre  $\theta$ , qui restent constantes, avec ce paramètre, sur une même ligne de courbure, mais qui varient d'une ligne à une autre.

Il s'agit maintenant d'exprimer que les équations (1) et (3) appartiennent à deux lignes de courbure de systèmes différents. Désignons par  $dx, dy, dz$  les variations infiniment petites de  $x, y, z$  sur la première ligne de courbure; par  $\partial x, \partial y, \partial z$  les variations sur la seconde, on aura

$$dx \partial x + dy \partial y + dz \partial z = 0.$$

On peut éliminer les six variations que renferme cette équation au moyen des suivantes :

$$a dx + b dy + c dz = 0, \quad dz = p dx + q dy,$$

$$\alpha \partial x + \epsilon \partial y + \gamma \partial z = 0, \quad \partial z = p \partial x + q \partial y;$$

il vient alors

$$(bp - aq)(\xi p - \alpha q) + (a + cp)(\alpha + \gamma p) + (b + cq)(\xi + \gamma q) = 0;$$

enfin, si l'on ajoute à cette équation celle que l'on obtient en multipliant membre à membre les équations (2) et (4), il vient simplement

$$(5) \quad a\alpha + b\xi + c\gamma = l\lambda,$$

équation qui doit être satisfaite en prenant pour  $a, b, c$  et  $l$  des fonctions du paramètre  $t$ , et pour  $\alpha, \xi, \gamma, \lambda$  des fonctions du paramètre  $\theta$ .

On peut satisfaire à l'équation (5) en supposant  $a, b, c$  constantes ou  $\alpha, \xi, \gamma$  constantes. Ce cas est celui des surfaces dont les lignes de courbure de l'un des systèmes sont dans des plans parallèles à un plan fixe. S'il s'agit, par exemple, du premier système, et si l'on prend le plan fixe pour celui des  $xz$ , on pourra faire

$$a = 0, \quad b = 1, \quad c = 0;$$

alors l'équation (5) se réduit à

$$\xi = l\lambda,$$

ce qui exige que l'on ait

$$\xi = 0, \quad \lambda = 0,$$

ou bien

$$-l = \text{une constante } m, \quad \xi = -m\lambda.$$

Si c'est la première hypothèse qui a lieu, comme  $\alpha, \xi, \gamma$  ne peuvent être nuls tous trois, on peut prendre, en outre,

$$\alpha = 1.$$

Laissons de côté le cas où les plans des lignes de l'une des courbures sont parallèles. Parmi les trois quantités  $a, b, c$  ou  $\alpha, \xi, \gamma$ , deux au moins sont différentes de zéro; on peut donc supposer  $a$  et  $\xi$  différents de zéro; par conséquent, on peut poser

$$a = 1, \quad \xi = 1;$$

l'équation (5) devient alors

$$(6) \quad \alpha + b + c\gamma = l\lambda.$$

Désignons les dérivées par des accents à la manière de Lagrange ; il viendra, en différentiant l'équation (6) par rapport au paramètre  $t$ , puis celle obtenue ainsi par rapport à  $\theta$ ,

$$(7) \quad \begin{cases} b' + c'\gamma = l'\lambda, \\ c'\gamma' = l'\lambda'. \end{cases}$$

Si  $c'$  et  $\gamma'$  sont différents de zéro, la deuxième équation (7) donne

$$l' = \frac{\gamma'}{\lambda'} c',$$

et la première devient alors

$$b' = \left( \frac{\lambda\gamma'}{\lambda'} - \gamma \right) c';$$

à cause de l'hypothèse  $c' \geq 0$ , cette équation ne peut subsister que si  $\frac{\lambda\gamma'}{\lambda'} - \gamma$  se réduit à zéro ou au moins à une constante ; par conséquent, le rapport des quantités  $b'$  et  $c'$  est constant, et il existe une relation linéaire entre  $b$  et  $c$ . L'équation (6) exige donc en premier lieu que l'on ait

$$c = \text{constante} \quad \text{ou} \quad \gamma = \text{constante},$$

ou que  $b$  et  $c$  soient liées par une équation linéaire. D'où il suit que les plans des lignes de l'une des courbures sont parallèles à une droite fixe. Supposons qu'il s'agisse des lignes de la première courbure, et prenons la droite fixe pour axe des  $\gamma$ ; on aura

$$b = 0;$$

l'équation (6) devient alors

$$\alpha + c\gamma = l\lambda,$$

et sa dérivée relative à  $t$ ,

$$c'\gamma = l'\lambda.$$

$c'$  ne peut être nul, car alors  $c$  serait constant, et l'on rentrerait dans le cas où les plans des lignes de l'une des courbures sont parallèles. Alors on tire des équations précédentes

$$\gamma = \frac{l'}{c'} \lambda, \quad \alpha = \left( l - \frac{cl'}{c'} \right) \lambda;$$

$\lambda$  ne peut être nul, car on aurait  $\alpha = 0$ ,  $\gamma = 0$ , et les plans des lignes

de la deuxième courbure seraient parallèles; il faut donc que  $\frac{l'}{c'}$  et  $l - \frac{cl'}{c'}$  soient constantes, et, par suite, que le rapport des quantités  $\alpha$  et  $\gamma$  soit constant. Cela prouve que les plans des lignes de la deuxième courbure sont parallèles à une droite fixe qui est située dans le plan des  $xz$ . On peut prendre cette droite pour axe des  $x$ , et l'on aura

$$\alpha = 0.$$

L'équation de condition (6) devient alors

$$c\gamma = l\lambda.$$

On ne peut avoir  $c = 0$  ni  $\gamma = 0$ , puisqu'on rentrerait dans le cas des plans parallèles. On a donc, en désignant par  $m$  une constante,

$$l = mc, \quad \lambda = \frac{\gamma}{m}.$$

Il résulte de cette discussion que les solutions de l'équation (5) se réduisent, pour notre objet, à trois seulement, et qui sont :

$$1^{\circ}. \quad a = 0, \quad b = 1, \quad c = 0, \quad \alpha = 1, \quad \xi = 0, \quad \lambda = 0;$$

$$2^{\circ}. \quad a = 0, \quad b = 1, \quad c = 0, \quad l = -m, \quad \xi = -m\lambda;$$

$$3^{\circ}. \quad a = 1, \quad b = 0, \quad l = mc, \quad \alpha = 0, \quad \xi = 1, \quad \lambda = \frac{\gamma}{m};$$

$m$  désigne partout une constante; les quantités dont la valeur n'est pas fixée, demeurent des fonctions arbitraires du paramètre  $t$  ou  $\theta$ . Nous allons examiner successivement les trois cas auxquels on est ici conduit.

## § II.

### *Premier cas.*

On a

$$a = 0, \quad b = 1, \quad c = 0, \quad \alpha = 1, \quad \xi = 0, \quad \lambda = 0;$$

si l'on fait, en outre,

$$\begin{aligned} l &= -t, & u &= f(t), \\ \gamma &= \theta, & v &= \varphi(\theta), \end{aligned}$$

$f$  et  $\varphi$  désignant deux fonctions arbitraires, les équations (1), (2), (3), (4) du § 1<sup>er</sup> deviennent

$$\begin{aligned} (1) \quad & \begin{cases} y = f(t), \\ q = t \sqrt{1 + p^2 + q^2}; \end{cases} \\ (2) \quad & \begin{cases} x + \theta z = \varphi(\theta), \\ p = \theta. \end{cases} \end{aligned}$$

L'élimination de  $t$  entre les équations (1), celle de  $\theta$  entre les équations (2), donnent

$$(3) \quad \begin{cases} y = f\left(\frac{q}{\sqrt{1 + p^2 + q^2}}\right), \\ x + pz = \varphi(p). \end{cases}$$

Chacune de ces équations aux différentielles premières renferme une fonction arbitraire et représente la surface cherchée. Elles constituent les deux intégrales intermédiaires d'une même équation différentielle partielle du deuxième ordre débarrassée d'arbitraires, et, par conséquent, en intégrant l'une quelconque d'entre elles, on obtiendra l'équation de la surface sous forme finie. Mais la connaissance des deux intégrales premières peut conduire, comme on sait, d'une manière plus rapide au résultat. Effectivement, la question se trouve alors ramenée à l'intégration de la seule équation

$$dz = p dx + q dy,$$

qui est aux différentielles ordinaires. Prenons  $t$  et  $\theta$  pour variables indépendantes; les équations (1) et (2) donnent

$$p = \theta, \quad q = \frac{t \sqrt{1 + \theta^2}}{\sqrt{1 - t^2}},$$

$$dy = f'(t) dt, \quad dx = -\theta dz - z d\theta + \varphi'(\theta) d\theta.$$

En portant ces valeurs de  $p$ ,  $q$ ,  $dx$  et  $dy$  dans l'équation

$$dz = p dx + q dy,$$

celle-ci devient

$$(4) \quad dz \sqrt{1 + \theta^2} + z \frac{\theta d\theta}{\sqrt{1 + \theta^2}} = \frac{t f'(t) dt}{\sqrt{1 - t^2}} + \frac{\theta \varphi'(\theta) d\theta}{\sqrt{1 + \theta^2}},$$



équations dont les deux membres sont séparément intégrables. Pour éviter les signes d'intégration, nous prendrons, au lieu de  $f(t)$  et  $\varphi(\theta)$ , deux autres fonctions arbitraires  $F(t)$  et  $\Phi(\theta)$  dont les dérivées  $F'(t)$  et  $\Phi'(\theta)$  soient telles que l'on ait

$$f(t) = (1-t^2)^{\frac{3}{2}} F'(t), \quad \varphi(\theta) = (1+\theta^2)^{\frac{3}{2}} \Phi'(\theta).$$

Intégrant alors l'équation (4), il vient

$$(5) \quad z\sqrt{1+\theta^2} = [t(1-t^2)F'(t) - F(t)] + [\theta(1+\theta^2)\Phi'(\theta) - \Phi(\theta)];$$

d'ailleurs la première équation (1) et la première équation (2) peuvent s'écrire

$$(6) \quad y = (1-t^2)^{\frac{3}{2}} F'(t),$$

$$(7) \quad x + \theta z = (1+\theta^2)^{\frac{3}{2}} \Phi'(\theta),$$

et il est clair que l'équation de la surface cherchée sera le résultat de l'élimination de  $t$  et  $\theta$  entre les équations (5), (6) et (7). On peut donner au résultat une forme plus élégante; en effet, si l'on élimine entre les équations (5), (6) et (7), les dérivées  $F'$  et  $\Phi'$  des fonctions arbitraires, il vient

$$\frac{z-\theta x}{\sqrt{1+\theta^2}} - \frac{ty}{\sqrt{1-t^2}} + F(t) + \Phi(\theta) = 0;$$

cette équation peut remplacer l'équation (5), et il est aisé de voir qu'on reproduit les équations (6) et (7) en la différentiant d'abord par rapport à  $t$ , puis par rapport à  $\theta$ . Si donc on fait

$$V = \frac{z-\theta x}{\sqrt{1+\theta^2}} - \frac{ty}{\sqrt{1-t^2}} + F(t) + \Phi(\theta),$$

l'équation de la surface cherchée sera le résultat de l'élimination de  $t$  et  $\theta$  entre les trois

$$(8) \quad V = 0, \quad \frac{dV}{dt} = 0, \quad \frac{dV}{d\theta} = 0.$$

On peut introduire  $p$  et  $q$  comme variables auxiliaires au lieu de  $t$  et  $\theta$ . Si l'on désigne par  $U$  le produit de  $V$  par  $\sqrt{1+\theta^2}$ , que l'on remplace  $t$  et  $\theta$  par leurs valeurs en fonction de  $p$  et  $q$ , et, enfin, qu'on

mette simplement  $\Phi(\theta)$  au lieu de  $\sqrt{1+\theta^2}\Phi(\theta)$ , on aura

$$U = z - px - qy + \sqrt{1+p^2} F\left(\frac{q}{\sqrt{1+p^2+q^2}}\right) + \Phi(p),$$

et il est évident qu'on peut prendre

$$(9) \quad U = 0, \quad \frac{dU}{dp} = 0, \quad \frac{dU}{dq} = 0,$$

à la place des équations (8).

Les surfaces représentées par les équations (8) ou (9) constituent un premier genre parmi celles dont toutes les lignes de courbure sont planes. Elles ont été étudiées par Monge, avec détail, dans son *Application de l'Analyse à la Géométrie* (cinquième édition, page 161). On trouvera dans cet ouvrage plusieurs générations élégantes de ces surfaces.

Dans l'analyse qui précède, nous avons pris la quantité  $-l$  pour le paramètre  $t$ ; nous avons donc exclu le cas de  $-l =$  une constante  $m$ . Dans ce cas, les équations qui doivent remplacer les équations (3) aux différentielles premières, sont évidemment

$$q = m\sqrt{1+p^2+q^2}, \\ x + pz = \varphi(p);$$

$\varphi$  désignant une fonction arbitraire. La première équation a lieu entre  $p$  et  $q$ , d'où il suit que la surface dont il s'agit est développable. La valeur de  $q$  en fonction de  $p$  est

$$q = \frac{m}{\sqrt{1-m^2}} \sqrt{1+p^2};$$

si donc  $\Phi$  désigne une fonction arbitraire, et que l'on fasse

$$U = z - px - \frac{m\sqrt{1+p^2}}{\sqrt{1-m^2}} y + \Phi(p),$$

l'équation de la surface sera le résultat de l'élimination de  $p$  entre les deux

$$U = 0, \quad \frac{dU}{dp} = 0.$$

Il est aisé de vérifier que ces deux équations entraîneront

$$x + pz = \varphi(p),$$

si l'on détermine la fonction arbitraire  $\Phi$  de manière que l'on ait

$$(1 + p^2) \Phi'(p) - p \Phi(p) = \varphi(p).$$

Nous avons encore exclu le cas de  $\gamma = \text{constante}$ , puisque nous avons pris  $\gamma$  pour le paramètre  $\theta$ . Mais comme l'équation (4) du § I<sup>er</sup> donne  $p = \gamma$ , on voit que le cas de  $\gamma$  constante est celui des surfaces cylindriques, qui peuvent être considérées comme un cas particulier des surfaces développables dont il vient d'être question.

### § III.

#### *Deuxième cas.*

La deuxième solution de l'équation (5) du § I<sup>er</sup> est

$$a = 0, \quad b = 1, \quad c = 0, \quad l = -m, \quad \epsilon = -m\lambda,$$

$m$  désignant une constante. Les équations relatives aux lignes de la première courbure ne renferment que la seule quantité arbitraire  $u$  qui peut être prise égale au paramètre  $t$ ; la seconde de ces équations, qui est

$$q = m \sqrt{1 + p^2 + q^2},$$

ne renferme aucune trace du paramètre  $t$ ; par suite, elle appartient à tous les points de la surface, qui n'est autre, comme on voit, que la surface développable considérée au § II.

Les deux équations relatives aux lignes de la deuxième courbure renferment *trois* arbitraires, fonctions du paramètre  $\theta$ . Cela provient de ce que les plans des lignes de la deuxième courbure sont essentiellement indéterminés; effectivement, ces lignes de courbure sont les génératrices rectilignes de la surface, et, par suite, leurs plans ne sont pas complètement déterminés. On peut faire cesser cette indétermination en convenant que les plans dont il s'agit soient parallèles à une droite fixe prise à volonté; c'est ainsi que la surface dé-

veloppable, dont il est ici question, s'est présentée naturellement comme un cas particulier de l'hypothèse discutée au § II.

La deuxième des trois solutions de l'équation (5) du § I<sup>er</sup> ne peut donc donner aucune surface nouvelle.

#### § IV.

##### *Troisième cas.*

On a ici

$$a = 1, \quad b = 0, \quad l = mc, \quad \alpha = 0, \quad \varepsilon = 1, \quad \lambda = \frac{\gamma}{m},$$

$m$  désignant une constante. Les quantités  $c$  et  $\gamma$  ne peuvent être supposées constantes ni l'une ni l'autre, car alors on rentrerait dans le cas du § II; nous ferons, en conséquence,

$$\begin{aligned} c &= -t, & u &= f(t), \\ \gamma &= -\theta, & v &= \varphi(\theta), \end{aligned}$$

$f$  et  $\varphi$  désignant deux fonctions arbitraires; les équations (1), (2), (3), (4) du § I<sup>er</sup> deviennent alors

$$\begin{aligned} (1) \quad & \begin{cases} x = tz + f(t), \\ p + t = mt\sqrt{1+p^2+q^2}, \end{cases} \\ (2) \quad & \begin{cases} y = \theta z + \varphi(\theta), \\ q + \theta = \frac{\theta}{m}\sqrt{1+p^2+q^2}. \end{cases} \end{aligned}$$

On aura les deux équations de la surface aux différentielles premières en éliminant  $t$  entre les équations (1) et  $\theta$  entre les équations (2); on trouve ainsi

$$(3) \quad \begin{cases} x = \frac{pz}{-1+m\sqrt{1+p^2+q^2}} + f\left(\frac{p}{-1+m\sqrt{1+p^2+q^2}}\right), \\ y = \frac{mqz}{-m+\sqrt{1+p^2+q^2}} + \varphi\left(\frac{mq}{-m+\sqrt{1+p^2+q^2}}\right); \end{cases}$$

mais il vaut mieux, pour obtenir l'équation sous forme finie, se servir des équations (1) et (2), en opérant comme au § II. Les équations (1)

et (2) donnent, en prenant  $t$  et  $\theta$  pour variables indépendantes,

$$p = \frac{(m^2-1)t\sqrt{m^2+(m^2-1)\theta^2}}{\sqrt{m^2+(m^2-1)\theta^2}-m^2\sqrt{1-(m^2-1)t^2}},$$

$$q = \frac{(m^2-1)\theta\sqrt{1-(m^2-1)t^2}}{\sqrt{m^2+(m^2-1)\theta^2}-m^2\sqrt{1-(m^2-1)t^2}},$$

$$dx = t dz + z dt + f'(t) dt,$$

$$dy = \theta dz + z d\theta + \varphi'(\theta) d\theta.$$

Portant ces valeurs de  $p$ ,  $q$ ,  $dx$  et  $dy$  dans l'équation

$$dz = p dx + q dy,$$

celle-ci devient

$$\begin{aligned} & \frac{1}{m^2-1} [\sqrt{m^2+(m^2-1)\theta^2} - \sqrt{1-(m^2-1)t^2}] dz \\ & + \left( \frac{t dt}{\sqrt{1-(m^2-1)t^2}} + \frac{\theta d\theta}{\sqrt{m^2+(m^2-1)\theta^2}} \right) z \\ & + \frac{t f'(t) dt}{\sqrt{1-(m^2-1)t^2}} + \frac{\theta \varphi'(\theta) d\theta}{\sqrt{m^2+(m^2-1)\theta^2}} = 0. \end{aligned}$$

Intégrant, il vient

$$(4) \quad \left\{ \begin{aligned} & \frac{\sqrt{m^2+(m^2-1)\theta^2} - \sqrt{1-(m^2-1)t^2}}{m^2-1} z \\ & + \int \frac{t f'(t) dt}{\sqrt{1-(m^2-1)t^2}} + \int \frac{\theta \varphi'(\theta) d\theta}{\sqrt{m^2+(m^2-1)\theta^2}} = 0. \end{aligned} \right.$$

La surface cherchée sera donc représentée par le système formé de la première équation (1), de la première équation (2) et de l'équation (4). On peut débarrasser le résultat des signes d'intégration qu'il renferme. Désignons, en effet, par  $F(t)$  et  $\Phi(\theta)$  deux nouvelles fonctions arbitraires, par  $F'(t)$  et  $\Phi'(\theta)$  les dérivées de ces fonctions, et posons

$$f(t) = [1 - (m^2 - 1)t^2]^{\frac{3}{2}} F'(t),$$

$$\varphi(\theta) = \frac{1}{m^2} [m^2 + (m^2 - 1)\theta^2]^{\frac{3}{2}} \Phi'(\theta);$$

l'équation (4) devient

$$(5) \left\{ \begin{aligned} & \frac{\sqrt{m^2 + (m^2 - 1)\theta^2} - \sqrt{1 - (m^2 - 1)t^2}}{m^2 - 1} z + t[1 - (m^2 - 1)t^2] F'(t) - F(t) \\ & + \frac{1}{m^2} \theta [m^2 + (m^2 - 1)\theta^2] \Phi'(\theta) - \Phi(\theta) = 0. \end{aligned} \right.$$

D'ailleurs la première équation (1) et la première équation (2) peuvent s'écrire ainsi :

$$(6) \quad x = tz + [1 - (m^2 - 1)t^2]^{\frac{1}{2}} F'(t),$$

$$(7) \quad y = \theta z + \frac{1}{m^2} [m^2 + (m^2 - 1)\theta^2]^{\frac{1}{2}} \Phi'(\theta).$$

Si l'on élimine  $F'$  et  $\Phi'$  entre les équations (5), (6) et (7), il vient

$$\begin{aligned} & \frac{1}{m^2 - 1} \left[ \frac{1}{\sqrt{1 - (m^2 - 1)t^2}} - \frac{m^2}{\sqrt{m^2 + (m^2 - 1)\theta^2}} \right] z \\ & - \frac{tx}{\sqrt{1 - (m^2 - 1)t^2}} - \frac{\theta y}{\sqrt{m^2 + (m^2 - 1)\theta^2}} + [F(t) + \Phi(\theta)] = 0. \end{aligned}$$

Cette équation peut remplacer l'équation (5), et il est aisé de voir qu'en la différentiant par rapport à  $t$  et par rapport à  $\theta$ , on reproduira les équations (6) et (7). Si donc on pose

$$\begin{aligned} V &= \frac{1}{m^2 - 1} \left[ \frac{1}{\sqrt{1 - (m^2 - 1)t^2}} - \frac{m^2}{\sqrt{m^2 + (m^2 - 1)\theta^2}} \right] z \\ & - \frac{t}{\sqrt{1 - (m^2 - 1)t^2}} x - \frac{\theta}{\sqrt{m^2 + (m^2 - 1)\theta^2}} y + [F(t) + \Phi(\theta)], \end{aligned}$$

l'équation de la surface cherchée sera le résultat de l'élimination de  $t$  et  $\theta$  entre les trois équations

$$(8) \quad V = 0, \quad \frac{dV}{dt} = 0, \quad \frac{dV}{d\theta} = 0.$$

Les surfaces représentées par ces équations (8) constituent un second genre de surfaces dont toutes les lignes de courbure sont planes. Il faut cependant remarquer qu'on pourrait en déduire les surfaces qui composent le premier genre en supposant  $m = 0$  ou  $m = \infty$ , et en opérant préalablement quelques transformations indispensables.

## § V.

Il est bon de remarquer que :

*Si dans une surface les lignes de courbure de l'un des systèmes sont planes, la même chose a lieu pour toutes les surfaces parallèles à la première, c'est-à-dire pour toutes les surfaces qui ont les mêmes normales.*

Considérons, en effet, une surface qui ait une ligne de courbure plane, et soit

$$ax + by + cz = u$$

l'équation du plan de cette ligne. On aura, pour tous les points de la ligne de courbure dont il s'agit, les deux équations

$$(1) \quad \begin{cases} ax + by + cz = u, \\ -ap - bq + c = l\sqrt{1 + p^2 + q^2}, \end{cases}$$

où  $a, b, c, u$  et  $l$  sont des constantes.

Cela posé, si l'on prend une longueur constante  $k$  sur chacune des normales de la surface donnée et à partir de cette surface, l'extrémité de la longueur  $k$  sera sur une surface parallèle. Les valeurs de  $p$  et  $q$  sont les mêmes pour un point de la surface donnée et pour le point correspondant de la surface parallèle; en outre, on passe du premier point au second en remplaçant  $x, y, z$  par

$$x - \frac{kp}{\sqrt{1 + p^2 + q^2}}, \quad y - \frac{kq}{\sqrt{1 + p^2 + q^2}}, \quad z + \frac{k}{\sqrt{1 + p^2 + q^2}};$$

en faisant cette substitution dans les équations (1), il vient

$$(2) \quad \begin{cases} ax + by + cz = u - kl, \\ -ap - bq + c = l\sqrt{1 + p^2 + q^2}. \end{cases}$$

Ces équations (2) appartiennent à une ligne tracée sur la surface parallèle à la surface donnée. Il est évident que cette ligne est plane et qu'elle est une ligne de courbure.

La série des normales à une surface, menées par les différents points d'une ligne de courbure plane, détermine donc des lignes de cour-

bure planes sur toutes les surfaces parallèles. Donc, en particulier, si dans une surface les lignes de courbure de l'un des systèmes sont planes, la même chose a lieu pour toutes les surfaces parallèles.

## DEUXIÈME PARTIE.

DES SURFACES DONT LES LIGNES DE COURBURE SONT PLANES  
DANS UN SYSTÈME ET SPHÉRIQUES DANS L'AUTRE.

### § 1<sup>er</sup>.

Il est nécessaire de rappeler ici, avant d'entrer en matière, en quoi consiste la transformation dite *par rayons vecteurs réciproques*.

Étant donné un système de points  $M, M', M'', \dots$ , si l'on joint ces points à un point quelconque  $O$ , et que sur les directions des rayons vecteurs  $OM, OM', OM'', \dots$  on prenne des longueurs  $OM_1, OM'_1, OM''_1, \dots$  telles que l'on ait

$$OM_1 = \frac{k}{OM}, \quad OM'_1 = \frac{k}{OM'}, \quad OM''_1 = \frac{k}{OM''}, \dots,$$

$k$  désignant une constante, les points  $M_1, M'_1, M''_1, \dots$  formeront une figure déduite de celle qui est formée par les points  $M, M', M'', \dots$  au moyen d'une *transformation par rayons vecteurs réciproques*. Le point  $O$  est dit le centre de la transformation.

En appliquant cette transformation par rayons vecteurs réciproques à un plan ou à une sphère, on obtient une sphère, à moins que le centre de la transformation ne soit sur le plan donné ou sur la sphère donnée, auquel cas la figure transformée est un plan. Il s'ensuit que la même transformation change une ligne droite ou une circonférence en une circonférence, à moins que la droite donnée ou la circonférence donnée ne passe par le centre de transformation, auquel cas la ligne transformée est droite.

La propriété la plus remarquable de la transformation par rayons vecteurs réciproques consiste dans la conservation des angles; en d'autres termes, si deux lignes se coupent, dans une figure, sous un certain



angle, les lignes correspondantes d'une autre figure, déduite de la première au moyen de notre transformation, se couperont sous le même angle. Et il résulte de là que :

*Si deux surfaces sont déduites l'une de l'autre, au moyen de la transformation par rayons vecteurs réciproques, les lignes de courbure de l'une des surfaces sont les transformées des lignes de courbure de l'autre [\*].*

De ce qui précède, on déduit immédiatement que :

*Si une surface a une ligne de courbure sphérique, la sphère sur laquelle se trouve cette ligne de courbure coupe la surface partout sous le même angle ; réciproquement, si une sphère coupe une surface partout sous le même angle, l'intersection est une ligne de courbure de la surface.*

En effet, si l'on effectue une transformation par rayons vecteurs réciproques, en plaçant le centre de transformation en un point de la ligne qu'il faut considérer sur la surface, cette ligne devient plane, les angles sont conservés et l'on rentre dans les conditions du théorème de M. Joachimsthal, théorème qui reçoit ainsi, comme on voit, une extension remarquable.

Il résulte de ce dernier théorème que :

*Si dans une surface les lignes de courbure de l'un des systèmes sont sphériques, la même chose a lieu pour toutes les surfaces parallèles à la première.*

## § II.

Ces préliminaires posés, nous allons procéder à la recherche des surfaces dont les lignes de courbure sont planes dans un système et sphériques dans l'autre.

Soient  $x, y, z$  les coordonnées rectangulaires de la surface cherchée;

---

[\*] Voir un Mémoire de M. Liouville, inséré au tome XII de ce Journal, page 265.

$p$  et  $q$  les dérivées partielles  $\frac{dz}{dx}$ ,  $\frac{dz}{dy}$ , on aura les quatre équations

$$\begin{aligned} (1) \quad & ax + by + cz = u, \\ (2) \quad & -ap - bq + c = l\sqrt{1 + p^2 + q^2}, \\ (3) \quad & (x - \alpha)^2 + (y - \beta)^2 + (z - \gamma)^2 = \alpha^2 + \beta^2 + \gamma^2 + 2v, \\ (4) \quad & -(x - \alpha)p - (y - \beta)q + (z - \gamma) = \lambda\sqrt{1 + p^2 + q^2}. \end{aligned}$$

Dans les équations (1) et (2), qui appartiennent aux lignes de courbure planes,  $a, b, c, u$  et  $l$  sont des fonctions d'un paramètre  $t$  dont l'une peut être prise égale à 1 et une autre à  $t$ . Dans les équations (3) et (4), qui appartiennent aux lignes de courbure sphériques,  $\alpha, \beta, \gamma, v$  et  $\lambda$  sont des fonctions d'un second paramètre  $\theta$  dont l'une peut être prise égale à  $\theta$ .

Pour avoir l'équation qui exprime que les équations (1) et (3) appartiennent à des lignes de courbure de systèmes différents, soient  $dx, dy, dz$  les variations de  $x, y, z$  sur la première ligne de courbure,  $\partial x, \partial y, \partial z$  les variations sur la seconde; on aura

$$dx \partial x + dy \partial y + dz \partial z = 0.$$

On peut chasser les six variations que renferme cette équation au moyen des suivantes :

$$\begin{aligned} a dx + b dy + c dz &= 0, \quad dz = p dx + q dy; \\ (x - \alpha) \partial x + (y - \beta) \partial y + (z - \gamma) \partial z &= 0, \quad \partial z = p \partial x + q \partial y; \end{aligned}$$

il vient ainsi

$$\begin{aligned} (bp - aq)[(y - \beta)p - (x - \alpha)q] + (a + cp)[(x - \alpha) + (z - \gamma)p] \\ + (b + cq)[(y - \beta) + (z - \gamma)q] = 0; \end{aligned}$$

en ajoutant à cette équation celle que l'on obtient en multipliant membre à membre, les équations (2) et (4), il vient

$$a(x - \alpha) + b(y - \beta) + c(z - \gamma) = l\lambda;$$

enfin, à cause de l'équation (1), celle-ci se réduit à

$$(5) \quad u = a\alpha + b\beta + c\gamma + l\lambda.$$

Pour mettre plus de clarté dans la discussion de l'équation (5) et pour n'omettre aucune de ses solutions, nous distinguerons quatre hypothèses qui sont les seules possibles et que nous allons examiner successivement.

1°. *Les quantités  $\alpha$ ,  $\beta$ ,  $\gamma$  sont liées par trois équations linéaires.* Dans cette hypothèse,  $\alpha$ ,  $\beta$ ,  $\gamma$  sont déterminées; les sphères qui contiennent les lignes de la seconde courbure sont concentriques, et en prenant leur centre commun pour origine des coordonnées, on aura

$$\alpha = 0, \quad \beta = 0, \quad \gamma = 0;$$

l'équation (5) se réduit alors à

$$u = l\lambda,$$

et elle exige que l'on ait

$$u = 0, \quad l = 0,$$

ou bien

$$\lambda = \text{une constante } m, \quad u = ml.$$

On a donc ces deux solutions de l'équation (5),

$$\alpha = 0, \quad \beta = 0, \quad \gamma = 0, \quad u = 0, \quad l = 0,$$

et

$$\alpha = 0, \quad \beta = 0, \quad \gamma = 0, \quad \lambda = m, \quad u = ml.$$

2°. *Les quantités  $\alpha$ ,  $\beta$ ,  $\gamma$  sont liées par deux équations linéaires.* Dans cette deuxième hypothèse, les centres des sphères qui contiennent les lignes de la seconde courbure sont sur une droite fixe; en prenant cette droite pour axe des  $z$ , on aura

$$\alpha = 0, \quad \beta = 0;$$

l'équation (5) se réduit alors à

$$u = c\gamma + l\lambda;$$

différentiant par rapport au paramètre  $\theta$  dont  $\gamma$  et  $\lambda$  dépendent seules, il vient

$$0 = c\gamma' + l\lambda'.$$

$\gamma'$  ne peut être nul, car autrement  $\gamma$  serait constant et l'on rentrerait dans la première hypothèse; on tire alors, des équations précédentes,

ces valeurs de  $c$  et  $u$ ,

$$c = -\frac{\lambda'}{\gamma'} l, \quad u = \left(\lambda - \frac{\gamma\lambda'}{\gamma'}\right) l.$$

D'où il suit qu'on doit avoir

$$c = -\frac{1}{m} l, \quad u = nl, \quad \frac{\lambda'}{\gamma'} = \frac{1}{m}, \quad \lambda - \frac{\gamma\lambda'}{\gamma'} = n,$$

c'est-à-dire

$$c = -\frac{1}{m} l, \quad u = nl, \quad \lambda = \frac{1}{m} \gamma + n,$$

$\frac{1}{m}$  et  $n$  étant des constantes; à moins que l'on n'ait

$$c = 0, \quad u = 0, \quad l = 0.$$

Si c'est le premier cas qui a lieu, le résultat est susceptible de simplification. On peut effectivement supposer que l'une des constantes  $\frac{1}{m}$  et  $n$  est nulle. En effet, si  $\frac{1}{m}$  n'est pas nul, à cause de

$$c = -\frac{1}{m} l, \quad u = nl,$$

les plans des lignes de la première courbure passent par un point fixe de l'axe des  $z$ , axe qui contient les centres des sphères des lignes de l'autre courbure; on peut prendre ce point fixe pour origine des coordonnées, et alors on aura

$$u = 0, \quad \text{c'est-à-dire} \quad n = 0.$$

La deuxième hypothèse que nous examinons fournit donc ces trois solutions de l'équation (5):

$$\alpha = 0, \quad \beta = 0, \quad \gamma = m\lambda, \quad c = -\frac{1}{m} l, \quad u = 0;$$

$$\alpha = 0, \quad \beta = 0, \quad \lambda = m, \quad c = 0, \quad u = ml;$$

$$\alpha = 0, \quad \beta = 0, \quad c = 0, \quad u = 0, \quad l = 0;$$

$m$  désignant une constante dans les deux premières solutions.

3°. Les quantités  $\alpha, \beta, \gamma$  sont liées par une seule équation linéaire. Dans cette troisième hypothèse, les centres des sphères qui contiennent

les lignes de la deuxième courbure sont dans un plan fixe. Si l'on prend ce plan fixe pour celui des  $xz$ , on aura

$$\xi = 0,$$

et l'équation (5) se réduit à

$$u = a\alpha + c\gamma + l\lambda;$$

en la différentiant deux fois par rapport à  $\theta$ , on trouve

$$0 = a\alpha' + c\gamma' + l\lambda',$$

$$0 = a\alpha'' + c\gamma'' + l\lambda'';$$

on ne peut avoir

$$\alpha'\gamma'' - \gamma'\alpha'' = 0,$$

car il en résulterait une relation linéaire entre  $\alpha$  et  $\gamma$ , et l'on rentrerait dans l'une des deux premières hypothèses; il s'ensuit que les trois équations précédentes donneront pour  $a$ ,  $c$  et  $u$  des valeurs de la forme

$$a = Al, \quad c = Cl, \quad u = Ul,$$

$A$ ,  $C$  et  $U$  étant indépendants du paramètre  $t$ . Si  $l$  est nul,  $a$ ,  $c$  et  $u$  le sont aussi; on obtient ainsi une solution de l'équation (5), savoir,

$$\xi = 0, \quad a = 0, \quad c = 0, \quad u = 0, \quad l = 0;$$

cette solution est insignifiante et nous n'en tiendrons pas compte, car elle ne donne évidemment d'autre surface que le plan  $y = 0$ . Ce cas mis de côté, on voit que  $A$ ,  $C$  et  $U$  sont des constantes; l'équation des plans des lignes de la première courbure devient

$$l(Ax + Cz - U) + b\gamma = 0;$$

elle ne renferme qu'un seul paramètre variable, savoir le rapport des quantités  $b$  et  $l$ ; il s'ensuit que les plans des lignes de la première courbure sont parallèles au plan des  $xz$  si  $A$  et  $C$  sont nuls tous deux; et que, dans le cas contraire, ces plans passent par une droite fixe située dans le plan  $xz$ .

Si les plans des lignes de la première courbure sont parallèles au

plan  $xz$ , on a

$$a = 0, \quad c = 0;$$

l'équation (5) se réduit à

$$u = l\lambda,$$

ce qui exige que l'on ait

$$\lambda = \text{une constante } m, \quad u = ml.$$

Si, au contraire, les plans des lignes de la première courbure passent par une droite fixe située dans le plan  $xz$ , on peut prendre cette droite pour axe des  $z$ , et l'on a

$$c = 0, \quad u = 0;$$

l'équation (5) se réduit à

$$a\alpha + l\lambda = 0.$$

On ne peut supposer ni  $a = 0$  ni  $\alpha = 0$ ; on a donc

$$l = ma, \quad \lambda = -\frac{1}{m}\alpha,$$

$m$  désignant une constante. On obtient ainsi ces deux solutions de l'équation (5), savoir,

$$\xi = 0, \quad \lambda = m, \quad a = 0, \quad c = 0, \quad u = ml;$$

$$\xi = 0, \quad \lambda = -\frac{1}{m}\alpha, \quad c = 0, \quad u = 0, \quad l = ma.$$

4°. Les quantités  $\alpha, \xi, \gamma$  ne sont liées entre elles par aucune équation linéaire. En différentiant trois fois, par rapport au paramètre  $\xi$ , l'équation de condition

$$u = a\alpha + b\beta + c\gamma + l\lambda,$$

il vient

$$0 = a\alpha' + b\beta' + c\gamma' + l\lambda',$$

$$0 = a\alpha'' + b\beta'' + c\gamma'' + l\lambda'',$$

$$0 = a\alpha''' + b\beta''' + c\gamma''' + l\lambda'''.$$

Le déterminant

$$\begin{cases} \alpha', & \xi', & \gamma', \\ \alpha'', & \xi'', & \gamma'', \\ \alpha''', & \xi''', & \gamma''', \end{cases}$$

ne peut être nul, car autrement il y aurait une relation linéaire entre  $\alpha, \xi, \gamma$ . On pourra donc tirer, des quatre équations précédentes, les valeurs de  $a, b, c$  et  $u$ , qui auront la forme

$$a = Al, \quad b = Bl, \quad c = Cl, \quad u = Ul,$$

$A, B, C$  et  $U$  étant indépendants de  $t$ . L'hypothèse  $l = 0$  donnerait  $a = 0, b = 0, c = 0, u = 0$ , solution insignifiante. En la rejetant, on voit que  $A, B, C$  et  $U$  sont constantes; l'équation des plans qui contiennent les lignes de première courbure devient

$$Ax + By + Cz = U;$$

elle ne renferme plus de traces du paramètre  $t$ ; par suite, notre quatrième hypothèse ne peut donner aucune surface autre que le plan.

Il résulte de cette discussion que l'équation (5) n'offre que sept solutions distinctes et utiles pour notre objet; savoir :

- |                  |               |                                 |                      |                      |                |
|------------------|---------------|---------------------------------|----------------------|----------------------|----------------|
| 1 <sup>o</sup> . | $\alpha = 0,$ | $\xi = 0,$                      | $\gamma = 0,$        | $u = 0,$             | $l = 0;$       |
| 2 <sup>o</sup> . | $\alpha = 0,$ | $\xi = 0,$                      | $\gamma = 0,$        | $\lambda = m,$       | $u = ml;$      |
| 3 <sup>o</sup> . | $\alpha = 0,$ | $\xi = 0,$                      | $\gamma = m\lambda,$ | $c = -\frac{1}{m}l,$ | $u = 0;$       |
| 4 <sup>o</sup> . | $\alpha = 0,$ | $\xi = 0,$                      | $\lambda = m,$       | $c = 0,$             | $u = ml;$      |
| 5 <sup>o</sup> . | $\alpha = 0,$ | $\xi = 0,$                      | $c = 0,$             | $u = 0,$             | $l = 0;$       |
| 6 <sup>o</sup> . | $\xi = 0,$    | $\lambda = m,$                  | $a = 0,$             | $c = 0,$             | $u = ml;$      |
| 7 <sup>o</sup> . | $\xi = 0,$    | $\lambda = -\frac{1}{m}\alpha,$ | $c = 0,$             | $u = 0,$             | $l = m\alpha.$ |

Nous allons étudier les surfaces qui correspondent à ces divers cas.

### § III.

#### *Premier cas.*

On a

$$\alpha = 0, \quad \xi = 0, \quad \gamma = 0, \quad u = 0, \quad l = 0;$$

si l'on fait, en outre,

$$a = t, \quad b = f(t), \quad c = -1, \quad 2v = \theta, \quad \lambda = \varphi(\theta),$$

$f$  et  $\varphi$  désignant deux fonctions arbitraires, les équations (1), (2),

(3), (4) du § II deviennent :

$$\begin{aligned} (1) \quad & \begin{cases} z = tx + yf(t), \\ pt + qf(t) + 1 = 0; \end{cases} \\ (2) \quad & \begin{cases} x^2 + y^2 + z^2 = \theta, \\ z - px - qy = \varphi(\theta) \sqrt{1 + p^2 + q^2}. \end{cases} \end{aligned}$$

Si l'on résout les équations (1) par rapport à  $t$  et  $f(t)$ , on trouve

$$\frac{y + qz}{qx - py} = t, \quad \frac{x + pz}{qx - py} = -f(t);$$

éliminant  $t$ , il vient

$$(3) \quad \frac{x + pz}{qx - py} + f\left(\frac{y + qz}{qx - py}\right) = 0.$$

Cette équation est l'une des deux équations aux différentielles premières de la surface. On aura l'autre équation aux différentielles premières en éliminant  $\theta$  entre les équations (2); il vient ainsi

$$(4) \quad z - px - qy = \sqrt{1 + p^2 + q^2} \varphi(x^2 + y^2 + z^2).$$

On obtiendrait l'équation de la surface sous forme finie en intégrant l'une ou l'autre des équations (3) et (4); mais il vaut mieux faire usage des quatre équations (1) et (2). Nous mettrons  $a$  et  $b$  au lieu de  $t$  et  $f(t)$  dans les équations (1), et nous considérerons  $a$  et  $b$  comme des fonctions quelconques du paramètre  $t$ . Nous déterminerons ultérieurement ces deux quantités qui ne doivent contenir qu'une fonction arbitraire, de manière à présenter le résultat sous la forme la plus simple possible. Les équations dont nous ferons usage sont donc

$$(5) \quad \begin{cases} z = ax + by, \\ ap + bq + 1 = 0, \\ x^2 + y^2 + z^2 = \theta, \\ z - px - qy = \varphi(\theta) \sqrt{1 + p^2 + q^2}. \end{cases}$$

La deuxième équation (5) et l'équation

$$dz = p dx + q dy$$



donnent les valeurs suivantes de  $p$  et  $q$ ,

$$p = -\frac{dy + b dz}{a dy - b dx}, \quad q = \frac{dx + a dz}{a dy - b dx};$$

en portant ces valeurs dans la quatrième équation (5), il vient

$$\begin{aligned} & a(z dy - y dz) + b(x dz - z dx) - (y dx - x dy) \\ &= \varphi(\theta) \sqrt{(a^2 + b^2 + 1)(dx^2 + dy^2 + dz^2) - (dz - a dx - b dy)^2}. \end{aligned}$$

Cette équation est l'équation différentielle ordinaire de la surface cherchée;  $dx$ ,  $dy$ ,  $dz$  y désignent les variations infiniment petites des coordonnées  $x$ ,  $y$ ,  $z$  d'un point qui se déplace sur la surface en suivant une direction arbitraire. Si le déplacement dont il s'agit se fait sur la ligne de première courbure, on a

$$dz - a dx - b dy = 0,$$

et l'équation précédente devient

$$(6) \quad \begin{cases} \frac{a}{\sqrt{1+a^2+b^2}}(z dy - y dz) + \frac{b}{\sqrt{1+a^2+b^2}}(x dz - z dx) \\ + \frac{-1}{\sqrt{1+a^2+b^2}}(y dx - x dy) = \varphi(\theta) \sqrt{dx^2 + dy^2 + dz^2}. \end{cases}$$

$z dy - y dz$ ,  $x dz - z dx$  et  $y dx - x dy$  sont les projections, sur les trois plans coordonnés, du double de l'aire infiniment petite décrite par le rayon vecteur de la ligne de première courbure; le premier membre de l'équation précédente représente donc le double de cette aire elle-même, et il aura pour valeur  $y' dx' - x' dy'$ , si l'on désigne par  $x'$ ,  $y'$  des coordonnées rectangulaires situées dans le plan de la ligne de courbure et ayant même origine que les coordonnées  $x$ ,  $y$ ,  $z$ . Alors on a évidemment

$$\theta = x^2 + y^2 + z^2 = x'^2 + y'^2, \quad dx^2 + dy^2 + dz^2 = dx'^2 + dy'^2;$$

par conséquent, l'équation (6) se réduit à

$$(7) \quad y' dx' - x' dy' = \varphi(\theta) \sqrt{dx'^2 + dy'^2},$$

et on a, nous le répétons,

$$\theta = x'^2 + y'^2.$$

Nous prendrons pour fonction arbitraire, au lieu de  $\varphi(\theta)$ , une fonction  $\Phi(\theta)$ , telle que

$$(8) \quad \varphi = \frac{\Phi - 2\theta\Phi'}{\sqrt{1 - 4\Phi\Phi' + 4\theta^2\Phi'^2}},$$

$\Phi'$  étant la dérivée de  $\Phi$ ; on trouve alors aisément que l'intégrale de l'équation (7) est

$$(9) \quad x' \cos g - y' \sin g = \Phi(\theta).$$

$g$  désigne la constante arbitraire introduite par l'intégration; mais il faut remarquer que cette constante peut varier avec le paramètre  $t$ . Quoi qu'il en soit, l'équation (9) exprime que les lignes de courbure planes sont égales entre elles; effectivement, chacune de ces lignes est définie par cette propriété, que *la projection du rayon vecteur sur une droite fixe est égale à une même fonction  $\Phi$  du carré de ce rayon vecteur*. Nous supposons que la droite fixe dont il s'agit fasse avec les axes des  $x$ , des  $y$  et des  $z$  des angles dont les cosinus soient proportionnels à  $t$ ,  $f(t)$  et  $1$ ; la fonction arbitraire du paramètre  $t$ , qui doit entrer dans l'équation finale, est ainsi fixée. Revenant aux coordonnées  $x, y, z$ , l'équation (9) devient

$$z + tx + fy = \sqrt{1 + t^2 + f^2} \Phi(\theta).$$

Nous la représenterons simplement par

$$(10) \quad V = 0,$$

en posant

$$(11) \quad V = z + tx + fy - \sqrt{1 + t^2 + f^2} \Phi(x^2 + y^2 + z^2).$$

Il s'agit maintenant de déterminer  $a$  et  $b$  en fonction de  $t$  et  $f$ ; cela fait, l'équation (10) et la première équation (5) feront connaître la surface cherchée.

Remarquons d'abord que la droite qui fait avec les axes des angles dont les cosinus sont proportionnels à  $t$ ,  $f(t)$  et  $1$ , est située dans le plan représenté par la première équation (5); on a donc

$$(12) \quad at + bf = 1.$$

En second lieu, différencions l'équation (10) et la première équation (5); il vient

$$dz + t dx + f dy - 2(x dx + y dy + z dz) \sqrt{1 + t^2 + f^2} \Phi' + \frac{dV}{dt} dt = 0,$$

$$dz - a dx - b dy = (a' x + b' y) dt;$$

d'où, en éliminant  $dt$ ,

$$(13) \quad \begin{cases} dz + t dx + f dy - 2(x dx + y dy + z dz) \sqrt{1 + t^2 + f^2} \Phi' \\ + \frac{dz - a dx - b dy}{a' x + b' y} \frac{dV}{dt} = 0. \end{cases}$$

Cette équation, qui ne renferme que les différentielles des coordonnées  $x, y, z$ , doit être identique avec

$$dz = p dx + q dy;$$

on doit donc trouver une équation identique en vertu de celles déjà formées, en portant dans la deuxième équation (5) les valeurs de  $p$  et  $q$  tirées de l'équation (13): or, il est aisé de voir qu'on obtiendra le même résultat en remplaçant, dans l'équation (13),  $dx, dy$  et  $dz$  par  $a, b$  et  $-1$  respectivement. On trouve ainsi, en ayant égard à l'équation (12) et à la première équation (5),

$$(14) \quad \frac{dV}{dt} = 0.$$

Ainsi les valeurs de  $a$  et  $b$  en fonction de  $t$  et  $f$  doivent être telles, que la première équation (5), l'équation (10) et l'équation (14) appartiennent toutes trois à la surface. Mais les deux dernières équations ne renferment ni  $a$  ni  $b$ ; il est dès lors inutile de déterminer leurs valeurs, et l'équation de la surface cherchée s'obtiendra en éliminant  $t$  entre les équations

$$(15) \quad V = 0, \quad \frac{dV}{dt} = 0.$$

La surface dont nous venons de former les équations est celle dont toutes les normales sont tangentes à la surface d'un cône à base arbitraire. Elle a été étudiée par Monge, qui en a fait connaître diverses

propriétés dans son *Application de l'Analyse à la Géométrie* (cinquième édition, page 286); elle constitue un premier genre parmi les surfaces que nous examinons dans cette deuxième partie de notre Mémoire.

§ IV.

*Deuxième cas.*

On a

$$\alpha = 0, \quad \beta = 0, \quad \gamma = 0, \quad \lambda = m, \quad u = ml;$$

les équations relatives aux lignes de première courbure sont

$$\begin{aligned} ax + by + cz &= ml, \\ -ap - bq + c &= l\sqrt{1 + p^2 + q^2}. \end{aligned}$$

On peut faire l'une des quantités  $a, b, c, l$  égale à 1, et l'une des trois autres égale à  $t$ ; les deux autres demeurent des fonctions indéterminées du paramètre  $t$ . Au contraire, les équations qui se rapportent aux lignes de courbure sphériques ne renferment que la seule arbitraire  $2v$ , qui peut être prise pour le paramètre des lignes de seconde courbure. Ces équations sont, en effet,

$$\begin{aligned} x^2 + y^2 + z^2 &= 2v, \\ z - px - qy &= m\sqrt{1 + p^2 + q^2}. \end{aligned}$$

La dernière de ces équations ne renferme pas le paramètre  $\theta$ ; la surface dont il s'agit a donc l'équation

$$(1) \quad z - px - qy = m\sqrt{1 + p^2 + q^2};$$

cette surface est développable, les lignes de la première courbure sont les génératrices droites, et, par suite, les plans de ces lignes sont essentiellement indéterminés.

Si l'on désigne par  $t$  un paramètre, par  $f(t)$  une fonction arbitraire, et qu'on fasse

$$V = z + tx + fy - m\sqrt{1 + t^2 + f^2},$$

l'équation de la surface cherchée sera le résultat de l'élimination de  $t$

entre les deux équations

$$V = 0, \quad \frac{dV}{dt} = 0.$$

Il est ainsi aisé de voir que l'arête de rebroussement de cette surface développable est située sur la sphère de rayon  $m$ . Dans le cas particulier de  $m = 0$ , on obtient les surfaces coniques à base arbitraire.

La surface dont nous nous occupons est comprise dans celles qui forment le premier genre et que nous avons étudiées au paragraphe précédent. On l'obtient en supposant  $\Phi = m$  dans les équations (15) de ce paragraphe.

Il faut remarquer que l'analyse ne peut ici déterminer les plans des lignes de la première courbure, mais on est le maître d'assujettir ces plans à passer par un point fixe. Tout devient alors déterminé et l'on rentre dans l'analyse du § III.

## § V.

### *Troisième cas.*

$$\alpha = 0, \quad \beta = 0, \quad \gamma = m\lambda, \quad c = -\frac{1}{m}l, \quad u = 0;$$

si l'on fait, en outre,

$$a = t, \quad b = f(t), \quad c = -1, \quad 2v = \theta, \quad \lambda = \varphi(\theta),$$

$f$  et  $\varphi$  désignant deux fonctions arbitraires, les équations (1), (2), (3), (4) du § II deviennent :

$$\begin{aligned} (1) \quad & \begin{cases} z = tx + yf(t), \\ pt + qf(t) + 1 = -m\sqrt{1+p^2+q^2}; \end{cases} \\ (2) \quad & \begin{cases} x^2 + y^2 + z^2 - 2mz\varphi(\theta) = \theta, \\ z - px - qy = (m + \sqrt{1+p^2+q^2})\varphi(\theta). \end{cases} \end{aligned}$$

Si l'on élimine  $t$  entre les équations (1),  $\theta$  entre les équations (2), on aura les deux équations aux différentielles premières de la surface

dont nous nous occupons; savoir,

$$(3) \quad \frac{pz + x(1 + m\sqrt{1 + p^2 + q^2})}{qx - py} + f\left[\frac{qz + y(1 + m\sqrt{1 + p^2 + q^2})}{qx - py}\right] = 0.$$

$$(4) \quad \frac{z - px - qy}{m + \sqrt{1 + p^2 + q^2}} = \varphi\left(x^2 + y^2 + z^2 - 2mz \frac{z - px - qy}{m + \sqrt{1 + p^2 + q^2}}\right).$$

Ces équations sont trop compliquées pour servir utilement à la recherche de l'équation sous forme finie. Il vaut mieux conserver les équations (1) et (2); mais ici, comme au § III, nous remettrons  $a$  et  $b$  au lieu de  $t$  et  $f(t)$ , nous réservant de déterminer ultérieurement la fonction arbitraire du paramètre  $t$  qui doit entrer dans le résultat final. Les équations que nous emploierons sont donc

$$(5) \quad \begin{cases} z = ax + by, \\ ap + bq + 1 = -m\sqrt{1 + p^2 + q^2}, \\ x^2 + y^2 + z^2 - 2mz\varphi = \theta, \\ z - px - qy = (m + \sqrt{1 + p^2 + q^2})\varphi. \end{cases}$$

Différentiant la dernière équation (5), il vient

$$-x dp - y dq = (m + \sqrt{1 + p^2 + q^2}) \varphi' d\theta + \frac{p dp + q dq}{\sqrt{1 + p^2 + q^2}} \varphi;$$

si donc on prend  $p$  et  $q$  pour variables indépendantes, on aura

$$(6) \quad x = -(m + \sqrt{1 + p^2 + q^2}) \varphi' \frac{d\theta}{dp} - \varphi \frac{p}{\sqrt{1 + p^2 + q^2}},$$

$$(7) \quad y = -(m + \sqrt{1 + p^2 + q^2}) \varphi' \frac{d\theta}{dq} - \varphi \frac{q}{\sqrt{1 + p^2 + q^2}};$$

portant ces valeurs de  $x$  et  $y$  dans la dernière équation (5), il vient

$$(8) \quad z = -(m + \sqrt{1 + p^2 + q^2}) \varphi' \left(p \frac{d\theta}{dp} + q \frac{d\theta}{dq}\right) + \varphi \frac{1 + m\sqrt{1 + p^2 + q^2}}{\sqrt{1 + p^2 + q^2}}.$$

Substituons à  $x$ ,  $y$  et  $z$  les valeurs précédentes dans la première équation (5) et dans la troisième, il viendra, en ayant égard à la deuxième

équation (5),

$$(9) \quad (a-p) \frac{d\theta}{dp} + (b-q) \frac{d\theta}{dq} = 0,$$

$$(10) \quad \left\{ \begin{array}{l} (m^2-1)\varphi^2 + \theta \\ = (m + \sqrt{1+p^2+q^2})^2 \varphi'^2 \left[ \left( \frac{d\theta}{dp} \right)^2 + \left( \frac{d\theta}{dq} \right)^2 + \left( p \frac{d\theta}{dp} + q \frac{d\theta}{dq} \right)^2 \right]. \end{array} \right.$$

Des équations (9) et (10) on tire, en ayant égard à la deuxième équation (5),

$$\frac{d\theta}{dp} = (b-q) \frac{\sqrt{(m^2-1)\varphi^2 + \theta}}{\varphi' \cdot (m + \sqrt{1+p^2+q^2}) \sqrt{1+p^2+q^2} \sqrt{a^2+b^2+1-m^2}},$$

$$\frac{d\theta}{dq} = - (a-p) \frac{\sqrt{(m^2-1)\varphi^2 + \theta}}{\varphi' \cdot (m + \sqrt{1+p^2+q^2}) \sqrt{1+p^2+q^2} \sqrt{a^2+b^2+1-m^2}}.$$

Si l'on porte ces valeurs de  $\frac{d\theta}{dp}$  et  $\frac{d\theta}{dq}$  dans l'équation

$$d\theta = \frac{d\theta}{dp} dp + \frac{d\theta}{dq} dq,$$

il vient

$$(11) \quad \frac{\varphi' d\theta}{\sqrt{(m^2-1)\varphi^2 + \theta}} = \frac{(b-q) dp - (a-p) dq}{(m + \sqrt{1+p^2+q^2}) \sqrt{1+p^2+q^2} \sqrt{a^2+b^2+1-m^2}}.$$

Au moyen de la deuxième équation (5), on peut ramener le second membre de l'équation (11) à ne plus contenir que deux variables, et, par suite, à être une différentielle exacte, puisque le premier membre en est une. Voici, je crois, le moyen le plus simple de faire le calcul. Soit  $\zeta$  une nouvelle variable, telle que

$$(12) \quad \sin \zeta = \frac{\sqrt{a^2+b^2+1-m^2}}{\sqrt{a^2+b^2}} \cdot \frac{1+m\sqrt{1+p^2+q^2}}{m+\sqrt{1+p^2+q^2}}.$$

De l'équation (12) jointe à la deuxième équation (5), on peut tirer les valeurs de  $p$  et  $q$  en fonction des deux variables  $\zeta$  et  $t$ ; on aura ensuite aisément leurs différentielles, et en substituant dans l'équation (11), il viendra

$$(13) \quad \frac{\sqrt{1-m^2} \varphi' d\theta}{\sqrt{(m^2-1)\varphi^2 + \theta}} + \frac{\sqrt{1-m^2} (ba' - ab') dt}{(a^2+b^2) \sqrt{a^2+b^2+1-m^2}} + d\zeta = 0,$$

équation où les variables sont séparées, et qui est, par conséquent, immédiatement intégrable.

Pour avoir un résultat débarrassé de signes d'intégration, nous prendrons, au lieu de  $\varphi(\theta)$ , une autre fonction arbitraire  $\Phi(\theta)$ , telle que l'on ait

$$(14) \quad \varphi = \frac{\Phi - 2\theta\Phi'}{\sqrt{1-4(1-m^2)\Phi\Phi' + 4(1-m^2)\theta\Phi'^2}},$$

et, par suite,

$$\sqrt{(m^2-1)\varphi^2 + \theta} = \frac{\sqrt{(m^2-1)\Phi^2 + \theta}}{\sqrt{1-4(1-m^2)\Phi\Phi' + 4(1-m^2)\theta\Phi'^2}},$$

$$\frac{\varphi}{\sqrt{(m^2-1)\varphi^2 + \theta}} = \frac{\Phi - 2\theta\Phi'}{\sqrt{(m^2-1)\Phi^2 + \theta}}.$$

Nous ferons aussi, pour abréger,

$$(15) \quad \begin{cases} \frac{\varphi\sqrt{1-m^2}}{\sqrt{\theta}} = \sin \Theta_0, & \frac{\sqrt{(m^2-1)\varphi^2 + \theta}}{\sqrt{\theta}} = \cos \Theta_0, \\ \frac{\Phi\sqrt{1-m^2}}{\sqrt{\theta}} = \sin \Theta, & \frac{\sqrt{(m^2-1)\Phi^2 + \theta}}{\sqrt{\theta}} = \cos \Theta, \end{cases}$$

équations d'où l'on déduit immédiatement, par la différentiation.

$$(16) \quad d\Theta_0 - d\Theta = \frac{\sqrt{1-m^2}\varphi' d\theta}{\sqrt{(m^2-1)\varphi^2 + \theta}}.$$

Il reste encore à indiquer quelle sera la fonction arbitraire  $f$  du paramètre  $t$  qui doit entrer dans le résultat; nous la définirons en posant

$$(17) \quad \begin{cases} a = \frac{1+t^2+f^2+m\sqrt{1+t^2+f^2}}{t+ff'} - t, \\ b = \frac{1+t^2+f^2+m\sqrt{1+t^2+f^2}}{t+ff'} f' - f; \end{cases}$$

équations d'où l'on tire aisément

$$(18) \quad a^2 + b^2 + 1 - m^2 = \frac{(m + \sqrt{1+t^2+f^2})^2 [1+f'^2 + (tf' - f)^2]}{(t+ff')^2},$$



puis

$$(19) \quad \left\{ \begin{aligned} \frac{ba' - ab'}{\sqrt{a^2 + b^2 + 1 - m^2}} &= - \frac{(tf' - f) \sqrt{1 + f'^2 + (tf' - f)^2}}{(t + ff') \sqrt{1 + t^2 + f^2}} \\ &\quad - \frac{f'' (1 + m \sqrt{1 + t^2 + f^2}) \sqrt{1 + t^2 + f^2}}{(t + ff') \sqrt{1 + f'^2 + (tf' - f)^2}}. \end{aligned} \right.$$

Or si l'on fait, pour abréger,

$$(20) \quad \left\{ \begin{aligned} \frac{(1 + m \sqrt{1 + t^2 + f^2}) \sqrt{1 + f'^2 + (tf' - f)^2}}{(t + ff') \sqrt{a^2 + b^2}} &= \sin T, \\ \frac{\sqrt{1 - m^2} \sqrt{1 + t^2 + f^2} (tf' - f)}{(t + ff') \sqrt{a^2 + b^2}} &= \cos T, \end{aligned} \right.$$

l'équation (19) se réduit à

$$(21) \quad \frac{\sqrt{1 - m^2} (ba' - ab')}{(a^2 + b^2) \sqrt{a^2 + b^2 + 1 - m^2}} = \frac{dT}{dt}.$$

En vertu des équations (16) et (21), l'équation (13), qu'il s'agit d'intégrer, devient

$$(22) \quad d\Theta_0 - d\Theta + dT + d\zeta = 0,$$

et l'on en tire

$$\Theta_0 - \Theta + T + \zeta = \text{constante}.$$

On peut supposer la constante nulle, car elle se fond dans  $\Theta$ . Effectivement, l'équation (14) peut s'écrire

$$d\Theta = - \sqrt{1 - m^2} \frac{\varphi d\theta}{2\theta \sqrt{(m^2 - 1)\varphi^2 + \theta}};$$

la fonction  $\Phi$  est donc telle, que la fonction  $\Theta$  qui en dépend se trouve naturellement munie d'une constante arbitraire qui y entre par addition. Ainsi, on peut écrire

$$\zeta = \Theta - \Theta_0 - T;$$

d'où

$$\begin{aligned} \sin \zeta &= (\sin \Theta \cos \Theta_0 - \cos \Theta \sin \Theta_0) \cos T \\ &\quad - (\cos \Theta \cos \Theta_0 + \sin \Theta \sin \Theta_0) \sin T. \end{aligned}$$

En vertu des équations (12), (15), (18) et (20), cette équation devient

$$(23) \left\{ \begin{aligned} & (m + \sqrt{1+t^2+f^2}) \sqrt{1+f'^2+(tf'-f)^2} \frac{1+m\sqrt{1+p^2+q^2}}{m+\sqrt{1+p^2+q^2}} \\ & = (1-m^2) \sqrt{1+t^2+f^2} (tf'-f) \left[ \frac{\Phi \sqrt{(m^2-1)\varphi^2+\theta} - \varphi \sqrt{(m^2-1)\Phi^2+\theta}}{\theta} \right] \\ & - (1+m\sqrt{1+t^2+f^2}) \sqrt{1+f'^2+(tf'-f)^2} \left[ \frac{\sqrt{(m^2-1)\Phi^2+\theta} \sqrt{(m^2-1)\varphi^2+\theta} - (m^2-1)\Phi\varphi}{\theta} \right] \end{aligned} \right.$$

Si l'on suppose que  $\alpha$ ,  $b$  et  $\varphi$  soient partout remplacées par leurs valeurs tirées des équations (14) et (17), l'équation de la surface cherchée sera le résultat de l'élimination de  $p$ ,  $q$ ,  $t$  et  $\theta$  entre les quatre équations (5) et l'équation (23). On peut donner au résultat une forme un peu plus simple, mais les calculs sont compliqués, et nous nous bornerons à ce qui précède.

Les surfaces dont nous venons de former les équations constituent un second genre parmi celles dont les lignes de courbure sont planes dans un système et sphériques dans l'autre. Les plans des lignes de l'une des courbures sont tangents à une surface conique à base arbitraire, et coupent la surface sous un angle dont le cosinus est proportionnel au cosinus de l'angle que ces mêmes plans font avec un plan fixe. Ces surfaces comprennent, comme cas particulier correspondant à  $m = 0$ , les surfaces dont nous avons formé le premier genre; mais celles-ci ont une propriété qui leur appartient exclusivement, propriété qui consiste en ce que les lignes de l'une des courbures sont sur des sphères concentriques; c'est pour cette raison que nous avons cru devoir les considérer à part.

## § VI.

### Quatrième cas.

On a

$$\alpha = 0, \quad \xi = 0, \quad \lambda = m, \quad c = 0, \quad u = mt;$$

si l'on fait, en outre,

$$a = t, \quad b = -1, \quad t = f(t), \quad \gamma = \theta, \quad 2\gamma = \varphi(\theta),$$

$f$  et  $\varphi$  désignant deux fonctions arbitraires, les équations (1), (2), (3), (4) du § II deviennent :

$$(1) \quad \begin{cases} y = tx - mf(t), \\ q - pt = f(t) \sqrt{1 + p^2 + q^2}; \end{cases}$$

$$(2) \quad \begin{cases} x^2 + y^2 + z^2 - 2\theta z = \varphi(\theta), \\ z - px - qy = \theta + m \sqrt{1 + p^2 + q^2}. \end{cases}$$

Si l'on élimine  $t$  entre les équations (1),  $\theta$  entre les équations (2), on obtient les suivantes :

$$(3) \quad \frac{qx - py}{x \sqrt{1 + p^2 + q^2} + mp} = f \left( \frac{y \sqrt{1 + p^2 + q^2} + mq}{x \sqrt{1 + p^2 + q^2} + mp} \right),$$

$$(4) \quad \begin{cases} x^2 + y^2 + z^2 - 2z(z - px - qy - m \sqrt{1 + p^2 + q^2}) \\ = \varphi(z - px - qy - m \sqrt{1 + p^2 + q^2}) \end{cases},$$

qui sont les deux équations aux différentielles premières de la surface dont nous nous occupons. Pour avoir l'équation sous forme finie, nous nous servirons des équations (1) et (2). Si l'on différentie la deuxième équation (2), il vient

$$-x dp - y dq = d\theta + m \frac{p dp + q dq}{\sqrt{1 + p^2 + q^2}};$$

en prenant donc  $p$  et  $q$  pour les variables indépendantes, on a

$$(5) \quad x = -\frac{d\theta}{dp} - m \frac{p}{\sqrt{1 + p^2 + q^2}},$$

$$(6) \quad y = -\frac{d\theta}{dq} - m \frac{q}{\sqrt{1 + p^2 + q^2}};$$

la deuxième équation (2) donne ensuite

$$(7) \quad z - \theta = -\left(p \frac{d\theta}{dp} + q \frac{d\theta}{dq}\right) + m \frac{1}{\sqrt{1 + p^2 + q^2}}.$$

Portant les valeurs de  $x$ ,  $y$ ,  $z$ , tirées des équations (5), (6) et (7), dans la première équation (1) et dans la première équation (2), il vient,

en ayant égard à la deuxième équation (1),

$$(8) \quad \frac{d\theta}{dq} = t \frac{d\theta}{dp},$$

$$(9) \quad \left(\frac{d\theta}{dp}\right)^2 + \left(\frac{d\theta}{dq}\right)^2 + \left(p \frac{d\theta}{dp} + q \frac{d\theta}{dq}\right)^2 = \varphi(\theta) + \theta^2 - m^2.$$

Des équations (8) et (9) on tire

$$\frac{d\theta}{dp} = \frac{\sqrt{\varphi(\theta) + \theta^2 - m^2}}{\sqrt{1 + t^2 + (p + qt)^2}},$$

$$\frac{d\theta}{dq} = t \frac{\sqrt{\varphi(\theta) + \theta^2 - m^2}}{\sqrt{1 + t^2 + (p + qt)^2}};$$

l'équation

$$d\theta = \frac{d\theta}{dp} dp + \frac{d\theta}{dq} dq$$

devient alors

$$(10) \quad \frac{d\theta}{\sqrt{\varphi(\theta) + \theta^2 - m^2}} = \frac{dp + tdq}{\sqrt{1 + t^2 + (p + qt)^2}}.$$

Au moyen de la deuxième équation (1), on peut ramener le second membre de l'équation (10) à ne plus contenir que deux variables ; dès lors ce deuxième membre deviendra une différentielle exacte, et l'équation (10) sera immédiatement intégrable. Soit  $\zeta$  une nouvelle variable telle que l'on ait

$$(11) \quad p + qt = \zeta \sqrt{1 + t^2},$$

$$(12) \quad dp + tdq = d\zeta \sqrt{1 + t^2} + \left( \frac{\zeta t}{\sqrt{1 + t^2}} - q \right) dt;$$

l'équation (10) devient

$$(13) \quad \frac{d\theta}{\sqrt{\varphi(\theta) + \theta^2 - m^2}} = \frac{d\zeta}{\sqrt{\zeta^2 + 1}} + \frac{\zeta t - q \sqrt{1 + t^2}}{(1 + t^2) \sqrt{\zeta^2 + 1}} dt.$$

Or, si l'on élimine  $p$  entre l'équation (10) et la première équation (1), l'équation finale est

$$(1 + t^2 - f^2)(\zeta t - q \sqrt{1 + t^2})^2 = f^2(\zeta^2 + 1),$$

en vertu de laquelle l'équation (13) se réduit à

$$(14) \quad \frac{d\zeta}{\sqrt{\zeta^2+1}} = \frac{d\theta}{\sqrt{\varphi(\theta)+\theta^2-m^2}} + \frac{fdt}{(1+t^2)\sqrt{1+t^2-f^2}}.$$

Nous prendrons, au lieu de  $f$  et  $\varphi$ , deux autres fonctions arbitraires  $F(t)$  et  $\Phi(\theta)$ , telles que l'on ait

$$\frac{f}{(1+t^2)\sqrt{1+t^2-f^2}} = \frac{1}{2} \frac{F'(t)}{F(t)}, \quad \frac{1}{\sqrt{\varphi(\theta)+\theta^2-m^2}} = -\frac{1}{2} \frac{\Phi'(\theta)}{\Phi(\theta)};$$

d'où

$$(15) \quad f(t) = \frac{(1+t^2)^{\frac{3}{2}} F'(t)}{\sqrt{4F^2(t) + (1+t^2)^2 F'^2(t)}}, \quad \varphi(\theta) = \frac{4\Phi^2(\theta)}{\Phi'^2(\theta)} - \theta^2 + m^2;$$

l'équation (14) devient alors

$$(16) \quad 2 \frac{d\zeta}{\sqrt{\zeta^2+1}} + \frac{\Phi'(\theta) d\theta}{\Phi(\theta)} = \frac{F'(t) dt}{F(t)}.$$

Intégrant et observant que la constante se fond dans les fonctions arbitraires, il vient

$$2 \log(\zeta + \sqrt{\zeta^2+1}) + \log \Phi(\theta) = \log F(t),$$

ou

$$(17) \quad (\zeta + \sqrt{\zeta^2+1})^2 \Phi(\theta) = F(t).$$

Or l'équation (11) et la seconde équation (1) donnent

$$z = \frac{p+qt}{\sqrt{1+t^2}}, \quad \sqrt{\zeta^2+1} = \frac{\sqrt{1+t^2-f^2} \sqrt{1+p^2+q^2}}{\sqrt{1+t^2}},$$

ce qui réduit l'équation (17) à

$$(18) \quad \frac{(p+qt + \sqrt{1+t^2-f^2} \sqrt{1+p^2+q^2})^2}{1+t^2} \Phi(\theta) = F(t).$$

Si l'on imagine que  $f(t)$  soit partout remplacée par sa valeur tirée de la première équation (15), l'équation de la surface cherchée sera le résultat de l'élimination de  $p, q, t$  et  $\theta$  entre les cinq équations (1), (2) et (18).

Les surfaces représentées par les équations (1), (2) et (18) constituent le troisième et dernier genre des surfaces dont les lignes de courbure sont planes dans un système et sphériques dans l'autre. Les plans

des lignes de la première courbure sont tangents à un cylindre dans le cas général, et passent par une droite fixe dans le cas particulier de  $m = 0$ . Ce cas de  $m = 0$  n'est pas aussi particulier qu'on pourrait croire; effectivement, les fonctions  $f$  et  $\varphi$  étant partout remplacées par leurs valeurs tirées des équations (15), si l'on considère les fonctions  $F$  et  $\Phi$  comme déterminées, et  $m$  comme un paramètre variable, les diverses surfaces représentées par les équations (1), (2) et (18) seront parallèles; elles peuvent, en conséquence, se déduire facilement de l'une quelconque d'entre elles, par exemple de celle qui correspond à  $m = 0$ . Cela résulte immédiatement de ce qui a été dit au § V de la première partie.

Dans cette hypothèse de  $m = 0$ , si l'on élimine  $p$ ,  $q$  et  $t$  entre les équations (1), (2) et (18), il vient

$$(19) \quad \frac{z - \theta - \sqrt{x^2 + y^2 + (z - \theta)^2}}{z - \theta + \sqrt{x^2 + y^2 + (z - \theta)^2}} \Phi(\theta) + F\left(\frac{y}{x}\right) = 0,$$

et il est aisé de voir qu'on reproduit la première équation (2) en différenciant l'équation (19) par rapport à  $\theta$ . Si donc on fait

$$V = \frac{z - \theta - \sqrt{x^2 + y^2 + (z - \theta)^2}}{z - \theta + \sqrt{x^2 + y^2 + (z - \theta)^2}} \Phi(\theta) + F\left(\frac{y}{x}\right),$$

l'équation de la surface dont nous nous occupons sera le résultat de l'élimination de  $\theta$  entre les deux équations

$$(20) \quad V = 0, \quad \frac{dV}{d\theta} = 0.$$

La surface représentée par les équations (20) a été considérée, pour la première fois, par M. Joachimsthal, dans le Mémoire cité plus haut.

## § VII.

### *Cinquième cas.*

On a

$$a = 0, \quad \varepsilon = 0, \quad c = 0, \quad u = 0, \quad l = 0.$$

Les équations relatives aux lignes de courbure planes sont

$$\begin{aligned} ax + by &= 0, \\ ap + bq &= 0; \end{aligned}$$

on en déduit

$$qx - py = 0;$$

on ne trouve donc, dans ce cinquième cas, que les seules surfaces de révolution, qui sont comprises dans le premier des deux genres de surfaces étudiées dans la première partie.

Les équations relatives aux lignes de courbure sphériques renferment trois indéterminées, et, par suite, deux fonctions arbitraires d'un paramètre. Les sphères qui contiennent les lignes de la seconde courbure sont essentiellement indéterminées, puisque ces lignes sphériques sont ici les parallèles de la surface.

### § VIII.

#### *Sixième cas.*

On a

$$\xi = 0, \quad \lambda = m, \quad a = 0, \quad c = 0, \quad u = ml,$$

$m$  étant une constante : si l'on fait, en outre,

$$b = -1, \quad l = -t,$$

les équations relatives aux lignes de courbure planes sont

$$\begin{aligned} y &= mt, \\ q &= t \sqrt{1 + p^2 + q^2}; \end{aligned}$$

et en éliminant  $t$ , on obtient l'équation différentielle partielle de la surface, savoir

$$mq = y \sqrt{1 + p^2 + q^2};$$

c'est l'équation générale des surfaces des canaux dont l'axe est une courbe plane arbitraire. Les lignes de l'une des courbures sont dans des plans parallèles; les lignes de la seconde courbure sont des circonférences qui ont leurs centres dans un même plan. Ces surfaces sont donc comprises parmi celles qui forment le premier genre des surfaces dont toutes les lignes de courbure sont planes.

Les lignes de courbure sphériques étant des cercles, les sphères qui les contiennent ne sont pas déterminées, et c'est ce que l'analyse in-

dique en laissant trois quantités indéterminées, dans les équations qui se rapportent aux lignes de la deuxième courbure.

§ IX.

*Septième cas.*

On a

$$\epsilon = 0, \quad \lambda = -\frac{1}{m}a, \quad c = 0, \quad u = 0, \quad l = ma;$$

si l'on fait, en outre,

$$a = t, \quad b = -1,$$

les équations relatives aux lignes de la première courbure sont

$$y = tx, \\ q - pt = mt\sqrt{1 + p^2 + q^2}.$$

En éliminant  $t$ , on aura l'équation aux différentielles premières de la surface, savoir

$$qx - py = my\sqrt{1 + p^2 + q^2}.$$

La surface dont il s'agit ici est évidemment un cas particulier des surfaces considérées par M. Joachimsthal, et dont nous avons formé l'équation au § VI. On voit aussi qu'elle est encore un cas particulier des surfaces dont toutes les lignes de courbure sont planes (§ IV de la première partie). Les lignes de la seconde courbure, étant planes et situées sur des sphères de rayons finis, sont nécessairement des circonférences. Il est très-aisé, d'ailleurs, de vérifier ce résultat à posteriori.

Comme dans les deux cas qui précèdent, l'analyse ne peut déterminer les sphères qui renferment les lignes de la seconde courbure.



## TROISIÈME PARTIE.

DES SURFACES DONT TOUTES LES LIGNES DE COURBURE SONT  
SPHÉRIQUES.

§ 1<sup>er</sup>.

D'après ce qui a été dit au § 1<sup>er</sup> de la deuxième partie, si toutes les lignes de courbure d'une surface sont sphériques, on a, en faisant usage des notations déjà employées,

$$(1) \quad (x-a)^2 + (y-b)^2 + (z-c)^2 = a^2 + b^2 + c^2 + 2u,$$

$$(2) \quad -(x-a)p - (y-b)q + (z-c) = l\sqrt{1+p^2+q^2},$$

$$(3) \quad (x-\alpha)^2 + (y-\beta)^2 + (z-\gamma)^2 = \alpha^2 + \beta^2 + \gamma^2 + 2v,$$

$$(4) \quad -(x-\alpha)p - (y-\beta)q + (z-\gamma) = \lambda\sqrt{1+p^2+q^2};$$

$a, b, c, u, l$  étant fonctions d'un paramètre  $t$ , tandis que  $\alpha, \beta, \gamma, v$  et  $\lambda$  sont fonctions d'un second paramètre  $\theta$ . Les équations (1) et (2) sont ainsi relatives aux lignes de la première courbure; les équations (3) et (4) se rapportent aux lignes de la deuxième courbure. La condition de perpendicularité des lignes de courbure qui passent par un même point s'obtiendra en éliminant les six variations  $dx, dy, dz, \delta x, \delta y, \delta z$  entre les cinq équations

$$dx \delta x + dy \delta y + dz \delta z = 0,$$

$$(x-a)dx + (y-b)dy + (z-c)dz = 0, \quad dz = p dx + q dy,$$

$$(x-\alpha)\delta x + (y-\beta)\delta y + (z-\gamma)\delta z = 0, \quad \delta z = p \delta x + q \delta y.$$

On trouve ainsi, en ayant égard aux équations (1), (2), (3), (4),

$$(5) \quad u + v + a\alpha + b\beta + c\gamma = l\lambda.$$

Dans la discussion de cette équation de condition, nous distinguerons quatre hypothèses qui sont les seules possibles, et que nous allons examiner.

1<sup>o</sup>. Les quantités  $a, b, c$  sont liées par trois équations linéaires. Dans cette hypothèse,  $a, b, c$  sont déterminées; les sphères qui

contiennent les lignes de la première courbure sont concentriques, et, en prenant leur centre commun pour origine des coordonnées, on aura

$$a = 0, \quad b = 0, \quad c = 0;$$

l'équation (5) se réduit alors à

$$u + v = l\lambda.$$

En la différentiant par rapport à  $t$ , il vient

$$u' = l'\lambda.$$

Cette dernière exige que  $u'$  et  $l'$  soient nuls ou que  $\lambda$  soit constante. Le cas de  $u' = 0$  donnerait

$$u = \text{constante};$$

par suite, la surface serait une sphère. Rejetant cette solution et désignant par  $m$  et  $m'$  deux constantes, on a

$$\lambda = \frac{m}{2}, \quad 2u' = ml', \quad \text{d'où} \quad 2u = ml + m',$$

puis

$$2v = -m'.$$

On a ainsi cette solution unique de l'équation (5),

$$a = 0, \quad b = 0, \quad c = 0, \quad 2u = ml + m', \quad 2v = -m', \quad \lambda = \frac{m}{2}.$$

2°. *Les quantités  $a, b, c$  sont liées par deux équations linéaires.* Dans cette deuxième hypothèse, les centres des sphères qui contiennent les lignes de la première courbure sont situés sur une droite fixe. En prenant cette droite fixe pour axe des  $z$ , on aura

$$a = 0, \quad b = 0;$$

l'équation (5) se réduit alors à

$$u + v + c\gamma = l\lambda.$$

Différentiant cette équation par rapport à  $t$ , puis celle obtenue par

rapport à  $t$ , il vient

$$\begin{aligned}v' + c\gamma' &= l\lambda', \\c'\gamma' &= l'\lambda'.\end{aligned}$$

$c'$  ne peut être nul, car autrement  $c$  serait constant, et l'on rentrerait dans la première hypothèse. On tire alors des équations précédentes

$$\gamma' = \frac{l'}{c'}\lambda', \quad v' = \left(l - \frac{cl'}{c'}\right)\lambda'.$$

Il faut donc de deux choses l'une : ou que  $\gamma'$ ,  $v'$  et  $\lambda'$  soient nuls, où que  $\frac{l'}{c'}$  et  $l - \frac{cl'}{c'}$  soient constantes.

Supposons d'abord le premier cas, savoir :

$$\gamma' = 0, \quad v' = 0, \quad \lambda' = 0;$$

les centres des sphères qui contiennent les lignes de la seconde courbure sont dans un plan fixe perpendiculaire à l'axe des  $z$ ; on peut prendre ce plan pour celui des  $xy$ , et alors on a

$$\gamma = 0, \quad v = -\frac{m'}{2}, \quad \lambda = \frac{m}{2},$$

$m$  et  $m'$  désignant des constantes. L'équation de condition (5) donne ensuite

$$u = \frac{m}{2}l + \frac{m'}{2}.$$

Considérons maintenant le deuxième cas. On aura, en désignant par  $m$  et  $m'$  deux constantes,

$$\begin{aligned}l &= mc + \frac{m'}{2}, \\ \gamma' &= m\lambda', \quad v' = \frac{m'}{2}\lambda';\end{aligned}$$

intégrant et désignant par  $m''$  et  $m'''$  deux nouvelles constantes, il vient

$$\gamma = m\lambda + \frac{m''}{2}, \quad v = \frac{m'}{2}\lambda + \frac{m'''}{2}.$$

L'équation de condition (5) donne enfin

$$u = -\frac{m''}{2}c - \frac{m'''}{2}.$$

On a ainsi ces deux solutions de l'équation (5) :

$$a = 0, \quad b = 0, \quad 2u = ml + m',$$

$$\gamma = 0, \quad 2v = -m', \quad \lambda = \frac{m}{2},$$

et

$$a = 0, \quad b = 0, \quad 2u = -\frac{m''}{2}c - \frac{m'''}{2},$$

$$l = mc + \frac{m'}{2}, \quad \gamma = m\lambda + \frac{m''}{2}, \quad 2v = m'\lambda + m'',$$

$m, m', m''$  et  $m'''$  désignant quatre constantes.

3°. Les quantités  $a, b, c$  sont liées par une seule équation linéaire. Les centres des sphères qui contiennent les lignes de la première courbure sont dans un plan fixe. En prenant ce plan pour celui des  $\gamma z$ , on aura

$$a = 0,$$

et l'équation (5) se réduit à

$$u + v + b\epsilon + c\gamma = l\lambda.$$

Différentiant une fois par rapport à  $\theta$ , puis ensuite deux fois par rapport à  $t$ , il vient

$$v' + b\epsilon' + c\gamma' = l\lambda',$$

$$b'\epsilon' + c'\gamma' = l'\lambda',$$

$$b''\epsilon' + c''\gamma' = l''\lambda'.$$

On ne peut avoir

$$b'c'' - c'b'' = 0,$$

car autrement il y aurait une relation linéaire entre  $b$  et  $c$ , et l'on rentrerait dans les hypothèses précédentes; on peut donc tirer des deux dernières équations des valeurs finies de  $\epsilon'$  et  $\gamma'$ , et ces valeurs auront la forme

$$\epsilon' = B\lambda', \quad \gamma' = C\lambda'.$$

$B$  et  $C$  étant fonctions du seul paramètre  $t$ .

Si  $\epsilon'$  et  $\gamma'$  sont nuls,  $\epsilon$  et  $\gamma$  sont constantes; les sphères qui contiennent les lignes de la seconde courbure ont leurs centres sur une ligne droite, et l'on rentre dans la deuxième hypothèse. Si  $\epsilon'$  et  $\gamma'$  ne sont pas nuls,  $\lambda'$  ne peut être nul, et  $B, C$  sont constantes. On a d'ailleurs

$$C\epsilon' - B\gamma' = 0, \quad \text{d'où} \quad C\epsilon - B\gamma = \text{constante}.$$

Cela prouve que les sphères qui contiennent les lignes de la seconde courbure ont leurs centres dans un plan perpendiculaire au plan  $yz$ ; on peut prendre ce plan pour celui des  $xz$ , et alors on aura

$$\epsilon = 0.$$

L'équation (5) se réduit alors à

$$u + v + c\gamma = l\lambda;$$

sa dérivée relative à  $\theta$ , et la dérivée de celle-ci relative à  $t$ , sont

$$\begin{aligned} v' + c\gamma' &= l\lambda', \\ c'\gamma &= l'\lambda'. \end{aligned}$$

On ne peut avoir  $c' = 0$ , ni  $\gamma' = 0$ ; car autrement on rentrerait dans les hypothèses précédentes. La dernière équation donne donc

$$l' = mc', \quad \lambda' = \frac{1}{m}\gamma';$$

d'où, en intégrant,

$$l = mc + m', \quad \lambda = \frac{1}{m}\gamma + m'',$$

$m, m'$  et  $m''$  étant trois constantes. Les équations précédentes donnent ensuite

$$v' = \frac{m'}{m}\gamma', \quad \text{d'où} \quad v = \frac{m'}{m}\gamma + m''',$$

$m'''$  désignant une nouvelle constante; puis

$$u = mm''c + (m'm'' - m''').$$

On a ainsi cette solution unique de l'équation (5):

$$a = 0, \quad u = mm''c + (m'm'' - m'''), \quad l = mc + m',$$

$$\epsilon = 0, \quad v = \frac{m'}{m}\gamma + m''', \quad \lambda = \frac{1}{m}\gamma + m''.$$

4°. Les quantités  $a, b, c$  ne sont liées par aucune équation linéaire. Je dis que  $\alpha, \epsilon, \gamma$  satisfont au moins à une équation linéaire, et que, par suite, on rentre dans l'une des trois précédentes hypothèses. En effet, différentions d'abord l'équation (5) par rapport à  $\theta$ , il vient

$$\nu' + a\alpha' + b\epsilon' + c\gamma' = l\lambda';$$

différentions celle-ci trois fois par rapport à  $t$ , il vient

$$a'\alpha' + b'\epsilon' + c'\gamma' = l'\lambda',$$

$$a''\alpha' + b''\epsilon' + c''\gamma' = l''\lambda',$$

$$a'''\alpha' + b'''\epsilon' + c'''\gamma' = l'''\lambda';$$

puisque'il n'existe aucune relation linéaire entre  $a, b, c$ , le déterminant

$$\begin{cases} a', & b', & c', \\ a'', & b'', & c'', \\ a''', & b''', & c''', \end{cases}$$

ne peut être nul; par conséquent, les équations précédentes donneront pour  $\alpha', \epsilon', \gamma'$  des valeurs finies qui auront la forme

$$\alpha' = A\lambda', \quad \epsilon' = B\lambda', \quad \gamma' = C\lambda',$$

$A, B, C$  étant indépendants de  $\theta$ . Ces équations exigent que  $\alpha'$  soit nul ou que  $A$  soit constante, que  $\epsilon'$  soit nul ou que  $B$  soit constante; enfin, que  $\gamma'$  soit nul ou que  $C$  soit constante. Si l'une des quantités  $\alpha', \epsilon', \gamma'$  est nulle, on rentre dans l'une des hypothèses précédentes. La même chose a lieu si aucune des quantités  $\alpha', \epsilon', \gamma'$  n'est nulle, car, dans ce cas, les équations précédentes donnent

$$\alpha' = \frac{C}{A}\gamma', \quad \epsilon' = \frac{C}{B}\gamma',$$

d'où

$$\alpha = \frac{C}{A}\gamma + \text{constante}, \quad \epsilon = \frac{C}{B}\gamma + \text{constante}.$$

Il existe donc deux relations linéaires entre  $\alpha, \epsilon, \gamma$ .

Il résulte de cette discussion, que l'équation (5) n'admet que quatre

solutions distinctes et utiles pour l'objet de nos recherches, savoir :

$$1^{\circ}. \quad a=0, \quad b=0, \quad c=0, \quad 2u=ml+m', \quad 2v=-m', \quad \lambda=\frac{m}{2};$$

$$2^{\circ}. \quad a=0, \quad b=0, \quad 2u=ml+m', \quad \gamma=0, \quad 2v=-m', \quad \lambda=\frac{m}{2};$$

$$3^{\circ}. \quad a=0, \quad b=0, \quad 2u=-m''c-m''', \quad l=mc+\frac{m'}{2},$$

$$\gamma=m\lambda+\frac{m''}{2}, \quad 2v=m'\lambda+m'';$$

$$4^{\circ}. \quad a=0, \quad u=mm''c+(m'm''-m'''), \quad l=mc+m',$$

$$\gamma=0, \quad v=\frac{m'}{m}\gamma+m'', \quad \lambda=\frac{1}{m}\gamma+m'';$$

$m, m', m'', m'''$  désignant des constantes. Nous allons examiner les quatre cas auxquels on est ainsi conduit.

## § II.

### Premier cas.

On a

$$a=0, \quad b=0, \quad c=0, \quad 2u=ml+m',$$

$$2v=-m', \quad \lambda=\frac{m}{2}.$$

Les équations (1) et (2) du § I<sup>er</sup>, qui sont relatives aux lignes de la première courbure, sont ici :

$$x^2 + y^2 + z^2 = ml + m',$$

$$z - px - qy = l\sqrt{1+p^2+q^2}.$$

L'élimination de  $l$  donne l'équation aux différentielles premières de la surface; savoir,

$$z - px - qy = \frac{x^2 + y^2 + z^2 - m'}{m} \sqrt{1+p^2+q^2}.$$

Si l'on compare cette équation à l'équation (4) du § III de la deuxième partie, on verra qu'elle se déduit de celle-ci, en supposant la fonction  $\varphi(\theta)$  linéaire et égale à  $m\theta + m'$ . La surface dont il s'agit ici est donc un cas particulier des surfaces qui composent le premier genre de celles dont les lignes de courbure sont planes dans un système et

sphériques dans l'autre. Les lignes de la seconde courbure sont des circonférences, circonstance qui est indiquée par le caractère analytique déjà remarqué dans la deuxième partie de ce travail. L'équation sous forme finie de notre surface s'obtiendra immédiatement, en prenant pour  $\Phi(\theta)$  une fonction linéaire de  $\theta$  dans les équations (15) du § III de la deuxième partie.

### § III.

#### *Deuxième cas.*

On a

$$\begin{aligned} a = 0, \quad b = 0, \quad 2u = ml + m', \\ \gamma = 0, \quad 2v = -m', \quad \lambda = \frac{m}{2}. \end{aligned}$$

L'équation des sphères qui renferment les lignes de la seconde courbure est

$$x^2 + y^2 + z^2 - 2ax - 2\epsilon y = -m'.$$

Ces sphères se coupent en un même point

$$x = 0, \quad y = 0, \quad z = \sqrt{-m'}.$$

Si donc on transforme par rayons vecteurs réciproques la surface dont il s'agit ici, en prenant pour centre de transformation le point représenté par les équations précédentes, on obtiendra l'une des surfaces dont nous nous sommes occupés dans les deux premières parties. Donc réciproquement, la surface actuelle est une transformée de l'une de celles-ci.

### § IV.

#### *Troisième cas.*

On a

$$\begin{aligned} a = 0, \quad b = 0, \quad 2u = -m''c - m''', \quad l = mc + \frac{m'}{2}, \\ \gamma = m\lambda + \frac{m''}{2}, \quad 2v = m'\lambda + m''', \end{aligned}$$

$m, m', m'', m'''$  étant des constantes.

On peut supposer  $m$  ou  $m'$  nul, car si  $m$  n'est pas nul, on pourra changer  $c$  en  $c - \frac{m'}{2m}$  en déplaçant l'origine des coordonnées sur l'axe des  $z$ ; on aura alors  $l = mc$ ; ce qui équivaut à faire  $m' = 0$ .



Supposons d'abord  $m = 0$ ; les équations relatives aux lignes de première courbure sont

$$\begin{aligned}x^2 + y^2 + z^2 - 2cz &= -m''c - m'', \\z - px - qy - c &= \frac{m'}{2}\sqrt{1 + p^2 + q^2};\end{aligned}$$

on voit que la surface dont il s'agit ici est un cas particulier des surfaces qui forment le troisième genre de celles dont les lignes de courbure sont planes dans un système et sphériques dans l'autre. On la retrouve effectivement en supposant que  $\varphi(\theta)$  soit une fonction linéaire dans l'analyse du § VI de la deuxième partie.

Supposons, en second lieu,  $m' = 0$ ; les équations relatives aux lignes de la deuxième courbure sont

$$\begin{aligned}x^2 + y^2 + z^2 - 2cz &= -m''c - m'', \\z - px - qy &= c(1 + m\sqrt{1 + p^2 + q^2}).\end{aligned}$$

La surface à laquelle ces équations appartiennent fait partie du second genre de celles dont les lignes de courbure sont planes dans un système et sphériques dans l'autre. On l'obtient en effet, en supposant que  $\varphi(\theta)$  soit une fonction linéaire dans l'analyse du § V de la deuxième partie.

Pour chacune des deux surfaces dont il vient d'être question, les lignes de la seconde courbure sont des cercles.

### § V.

#### Quatrième cas.

On a

$$\begin{aligned}a &= 0, \quad u = mm''c + (m'm'' - m''), \quad l = mc + m', \\ \xi &= 0, \quad \nu = \frac{m'}{m}\gamma + m'', \quad \lambda = \frac{1}{m}\gamma + m'',\end{aligned}$$

$m, m', m'', m''$  étant des constantes. Les équations des sphères relatives aux lignes de l'une et l'autre courbure sont

$$\begin{aligned}(1) \quad x^2 + y^2 + z^2 - 2bx - 2cz &= 2mm''c + 2(m'm'' - m''), \\(2) \quad x^2 + y^2 + z^2 - 2ax - 2\gamma z &= 2\frac{m'}{m}\gamma + 2m''.\end{aligned}$$

Les sphères représentées par l'équation (1) se coupent en un même point, pour lequel on a

$$x = \sqrt{2(m' m'' - m'') - m^2 m''^2}, \quad y = 0, \quad z = -m m'';$$

de même, les sphères (2) se coupent au point fixe

$$x = 0, \quad y = \sqrt{2 m'' - \frac{m'^2}{m^2}}, \quad z = -\frac{m'}{m}.$$

Si donc on transforme, par rayons vecteurs réciproques, la surface dont il est ici question, en prenant pour centre de transformation l'un des points dont on vient de parler, on obtiendra l'une des surfaces étudiées dans la première ou dans la deuxième partie. Donc réciproquement, la surface actuelle est une transformée de l'une de celles-ci.

## § VI.

Il résulte de cette discussion, que si l'on exclut les surfaces dont les lignes de courbure d'un système sont circulaires, et qui appartiennent aux genres considérés dans les deux premières parties, les surfaces dont toutes les lignes de courbure sont sphériques ne peuvent former que deux genres distincts.

Dans le premier genre, les centres des sphères des lignes de l'une des courbures sont sur une droite fixe; les centres des sphères des lignes de l'autre courbure sont dans un plan fixe perpendiculaire à la droite fixe.

Dans le second genre, les centres des sphères des lignes de chacune des courbures sont dans un plan fixe; les deux plans fixes sont perpendiculaires entre eux.

Enfin toutes ces surfaces peuvent se déduire, au moyen de la transformation par rayons vecteurs réciproques, soit des surfaces dont toutes les lignes de courbure sont planes, soit des surfaces dont les lignes de courbure sont planes dans un système et sphériques dans l'autre. Toutefois, il faut admettre que le centre de transformation puisse être imaginaire, ce qui ne peut présenter aucune difficulté. Au surplus, il est très-aisé de voir qu'on peut se borner aux centres de transformation réels, pourvu que l'on joigne aux surfaces obtenues toutes les surfaces qui leur sont parallèles.

## CONCLUSION.

L'analyse développée dans ce Mémoire conduit naturellement à distinguer en plusieurs genres les surfaces dont toutes les lignes de

courbure sont planes ou sphériques. Ainsi, les surfaces dont toutes les lignes de courbure sont planes forment deux genres dont le premier a été étudié par Monge; les surfaces dont les lignes de courbure sont planes dans un système et sphériques dans l'autre forment trois genres; enfin les surfaces dont toutes les lignes de courbure sont sphériques ne forment proprement que deux nouveaux genres.

Pour les surfaces d'un même genre, les lignes de courbure de chaque système sont déterminées directement par le moyen de deux équations entre les coordonnées rectangulaires  $x, y, z$ , et les différentielles partielles  $\frac{dz}{dx}, \frac{dz}{dy}$  ou  $p, q$ . Chacun des systèmes d'équations dont il s'agit renferme un paramètre variable, et, en général, une fonction arbitraire de ce paramètre; ils constituent les deux intégrales intermédiaires d'une équation différentielle partielle débarrassée d'arbitraires, en sorte que, pour achever la solution, il ne reste plus qu'à intégrer la seule équation différentielle ordinaire  $dz = p dx + q dy$ .

Mais, dans quelques cas particuliers, les équations relatives à l'un des systèmes de lignes de courbure ne renferment aucune arbitraire, tandis que les équations qui se rapportent à l'autre système contiennent deux fonctions arbitraires. Dans ces cas, les plans ou les sphères qui contiennent les lignes de courbure de ce dernier système sont indéterminés, et les surfaces correspondantes sont développables ou sont à lignes de courbure circulaires. Ce caractère analytique n'est pas le seul par lequel se manifeste l'existence des surfaces à lignes de courbure droites ou circulaires. En effet, pour chacun des cinq genres étudiés dans la deuxième et dans la troisième partie, les équations qui se rapportent aux lignes de l'une des courbures peuvent être satisfaites quels que soient le paramètre et la fonction arbitraire de ce paramètre contenus dans ces équations. Les solutions qui en résultent sont de véritables solutions *singulières*; les surfaces correspondantes sont, outre la sphère, le cône droit, le cylindre droit, le tore, et les surfaces que l'on obtient en transformant celles-ci par rayons vecteurs réciproques. Ces surfaces sont déjà renfermées dans les genres que nous avons étudiés; aussi nous bornons-nous à les mentionner.

