

JOURNAL
DE
MATHÉMATIQUES

PURES ET APPLIQUÉES

FONDÉ EN 1836 ET PUBLIÉ JUSQU'EN 1874

PAR JOSEPH LIOUVILLE

CAMILLE JORDAN

**Nouvelles recherches sur la limite de transitivité des groupes
qui ne contiennent pas le groupe alterné**

Journal de mathématiques pures et appliquées 5^e série, tome 1 (1895), p. 35-60.

http://www.numdam.org/item?id=JMPA_1895_5_1__35_0

 gallica

NUMDAM

Article numérisé dans le cadre du programme
Gallica de la Bibliothèque nationale de France
<http://gallica.bnf.fr/>

et catalogué par Mathdoc
dans le cadre du pôle associé BnF/Mathdoc
<http://www.numdam.org/journals/JMPA>

*Nouvelles recherches sur la limite de transitivité des groupes
qui ne contiennent pas le groupe alterné;*

PAR M. CAMILLE JORDAN.

M. Bochert a publié dans les *Mathematische Annalen* (t. XXIX, XXIII et XL), une suite de Mémoires très intéressants sur la *Théorie des substitutions*.

Parmi les résultats remarquables qu'il a obtenus figurent en particulier les suivants :

S'il existe un groupe t fois transitif, de degré n et de classe u , et ne contenant pas le groupe alterné, les trois nombres t, n, u satisferont (si $u > 3$) aux deux inégalités

$$(I) \quad u \geq \frac{n}{2} - 1,$$

$$(II) \quad \log n \geq a \sqrt{t \log t}$$

a désignant un facteur numérique qu'on peut prendre égal à $\frac{1}{8} \sqrt{\frac{\log 2}{8}}$, si $t \geq 8$.

La proposition exprimée par l'inégalité (I) nous paraît être la plus importante qui ait été obtenue dans cette théorie depuis les travaux de M. Sylow; elle ne saurait manquer d'être féconde en conséquences.

Le présent Mémoire a pour but d'établir que cette proposition, combinée avec les résultats de M. Sylow, permet d'établir entre n et t une relation de la forme (II), mais où le coefficient a est sensiblement réduit.

Nous établissons d'abord (§ I) la proposition suivante :

Soit G un groupe t fois transitif, d'ordre n et de classe u , ne contenant pas le groupe alterné; supposons $t \geq 8$.

G contiendra un sous-groupe H jouissant des propriétés suivantes :

1° *Ses substitutions sont de la forme AS, A désignant une substitution opérée entre t lettres données a_1, \dots, a_t , S une substitution opérée sur les $n - t$ autres lettres;*

2° *Les substitutions partielles A, combinées ensemble, reproduisent toutes celles du groupe alterné \mathfrak{A}_t entre les lettres a_1, \dots, a_t ;*

3° *H ne contient aucun sous-groupe jouissant des mêmes propriétés.*

Nous précisons la forme des substitutions de H.

Nous cherchons ensuite une limite inférieure de $n - t$; dans cette étude nous distinguons deux cas, que nous traitons séparément dans les § II et III. Cette analyse nous conduit au résultat suivant :

Soient k un entier arbitraire > 4 et $< t$; δ le plus grand entier qui satisfasse à l'inégalité

$$\delta < t - \frac{(t - k + 1) \log 2}{t + \log 2}.$$

Posons d'ailleurs, pour abrégé,

$$\varphi(t) = \left(t + \frac{1}{2}\right) \log t - t + \frac{1}{2} \log 2\pi + \frac{1}{12t}.$$

On aura l'une des deux inégalités

$$\log(n - t) \geq (k - 3) \log 2 - \log k,$$

$$\log(n - t) > \varphi(t) - \frac{1}{12t} - \varphi(\delta) - \varphi(t - \delta).$$

Dans le § IV nous discutons ces formules pour déterminer la ma-

nière la plus avantageuse de choisir l'entier k , et nous arrivons à la relation finale

$$\log(n-t) \underset{>}{\approx} a\sqrt{t \log t},$$

où le coefficient numérique a tend rapidement vers la valeur asymptotique $\log 2$ lorsque t tend vers ∞ .

I.

Soit G un groupe t fois transitif, de degré n , de classe u et ne contenant pas le groupe alterné. Supposons $t \underset{>}{\geq} 8$. On aura (BOCHERT, *Mathematische Annalen*, t. XL, p. 192)

$$u \underset{>}{\approx} \frac{1}{2}n - 1.$$

Soient a_1, \dots, a_t , t lettres quelconques choisies arbitrairement parmi celles de G , et soit G' le sous-groupe formé par celles des substitutions de G qui permutent exclusivement ces lettres entre elles. Les substitutions de G' seront de la forme

$$AS,$$

A étant une substitution entre les t lettres a_1, \dots, a_t , et S une substitution entre les autres lettres b_1, \dots, b_{n-t} . Les substitutions partielles A permutent entre elles a_1, \dots, a_t de toutes les manières possibles.

On peut déterminer dans G' un sous-groupe H jouissant des propriétés suivantes :

1° Les substitutions $A_1 S_1, A_2 S_2, \dots$ de H seront telles que leurs premiers facteurs A_1, A_2, \dots reproduisent par leur combinaison toutes les substitutions du groupe alterné \mathfrak{A}_t entre t lettres ;

2° H ne contient aucun sous-groupe jouissant de la propriété précédente.

En effet, le sous-groupe formé par toutes celles des substitutions de G qui permutent a_1, \dots, a_t d'une manière alternée satisfait à la première condition ; et s'il ne remplit pas la seconde, il contiendra un sous-groupe H qui y satisfait.

Les substitutions de H étant de la forme AS , considérons le groupe I formé par celles de ces substitutions où $A = 1$.

Il est permutable aux substitutions de H . Il pourrait d'ailleurs se réduire à la seule substitution 1 ; mais nous admettrons, pour plus de généralité, qu'il contienne d'autres substitutions.

Si l'ordre O de I ne se réduit pas à une puissance de 2 , il admettra au moins un facteur premier impair p ; soit p^μ la plus haute de ses puissances qui divise O . D'après M. Sylow (*Mathematische Annalen*, t. V), I contient un groupe J d'ordre p^μ , et l'on aura

$$O = (rp + 1)\nu p^\mu,$$

νp^μ désignant l'ordre du groupe K formé par celles des substitutions de I qui sont permutables à J ; r désignant un entier.

Soient d'ailleurs a_i, a_k, a_l, a_m quatre quelconques des lettres a_1, \dots, a_t . Joignons aux substitutions de I celles des substitutions de H où la première substitution partielle A est égale à

$$(a_i a_k)(a_l a_m).$$

Nous obtiendrons un nouveau groupe I_1 , d'ordre $2O$. Soit ν_1, p^μ l'ordre du groupe formé par celles de ses substitutions qui sont permutables à J ; on aura évidemment $\nu_1 = 2\nu$ ou $\nu_1 = \nu$, suivant que, dans les nouvelles substitutions introduites, il y en a ou non qui soient permutables à J . Mais la seconde hypothèse doit être rejetée; car le théorème de M. Sylow, appliqué à I_1 , donne

$$2O = (r_1 p + 1)\nu_1 p^\mu = 2(rp + 1)\nu p^\mu,$$

d'où

$$\nu_1 \equiv 2\nu \pmod{p}.$$

Donc pour toutes les valeurs des indices i, k, l, m , H contiendra une substitution de la forme

$$(a_i a_k)(a_l a_m)S$$

permutable à J . Ces substitutions, combinées avec celles de K , fournissent un groupe H_1 , dont les substitutions sont permutables à J , et

de la forme AS, A parcourant toute la suite des substitutions dérivées des substitutions $(a_i a_k)(a_i a_m)$, c'est-à-dire toutes les substitutions du groupe alterné. Mais, par hypothèse, H ne contient aucun sous-groupe jouissant de cette propriété; donc $H_1 = H$, et nous pouvons énoncer ce premier résultat :

Le groupe I contient un groupe J d'ordre p^μ , permutable à toutes les substitutions de H.

Si l'ordre de I se réduisait à une puissance de 2, telle que 2^h , ce résultat subsisterait encore; on n'aurait qu'à poser $p = 2$ et $J = I$; car les substitutions de H sont permutables à I.

Cela posé, le groupe J, d'ordre p^μ , contient (SYLOW, *Mathematische Annalen*, t. V) des substitutions auxquelles toutes celles de J sont échangeables. Celles de ces substitutions qui sont d'ordre p forment un groupe L, unique de son espèce parmi les sous-groupes de J. Les substitutions de H étant permutables à J le seront donc à L.

Réunissons dans une même classe les lettres que L permute entre elles. La $i^{\text{ème}}$ classe, par exemple, contiendra p^{μ_i} lettres (μ_i étant un entier, qui peut être nul pour certaines classes, mais non pour toutes). Caractérisons ces lettres par μ_i indices simultanés, x_1, \dots, x_{μ_i} variables chacun de 0 à $p - 1 \pmod{p}$; les déplacements que L leur fait subir seront représentés par les substitutions linéaires

$$(1) \quad |x_1, \dots, x_{\mu_i} \quad x_1 + \lambda_1, \dots, x_{\mu_i} + \lambda_{\mu_i}|$$

(JORDAN, *Traité des substitutions*, p. 201).

Les substitutions de H, étant permutables à L, seront de la forme suivante

$$ABP,$$

B désignant une substitution qui permute d'un mouvement d'ensemble les diverses classes qui ont le même nombre de lettres, en remplaçant chaque lettre par sa correspondante; P désignant un produit de substitutions partielles P_1, P_2, \dots opérées respectivement entre les lettres de la première classe, celles de la seconde, etc. D'ailleurs la substitution P_i ,

les bi-classes (ou du moins celles d'entre elles qui contiennent le même nombre de classes, contenant elles-mêmes le même nombre de lettres); P' désignant un produit de substitutions P'_1, P'_2, \dots opérées respectivement entre les classes de la première bi-classe, entre celles de la seconde, etc.; 5° que les substitutions P'_1, P'_2, \dots appartiendront respectivement aux groupes linéaires de degrés $p'^{u'_1}, p'^{u'_2}, \dots$.

Considérons le groupe H'' formé par les substitutions partielles AC . Si le groupe I'' formé par celles de ses substitutions où $A = 1$ contient des substitutions autres que l'unité, on pourra répéter encore ces raisonnements et grouper les bi-classes en tri-classes, et ainsi de suite. Admettons donc, pour fixer les idées en évitant des complications inutiles, que I'' se réduise à la substitution 1.

Groupons les bi-classes en catégories, en réunissant celles que les substitutions C permutent entre elles. Chacune des substitutions C sera un produit de substitutions partielles C_1, C_2, \dots opérées respectivement entre les bi-classes de la première catégorie, celles de la seconde catégorie, etc. Et les substitutions de H seront de la forme

$$ACP'P = AC_1C_2\dots P'_1P'_2\dots P_1P_2\dots$$

Chacun des groupes $\varepsilon_1, \varepsilon_2, \dots$ respectivement formés par les substitutions partielles C_1 , par les substitutions C_2 , etc., se réduira à la seule substitution 1, si la catégorie correspondante n'a qu'une bi-classe; sinon il contiendra des substitutions permutant ses bi-classes. Dans ce dernier cas, il sera isomorphe sans méridric au groupe alterné \mathfrak{A}_2 formé par les substitutions A .

En effet, si H contenait une substitution dans laquelle A se réduisit à l'unité, sans qu'on eût en même temps $C_1 = 1, C_2 = 1, \dots, I''$ contiendrait, contre l'hypothèse, une substitution $C_1C_2\dots$ différente de l'unité.

D'autre part, si H contient une substitution

$$\Sigma = AC_2\dots P'P,$$

où C_1 , par exemple, se réduise à l'unité, sans qu'il en soit de même de A , il contiendra les transformées de Σ par ses diverses substitutions. Ces transformées, ne déplaçant pas les bi-classes de la première caté-

gorie, seront, comme Σ lui-même, de la forme

$$AC_2 \dots P'P.$$

En les combinant ensemble, on obtiendra un groupe H_1 de substitutions de la même forme, dans lesquelles A parcourra encore toute la suite des substitutions de \mathfrak{A}_t (car on sait que ce groupe est simple). Mais, par hypothèse, H ne contient pas de sous-groupe jouissant de cette propriété; donc $H_1 = H$; par suite, dans toutes les substitutions de H , on aura $C_1 = 1$; donc C_1 se réduira à l'unité, et la première catégorie ne contiendra qu'une seule bi-classe.

Nous pouvons donc énoncer, comme résultat de cette analyse, la proposition suivante :

Les substitutions de H sont de la forme

$$AC_1C_2 \dots P'_1P'_2 \dots P_1P_2 \dots,$$

P_1, P_2, \dots étant des substitutions linéaires opérées sur les p^{u_1}, p^{u_2}, \dots lettres qui constituent respectivement la première classe, la seconde, etc.;

P'_1, P'_2, \dots des substitutions d'ensemble linéaires, opérées sur les classes en nombre p^{u_1}, p^{u_2}, \dots qui constituent respectivement la première bi-classe, la seconde, etc.;

C_1, C_2, \dots des substitutions d'ensemble, opérées respectivement sur les bi-classes de la première catégorie, de la seconde, etc.;

A une substitution opérée sur les t lettres a_1, \dots, a_t .

Les substitutions partielles A reproduisent le groupe alterné \mathfrak{A}_t ; les substitutions C_1 , les substitutions C_2 , etc., forment autant de groupes $\mathfrak{S}_1, \mathfrak{S}_2, \dots$; chacun d'eux sera isomorphe sans méridricité à \mathfrak{A}_t si la catégorie correspondante contient plusieurs bi-classes; si elle n'en contient qu'une, il se réduira à l'unité.

La forme générale des substitutions de H étant ainsi fixée, soit k un entier arbitraire au moins égal à 5 et au plus égal à t .

Soit K le groupe formé par celles des substitutions de H dont le premier facteur A permute entre elles les lettres a_1, \dots, a_k sans déplacer a_{k+1}, \dots, a_t .

Deux cas seront ici à distinguer :

1° Dans chaque catégorie, le nombre des bi-classes qui ne sont déplacées par aucune des substitutions de K est supérieur à la moitié du nombre total.

2° Il existe au moins une catégorie où le nombre des bi-classes non déplacées ne surpasse pas la moitié du nombre total.

Discutons successivement ces deux hypothèses.

II.

Admettons d'abord la première hypothèse.

Les bi-classes d'une même catégorie contenant toutes le même nombre de lettres, le nombre de lettres contenues dans les bi-classes que K déplace sera moindre que $\frac{n-t}{2}$.

Les substitutions de K seront de la forme

$$ARP'_i P'_i \dots P_l P_l \dots,$$

A désignant une substitution du groupe \mathfrak{A}_k alterné entre k lettres a_1, \dots, a_k (les diverses substitutions A reproduisant d'ailleurs tout ce groupe);

R une substitution opérée entre les lettres des bi-classes que K déplace;

P'_i, P'_i, \dots des substitutions d'ensemble linéaires, opérées respectivement entre les classes de chacune des bi-classes restantes;

P_l, P_l, \dots des substitutions linéaires, opérées respectivement entre les lettres de chaque classe de ces dernières bi-classes.

Considérons le groupe K' formé par les substitutions partielles

$$AP'_i P'_i \dots,$$

et les groupes $\mathfrak{Q}'_i, \mathfrak{Q}'_i, \dots$ respectivement formés par les substitutions P'_i , par les substitutions P'_i, \dots . Deux cas seront à distinguer :

1° L'un au moins des groupes $\mathfrak{Q}'_i, \mathfrak{Q}'_i, \dots$, par exemple \mathfrak{Q}'_i , admet un groupe composant isomorphe à \mathfrak{A}_k .

Les classes permutées par P' sont, comme on l'a vu, au nombre de $p'^{\mu'_i}$, p' étant un nombre premier et μ'_i un entier. Chacune d'elles contenant au moins une lettre, on aura $n - t \geq p'^{\mu'_i}$.

D'ailleurs, \mathcal{Q}'_i est contenu dans le groupe linéaire de degré $p'^{\mu'_i}$. Pour qu'il admette un groupe composant isomorphe à \mathcal{A}_k , les conditions suivantes seront nécessaires (*Bulletin de la Société mathématique de France*, t. I, p. 35 et suivantes)

$$1^{\circ} \quad \frac{(p'^{\mu'_i} - 1)(p'^{\mu'_i} - p') \dots (p'^{\mu'_i} - p'^{\mu'_i - 1})}{\delta(p' - 1)}$$

(δ désignant le plus grand commun diviseur de μ'_i et de $p' - 1$) doit être divisible par $\frac{1 \cdot 2 \dots k}{2}$;

$$2^{\circ} \quad \mu'_i \geq q - 1$$

(q désignant le plus grand nombre premier autre que p' et inférieur à $k - 1$);

$$3^{\circ} \quad \mu'_i \geq k - \frac{\log k}{\log 2} - 3.$$

Comme p' est au moins égal à 2, cette dernière inégalité donne

$$n - t \geq p'^{\mu'_i} \geq 2^{k - \frac{\log k}{\log 2} - 3}.$$

Cette inégalité pourra suffire en général (¹).

(¹) Pour les petites valeurs de k , on pourra recourir aux autres relations.

Ainsi, pour $k = 5$ ou 6 , μ'_i sera au moins égal à 2 (2^o relation), à moins qu'on n'ait $p' = 3$, $\mu'_i = 1$. La première relation montre que cette hypothèse est inadmissible, ainsi que les suivantes $p'^{\mu'_i} = 2^2, 2^3, 3^2$. D'ailleurs, 2^4 est moindre que 3^3 et que 5^2 . Donc $p'^{\mu'_i}$, et *a fortiori* $n - t$, ne peut être moindre que 2^4 .

Il en est de même à plus forte raison si $k = 7$ ou 8 .

Si $k = 9$, $\mu'_i \geq 6$, à moins qu'on n'ait $p' = 7$, $\mu'_i \geq 4$. Mais $7^4 > 2^6$. Donc $n - t \geq 2^6$.

Si $k = 10$, $\mu'_i \geq 6$, à moins qu'on n'ait $p' = 7$, $\mu'_i \geq 4$. La première relation exclut les hypothèses $p'^{\mu'_i} = 2^6$ ou 2^7 . D'ailleurs, 2^8 est moindre que 3^6 et que 7^4 . Donc $n - t \geq 2^8$.

Si $k = 11$, on trouvera $n - t \geq 2^{10}$; ...

2° Supposons, au contraire, qu'aucun des groupes $\mathcal{G}'_i, \mathcal{G}''_i, \dots$ n'ait de groupe composant isomorphe à \mathfrak{A}_k . Le groupe K' contiendra toutes les substitutions de \mathfrak{A}_k (*Bulletin de la Société mathématique*, p. 50). Le groupe K contiendra des substitutions correspondantes, de la forme

$$ARP_i P_i \dots,$$

dans lesquelles A parcourt encore toute la suite des substitutions de \mathfrak{A}_k .

Les groupes $\mathcal{G}_i, \mathcal{G}''_i, \dots$, respectivement formés par les substitutions partielles P_i , par les substitutions P_i , etc. sont contenus dans des groupes linéaires de degrés $p^{u_i}, p^{u''_i}, \dots$. Si l'un d'eux, par exemple \mathcal{G}_i , admet un groupe composant isomorphe à \mathfrak{A}_k , on trouvera pour le nombre $n - t \geq p^{u_i}$ la même limite inférieure que tout à l'heure.

L'hypothèse contraire est d'ailleurs inadmissible. Car K contiendrait des substitutions de la forme

$$AR,$$

où A parcourrait toute la suite des substitutions de \mathfrak{A}_k . Il contiendrait en particulier une substitution Σ dans laquelle A se réduirait à la substitution circulaire ternaire $(a_1 a_2 a_3)$. Le nombre des lettres déplacées par Σ serait moindre que $3 + \frac{n-t}{2}$ et, *a fortiori* (t étant ≥ 8), moindre que $\frac{n}{2} - 1$; il serait donc moindre que u , ce qui est contraire à l'hypothèse que u est la classe de G .

On aura donc nécessairement, dans le cas que nous venons de discuter,

$$n - t \geq 2^{k - \frac{\log k}{\log 2} - 3},$$

d'où

$$\log(n - t) \geq (k - 3) \log 2 - \log k.$$

III.

Supposons, contrairement à l'hypothèse examinée dans la Section précédente, qu'il existe au moins une catégorie, la première par exemple, dans laquelle les bi-classes non déplacées par K ne forment

pas plus de la moitié du nombre total. Cette catégorie contiendra nécessairement plusieurs bi-classes, que nous désignerons par c_1, c_2, \dots, c_n .

Les substitutions de H sont (§ I) de la forme

$$AC_1 C_2, \dots, P'P = AC_1 Q,$$

les substitutions partielles A reproduisant tout le groupe alterné \mathfrak{A}_t et les substitutions C_i un groupe \mathfrak{C}_i isomorphe sans méridie à \mathfrak{A}_t , et d'ordre $\frac{t!}{2}$ comme ce dernier. Quant aux substitutions Q, elles ne déplacent pas les bi-classes c_1, \dots, c_n .

Soit \mathfrak{C}_1 le sous-groupe d'ordre $\frac{t!}{2n}$ formé par celles des substitutions de \mathfrak{C}_1 qui ne déplacent pas c_1 . Soit μ le nombre des bi-classes c_1, \dots, c_μ que toutes les substitutions de \mathfrak{C}_1 laissent immobiles. Les bi-classes c_1, \dots, c_n pourront se répartir μ à μ en $\frac{n'}{\mu} = \nu$ systèmes s_1, \dots, s_ν , tels que toute substitution de \mathfrak{C}_1 qui laisse immobile une bi-classe laissera aussi immobiles toutes celles de son système (¹).

Les substitutions de \mathfrak{C}_1 seront de la forme

$$DS_1 S_2 \dots S_\nu,$$

D étant une substitution d'ensemble effectuée sur les ν systèmes; S_1, S_2, \dots des substitutions effectuées dans l'intérieur de chaque système entre les bi-classes qui le composent.

Les substitutions de H et, en particulier, celles de K seront donc de la forme

$$ADS_1 S_2 \dots Q.$$

Deux cas seront à distinguer ici :

PREMIER CAS. — *Ceux des systèmes s_1, s_2, \dots qui ne sont déplacés par aucune des substitutions de K forment plus de la moitié du nombre total.*

(¹) L'un des nombres μ, ν pourrait se réduire à l'unité sans que notre analyse cessât de s'appliquer.

Les substitutions de K pourront se mettre sous la forme

$$ARS_i S_i \dots Q,$$

A désignant une substitution entre les lettres a_1, \dots, a_k ;

R une substitution opérée entre les bi-classes des systèmes que K déplace;

S_i, S_i, \dots des substitutions opérées respectivement entre les bi-classes de chacun des systèmes non déplacés s_i, s_i .

Le groupe alterné \mathfrak{A}_k formé par les substitutions A et le groupe Γ formé par les substitutions $RS_i S_i \dots$ sont des sous-groupes correspondants pris dans les deux groupes \mathfrak{A}_k et C_1 , qui sont isomorphes sans méridrie; ils sont isomorphes l'un à l'autre, sans méridrie; Γ sera donc simple et d'ordre $\frac{k!}{2}$, comme \mathfrak{A}_k .

Cela posé, soient s_i, s_i, \dots les groupes respectivement formés par les substitutions partielles S_i , par les substitutions S_i , etc. Le groupe Γ admet évidemment comme facteurs de composition ceux de s_i ; donc s_i est simple, et d'ordre $\frac{k!}{2}$, s'il ne se réduit pas à la seule substitution 1 , de même pour s_i, \dots .

Mais les groupes s_i, s_i, \dots ne peuvent se réduire tous à la substitution 1 ; car les substitutions de K , se réduisant à la forme

$$ARQ,$$

laisseraient immobiles les bi-classes des systèmes s_i, s_i , lesquelles forment plus de la moitié du nombre total des bi-classes de la première catégorie; résultat contraire à notre hypothèse.

Nous devons donc admettre que l'un, au moins, des groupes s_i, s_i, \dots , par exemple, s_i soit d'ordre $\frac{k!}{2}$. Or, les substitutions de s_i sont opérées entre les μ bi-classes du système s_i , lesquelles jouissent de la propriété que toute substitution de C_1 , qui laisse l'une d'elles immobile, ne déplace pas les autres. L'ordre de s_i ne peut donc surpasser μ , d'où l'inégalité

$$\mu > \frac{k!}{2}.$$

D'ailleurs, le nombre total des lettres qui figurent dans s_i ne surpasse pas $n - t$, et chaque bi-classe en contient au moins une; on aura donc *a fortiori*

$$n - t \geq \mu \geq \frac{k!}{2},$$

d'où

$$\log(n - t) \geq \log k! - \log 2.$$

Or, d'après une formule classique de la théorie des fonctions eulériennes, $\log k!$ est égal à $(k + \frac{1}{2}) \log k - k + \frac{1}{2} \log 2\pi + \rho$, le reste ρ étant compris entre 0 et $\frac{1}{12k}$.

Donc

$$\log(n - t) > (k + \frac{1}{2}) \log k - k + \frac{1}{2} \log 2\pi - \log 2.$$

Le nombre k étant ≥ 5 , cette limite sera plus élevée que la suivante

$$\log(n - t) > (k - 3) \log 2 - \log k,$$

trouvée précédemment dans l'hypothèse traitée dans le § II. Cette dernière limite est donc également applicable au cas actuel.

DEUXIÈME CAS. — *Ceux des systèmes s_1, s_2, \dots que K ne déplace pas ne forment pas plus de la moitié du nombre total.*

Le sous-groupe \mathfrak{e}_{11} , formé par celles des substitutions de \mathfrak{e}_1 qui ne déplacent pas les bi-classes du système s_1 , admet ν transformés distincts par les substitutions de \mathfrak{e}_1 . Ces transformés $\mathfrak{e}_{11}, \mathfrak{e}_{12}, \dots, \mathfrak{e}_{1\nu}$ seront respectivement formés par celles des substitutions de \mathfrak{e}_1 qui laissent immobiles les bi-classes de s_1 , celles de s_2 , etc.; et chaque substitution de \mathfrak{e}_1 transformera ces sous-groupes les uns dans les autres de la même manière qu'elle permute les systèmes correspondants s_1, s_2, \dots . Si donc elle est permutable à l'un de ces sous-groupes, elle ne déplacera pas le système correspondant.

Donc ceux des sous-groupes $\mathfrak{e}_{11}, \dots, \mathfrak{e}_{1\nu}$ auxquels toutes les substitutions de K sont permutables ne forment pas plus de la moitié du nombre total.

Cela posé, le groupe \mathfrak{e}_1 étant isomorphe sans méridric au groupe \mathfrak{A}_1 ,

aux sous-groupes $\mathfrak{e}_{11}, \dots, \mathfrak{e}_{1v}$ correspondront dans \mathfrak{A}_t des sous-groupes $\Gamma_1, \dots, \Gamma_v$, qui seront transformés les uns dans les autres par les substitutions de \mathfrak{A}_t de la même manière que $\mathfrak{e}_{11}, \dots, \mathfrak{e}_{1v}$ le sont par les substitutions correspondantes de \mathfrak{e}_1 .

Donc ceux des sous-groupes $\Gamma_1, \dots, \Gamma_v$ auxquels les substitutions du groupe \mathfrak{A}_k (isomorphe à K) sont permutables, ne forment pas plus de la moitié du nombre total.

D'ailleurs l'ordre Ω du groupe Γ_1 est égal à $\frac{t!}{2^n}$, ordre de \mathfrak{e}_{11} ; et, chaque bi-classe contenant au moins une lettre, on a $n - t \geq n'$; donc

$$n - t \geq \frac{t!}{2\Omega},$$

Ω désignant l'ordre d'un sous-groupe Γ_1 contenu dans \mathfrak{A}_t ; ce sous-groupe Γ_1 étant d'ailleurs assujéti à la condition que ceux de ses transformés $\Gamma_1, \dots, \Gamma_v$ qui sont permutables à toutes les substitutions de \mathfrak{A}_k ne forment pas plus de la moitié du nombre total.

Pour discuter cette formule, groupons les lettres a_1, \dots, a_t en classes, en réunissant celles que Γ_1 permute transitivement. Soient respectivement $\gamma_1, \gamma_2, \dots$ le nombre des lettres qu'elles contiennent; on aura

$$\gamma_1 + \gamma_2 + \dots = t,$$

et les substitutions de Γ_1 seront de la forme

$$G_1 G_2 \dots,$$

G_1, G_2, \dots étant des substitutions partielles opérées respectivement sur les lettres de chaque classe.

Soient Ω_1 l'ordre du groupe Γ_{11} formé par les substitutions G_1 ; Ω_2 celui du groupe Γ_{12} formé par les substitutions G_2 ; etc. Le groupe Γ_1 , dérivé de la combinaison de toutes ces substitutions, aura pour ordre $\Omega_1 \Omega_2 \dots$. Mais il contient évidemment Γ_1 . Donc Ω divise $\Omega_1 \Omega_2 \dots$. Il divisera même $\frac{1}{2} \Omega_1 \Omega_2 \dots$ si l'un des groupes $\Gamma_{11}, \Gamma_{12}, \dots$ n'est pas contenu dans \mathfrak{A}_t ; car Γ_1 , étant contenu dans ce dernier groupe, le sera dans le groupe d'ordre $\frac{1}{2} \Omega_1 \Omega_2 \dots$ formé par les substitutions communes à Γ_1 et à \mathfrak{A}_t .

Nous aurons donc

$$n - t \geq \frac{t!}{r \Omega_1 \Omega_2 \dots},$$

r étant égal à 2 ou à 1, suivant que les groupes $\Gamma_{11}, \Gamma_{12}, \dots$ sont tous contenus dans \mathfrak{A}_t ou non.

Cela posé, considérons l'expression

$$\frac{x(x-1)\dots(x-k+1)}{t(t-1)\dots(t-k+1)}.$$

C'est une fonction de x , qui s'annule pour $x = k - 1$; à partir de ce moment, elle est positive et croissante; pour $x = t$ elle devient égale à 1. L'équation

$$\frac{x(x-1)\dots(x-k+1)}{t(t-1)\dots(t-k+1)} = \frac{1}{2}$$

admet donc une racine ξ comprise dans l'intervalle de $k - 1$ à t .

On a évidemment

$$\frac{\xi}{t} > \frac{\xi-1}{t-1} > \dots > \frac{\xi-k+1}{t-k+1},$$

d'où

$$\left(\frac{\xi}{t}\right)^k > \frac{\xi(\xi-1)\dots(\xi-k+1)}{t(t-1)\dots(t-k+1)} > \frac{1}{2},$$

$$\left(\frac{\xi-k+1}{t-k+1}\right)^k < \frac{\xi(\xi-1)\dots(\xi-k+1)}{t(t-1)\dots(t-k+1)} < \frac{1}{2}.$$

La première inégalité donne

$$\xi > \left(\frac{1}{2}\right)^{\frac{1}{k}} t > \left(\frac{1}{2}\right)^{\frac{1}{3}} t,$$

quantité plus grande que $\frac{2}{3}t$ et que $\frac{1}{2}t + 1$ (t étant > 4).

On déduit de la seconde

$$\frac{\xi-k+1}{t-k+1} < \left(\frac{1}{2}\right)^{\frac{1}{k}} < e^{-\frac{1}{k} \log 2} < \frac{1}{1 + \frac{1}{k} \log 2},$$

d'où

$$\begin{aligned}\frac{\xi - t}{t - k + 1} &< \frac{-\frac{1}{k} \log 2}{1 + \frac{1}{k} \log 2}, \\ t - \xi &> \frac{(t - k + 1) \log 2}{k + \log 2}, \\ \xi &< t - \frac{(t - k + 1) \log 2}{k + \log 2}.\end{aligned}$$

Soit δ le plus grand nombre entier inférieur à la quantité

$$\eta = t - \frac{(t - k + 1) \log 2}{k + \log 2};$$

on aura, d'une part

$$\delta < t,$$

et d'autre part,

$$\delta > \xi - 1 \geq k - 1 \geq 4;$$

$$\delta > \frac{2}{3}t - 1 > \frac{1}{2}t.$$

Ces préliminaires posés, nous pouvons établir le théorème suivant :

Si l'un des entiers $\gamma_1, \gamma_2, \dots$, par exemple γ_1 , est supérieur à δ , le groupe correspondant Γ_{11} ne pourra contenir le groupe \mathfrak{A}_{γ_1} alterné entre les γ_1 lettres a_1, \dots, a_{γ_1} que Γ_{11} déplace.

Supposons en effet que γ_1 soit $> \delta$, et, par suite, $> \frac{1}{2}t$, et que Γ_{11} contienne \mathfrak{A}_{γ_1} . Il admettra le facteur de composition $\frac{\gamma_1!}{2}$ (précédé du facteur 2 si Γ_{11} est le groupe symétrique). Quant à $\Gamma_{12}, \Gamma_{13}, \dots$, leurs facteurs de composition divisant respectivement $\gamma_2!, \gamma_3!, \dots$ seront moindres que $\frac{\gamma_1!}{2}$ (car $\gamma_1 > \frac{1}{2}t > \gamma_2 + \gamma_3 + \dots$). Si donc nous supprimons tous ceux des facteurs de composition de Γ , qui sont moindres que $\frac{\gamma_1!}{2}$, nous obtiendrons comme sous-groupe de Γ , le groupe alterné \mathfrak{A}_{γ_1} . Ce sous-groupe est évidemment le seul groupe alterné entre γ_1 lettres qui soit contenu dans Γ .

Chacun des transformés $\Gamma_1, \dots, \Gamma_\nu$ du groupe Γ , contient de même un groupe alterné entre γ_1 lettres prises parmi les lettres a_1, \dots, a_t . Supposons que, parmi eux, il y en ait M qui contiennent le même groupe alterné \mathfrak{A}_{γ_1} . Il y en aura également M qui contiennent chacun des groupes alternés transformés de \mathfrak{A}_{γ_1} . Le nombre de ceux-ci étant évidemment égal au nombre des combinaisons de t lettres γ_1 à γ_1 , le nombre ν des transformés de Γ , sera

$$M \frac{t(t-1)\dots(t-\gamma_1+1)}{1.2\dots\gamma_1}.$$

Le groupe \mathfrak{A}_k sera contenu dans tous ceux de ces transformés qui contiennent un groupe alterné entre γ_1 lettres, parmi lesquelles figurent a_1, \dots, a_k . Ceux-ci sont au nombre de

$$M \frac{(t-k)(t-k-1)\dots(t-\gamma_1+1)}{1.2\dots(\gamma_1-k)}$$

et contenant \mathfrak{A}_k , ils seront tous permutable à ses substitutions.

Le nombre des groupes de la suite $\Gamma_1, \dots, \Gamma_\nu$ qui sont permutable aux substitutions de \mathfrak{A}_k sera donc une fraction du nombre total au moins égale à

$$\frac{\gamma_1(\gamma_1-1)\dots(\gamma_1-k+1)}{t(t-1)\dots(t-k+1)}.$$

Mais on a, par hypothèse,

$$\gamma_1 \geq \delta + 1 \geq \eta > \xi.$$

La fraction précédente sera donc plus grande que

$$\frac{\xi(\xi-1)\dots(\xi-k+1)}{t(t-1)\dots(t-k+1)} = \frac{1}{2},$$

résultat contraire à l'hypothèse que nous discutons.

Nous sommes maintenant en mesure d'assigner facilement une limite inférieure à la valeur de $n - t$. Nous distinguerons trois cas dans cette discussion.

PREMIER SOUS-CAS. — *Aucun des nombres $\gamma_1, \gamma_2, \dots$ ne surpasse δ .*

Le nombre Ω_1 divise la factorielle $\gamma_1!$ il divise même $\frac{\gamma_1!}{2}$ si Γ_{11} est contenu dans le groupe alterné. De même, Ω_2 divise $\gamma_2!$ (ou $\frac{\gamma_2!}{2}$); etc. Donc $r\Omega_1, \Omega_2, \dots$ divise $\gamma_1!, \gamma_2!, \dots$, et l'on aura

$$n - t \geq \frac{t!}{\gamma_1! \gamma_2! \dots}$$

D'ailleurs, si $\gamma_1 \geq \gamma_2$, on aura évidemment

$$\gamma_1! \gamma_2! < (\gamma_1 + 1)! (\gamma_2 - 1)!$$

La limite inférieure trouvée ci-dessus prendra donc sa plus petite valeur dans la supposition

$$\gamma_1 = \delta, \quad \gamma_2 = t - \delta, \quad \gamma_3 = \gamma_4 = \dots = 0.$$

On aura ainsi, dans tous les cas,

$$n - t \geq \frac{t!}{\delta! (t - \delta)!}$$

Posons

$$\varphi(t) = \left(t + \frac{1}{2}\right) \log t - t + \frac{1}{2} \log 2\pi + \frac{1}{12t}$$

On a, d'après la formule connue qui donne la valeur approchée de $\log \Gamma(t + 1)$,

$$\varphi(t) - \frac{1}{12t} < \log t! < \varphi(t)$$

et, par suite,

$$\log(n - t) > \varphi(t) - \frac{1}{12t} - \varphi(\delta) - \varphi(t - \delta).$$

Cette expression, que nous représenterons par $f(\delta)$, est une fonction décroissante de δ (δ étant $> \frac{t}{2}$). Car sa dérivée

$$-\log \delta - \frac{1}{2\delta} + \frac{1}{12\delta^2} + \log(t - \delta) + \frac{1}{2(t - \delta)} + \frac{1}{12(t - \delta)^2}$$

s'annule pour $\delta = \frac{t}{2}$, et devient ensuite négative, la dérivée seconde

$$-\frac{1}{\delta} + \frac{1}{2\delta^2} - \frac{1}{6\delta^3} - \frac{1}{t-\delta} + \frac{1}{2(t-\delta)^2} - \frac{1}{6(t-\delta)^3}$$

étant négative

DEUXIÈME CAS. — *Le nombre γ_1 surpasse δ ; mais le groupe Γ_{11} n'est pas primitif.*

Soient

α le nombre des systèmes entre lesquels les lettres de Γ_{11} se partagent;

$\frac{\gamma_1}{\alpha}$ le nombre des lettres de chaque système;

$r\Omega_1$ divisera $\alpha! \left[\left(\frac{\gamma_1}{\alpha} \right)! \right]^\alpha$;

$\Omega_2, \Omega_3, \dots$ divisera $(t - \gamma_1)!$

On aura donc

$$n - t > \frac{t!}{\alpha! \left[\left(\frac{\gamma_1}{\alpha} \right)! \right]^\alpha (t - \gamma_1)!};$$

d'où

$$\log(n - t) > \varphi(t) - \frac{1}{12t} - \varphi(\alpha) - \alpha \varphi\left(\frac{\gamma_1}{\alpha}\right) - \varphi(t - \gamma_1),$$

si $t - \gamma_1 > 0$. Cette formule subsistera encore pour $t - \gamma_1 = 0$, si l'on convient de poser $\varphi(0) = 0$.

Désignons par $F(\gamma_1, \alpha)$ le second membre de l'inégalité précédente. Le nombre α , divisant γ_1 , ne pourra prendre que des valeurs comprises entre 2 et $\frac{\gamma_1}{2}$. Cherchons le minimum de F , lorsque α varie d'une manière continue entre ces limites.

La dérivée seconde

$$\frac{\partial^2 F}{\partial \alpha^2} = -\frac{1}{2\alpha} - \frac{\gamma_1 - \frac{1}{2}}{\alpha^2} - \frac{1}{6\alpha^3} - \frac{1}{6\gamma_1},$$

étant constamment négative, le minimum cherché ne pourra avoir lieu que pour l'une des valeurs extrêmes $2, \frac{\gamma_1}{2}$. Ce sera pour $\alpha = 2$.

En effet, la différence

$$F\left(\gamma_1, \frac{\gamma_1}{2}\right) - F(\gamma_1, 2) = \varphi\left(\frac{\gamma_1}{2}\right) - \left(\frac{\gamma_1}{2} - 1\right) \varphi(2)$$

s'annule pour $\gamma_1 = 4$. Elle sera positive si $\gamma_1 > 4$, car sa dérivée

$$\frac{1}{2} \left(\log \frac{\gamma_1}{2} + \frac{1}{\gamma_1} - \frac{1}{3\gamma_1^2} \right) - \frac{1}{2} \varphi(2)$$

est positive. Or γ_1 , étant $> \delta$, est par là même > 4 .

On aura donc

$$\log(n-t) > F(\gamma_1, 2).$$

Supposons que γ_1 , qui par hypothèse est $\geq \delta + 1$, varie de $\delta + 1$ à $t - 1$ et cherchons le minimum de cette expression. Sa dérivée

$$-\varphi'\left(\frac{\gamma_1}{2}\right) + \varphi'(t - \gamma_1)$$

est négative si $\frac{\gamma_1}{2} \leq t - \gamma_1$, d'où $\gamma_1 \geq \frac{2}{3}t$. Cette circonstance se présentera dans tout le champ, car $\delta + 1 > \frac{2}{3}t$. Le minimum cherché aura donc lieu pour $\gamma_1 = t - 1$ et sera égal à $F(t - 1, 2)$.

Il reste à comparer cette valeur à celle qu'on obtiendrait pour $\gamma_1 = t$, laquelle est $F(t, 2)$.

La différence

$$(1) \left\{ \begin{aligned} & F(t-1, 2) - F(t, 2) \\ & = 2 \left[\varphi\left(\frac{t}{2}\right) - \varphi\left(\frac{t-1}{2}\right) \right] - \varphi(1) \\ & = (t+1) \log \frac{t}{2} - t \log \frac{t-1}{2} + \frac{1}{3t} - \frac{1}{3(t-1)} - \frac{1}{2} \log 2\pi - \frac{1}{12} \end{aligned} \right.$$

est une fonction croissante de t , déjà positive pour sa valeur minimum $t = 8$.

Le minimum de $\log(n - t)$ sera donc

$$\begin{aligned} F(t, 2) &= \varphi(t) - \frac{1}{12t} - \varphi(2) - 2\varphi\left(\frac{t}{2}\right) \\ &= \left(t + \frac{1}{2}\right) \log t - t + \frac{1}{2} \log 2\pi \\ &\quad - \left(2 + \frac{1}{2}\right) \log 2 + 2 - \frac{1}{2} \log 2\pi - \frac{1}{24} \\ &\quad - (t + 1) \log \frac{t}{2} + t - \log 2\pi - \frac{1}{3t} \\ &= t \log 2 - \frac{1}{2} \log t - \frac{1}{3t} + 2 - \frac{1}{24} - \frac{3}{2} \log 2 - \log 2\pi. \end{aligned}$$

Cette limite est évidemment plus grande que $(t - 3) \log 2 - \log t$, et, *a fortiori*, que $(k - 3) \log 2 - \log k$, k étant un nombre quelconque > 4 , mais $\bar{z}t$. On doit donc la rejeter, comme moins précise que celle obtenu par la discussion du § II.

TROISIÈME SOUS-CAS. — *Le nombre γ_1 est $> \delta$; Γ_{11} est primitif, mais ne contient pas le groupe alterné.*

Le groupe Γ_{11} , ne contenant dans ce cas aucune substitution circulaire ternaire, son ordre Ω_1 ne pourra surpasser $\frac{\gamma_1!}{m!}$, m étant le plus grand entier contenu dans $\frac{\gamma_1 + 1}{2}$ (BOCHERT, *Mathematische Annalen*, t. XXXIII, p. 584). D'autre part, si $t - \gamma_1 > 1$, $r\Omega_2\Omega_3\dots$ divisera $(t - \gamma_1)!$; et si $t - \gamma_1 = 1$ ou 0, $\Omega_2\Omega_3\dots$ se réduira à l'unité, mais r pourra être égal à 2. On a enfin dans tous les cas

$$\log m! > \varphi(m) - \frac{1}{12m} > \varphi\left(\frac{\gamma_1}{2}\right) - \frac{1}{6\gamma_1},$$

car $m \geq \frac{\gamma_1}{2}$, et $\varphi(x) - \frac{1}{12x}$ est une fonction croissante.

Posant donc, pour abrégier,

$$\varphi(t) - \frac{1}{12t} + \varphi\left(\frac{\gamma_1}{2}\right) - \frac{1}{6\gamma_1} - \varphi(\gamma_1) - \varphi(t - \gamma_1) = \psi(\gamma_1),$$

nous aurons

$$\begin{aligned} \log(n - t) &> \psi(\gamma_1) && \text{si } \gamma_1 < t - 1, \\ \log(n - t) &> \psi(t - 1) - \log 2 && \text{si } \gamma_1 = t - 1. \end{aligned}$$

Enfin, si $\gamma_1 = t$, on aura

$$m \geq \frac{t}{2}, \quad \log m! \geq \log \Gamma\left(\frac{t}{2} + 1\right),$$

$$\log(n-t) \geq \varphi\left(\frac{t}{2}\right) - \frac{1}{6t} - \log 2.$$

Lorsque γ_1 varie de δ à $t-1$, la dérivée seconde

$$\psi''(\gamma_1) = -\frac{1}{2\gamma_1} + \frac{1}{6\gamma_1^3} - \frac{1}{t-\gamma_1} + \frac{1}{2(t-\gamma_1)^2} - \frac{1}{6(t-\gamma_1)^3}$$

sera négative. Le minimum de $\psi(\gamma_1)$ aura donc lieu pour $\gamma_1 = \delta$ ou $t-1$; $\log(n-t)$ sera donc supérieur à la plus petite des trois quantités

$$\psi(\delta), \quad \psi(t-1) - \log 2, \quad \varphi\left(\frac{t}{2}\right) - \frac{1}{6t} - \log 2.$$

La première de ces limites $\psi(\delta)$ pourra être rejetée, car elle est supérieure à la limite $f(\delta)$ obtenue pour le premier cas : on a en effet

$$\psi(\delta) - f(\delta) = \varphi\left(\frac{\delta}{2}\right) - \frac{1}{6\delta}$$

expression dont la dérivée est positive, et qui l'est elle-même dès que $\delta = 4$.

Les deux autres limites sont également à rejeter, car elles sont supérieures à $(t-3)\log 2 - \log t$, et *a fortiori* à $(k-3)\log 2 - \log k$ si $k < t$. On a en effet

$$\begin{aligned} & \psi(t-1) - \log 2 - (t-3)\log 2 + \log t \\ &= (t + \frac{1}{2})\log t - t + \frac{t}{2}\log\frac{t-1}{2} - \frac{t-1}{2} \\ & \quad - (t - \frac{1}{2})\log(t-1) + (t-1) - \frac{1}{12(t-1)} + 1 - \frac{1}{12} \\ & \quad - \log 2 - (t-3)\log 2 + \log t. \end{aligned}$$

Or, on a

$$\begin{aligned} & \frac{1}{2}\log\frac{t-1}{2} - (t - \frac{1}{2})\log(t-1) = -\frac{t}{2}\log 2 - \frac{t-1}{2}\log(t-1) \\ & = -\frac{t}{2}\log 2 - \frac{t-1}{2}\log t - \frac{t-1}{2}\log\left(1 - \frac{1}{t}\right). \end{aligned}$$

Mais

$$-\frac{t-1}{2} \log\left(1 - \frac{1}{t}\right) > \frac{t-1}{2} \frac{1}{t} > \frac{1}{2} - \frac{1}{2t}.$$

Substituant cette valeur, on voit que la différence cherchée est plus grande que

$$\left(\frac{t}{2} + 2\right) \log t - (1 + 3 \log 2) \frac{t}{2} + \frac{5}{12} + 2 \log 2 - \frac{1}{2t} - \frac{1}{12(t-1)},$$

quantité évidemment positive.

On a d'autre part

$$\begin{aligned} \varphi\left(\frac{t}{2}\right) - \frac{1}{6t} - \log 2 - (t-3) \log 2 + \log t \\ = \frac{t+3}{2} \log t - \frac{1+3 \log 2}{2} t + \frac{3}{2} \log 2 + \frac{1}{2} \log 2 \pi + \log t, \end{aligned}$$

quantité évidemment positive.

IV.

En réunissant les résultats des deux Sections précédentes, nous pouvons formuler le théorème suivant :

Soit G un groupe de classe u, et au moins t fois transitif (t > 8), et ne contenant pas le groupe alterné.

Soit k un entier > 4 et < t, choisi à volonté; δ le plus grand entier qui satisfasse à l'inégalité

$$\delta < t - \frac{(t-k+1) \log 2}{k + \log 2}.$$

Posons en outre

$$\varphi(t) = \left(t + \frac{1}{2}\right) \log t - t + \frac{1}{2} \log 2 \pi + \frac{1}{12t}.$$

On aura nécessairement l'une des deux inégalités suivantes

$$(2) \quad \begin{cases} \log(n-t) \geq (k-3) \log 2 - \log k, \\ \log(n-t) > \varphi(t) - \frac{1}{12t} - \varphi(\delta) - \varphi(t-\delta). \end{cases}$$

Il nous reste à déterminer l'entier arbitraire k de manière à obtenir une limite aussi élevée que possible.

Si nous faisons croître k d'une manière continue de 5 à t , δ croîtra et $\varphi(t) - \frac{1}{12t} - \varphi(\delta) - \varphi(t - \delta)$ décroîtra. Au contraire, l'expression $(k - 3)\log 2 - \log k$ sera croissante, et finira par dépasser l'autre. On obtiendra donc le meilleur résultat possible en assignant à k l'une des deux valeurs entières entre lesquelles se trouve comprise la racine de l'équation

$$(k - 3)\log 2 - \log k = \varphi(t) - \frac{1}{12t} - \varphi(\delta) - \varphi(t - \delta).$$

Cherchons à nous rendre compte de l'ordre de grandeur de la limite inférieure de $\log(n - t)$ lorsque t est très grand.

Faisons tendre k vers l'infini en même temps que t , mais moins rapidement; la valeur principale de $(k - 3)\log 2 - \log k$ sera $k \log 2$; celle de δ sera t ; celle de $t - \delta$ sera $\frac{t \log 2}{k}$. Pour trouver celle de

$$\begin{aligned} & \varphi(t) - \frac{1}{12t} - \varphi(\delta) - \varphi(t - \delta) \\ &= (t + \frac{1}{2}) \log t - (\delta + \frac{1}{2}) \log \delta \\ & \quad - (t - \delta + \frac{1}{2}) \log(t - \delta) - \frac{1}{2} \log 2\pi - \frac{1}{12\delta} - \frac{1}{12(t - \delta)}, \end{aligned}$$

remplaçons $\log \delta$ par

$$\log t + \log\left(1 - \frac{t - \delta}{t}\right) = \log t - \frac{t - \delta}{t} - \frac{(t - \delta)^2}{2t^2} - \dots$$

Le terme prépondérant dans l'expression ainsi transformée sera $(t - \delta) \log t$, dont la valeur principale est

$$\frac{t \log 2}{k} \log t.$$

Elle deviendrait égale à $k \log 2$, si l'on posait

$$k = \sqrt{t \log t}.$$

Si nous prenons pour k une valeur entière voisine de ce dernier nombre, les deux expressions (2), et par suite la limite inférieure de $\log(n - t)$, seront de la forme

$$\sqrt{t \log t} \log 2(1 + \varepsilon),$$

ε étant un infiniment petit.

