

C. DROUETS

Solution du problème 115

Nouvelles annales de mathématiques 1^{re} série, tome 5
(1846), p. 548-550

http://www.numdam.org/item?id=NAM_1846_1_5__548_1

© Nouvelles annales de mathématiques, 1846, tous droits réservés.

L'accès aux archives de la revue « Nouvelles annales de mathématiques » implique l'accord avec les conditions générales d'utilisation (<http://www.numdam.org/conditions>). Toute utilisation commerciale ou impression systématique est constitutive d'une infraction pénale. Toute copie ou impression de ce fichier doit contenir la présente mention de copyright.

NUMDAM

Article numérisé dans le cadre du programme
Numérisation de documents anciens mathématiques

<http://www.numdam.org/>

SOLUTION DU PROBLÈME 115 (t. V, p. 167),

PAR M. C. DROUETS,

élève du collège royal militaire de La Flèche.

—

Étant donnés dans le même plan deux cercles et un point fixe, mener deux tangentes parallèles telles que le rapport

des distances du point aux deux tangentes soit un rapport donné $\frac{m}{n}$; par la géométrie élémentaire et par l'analyse quand les deux cercles sont remplacés par des coniques.

Soient C, C' les deux centres, R, \dots, R' les rayons, A le point fixe, $mT, m'T'$ les deux tangentes. Par le point A je conçois une parallèle commune qui coupe la droite mm' des points de contact en O , dans le rapport donné ; puis à ce point une parallèle aux rayons $Cm, C'm'$, c'est-à-dire une perpendiculaire à AD ; elle rencontre CC' en I , et divise cette longueur dans le rapport donné ; ainsi on connaît de position et de grandeur le diamètre AI d'une circonférence qui doit contenir le point O ; mais dans le trapèze $CmC'm'$, la ligne IR , parallèle aux bases, est une fonction des bases R, R' et du rapport dans lequel le point I divise CC' ;

$$IR = \frac{Rm + R'n}{m + n} ;$$

donc IO est connu, et par suite le point R ; IR donne la direction des rayons de contact ; il existe en dehors de la ligne CC' un point analogue à I , qui donnera aussi deux solutions de la question. Cette solution est particulière au cercle · en voici une plus générale, facilement applicable aux coniques. Je conçois le point A comme centre de similitude de la courbe C et d'une seconde D , dont le rapport de similitude à C serait le rapport donné $\frac{m}{n}$; ces deux courbes auraient alors les tangentes (correspondantes à un même rayon vecteur) parallèles et à des distances du centre de similitude dont le rapport serait $\frac{m}{n}$; la question reviendrait donc à mener une tangente commune aux courbes D et C' .

Cette dernière construction pourra être ramenée à l'inter-

section de deux coniques au moyen des polaires réciproques ; mais le cas le plus favorable serait celui où les coniques D et C' auraient un foyer commun ; alors le problème se réduirait à l'intersection de deux cercles , qui seraient les polaires réciproques des deux coniques par rapport à un cercle directeur ayant pour centre le foyer commun.

Par rapport au point A , on aura deux courbes semblables à C ; chacune d'elles pourra donner quatre tangentes communes avec C ; il y aurait alors huit solutions.

Analyse.

Je prends pour axes de coordonnées deux droites rectangulaires passant par le point A. Soient

$$A y^2 + Bxy + Cx^2 + Dy + Ex + F = 0, ,$$

$$ay^2 + bxy + cx^2 + dy + ex + f = 0, ,$$

les équations des deux coniques ; $y = mx + m$ celles des

$$y = mx + n'$$

deux tangentes parallèles , leurs distances au point A sont :

$$\frac{n}{\sqrt{1+m^2}} : \frac{n'}{\sqrt{1+m^2}} ; k \text{ étant leur rapport , il faut que}$$

$n' = nk$. Je vais exprimer que $y = mx + n$ touche la première conique , $ky = mx + nk$ touche la seconde ; j'aurai deux équations entre m et n , ce qui déterminera ces deux inconnues. Ces équations sont (Voir t. II, p. 108) :

$$\begin{aligned} & (B^2 - 4AC) n^2 + (D^2 - 4AF) m^2 + (E^2 - 4CF) + \\ & + 2(2AE - BD) mn - 2(2CD - BE) n + 2(DE - 2BF) m = 0 ; \\ & (b^2 - 4ac) n^2 k^2 + (d^2 - 4af) m^2 + (e^2 - 4cf) + \\ & + 2(2ae - bd) mnk - 2(2cd - be) nk + 2(de - 2bf) m = 0. \end{aligned}$$

L'élimination de m donnera généralement en n une équation du quatrième degré, ce qui déterminera les points B, B' où les deux tangentes vont couper l'axe de y ; or, par chacun de ces points on peut mener deux tangentes ; il y aura donc généralement huit solutions.