

LOUIS THOMAS

**Note sur le changement de la variable
indépendante**

Nouvelles annales de mathématiques 1^{re} série, tome 9
(1850), p. 365-367

http://www.numdam.org/item?id=NAM_1850_1_9_365_0

© Nouvelles annales de mathématiques, 1850, tous droits réservés.

L'accès aux archives de la revue « Nouvelles annales de mathématiques » implique l'accord avec les conditions générales d'utilisation (<http://www.numdam.org/conditions>). Toute utilisation commerciale ou impression systématique est constitutive d'une infraction pénale. Toute copie ou impression de ce fichier doit contenir la présente mention de copyright.

NUMDAM

Article numérisé dans le cadre du programme
Numérisation de documents anciens mathématiques

<http://www.numdam.org/>

NOTE SUR LE CHANGEMENT DE LA VARIABLE INDÉPENDANTE ;

PAR M. LOUIS THOMAS.

Supposons que l'on ait une équation différentielle entre la variable indépendante x , sa fonction y et les dérivées successives de cette fonction

$$F \left(x, y, \frac{dy}{dx}, \frac{d^2y}{dx^2}, \dots, \frac{d^m y}{dx^m} \right) = 0,$$

et que l'on veuille, au moyen de la relation

$$\varphi \left(x, y, z, \frac{dy}{dx}, \dots, \frac{d^n y}{dx^n}, \frac{dz}{dx}, \dots, \frac{d^p z}{dx^p} \right) = 0,$$

transformer la première équation en une autre qui ne contienne que x, z et les dérivées de x par rapport à z , considérée comme nouvelle variable indépendante. Pour y parvenir, on différenciera n fois $F = 0$ et m fois $\varphi = 0$ par rapport à x . On aura ainsi $m + n + 2$ équations contenant $y, \frac{dy}{dx}, \frac{d^2y}{dx^2}, \dots, \frac{d^{m+n}y}{dx^{m+n}}$ que l'on pourra éliminer, et il restera une équation contenant $x, z, \frac{dz}{dx}, \dots,$

$\frac{d^{p+m}z}{dx^{p+m}}$ que l'on pourra transformer en une autre contenant $x, z, \frac{dx}{dz}, \dots, \frac{d^{m+p}z}{dx^{m+p}}$ au moyen des relations

$$\frac{dz}{dx} = \frac{1}{\left(\frac{dx}{dz} \right)}, \quad \frac{d^2z}{dx^2} = - \frac{\left(\frac{d^2x}{dz^2} \right)}{\left(\frac{dx}{dz} \right)}, \dots,$$

ce qu'il fallait obtenir.

Si l'on avait voulu une équation finale contenant $y, z, \frac{dz}{dy}, \frac{d^2z}{dy^2}, \dots$, on aurait préparé les équations

$$F = 0 \quad \text{et} \quad \varphi = 0$$

de manière qu'elles contiennent, au lieu des dérivées de y et de z par rapport à x , les dérivées de x et de y par rapport à z prise pour variable indépendante au moyen des relations

$$\frac{dz}{dx} = \frac{1}{\left(\frac{dx}{dz}\right)}, \quad \frac{d^2z}{dx^2} = \dots, \quad \frac{dy}{dx} = \frac{\left(\frac{dy}{dz}\right)}{\left(\frac{dx}{dz}\right)}, \quad \frac{d^2y}{dx^2} = \dots,$$

et l'on différentierait la première équation résultante n fois et la seconde m fois pour éliminer x et toutes les dérivées par rapport à z .

En général, soient $k - 1$ équations différentielles

$$\varphi_1 = 0, \quad \varphi_2 = 0, \quad \varphi_{k-1} = 0,$$

entre k fonctions y, z, \dots, v, u, t de la variable indépendante x et cette valeur elle-même, outre l'équation différentielle

$$F\left(x, y, \frac{dy}{dx}, \frac{d^2y}{dx^2}, \dots\right) = 0,$$

qui donne y en fonction de x . Si l'on veut obtenir une équation ne contenant que x, t et les dérivées de x par rapport à t prise pour nouvelle variable indépendante, on différentiera α fois chacune des k équations

$$F = 0, \quad \varphi_1 = 0, \dots, \quad \varphi_{k-1} = 0$$

par rapport à x , et l'on déterminera α de manière que le nombre total des équations $k\alpha + k$ soit supérieur d'une unité au nombre des quantités à éliminer, lesquelles sont y, x, \dots, v, u et leurs dérivées par rapport à x . Soient

donc m, n, \dots, p, q les ordres des dérivées les plus élevées de y, z, \dots, v, u qui entrent dans les k équations données ; après les avoir différenciées α fois, on aura les dérivées de y jusqu'à l'ordre $m + \alpha$, celles de z jusqu'à l'ordre $n + \alpha$, celles de v jusqu'à l'ordre $p + \alpha$, et celles de u jusqu'à l'ordre $q + \alpha$. On aura donc à éliminer

$m + \alpha + 1 + n + \alpha + 1 + \dots + p + \alpha + 1 + q + \alpha + 1$ quantités

ou

$$m + n + \dots + p + q + (k - 1)\alpha + k - 1,$$

ou

$$m + n + \dots + p + q - \alpha + k\alpha + k - 1 \text{ quantités.}$$

Pour que ce nombre soit inférieur d'une unité à $k\alpha + k$, nombre des équations, il faut et il suffit qu'on ait

$$m + n + \dots + p + q = \alpha.$$

Si r est l'ordre de la dérivée la plus élevée de t , entrant dans les équations primitives

$$F = 0, \quad \varphi_1 = 0, \dots, \quad \varphi_{k-1} = 0,$$

on aura une équation finale contenant x, t et les dérivées de t par rapport à x jusqu'à l'ordre $r + \alpha$, qu'on transformera aisément en une équation contenant α, t et les dérivées de x par rapport à t aussi jusqu'à l'ordre $r + \alpha$. C'est ce qu'il s'agissait d'obtenir.

Si l'on avait demandé une équation finale contenant u, t et les dérivées de u par rapport à t , on aurait préparé les équations de manière qu'elles contiennent les mêmes variables et les dérivées de toutes excepté t par rapport à t prise pour nouvelle variable indépendante, et l'on aurait ensuite opéré comme on vient de le dire.