

LÉON RABEAU

CHARLES KESSLER

Solution de la question 498

Nouvelles annales de mathématiques 1^{re} série, tome 19
(1860), p. 154-158

http://www.numdam.org/item?id=NAM_1860_1_19__154_0

© Nouvelles annales de mathématiques, 1860, tous droits réservés.

L'accès aux archives de la revue « Nouvelles annales de mathématiques » implique l'accord avec les conditions générales d'utilisation (<http://www.numdam.org/conditions>). Toute utilisation commerciale ou impression systématique est constitutive d'une infraction pénale. Toute copie ou impression de ce fichier doit contenir la présente mention de copyright.

NUMDAM

Article numérisé dans le cadre du programme
Numérisation de documents anciens mathématiques

<http://www.numdam.org/>

SOLUTION DE LA QUESTION 498

(voir p. 4.),

PAR M. LÉON RABEAU,
Élève de Spéciales au lycée de Poitiers.

ET M. CHARLES KESSLER,
Élève au Prytanée Militaire.

On donne une droite fixe, un point B sur cette droite et un point fixe A. Trouver une courbe telle, qu'en menant par un point quelconque pris sur cette courbe une tangente, et par le point A une parallèle à cette tangente, ces droites interceptent sur la droite fixe deux segments comptés du point B, tels, que la somme des carrés de ces segments soit égale à un carré donné k^2 . Même question en prenant la différence des carrés.

Je prends la droite donnée pour axe des y , et la droite BA pour axe des x . Le point B sera alors l'origine des coordonnées.

Soit (x_1, y_1) un point de la courbe. L'équation de la tangente en ce point sera

$$y - y_1 = y'(x - x_1).$$

L'équation de la parallèle menée par le point A sera, en appelant a la distance AB,

$$y = y'(x - a).$$

Les ordonnées à l'origine sont pour les deux parallèles

$$y = y_1 - x_1 y',$$

$$y = -ay'.$$

On doit donc avoir, en effaçant les indices ,

$$(1) \quad (y - xy')^2 + a^2 y'^2 = k^2 ;$$

on tire de cette équation

$$y = x' \pm \sqrt{k^2 - a^2 y'^2},$$

et en prenant les dérivées des deux membres ,

$$y' = y' + y'' x \pm y'' \frac{-a^2 y'}{\sqrt{k^2 - a^2 y'^2}},$$

d'où

$$y'' \left(x \mp \frac{a^2 y'}{\sqrt{k^2 - a^2 y'^2}} \right) = 0.$$

Cette dernière équation est vérifiée par

$$y'' = 0$$

et par

$$y' = \pm \frac{kx}{a \sqrt{x^2 + a^2}}.$$

La première solution donne $y' = m$ (une constante arbitraire). Transportant cette valeur dans l'équation (1), on a, pour première solution du problème,

$$(a) \quad y = mx \pm \sqrt{k^2 - a^2 m^2}.$$

La seconde valeur de y' , transportée dans la même équation, donne, en réduisant ,

$$y^2 = \frac{k^2}{a^2} (x^2 + a^2),$$

d'où

$$(\beta) \quad \frac{y^2}{k^2} - \frac{x^2}{a^2} = 1,$$

équation d'une hyperbole dont deux diamètres conjugués.

sont en direction, les axes coordonnés, et en longueur, $2a$ et $2k$, $2a$ étant l'axe imaginaire (l'axe des x).

Nous remarquerons que l'équation (α) est celle d'une tangente menée à cette hyperbole; il est évident, en effet, que toutes ces droites, se confondant avec leurs tangentes, répondent à la question.

Si $a = k$, l'hyperbole devient équilatère.

Si l'on avait pris la différence des carrés, au lieu de considérer leur somme, rien n'aurait été changé dans le calcul précédent, que a^2 en $-a^2$. En faisant cette transformation, on arrive encore à

$$y'' = 0, \quad \text{d'où} \quad y' = m,$$

et à

$$y'' = \pm \frac{kx}{a\sqrt{a^2 - x^2}}.$$

La première solution donne

$$y = mx \pm \sqrt{k^2 + a^2 m^2},$$

et la seconde,

$$\frac{y^2}{k^2} + \frac{x^2}{a^2} = 1,$$

équation d'une ellipse dont les diamètres conjugués sont $2a$ et $2k$. La première équation représente encore l'équation d'une tangente à cette ellipse.

Si $a = k$, cette ellipse devient un cercle si les axes sont rectangulaires, et s'ils sont obliques, une ellipse rapportée à ses deux diamètres conjugués égaux.

Note. M. Franck, licencié ès sciences, chef d'une institution israélite à Lyon, donne une solution identique à la précédente, et ajoute :

Supposons que l'on veuille satisfaire à la condi-

tion

$$\frac{1}{x_1} + \frac{1}{x_2} = \frac{p}{px - y} - \frac{p}{a} = k \quad (*)$$

ce qui donne l'équation différentielle

$$y = px - \frac{ap}{p + ak}.$$

En différentiant

$$dp \left[x - \frac{a(p + ak)ap}{(p + ak)^2} \right] = 0,$$

ou

$$dp \left[x - \frac{a^2 k}{(p + ak)^2} \right] = 0.$$

L'équation de la courbe cherchée sera le résultat de l'élimination de p entre les deux équations

$$(1) \quad x - \frac{a^2 k}{(p + ak)^2} = 0,$$

$$(2) \quad y = px - \frac{ap}{p + ak};$$

l'équation (1) donne

$$(p + ak)^2 = \frac{b^2 k}{x}.$$

$$(3) \quad p = -bk + \varepsilon,$$

en posant

$$\varepsilon = \pm \sqrt{\frac{x}{k}};$$

remplaçant dans l'équation (2) la valeur de p fournie par

(*) p c'est y' .

l'équation (3), on obtient

$$\varepsilon (y + b k x + b) = 2 b k,$$

et en élevant au carré

$$\frac{b^2 k}{x} (y + b k x + b)^2 = 4 b^4 k^2,$$

on obtient

$$y = - (a k x + a) \pm 2 a \sqrt{k x},$$

équation d'une parabole facile à construire.

M. Kessler trouve un lieu du troisième ordre lorsqu'on prend la somme directe des segments.