

CH.-PH. CAHEN

## Sur l'hypocycloïde à trois rebroussements

*Nouvelles annales de mathématiques 2<sup>e</sup> série*, tome 14  
(1875), p. 21-31

[http://www.numdam.org/item?id=NAM\\_1875\\_2\\_14\\_\\_21\\_1](http://www.numdam.org/item?id=NAM_1875_2_14__21_1)

© Nouvelles annales de mathématiques, 1875, tous droits réservés.

L'accès aux archives de la revue « Nouvelles annales de mathématiques » implique l'accord avec les conditions générales d'utilisation (<http://www.numdam.org/conditions>). Toute utilisation commerciale ou impression systématique est constitutive d'une infraction pénale. Toute copie ou impression de ce fichier doit contenir la présente mention de copyright.

NUMDAM

Article numérisé dans le cadre du programme  
Numérisation de documents anciens mathématiques  
<http://www.numdam.org/>

---

## SUR L'HYPOCYCLOÏDE A TROIS REBROUSSEMENTS ;

PAR M. CH.-PH. CAHEN.

---

Steiner a énoncé (sans démonstration) un certain nombre de propriétés de l'*hypocycloïde à trois rebroussements*.

Cette courbe est engendrée par un point de la circonférence d'un cercle qui roule intérieurement, sans glisser, sur la circonférence d'un cercle de rayon triple.

Une démonstration de ces propriétés a été publiée par M. Cremona dans le *Journal de Crelle* (année 1865, p. 101).

On trouve dans le Mémoire de M. Cremona (p. 106, § 11) une propriété de l'hypocycloïde à trois rebroussements qui est présentée sous une forme un peu différente dans les *Nouvelles Annales* du mois de janvier 1869 (question 898).

Je rappelle ici la solution de cette question 898, et je vais montrer tout le parti qu'on peut en tirer pour démontrer par la Géométrie les propriétés démontrées par M. Cremona d'une autre manière.

Enfin j'appliquerai cette même méthode à la démonstration de la question 868 proposée dans les *Nouvelles Annales* du mois de mai 1868.

I. On donne un cercle  $C$  (*fig. 1*) tangent à une droite  $D$  en  $O$ . D'un point  $M$  de la circonférence on mène  $MA$  perpendiculaire à  $D$ , et l'on prend  $AB = AO$ . On joint  $BM$  et l'on demande l'enveloppe de la droite  $BM$  quand le point  $M$  se déplace sur la circonférence. L'enveloppe cherchée admet trois axes de symétrie et trois points de rebroussement remarquables (question 898).

Fig. 1.





Fig. 2.



Remarquons d'abord que l'arc  $OM$  qui mesure l'angle en  $O$  du triangle isocèle  $MOB$  est moitié de l'arc  $ON$  qui mesure l'angle  $M$  extérieur à ce triangle, ce qui montre que la question proposée revient à la propriété suivante énoncée par M. Cremona (*Journal de Crelle*, p. 106) :

Deux rayons  $CM$ ,  $CN$  du cercle  $C$  tournent simultanément autour du point  $C$ , en sens opposé et avec la condition que leurs vitesses angulaires aient le rapport  $1 : 2$ ; trouver l'enveloppe de la corde  $MN$  (\*).

Si l'on considère deux de ces cordes  $MN$  et  $M'N'$  (*fig. 2*) se coupant en  $H$ , le triangle  $M'NH$ , qui a deux angles égaux, est isocèle, et par suite, lorsque les cordes  $MN$ ,  $M'N'$  se rapprochent jusqu'à se confondre, on aura à la limite  $MN = MH$ .

Cela résulte de ce que l'arc  $NN'$  est double de l'arc  $MM'$ .

---

(\*) Voir *Crelle*, p. 117, § 33.





cercle C; si MK est bissectrice de l'angle  $\widehat{RMT}$ , comme arc OR = 2 arc OM, il en résulte arc OM = 2 arc OK, donc MK est une tangente à l'hypocycloïde; donc :

*Si, par un point du cercle C, on mène une tangente au cercle et trois tangentes à l'hypocycloïde, deux de ces tangentes sont les bissectrices des angles formés par la troisième et la tangente au cercle.*

V. Arc MK = arc KR (fig. 4) : donc MR est perpendiculaire à KC (\*).

Il résulte de là que, MK, MK', MR étant trois tangentes menées par un point du cercle C à l'hypocycloïde, la parallèle RL à KK' touche l'hypocycloïde, parce que l'angle R est droit et que le cercle C est le lieu des sommets des angles droits circonscrits à la courbe.

En prenant  $\mu\lambda = \mu R$ , on a le point de contact  $\lambda$  de cette tangente, et comme KL = KM, que K'L' = K'M, les points L, L' sont les points de contact des tangentes KL, K'L'.

Ainsi :

VI. *La droite LL', qui joint les points de contact L, L' de deux tangentes rectangulaires, est tangente à la courbe (\*\*).*

VII. *La longueur LL' est constante et égale à quatre fois le rayon du cercle C.*

Réciproque du théorème VI :

VIII. *Les tangentes à l'hypocycloïde aux points L, L', où une tangente à cette courbe la rencontre, sont rectangulaires.*

(\*) Crelle, p. 103, § 9.

(\*\*) Crelle, p. 106, § 12.

Menons la tangente LM en L (*fig. 4*) à l'hypocycloïde et la tangente ML'' perpendiculaire à ML; la droite LL'' est tangente à l'hypocycloïde d'après le théorème VI, et comme, par un point L pris sur la courbe, on ne peut mener que deux tangentes LM et LL', LL'' se confond avec LL', et le point L'' avec le point L', car  $LL'' = LL'$ .

IX. Si l'on achève le rectangle LML'S dont la diagonale MS passe par les points C et  $\mu$  milieux des droites KK', LL', on a le théorème suivant :

*Le lieu des intersections S des normales rectangulaires est une circonférence qui a C pour centre et pour rayon 3CM.*

X. *Développée.* — Les trois normales SL, SL', S $\lambda$  enveloppent évidemment une hypocycloïde inversement homothétique (le point C étant le centre d'homothétie) de celle qu'enveloppent leurs homologues MK, MK', MR, c'est-à-dire que :

*La développée de l'hypocycloïde est une hypocycloïde inversement homothétique à la première (C est le centre d'homothétie); le rapport d'homothétie est  $\frac{1}{3}$ .*

Reportons-nous à la *fig. 4*, nous verrons que la parabole qui a S pour foyer et qui touche les droites ML, ML' a pour tangente au sommet la droite LL' qui passe par les pieds L et L' des perpendiculaires abaissées du foyer S sur les tangentes ML, ML'; par suite, cette parabole a son sommet au point  $\lambda$ , où LL' touche l'hypocycloïde.

Il résulte de là que :

XI. *Cette parabole enveloppe l'hypocycloïde elle-même;*

XII. *Son axe enveloppe la développée de l'hypocycloïde;*

XIII. Son sommet  $\lambda$  décrit l'hypocycloïde ;


XIV. Son foyer  $S$  décrit le cercle qui passe par les trois points de rebroussement de l'hypocycloïde ;

Enfin :

XV. Sa directrice est la parallèle menée par le point  $M$  à  $LL'$ , et, comme cette parallèle est symétrique de  $LL'$  par rapport au point  $C$ , elle enveloppe une hypocycloïde symétrique par rapport au point  $C$  de celle qu'enveloppe  $LL'$ .

XVI. Considérons deux tangentes  $AA'$ ,  $BB'$  (fig. 5) à l'hypocycloïde.

Fig. 5.



Soit arc  $OA = \alpha$ , et par suite arc  $OA' = 2\alpha$  ; de même  $OB = \beta$  et  $OB' = 2\beta$ . L'angle  $\widehat{ADB'}$  a pour mesure

$$\text{arc} \frac{AB' - BA'}{2} = \text{arc} \frac{2\beta - \alpha - 2\alpha - \beta}{2} = \text{arc} \frac{\alpha - \beta}{2}.$$

Les angles  $B'$  et  $A'$  ont aussi chacun pour mesure  $\text{arc} \frac{\alpha - \beta}{2}$  ; donc les triangles  $DAB'$ ,  $DBA'$  sont isocèles.

XVII. On voit par là que :


Étant donnée une tangente  $AA'$  à l'hypocycloïde et un point  $D$  sur cette tangente, pour mener par  $D$  une seconde tangente, il suffit de décrire du point  $A$  (le plus rapproché de  $O$  des deux points  $A$ ,  $A'$ ) un arc de cercle



de rayon  $AD$  qui coupe le cercle  $C$  au point  $B'$  ; joignant  $B'D$ , on a une tangente  $BD$  à l'hypocycloïde.

XVIII. Soit  $AA'$  (*fig. 6*) une tangente menée à l'hypocycloïde par un point arbitraire  $D$ .

Fig. 6.



Du point  $E$  où  $AA'$  coupe le cercle  $C$  comme centre, décrivons avec  $ED$  comme rayon une circonférence qui coupe la circonférence  $C$  aux points  $B'$  et  $C'$  ; d'après ce qui a été dit (XVII),  $B'D$  et  $C'D$  seront des tangentes menées par le point  $D$  à l'hypocycloïde.

Ces deux tangentes coupent encore le cercle  $C$  en  $F$  et en  $G$ .

En se reportant au théorème XVI, on voit que les triangles  $FDA'$ ,  $GDA'$  sont isocèles ; donc  $FG$  est perpendiculaire au milieu de  $A'D$  ; de même  $EF$  est perpendiculaire au milieu de  $C'D$ , et  $EG$  est perpendiculaire au milieu de  $B'D$ .

Il résulte de là que les parallèles menées aux côtés du triangle  $EFG$  respectivement par les points  $A'$ ,  $B'$ ,  $C'$  forment un triangle  $ABC$  homothétique à  $EFG$ , le point d'intersection  $D$  des hauteurs du triangle  $EFG$  étant le centre d'homothétie, et, par suite, le triangle  $ABC$  a pour hauteurs celles du triangle  $EFG$  qui, comme on sait, touchent l'hypocycloïde.

Si, maintenant, on se reporte à la *fig. 1*, on voit que

MN étant une tangente à l'hypocycloïde, si l'on a

$$2\text{arc OM} = \text{arc ON},$$

c'est par le point N que passe la tangente perpendiculaire à MN.

Si, d'un autre côté, nous nous reportons à la *fig. 5*, nous verrons que, si l'on a  $2\text{arc OA} = \text{arc OA}'$ , c'est du point A comme centre qu'on a décrit la circonférence qui sert à déterminer une nouvelle tangente BB'.


Comme, dans le problème actuel (*fig. 6*), nous avons décrit le cercle du point E comme centre, c'est la droite BC qui sera une tangente à l'hypocycloïde; il en sera de même de AB et de AC.

Donc :

*Si trois tangentes à l'hypocycloïde passent par un même point, les tangentes perpendiculaires respectivement à celles-là forment un triangle dont les trois premières tangentes sont les hauteurs.*

XIX. D'un point quelconque F du cercle circonscrit au triangle ABC, abaissons des perpendiculaires sur les côtés de ce triangle. On sait que les pieds de ces

Fig. 7.



*perpendiculaires sont en ligne droite; trouver l'enveloppe de cette droite (question 868) (\*).*

---

(\*) Voir *Crelle*, p. 110, § 19, et *Nouvelles Annales*, 2<sup>e</sup> série, t. IX, p. 73, la solution de M. P. Serret.

La droite  $ab$  (*fig. 7*) qui joint les pieds des perpendiculaires est tangente au sommet d'une parabole inscrite au triangle  $ABC$ . Cette parabole a le point  $F$  pour foyer, et sa directrice passe par le point de concours  $H$  des hauteurs.


La droite  $HF$  rencontre  $ab$  en  $d$ , et le point  $d$  est le milieu de  $HC$ ; donc les triangles  $dpH$  et  $daF$  sont égaux et  $da = dp$ .

Il résulte de là que le triangle  $dam$  est isocèle.

Comme d'ailleurs le cercle des neuf points du triangle  $ABC$  passe par les milieux de  $HA$ ,  $HB$ ,  $HC$ , il passera aussi par le milieu  $d$  de  $HF$ .

On voit par là que  $ABC$  (*fig. 8*) étant le triangle donné,  $m$  le pied de la hauteur  $Am$ ,  $ad$  une des droites

Fig. 8.



dont on cherche l'enveloppe et qui rencontre en  $a$  le côté  $BC$  et en  $d$  le cercle des neuf points, le triangle  $adm$  est isocèle. Or l'angle  $m$  de ce triangle a pour mesure  $\frac{\text{arc } di}{2}$ ,  $\propto$  l'angle en  $a$  a pour mesure  $\frac{\text{arc}(mk - di)}{2}$ ; donc  $\text{arc } mk = 2 \text{ arc } di$ , donc la droite  $ab$  enveloppe une hypocycloïde circonscrite au cercle des neuf points et touchant les trois côtés et les trois hauteurs du triangle donné, ce qu'on pouvait prévoir en prenant le point  $F$  à un som-

met ou au point diamétralement opposé à un sommet de ce triangle.

On voit aussi que l'hypocycloïde est l'enveloppe des tangentes au sommet des paraboles inscrites à un triangle (\*).