

## Errata

*Nouvelles annales de mathématiques 3<sup>e</sup> série*, tome 2  
(1883), p. 288

<[http://www.numdam.org/item?id=NAM\\_1883\\_3\\_2\\_\\_288\\_1](http://www.numdam.org/item?id=NAM_1883_3_2__288_1)>

© Nouvelles annales de mathématiques, 1883, tous droits réservés.

L'accès aux archives de la revue « Nouvelles annales de mathématiques » implique l'accord avec les conditions générales d'utilisation (<http://www.numdam.org/conditions>). Toute utilisation commerciale ou impression systématique est constitutive d'une infraction pénale. Toute copie ou impression de ce fichier doit contenir la présente mention de copyright.

NUMDAM

Article numérisé dans le cadre du programme  
Numérisation de documents anciens mathématiques  
<http://www.numdam.org/>

---

---

### ERRATA.

---

Page 130, ligne 1, *au lieu de* : courbe, *lisez* : ligne à flexion constante.

Page 131, lignes 3, 5, 10, 11, en remontant, *au lieu de* :  $Cx - Ax - Ap$ .  
*lisez* :  $Cx - Ax + Ap$ .

*Rectification.* — La question 1131 a déjà été proposée sous le n° 1111 (août 1882).

---

(<sup>1</sup>) Ce théorème a été énoncé par M. Catalan, comme suit : « La somme des diviseurs des nombres 1, 2, 3, ...,  $n$  égale la somme des plus grands multiples de ces nombres, non supérieurs à  $n$ . »