RÉGINE DOUADY

Un processus d'apprentissage du concept d'aire de surface plane

Publications de l'Institut de recherche mathématiques de Rennes, 1987-1988, fascicule 5
« Didactique des mathématiques », , p. 1-50

http://www.numdam.org/item?id=PSMIR_1987-1988__5_A3_0

© Département de mathématiques et informatique, université de Rennes,
1987-1988, tous droits réservés.

L'accès aux archives de la série « Publications mathématiques et informatiques de Rennes » implique l'accord avec les conditions générales d'utilisation (<http://www.numdam.org/conditions>). Toute utilisation commerciale ou impression systématique est constitutive d'une infraction pénale. Toute copie ou impression de ce fichier doit contenir la présente mention de copyright.

NUMDAM

Article numérisé dans le cadre du programme
Numérisation de documents anciens mathématiques
<http://www.numdam.org/>

UN PROCESSUS D'APPRENTISSAGE DU CONCEPT D'AIRE DE SURFACE PLANE ⁽¹⁾

Exposé présenté le 18 novembre 1988

par

Régine DOUADY

Sous le titre "Ingénierie didactique à propos des mesures de surfaces planes à l'école élémentaire"

Introduction

L'objet de ce travail est l'étude de la construction de la notion d'aire chez des élèves du cours moyen (9-11 ans).

L'aire est un moyen de rendre compte de la place occupée par une surface dans le plan. Par le choix d'une unité, on peut associer un nombre à une vaste famille de surfaces du plan (contenant toutes celles qu'on rencontre à l'école élémentaire et au collège). Si l'on change d'unité, les nombres changent mais les nouvelles mesures sont proportionnelles aux anciennes. Cependant, contrairement à ce qui se passe pour les segments, deux surfaces connexes auxquelles on associe le même nombre ne sont pas nécessairement superposables.

L'analyse que nous faisons nous amène à distinguer trois pôles en jeu : le pôle géométrique avec les surfaces considérées comme parties du plan, le pôle "grandeur" avec les aires (mathématiquement, l'aire peut être considérée comme une classe d'équivalence de surfaces, elle n'est pas définie pour les élèves mais on peut donner du sens à l'expression "avoir même aire") et le pôle numérique avec les mesures.

L'objectif de l'enseignement que nous cherchons à mettre sur pied est bien d'associer un nombre au maximum de surfaces (en particulier tous les polygones et les disques) de façon à pouvoir faire des comparaisons et des calculs. Cependant, pour définir une application mesure entre surfaces et nombres avec suffisamment de sens pour les élèves, nous faisons l'hypothèse qu'il faut d'abord construire l'aire comme grandeur autonome en distinguant aire et surface aussi bien qu'aire et nombre.

Un autre de nos objectifs est de différencier aire et longueur, en particulier aire et périmètre, et ceci avant même d'avoir un moyen de mesurer les aires – le périmètre est en effet, pour les élèves, une autre "mesure" de la surface. Nous retardons l'identification entre aire et nombre avec l'hypothèse qu'une identification précoce entre grandeurs et nombres favorise l'amalgame des différentes grandeurs en jeu (ici aire et longueur).

Nous avons donc élaboré un processus d'apprentissage conforme à ces hypothèses didactiques. Nous l'avons réalisé dans deux classes (un CM1, un CM2). L'analyse des productions des élèves en classe, au cours d'entretiens et d'épreuves écrites a permis de dégager les acquis, les difficultés qui résistent et les difficultés non prévues qui nous amènent à faire de nouvelles

(1) Cet article a été publié dans "Cahier de didactique des Mathématiques" de l'I.R.E.M. de Paris VII n° 37 de mai 1987 sous la signature de R. DOUADY et M.J. GLORIAN.

hypothèses didactiques et à modifier les séquences.

Dans la première partie, nous développons notre problématique et formulons les hypothèses didactiques. Dans une deuxième partie, nous présentons les choix didactiques retenus pour la construction des séquences et les conceptions des élèves relevées au cours et à la fin de l'apprentissage. La troisième partie est consacrée aux résultats et à la formulation de nouvelles hypothèses didactiques. La quatrième partie est un retour sur l'ingénierie didactique permettant de baser le processus d'apprentissage sur le déroulement de plusieurs dialectiques mettant en jeu différents sens de l'aire. Certaines étaient prévues dans le processus de départ, d'autres sont proposées ou renforcées à la suite de l'expérimentation.

I Problématique

La première question qui se pose est de définir l'objet d'enseignement "aire" et pour cela de commencer par examiner la définition de l'aire d'un point de vue mathématique de façon à adopter pour l'enseignement une présentation qui soit fondée mathématiquement. Nous donnerons ensuite un aperçu du point de vue généralement adopté dans l'enseignement et des difficultés observées chez les élèves avant de formuler nos hypothèses didactiques.

1. Point de vue mathématique

Dans toute la suite nous entendons par surface une partie du plan. La notion d'aire est un moyen de rendre compte de la place occupée par une surface dans le plan. L'objectif est de définir une application mesure d'un ensemble $\mathcal{A}$ de surfaces planes à valeurs dans $\mathbb{R}^+$. Nous ne chercherons pas à caractériser les surfaces qui sont dans l'ensemble $\mathcal{A}$. L'important est pour nous qu'il contienne toutes les surfaces qu'on sera amené à mesurer à l'école élémentaire et au collège. On peut dire que l'ensemble $\mathcal{A}$ est contenu dans l'ensemble des parties de $\mathbb{R}^2$ intégrables au sens de l'intégrale de Riemann et qu'il contient toutes les parties compactes de $\mathbb{R}^2$ à bord $\mathcal{C}_1$ par morceaux.

L'application F de $\mathcal{A}$ dans $\mathbb{R}^+$ devra vérifier les propriétés suivantes :

- si S_1 et S_2 sont des surfaces "quasidisjointes" (i.e. qui n'ont en commun que des points du bord), alors $F(S_1 \cup S_2) = F(S_1) + F(S_2)$

- si $S \in \mathcal{A}$ et S d'intérieur non vide, alors $F(S) > 0$
- pour toute isométrie g de $\mathbb{R}^2$, et toute surface $S \in \mathcal{A}$, $F(g(S)) = F(S)$.

On montre que pour tout $A \in \mathcal{A}$, d'intérieur non vide, il existe une et une seule application $F_A: \mathcal{A} \rightarrow \mathbb{R}^+$ vérifiant les propriétés ci-dessus et telle que $F_A(A) = 1$.

A est la surface unité pour la mesure (de surface) F_A et $F_A(S)$ est la mesure de S avec A pour unité. La mesure d'une surface est un nombre réel positif ou nul.

Propriétés :

- L'application F_A est surjective : l'image de l'ensemble des carrés suffit à recouvrir $\mathbb{R}^+$ mais elle n'est pas injective : à partir d'un rectangle, on peut toujours en fabriquer un autre non surposable et de même mesure.

- L'application F_A est croissante pour l'inclusion dans $\mathcal{A}$ et l'ordre usuel dans $\mathbb{R}^+$.

- Toutes les applications F vérifiant les propriétés ci-dessus sont des F_A pour un certain A .

- Toutes les mesures de surfaces définies comme ci-dessus sont proportionnelles :

si $B \in \mathcal{A}$, posons $\lambda = F_A(B)$, alors $F'_A = (1/\lambda) F_A$ définie par

$\forall S \quad F'_A(S) = (1/\lambda) F_A(S)$ est telle que $F'_A(B) = 1$.

L'unicité de F_B entraîne $F_B = F'_A = (1/\lambda) F_A$.

- En particulier, si B est telle que $F_A(B) = 1$, alors $F_A = F_B$, si bien que pour une mesure F , on peut appeler unité n'importe quelle surface S telle que $F(S) = 1$.

Aire d'une surface :

Pour chaque choix de A , l'application F_A permet de définir une relation d'équivalence $\mathcal{R}_A : S \mathcal{R}_A S'$ si et seulement si $F_A(S) = F_A(S')$.

Les propriétés précédentes entraînent que les classes d'équivalence

obtenues ne dépendent pas du choix de A .

Nous appellerons aire d'une surface S sa classe d'équivalence pour n'importe laquelle des relations $\mathcal{R}_A$.

F_A permet alors de définir une application f_A de l'ensemble des aires sur $\mathbb{R}^+$ de façon qu'on ait un diagramme commutatif :

x est l'application qui, à toute surface associe sa classe d'équivalence. Si S est une surface et s sa classe d'équivalence, on a : $f_A(s) = F_A(S)$.

f_A est bijective, cela permet de définir sur $\mathcal{Q}$ une addition et un ordre tels que f_A soit un isomorphisme de $\mathcal{Q}$ sur $\mathbb{R}^+$.

On a alors :

- si S_1 et S_2 sont deux surfaces "quasidisjointes", s_1 l'aire de S_1 , s_2 l'aire de S_2 , s l'aire de $S = S_1 \cup S_2$, alors $s = s_1 + s_2$
- si $S_1 \subset S_2$, alors $s_1 \leq s_2$ où s_1 est l'aire de S_1 et s_2 l'aire de S_2

On peut aussi définir sur $\mathcal{Q}$ une multiplication externe de $\mathbb{R}^+ \times \mathcal{Q}$ dans $\mathcal{Q}$ telle que si $\lambda \in \mathbb{R}^+$ et $s \in \mathcal{Q}$, alors $f_A(\lambda s) = \lambda f_A(s)$.

En fait, en mathématiques on garde rarement les trois termes surface, aire et nombre et le plus souvent on définit directement l'aire comme la mesure de la surface. Cette définition de l'aire la fait dépendre de l'unité choisie, mais cela a peu d'importance puisque toutes les mesures sont proportionnelles, l'aire est alors définie à un facteur multiplicatif près.

Propriétés :

- Découpage-recollement : Soit une surface S et une partition quelconque de S en surfaces $S_1, S_2, \dots, S_n$ appartenant à $\mathcal{A}$. Considérons les surfaces $S'_i = g_i(S_i)$ ($1 \leq i \leq n$) où les g_i sont des isométries quelconques du plan, alors la surface $S' = \bigcup S'_i$ a même aire que S . En particulier deux surfaces superposables à découpage et recollement bord à bord près ont des aires

égales.

- Dimensionnalité de l'aire, bilinéarité de sa mesure par rapport aux mesures de longueur :

Choisissons un carré comme surface unité, la longueur u d'un côté comme unité de longueur et son aire s comme unité d'aire. Un rectangle dont les côtés ont pour longueur $a u$ et $b u$ a pour aire $a.b.s$.

Si on applique au rectangle une homothétie de rapport h , les longueurs des côtés sont multipliées par h et son aire par h^2 . Plus généralement, on démontre par pavage, encadrement et passage à la limite que si on applique à une surface S une homothétie (ou une similitude) de rapport h , son aire est multipliée par h^2 . On retrouve cette propriété dans l'équation aux dimensions entre aires et longueurs.

2) Point de vue généralement adopté dans l'enseignement

Nous avons vu que l'usage en mathématique est d'identifier $\mathcal{A}$ et $\mathbb{R}^+$ grâce au choix d'une unité et de ne retenir que les deux pôles : surfaces et nombres. C'est le point de vue généralement adopté dans l'enseignement. Dans ces conditions, l'aire est un invariant non pas de la surface mais du couple (surface, unité) : pour une surface fixée, l'aire, considérée comme nombre dépend du choix de l'unité. C'est légitime quand on n'a pas l'intention de changer d'unité, mais c'est un point de vue difficile à tenir si on veut s'occuper de surfaces matérielles et si on veut que l'aire soit un invariant de la surface et d'elle seule.

La présentation standard consiste à recourir au pavage de surfaces, en passant rapidement au pavage avec des carrés et à compter les carreaux pour déterminer l'aire de surfaces quadrillées ; ensuite, pour des rectangles ou carrés, à trouver des moyens économiques de comptage ; à introduire les unités légales avec multiples et sous multiples et selon le cas avant ou après cela, à établir les formules de calcul d'aire des rectangles en fonction des longueurs des côtés. On raccroche ensuite à ces formules celles relatives au triangle et à d'autres quadrilatères (losange, parallélogramme, trapèze).

Dans la majorité des manuels de 6e conformes aux programmes de 1977 (éditions de 1977 ou de 1981) l'aire est définie comme un nombre, parfois même comme un nombre de carreaux. Dans certains manuels, on n'envisage pas la possibilité de changer d'unité sinon de prendre des carrés de dimensions multiples ou sous multiples du carré unité.

Les manuels qui ne veulent considérer que les deux pôles surfaces et nombres définissent l'aire comme un nombre mais utilisent l'expression "unité d'aire". Si l'aire est un nombre, que peut bien signifier une unité d'aire? On peut aussi lire "le m^2 est l'aire d'un carré dont le côté mesure 1 m". Si l'aire est un nombre, comment le m^2 peut-il être une aire? Quand on arrive aux exercices tous les livres parlent d'une aire de $25 m^2$. Ils sont ainsi amenés à adopter, à un moment ou à un autre, sans le dire, le point de vue "grandeur", adopté explicitement par d'autres manuels où le nombre est la mesure de l'aire.

Ainsi, même en admettant que l'objectif de l'enseignement est bien la construction et l'utilisation d'une fonction mesure qui associe un nombre à n'importe quelle surface, il semble bien qu'il y ait un troisième terme en jeu que l'on aura du mal à évacuer dans l'enseignement parce qu'il faudra bien un jour ou l'autre donner un statut à ces $25 m^2$ dont on aura besoin. Si on ne veut pas les identifier à la surface comme on le faisait autrefois, il va être aussi difficile de les identifier au nombre si on veut aussi que $25 m^2$ puisse être égal à $2\,500 dm^2$ alors que $25 \neq 2500$. Ce troisième terme, c'est l'aire en tant que grandeur.

Ainsi qu'on vient de le voir, l'attention est essentiellement portée sur les deux pôles surfaces et nombres et ce d'un point de vue statique. On s'intéresse rarement à l'action des transformations, à la recherche d'invariants ou de modes de variations. Quand l'aire intervient, c'est très vite comme produit de longueurs avec des expressions numériques après choix d'unités de mesure. Il y a en général très peu de travail sur l'aire comme grandeur autonome.

3) Quelques difficultés et erreurs observées chez les élèves

* La surface unité étant une surface avec une certaine forme, la mesure d'une surface S est tributaire de la possibilité de paver effectivement S avec cette forme. Ainsi des élèves rencontrent des difficultés pour exprimer l'aire d'un triangle en cm^2 puisqu'on ne peut pas le paver avec des carrés.

* L'aire est attachée à la surface et ne se dissocie pas d'autres caractéristiques de cette surface :

- si le périmètre d'une surface augmente, son aire aussi (et réciproquement)
- si deux surfaces ont le même périmètre, elles ont la même aire (et réciproquement).

* On étend des formules à des situations où elles ne sont pas valables : par exemple produit des "dimensions" pour un parallélogramme ou des "trois dimensions" d'un triangle.

* L'acquisition par les élèves de la "bidimensionalité" de l'aire (si les longueurs sont multipliées par k , l'aire est multipliée par k^2) pose problème. Cette question a été étudiée par J. Rogalski (1983).

4. Hypothèses didactiques

Il nous semble qu'un certain nombre de difficultés sont liées au traitement par les élèves des problèmes d'aire, soit du point de vue des surfaces, soit du point de vue des nombres.

Par exemple, une diminution de l'aire est comprise comme une diminution de la surface avec sa forme et va de pair avec une diminution du périmètre : l'aire et le périmètre sont alors amalgamés à la surface et liés à sa forme : on agrandit ou diminue la surface en conservant sa forme ; le périmètre c'est le contour, l'aire c'est l'intérieur.

A l'autre extrême, l'aire est un nombre : on est sur le plan du calcul et on ne relève que des éléments pertinents pour le calcul, par exemple des mesures de longueur qui paraissent caractéristiques de la surface considérée et qu'on combine dans des formules plus ou moins fondées : par exemple ajouter les mesures de deux côtés d'un triangle et multiplier par la troisième, pour calculer l'aire du triangle en faisant le produit de deux longueurs.

Ainsi, au sujet de l'aire, les élèves développeraient une "conception forme" liée au cadre géométrique ou une "conception nombre" liée au cadre numérique, ou les deux, mais de façon indépendante l'une de l'autre, et ils traiteraient les problèmes sans établir de relation entre les deux points de vue. Or les problèmes d'aire mettent de façon essentielle en relation les cadres numérique et géométrique. Le concept d'aire en tant que grandeur constitue à notre avis un relais entre les surfaces et les nombres. Ceci nous amène à faire notre première hypothèse didactique :

(1) Le développement dans l'enseignement du concept d'aire en tant que grandeur permet aux élèves d'établir les relations nécessaires entre les deux cadres (géométrique et numérique)

De plus, si l'objectif d'apprentissage est bien la construction et la manipulation d'une application mesure $F : \mathcal{A} \longrightarrow \mathbb{R}^+$, il y a deux manières d'aborder la construction de cette application.

Pour un choix fixe d'une surface unité A , par exemple un carré, il est facile d'associer un nombre à toute une catégorie de surfaces : celles pavables avec un nombre fini de copies de A . Le problème est d'enrichir l'ensemble des surfaces mesurables avec l'unité A . Par exemple quel nombre associer à un triangle ou à un disque ?

Pour une surface donnée S , deux cas se présentent :

1) on peut découper S , ou un certain nombre d'exemplaires de S , en un nombre fini k de pièces et recoller ces pièces sans chevauchement de manière à obtenir une surface S' pavable avec A .

Alors $F(S) = F(S')$, ou $k F(S) = F(S')$ selon le cas. On s'appuie sur l'additivité et l'invariance par déplacement.

2) on ne peut pas développer la procédure (1), on est alors conduit à une procédure d'encadrement de S par des surfaces pavables avec A ou des subdivisions de A et qui approximent S de mieux en mieux par l'intérieur et par l'extérieur.

Pour aborder la construction de l'application mesure, on peut soit utiliser les deux procédures soit n'utiliser que la deuxième. En effet, par la première procédure il est impossible d'atteindre toutes les surfaces de $\mathcal{A}$. La deuxième procédure est suffisante pour atteindre n'importe quelle surface de $\mathcal{A}$ et elle ne nécessite pas d'utilisation d'autre surface unité que des carrés. Cependant, nous pensons que la seule considération du deuxième point de vue ne permet pas à l'élève d'échapper à la prégnance de la forme des pièces et peut expliquer certaines des difficultés rencontrées. Nous faisons l'hypothèse que l'utilisation du découpage-recollement permet l'élaboration du concept d'aire, étape-relais entre les surfaces et les nombres dans la construction de F , conformément à notre première hypothèse didactique.

D'autre part, si on prend comme unité l'aire d'un carré, on pourra éviter de dénombrer les unités en calculant sur les mesures. On aura alors besoin, pour construire F , d'établir des relations entre les mesures de longueur et les mesures d'aire.

Or la mesure permet d'identifier toutes les grandeurs (y compris longueurs et aires) à $\mathbb{R}^+$. Ceci est précieux du point de vue de la modélisation mathématique. Toutefois une identification trop précoce nous semble favoriser l'amalgame des différentes grandeurs alors que l'objectif à cet âge est plutôt de les différencier, et c'est sur quoi porte notre deuxième hypothèse.

(2) Une identification trop précoce entre grandeurs et nombres favorise l'amalgame des différentes grandeurs (ici longueurs et

aires)

Nous voulons éviter les confusions entre longueurs et aires, en particulier entre périmètre et aire, qui sont une des difficultés des élèves dans l'acquisition des mesures spatiales. Pour cela il nous paraît important de développer des situations d'apprentissage dans lesquelles jouent de façon significative pour les uns les différences entre longueurs et aires, pour les autres les relations que ces grandeurs entretiennent. C'est pourquoi, dans notre ingénierie didactique, nous choisirons de dissocier les grandeurs (longueurs et aires) d'une part des objets (segments, surfaces), d'autre part des nombres, avant d'aborder la mesure en fonction d'une unité choisie et les relations entre mesures de ces grandeurs.

II. Méthodologie

1. Ingénierie didactique

a) Nos choix didactiques

L'analyse précédente nous amène à distinguer deux points dans l'apprentissage :

a) construction de la notion d'aire comme grandeur autonome en faisant des comparaisons directes d'aires par inclusion, par découpage - recollage, et des mesures directes d'aire déduites du pavage à l'aide de pavés de formes variées.

Cela nous amène à :

- dégager l'aire de la forme en différenciant aire et surface : deux surfaces de formes différentes peuvent avoir des aires égales.
- distinguer l'aire du nombre tout en contrôlant la correspondance : surfaces $\rightarrow$ nombres : à une même surface peuvent correspondre des nombres différents suivant l'unité choisie, mais l'aire, elle, ne change pas.

b) établir des relations entre aires et longueurs en s'intéressant à diverses transformations : les uns sont choisies pour pointer qu'aires et longueurs peuvent varier indépendamment l'une de l'autre, et même en sens inverse (aire et périmètre par exemple) ; les autres pour établir des relations

entre aires et longueurs : calcul d'aires des surfaces usuelles, bidimensionalité. Ce faisant, on travaille à

- différencier aire et longueur en même temps qu'aire et surface

b) Les séquences didactiques

Nous avons contruit des séquences didactiques fondées sur les analyses précédentes et nous avons observé leur déroulement dans deux classes : un CM1 (9-10 ans) et un CM2 (10-11 ans). Les CM2 n'avaient pas abordé la notion d'aire en CM1. On peut trouver dans (Douady - Perrin 84-85) ou (Douady - Perrin 83) une description de la plupart des séquences didactiques utilisées.

Cependant ces documents ont été rédigés après le déroulement complet en classe et l'observation des élèves au cours d'entretiens par deux, ce qui fait qu'on y trouve des séquences qui n'avaient pas été proposées aux élèves des deux classes concernées, mais qu'il nous a paru important d'ajouter.

En particulier, l'approche sur papier quadrillé n'a pas été réalisée parce que le comptage de carreaux nous semblait un acquis disponible des classes concernées. Cela s'est révélé exact. Cependant le recours au papier quadrillé est intéressant pour donner un premier sens au mot "aire", sans rencontrer l'ambiguïté qui reste attachée à des expressions comme "place occupée" qui pour les élèves font parfois davantage référence à l'encombrement (diamètre) qu'à l'aire. Dans la classe de CM1 nous avons eu recours à la masse pour éviter ce problème. Nous considérons maintenant qu'un jeu de cadres entre papier blanc et papier quadrillé est un point important pour la mise en relation de différents sens de l'aire et l'ancrage de la dialectique surfaces - aires - nombres (voir IV Retour sur l'ingénierie didactique).

L'approche par les transformations n'a pas été proposée non plus aux élèves puisque son importance n'avait pas été prévue et que c'est un des résultats des observations et des entretiens individuels que nous avons eus avec les élèves après l'apprentissage.

Nous donnons ci-dessous la liste des séances réalisées dans chacune des deux classes. chaque séance de travail durait environ 1 heure 1/4.

Séquences réalisées en CM1

** approche physique* (1 séance : 9.12.1982)

Comparer des pièces en lino, en carton, selon la masse, selon la place occupée.

** approche géométrique* (3 séances : 16.12.82 ; 6.01.83 ; 7.01.83)

Découpages et recolllements convenables à partir de rectangles : un même rectangle pour les 4 membres d'une équipe, des rectangles différents pour deux équipes différentes. Découper les rectangles et recoller les morceaux sans en perdre et sans les faire chevaucher de façon que les quatre membres de l'équipe aient des surfaces de formes différentes. Décalquer les assemblages obtenus sur une feuille blanche et comparer les nouvelles surfaces. Introduction du mot aire - comparaison des aires des surfaces construites, au sein d'une équipe, au niveau de la classe.

** différenciation aire et périmètre* (3 séances : 13.01.83 ; 27.01.83 ; 3.02.83)

- Commander de la ficelle pour border les surfaces fabriquées précédemment : deux surfaces de même aire peuvent avoir des périmètres différents.

- Modifier une surface donnée de façon à diminuer l'aire et à augmenter le périmètre.

- Modifier un rectangle de façon à conserver l'aire et à augmenter le périmètre.

** pavages et comparaison d'aires* (3 séances : 3.03.83 ; 4.03.83 ; 10.03.83)

Pavages de 4 surfaces à l'aide de pavés différents. Comparaison des aires des surfaces en ne disposant plus des surfaces elles-mêmes mais seulement des résultats du pavage et des pavés.

Les pavés ont été choisis de façon qu'il y ait des relations numériques entre eux faciles dans certains cas (rapports 2 ou 4), difficiles dans d'autres cas (rapports fractionnaires : $3/2$, $3/4$). Les surfaces étaient pavables par au moins un des pavés, ce qui donnait des comparaisons faciles entre certaines surfaces, difficiles entre d'autres et amenait à la nécessité de rechercher une unité commune ou de trouver au moins une des relations difficiles.

Surfaces proposées :

S_5 n'a été utilisé
que par le CM2

Pavés utilisés :

Séquences réalisées en CM2

* *approche géométrique* (3 séances : 10.01.83 ; 14.01.83 ; 24.01.83)

les mêmes séquences qu'en CM1

* *différenciation aire et périmètre* (une séance fin janvier 83)
Commande de fil pour border les surfaces construites précédemment (cf CM1) : deux surfaces de même aire peuvent avoir des périmètres différents

* *pavages* (3 séances : 17.02.83 ; 24.02.83 ; 26.02.83)
Pavage de 5 surfaces à l'aide de pavés variés ; recherche de relations entre les pavés. Les pavés étaient les mêmes qu'en CM1, il y avait une surface de plus. A cette étape les relations simples entre pavés sont trouvées et rassemblées dans un tableau à double entrée, les résultats du pavage également. Le maître introduit le mot "mesure".

* *mesure et comparaison d'aires* (4 séances : 28.02.83 ; 4.03.83 ; 7.03.83 ; 10.03.83).

Les élèves ne disposent plus des surfaces et doivent comparer les aires à l'aide des résultats du pavage. Cela a amené certains groupes d'élèves à introduire de nouvelles unités, d'autres à tenter de compléter le tableau des relations entre carrelages.

On demande alors à tous les élèves de compléter ce tableau et

d'exprimer les mesures de toutes les aires à l'aide de chacune des unités, y compris celles qui ont été introduites pour la comparaison.

Les élèves ont ensuite à mesurer une surface qui n'est pavable avec aucun des pavés considérés. On doit la couper en deux morceaux ou la remplacer par une surface de même aire et pavable.

* *Aires en cm^2* (1 séance et demie : 15.03.83 ; 17.03.83)

Recherche de surfaces variées d'aire 1cm^2 ; 12cm^2

Recherche de rectangles d'aire 12cm^2 .

* *Encadrements*: (1 séance et demie : 17.03.83 et 18.03.83)

A l'aide de papier millimétré transparent, encadrements de l'aire d'une surface polygonale et d'une surface à bords arrondis.

* *Calcul d'aires de rectangles* (13 05 83):

Recherche de rectangles à périmètre fixé, calcul de l'aire (l'interruption s'explique par les vacances de Pâques et un séjour en classe de nature).

2. Observation des élèves

Les séquences d'enseignement ont été observées. Nous avons pris des

notes sur le déroulement. La plupart des productions des élèves ont été récupérées au CM1.

Les élèves du CM1 ont répondu à des épreuves écrites les 17/03/83 et 14/4/83.

Nous avons observé les élèves des deux classes au cours d'entretiens par deux, au CM1 juste après l'apprentissage les 26 et 27 mars 1983, au CM2 deux mois après l'apprentissage entre le 20 et le 31 mai 1983.

Les élèves des deux classes ont passé en juin 1983 des tests écrits empruntés à J. Rogalski (1983).

3. Etude des conceptions des élèves.

1) Au cours de l'apprentissage

- Au démarrage, au CM2, certains enfants ont une conception de la place occupée par une surface liée à sa forme et se référant plutôt à l'encombrement ou à la situation de la surface dans la feuille de papier ou même à la manière dont elle a été obtenue : pour comparer la place occupée par des surfaces obtenues par découpage et recollement sans perte ni chevauchement de rectangles superposables, des élèves ne peuvent accepter qu'une surface encombrante (figure 1) puisse ne pas occuper plus de place qu'une autre plus "compacte" (figure 2)

Fig 1

Fig 2

D'autres élèves veulent mesurer les distances des surfaces au bord de la feuille et d'autres ajouter les périmètres de tous les morceaux.

Mais ces difficultés ne résistent pas quand on parle de quantité de carton utilisée ou quand on fait référence à l'usage d'une balance :

A la séance suivante, les élèves du CM2 recourent tous à la comparaison des rectangles pour comparer toutes les surfaces de la classe du point de vue de l'aire. Le problème est plutôt de s'entendre sur ce que l'on veut comparer. L'introduction du mot aire dans un premier travail sur papier quadrillé évite cette ambiguïté.

En CM1, le recours à la masse a évité l'ambiguïté de l'expression place occupée : si une surface se déduit d'une autre par découpage et recollement convenable, il est clair que la masse n'a pas changé (à la colle près) car la place des morceaux sur le plateau de la balance n'a pas d'importance et que les deux surfaces occupent autant de place car la référence est alors la quantité de papier. Inversement, il n'est pas tout sûr pour les élèves que deux surfaces découpées dans le même carton et de même masse occupent autant de place : il faudrait trouver un découpage qui permette de reconstituer l'une à partir de l'autre.

- L'amalgame entre aire et périmètre apparaît à plusieurs occasions :

- * quand il s'agit de commander du fil pour border les surfaces en général très irrégulières fabriquées par les élèves à partir des rectangles : par exemple, un élève de CM1 qui a une surface particulièrement compliquée décide de se simplifier la tâche en mesurant le bord du rectangle témoin.
- * en CM1, dans les épreuves écrites du 17 mars, lorsqu'il s'agit de dessiner un triangle de même aire qu'un rectangle donné, 13 élèves sur 24 fournissent un triangle de même périmètre que le rectangle.
- * à la fin de l'apprentissage en CM2, cet amalgame entre conservation de l'aire et du périmètre réapparaît lors d'une situation plus complexe : il s'agit d'encadrer l'aire d'une surface à bords irréguliers et arrondis en utilisant du papier millimétré transparent; un (bon) élève de la classe demande de la ficelle pour se simplifier le travail en rectifiant le bord de la surface.

- La liaison entre surface et aire apparaît quand on demande aux élèves de modifier une surface donnée pour en fabriquer une autre d'aire plus petite et de périmètre plus grand.

Pour diminuer l'aire, deux procédures sont utilisées : enlever un morceau, dessiner une surface à l'intérieur de la surface donnée.

Il semble que la première procédure fasse davantage référence à une conception de l'aire indépendante de la forme et la deuxième à une conception liée à la forme. La consigne engage à une transformation : "modifier" ; la première procédure opère localement en enlevant un morceau ce qui change la forme de la surface ; la deuxième correspond à une vision plus globale de la surface qu'on essaie de modifier le moins possible en concevant une autre surface qui ressemble à la première mais située à

l'intérieur de celle-ci : il semble que les élèves attachent de l'importance à la forme de la surface et veuillent en modifier la taille sans en modifier la forme.

A ces deux procédures prenant en compte la variation d'aire à effectuer correspondent deux procédures pour prendre en compte la variation de périmètre :

- * ceux qui enlèvent un morceau l'enlèvent toujours sur le bord (enlever un morceau à l'intérieur ne leur paraît pas pertinent du point de vue du périmètre puisqu'ils ne considèrent que le périmètre extérieur) et ils s'aperçoivent assez vite que pour augmenter le périmètre, il faut remplacer un bord droit par un bord "en zigzag" ou courbe, même si leur premier essai diminuait le périmètre.

- * les élèves qui dessinent une surface à l'intérieur de la surface donnée font en général un bord assez parallèle au bord donné. Ils ont diminué le périmètre. Pour rectifier, certains ont alors l'idée de "rajouter du périmètre" en doublant le bord de la surface intérieure, mais d'autres restent bloqués.

Aude

Hélène

Les élèves qui sont restés bloqués avaient au départ un triangle et ont produit des triangles emboîtés

- approche de la mesure

Les élèves n'ont pas rencontré de difficulté pour associer des nombres différents à la même surface que ce soit pour exprimer le résultat de pavages avec des unités différentes ou des mesures obtenues indirectement. Le recours aux nombres pour comparer des surfaces et la nécessité d'utiliser une même unité pour mesurer les surfaces à comparer n'ont posé de problème pour personne. Les seules difficultés étaient sur les nombres dans le cas où ils étaient fractionnaires.

Au CM1, les élèves n'ont pas produit d'unité nouvelle permettant de mesurer tous les pavés, ils n'ont pas non plus exprimé la mesure des pavés en fonction de chacun des autres : ils ont trouvé la relation $3r = 2R$ qui permettait de mesurer toutes les aires en prenant pour unité le rectangle d'aire r par substitution de $3r$ à $2R$ et ils ont explicité quelques relations utilisant des $1/4$ ou des $1/3$. Le travail fait auparavant sur les fractions n'étaient pas suffisant pour que tous les élèves expriment toutes les relations entre les pavés.

Au CM2, certains élèves ont recherché une unité commune permettant de mesurer les deux pavés rectangles : trois nouvelles unités ont été proposées, le rectangle (1,3), le rectangle (2,3) et le carré (1,1). D'autres se sont lancés dans la recherche systématique de toutes les relations entre les unités d'aires utilisées, recherche qui sera ensuite effectuée par toute la classe de façon à compléter le tableau donnant les relations entre unités.

2) Au cours des entretiens individuels

Les entretiens individuels ont eu lieu au CM1 deux semaines après l'apprentissage, au CM2 plus de 2 mois après l'apprentissage. Nous avons choisi d'interroger les élèves par deux pour observer ou le cas échéant

provoquer des conflits de conception. Les élèves étaient choisis de façon qu'il n'y ait pas domination de l'un par l'autre.

Le problème était de comparer les aires des surfaces ci-dessous :

S1

S2

S3

S4

Les figures étaient dessinées sur papier blanc, en cas de besoin, nous pouvions fournir les mêmes figures sur papier quadrillé au demi centimètre et aussi du papier blanc et du papier quadrillé au demi centimètre à volonté.

Procédures observées

a) *Ramener la comparaison des aires à la comparaison des nombres.*

1) grâce au pavage : en comptant les carreaux sur papier quadrillé ou en quadrillant le papier blanc en carrés.

2) en faisant un produit de longueurs pour calculer les aires, en inventant au besoin des formules erronées (parallélogramme ou triangle).

Le désir de se ramener aux nombres est très fort, particulièrement au CM2 où on avait institutionnalisé la formule de calcul de l'aire d'un rectangle et où les élèves travaillaient sur des calculs d'aires de rectangles pendant la même période en classe : beaucoup répétaient la question posée sous la forme "calculer les aires".

b) *Ramener la comparaison des aires à la comparaison des longueurs des côtés* (pour S1 et S2).

c) *Découper et recoller de façon convenable* (pour comparer S1 et S2; S3 et S4) ou *paver* (S1 avec S3; S2 avec S4).

d) "Redresser" le parallélogramme pour en faire un rectangle ;
"pencher" davantage le parallélogramme.

Arguments utilisés par les élèves pour justifier leurs procédures :

a) Pour justifier un calcul :

- un parallélogramme a deux dimensions : pour calculer l'aire on multiplie les deux dimensions : $6 \times (4 + 1/2) = 27$.

Sur demande de l'interrogateur de montrer où sont les 27 cm², certains élèves justifient ce calcul en produisant un pavage par des petits parallélogrammes et déclarent : On a bien 27 cm².

- pour le triangle

on a diverses "formules".

* une aire c'est un produit de 2 longueurs et on fait $(a+b) \times c$ pour le triangle (ou $axc + bxc$)

* un rectangle a deux dimensions, on multiplie pour trouver l'aire, un triangle a trois dimensions donc c'est $a \times b \times c$

* $a \times b \times c$ donne un résultat beaucoup trop grand (par rapport à

S1 et S3) et des élèves proposent alors $(a + b + c) \times 3$ ou même $a+b+c$. On assiste aussi au passage à des procédures périmétriques devant une difficulté de calcul : les côtés obliques du triangle mesurent $4\frac{1}{2}$ et $5\frac{1}{2}$, un élève veut multiplier les 3 côtés du triangle et ne sait comment multiplier $4\frac{1}{2}$ par $5\frac{1}{2}$; il décide alors de rassembler les $1/2$ et finit par ajouter les 3 dimensions.

b) Pour se ramener à la comparaison des longueurs :

S_1 et S_2 ont toutes les deux un côté de 6 cm, on compare les autres côtés $4,5 > 4$ donc l'aire de S_2 est plus grande que l'aire de S_1 .

c) Découpage-recollement : si on découpe un morceau d'une surface et qu'on le recolle sans chevauchement on conserve l'aire. Cet argument est correct et valorisé dans l'apprentissage ; mais les élèves qui ne peuvent utiliser que celui-là échouent dans la comparaison de S_3 et de S_4 .

d) Déformation :

Si on "redresse" le parallélogramme, cela fait un rectangle de 4,5cm sur 6cm donc l'aire de S_2 est plus grande que l'aire de S_1 .

Conflits et changements de procédure

Il semble que les élèves aient plusieurs types de conviction qui les amènent à des conclusions opposées pour la comparaison de S1 et de S2.

- Convictions permettant de conclure correctement $A_1 = A_2$:

* quand on découpe une surface et qu'on recolle convenablement les morceaux on a une surface de même aire.

* pour comparer des surfaces dessinées sur papier quadrillé on compare le nombre de carreaux qu'elles contiennent (éventuellement en regroupant des morceaux de carreaux pour faire des carreaux entiers). Au besoin on quadrille le papier pour faire apparaître des cm^2 .

- Convictions amenant à la conclusion $A_1 < A_2$:

* quand on déforme un parallélogramme "en penchant plus ou moins" on conserve l'aire, en particulier un parallélogramme de 1 cm de côté a une aire de 1cm^2 , mais aussi un parallélogramme obtenu à partir d'un carré de 1 cm de côté par découpage et recollement : a tous ses côtés qui mesurent 1 cm.

* l'aire du parallélogramme est le produit des dimensions, comme pour le rectangle.

Les deux types de convictions coexistent souvent chez le même élève. Pour certains groupes, on assiste même à un va et vient des arguments contradictoires repris tour à tour par l'un ou l'autre des deux partenaires.

Les élèves ont différents moyens de résoudre la contradiction :

Le conflit se produit parfois spontanément par confrontation d'une procédure (c) et d'une procédure (d) et il arrive que les élèves soient très étonnés de constater que le "côté droit" (hauteur du parallélogramme) mesure 4 cm alors que le côté penché mesure 4,5 cm. Cela suffit parfois à résoudre la contradiction et, pour se convaincre, certains groupes dessinent sur la feuille d'autres côtés "de plus en plus penchés" et se convainquent de l'accroissement de la longueur de deux des cotés et de la conservation de l'aire du parallélogramme. Inversement, cet accroissement de la longueur dans les cas extrêmes amène parfois les élèves à douter de la conservation de l'aire.

Pour d'autres groupes, le conflit se produit au moment où on leur fournit du papier quadrillé ou simplement au moment où on leur demande de dessiner les cm^2 (après une réponse $A_1 = 24 \text{ cm}^2$, $A_2 = 27 \text{ cm}^2$). Le pavage du rectangle et du parallélogramme peut les amener à rassembler les deux pointes triangulaires du parallélogramme pour obtenir des carreaux entiers et ainsi passer à une stratégie de type "découpage recollement".

Pour d'autres (procédure déformation), le changement de conviction s'opère souvent quand on leur propose de "pencher" de plus en plus le parallélogramme jusqu'à ce qu'il soit évident que l'aire est devenue très petite. Il faut d'ailleurs noter la résistance des élèves à pencher au-delà d'un certain seuil pour aboutir à des dessins comme celui-ci où on ne peut plus parler de "côté vertical":

Pour ceux qui justifient le calcul avec un pavage de S_2 par des petits parallélogrammes de 1cm de côté, le changement de conviction s'opère quand ils peuvent pointer la différence entre les 2 parallélogrammes :

- celui qu'on obtient à partir du carré de côté 1cm a une aire de 1cm^2 mais les côtés ne mesurent pas tous 1cm :

- celui qu'on obtient par déformation : tous ses côtés mesurent 1cm, mais son aire est plus petite que 1cm^2 .

Notre interprétation est que beaucoup d'élèves amalgament trois transformations : le "parallélogramme articulé" qui conserve les longueurs des côtés mais non les aires, le glissement d'un côté sur son support qui conserve les aires mais non les longueurs de tous les côtés et la rotation autour d'un sommet qui conserve à la fois les longueurs et les aires.

L'incidence sur la conservation des aires et des longueurs de

transformations de figures par déformation continue est un point qui n'avait pas été abordé dans l'apprentissage et qui semble important pour déstabiliser des conceptions spontanées erronées des élèves à ce sujet et amorcer une autonomie des différentes notions amalgamées.

3) Evolution des élèves du CM1

Nous présentons ci-dessous l'évolution des élèves à travers l'épreuve écrite du 17/03, les entretiens en binômes des 26 et 27/03, l'épreuve écrite du 14/04 et des tests écrits en juin (cf ci-dessous III). Nous interprétons les résultats à partir d'un tableau récapitulatif.

a) Epreuve du 17/3

texte :

S_1 A_1 est l'aire de S_1

S_2 A_2 est l'aire de S_2

- 1) Comparer les aires A_1 et A_2
- 2) Dessiner un triangle d'aire A_1
- 3) Dessiner un rectangle d'aire A_2

Les réponses

Nous classons les procédures selon les outils mobilisés:

(L) *longueur* ces élèves comparent les longueurs des côtés de S_1 et S_2 ou les périmètres.

(D) *déformation* en faisant pivoter les côtés autour des sommets ou en faisant glisser un côté sur son support le parallélogramme se redresse en rectangle.

(DR) *découpage-recollement* ces élèves découpent à gauche du parallélogramme un triangle qu'ils recollent à droite bord à bord sans chevauchement.

1ère question : (L) 11
 (D) 2 avec $A_1 = A_2$
 (DR) 11 dont 9 correctes, 1 estimation $A_1 = A_2$
 1 réponse $A_1 \neq A_2$

<u>2ème question :</u>	(L)	13	ils dessinent un triangle (6, 6, 8=4+4) ou (8, 8, 4)
	(DR)	2	
rien ou essais infructueux		9	

Parmi les 9 réponses (DR) correctes à la 1ère question, les réponses à la 2ème question se répartissent ainsi : 1 produit 2 triangles d'aire A_1 , 1 a une procédure (DR) qui n'aboutit pas, 3 ont une procédure (L), 4 ne font rien.

Les 2 (D) de la 1ère question adoptent (L).

3ème question : * parmi les 12 réponses $A_1 = A_2$ à la 1ère question

- 5 proposent le rectangle S_1 , dont 2 se réfèrent à la 1ère question, et 3 reproduisent le découpage et recollement.
- 3 "redressent" et proposent le rectangle (4+1/2, 6)
- 4 ne font rien

* parmi les 8 réponses $A_2 > A_1$

6 "redressent" comme les précédents, 1 fournit un rectangle de même périmètre (4, 6+1/2), 1 ne fait rien.

b) Entretiens

22 élèves sont interviewés, 20 en binômes et 2 individuellement.

Parmi les binômes, 4 présentent des convictions qui s'opposent, chacun développant ses arguments, 4 présentent des oppositions plus molles, l'un des partenaires oscillant entre les convictions issues de la référence aux longueurs ou au découpage-recollement. Dans les deux autres cas, les partenaires s'accordent dans un binôme pour se référer aux longueurs des côtés, dans l'autre au découpage-recollement. Au cours des entretiens, les procédures des individus évoluent comme suit :

Au début, 10 (L), 2 (D) et 10 (DR). Parmi les (L), 7 changent ou oscillent, 3 vers (D) et 4 vers (DR). Dans les cas où les conflits ne sont pas assez forts pour être dépassés par l'argumentation, c'est la référence au nombre de carreaux déterminé grâce au papier quadrillé ou grâce à un quadrillage du papier blanc qui résout le problème. Dans chaque binôme où l'un des partenaires avait une conception affirmée (DR), il a fait évoluer l'autre, quitte à recourir au quadrillage. Cette évolution s'est confirmée lors de l'épreuve écrite du 14/04.

c) Epreuve du 14/04

texte : _____

c) Epreuve du 14/04

texte :

Pour chaque surface, dessiner un rectangle de même aire.

Les réponses

Sur les 21 réponses dépouillées, une seule fait référence au périmètre pour dessiner un rectangle de même aire que l'hexagone.

9 produisent des rectangles corrects pour les 4 surfaces

8 produisent des rectangles corrects pour les 3 surfaces autres que l'hexagone: 6 n'en produisent aucune pour celui-ci, 1 essaie par découpage mais sans succès, 1 dessine une surface de même aire non rectangulaire.

Les autres associent au parallélogramme un rectangle de même aire et dessinent pour les autres surfaces des rectangles les encadrant ou contenus dedans.

d) Tableau récapitulatif

Nous présentons ci-dessous les conceptions des 18 élèves qui ont passé toutes les épreuves, telles qu'elles se sont manifestées aux trois occasions (17/03, entretiens 26-27/03, 14/04) en ordonnant les élèves selon leurs performances en juin (voir textes en annexe) aux items "combien de petites figures dans la grande" pour les carrés, parallélogrammes et triangles équilatéraux (rapports 2 et 3), "combien de pots de peinture pour peindre la grande surface" pour le triangle quelconque (8 items). Les 18 élèves ont répondu correctement aux questions concernant le carré et le parallélogramme agrandis dans les rapports 2 et 3. Nous différencions les élèves selon leurs réponses dans les cas de triangles.

Dans le tableau ci-dessous, pour le 14/04, DR⁺ signifie que l'élève utilise le découpage-recollement aux quatre questions avec réponses correctes. Dans les autres cas on indique le nombre de réponses utilisant correctement le découpage-recollement. Sauf précision contraire, il y a non-réponse dans les autres cas. Leïla a produit des rectangles ayant un lien géométrique avec la figure donnée mais pas la même aire, sauf dans un cas.

	17/03	entretiens	14/04	juin
Aude	L	DR	DR+	réponses correctes à toutes les questions
Hélène	DR	DR	DR+	
Valérie	DR estim.	DR	DR(3quest.)	
David C.	DR	DR	DR+	
Pascal	L-D	L-->DR	DR+	
Jamel	DR	DR	DR+	
Thierry	DR-L	L-->DR	DR+	
Jeanlin	DR-mes.	DR-mesure	DR+	
Virginie	DR	DR	DR(3quest.)	
Nathalie	L	L-->D	DR(3quest.)	
Paulo	L	L->D-L	DR(3quest.)	
Sébastien	DR-D	DR	DR(3quest.)	
Sylvain	L-D	L-->DR	DR(3quest.)	tout correct sauf
Leila	L-D	L-->D	des rectangles 1correct	
Bruno	D-L	L	DR(3quest.)L(4)	3
Souhade	DR-D-L	D	DR(1-2)	
Sonia	D-L	L	DR 1seul correct	pavages-objet corrects
David T	DR-L	DR-L	DR+	corrects
Raphael	L-D	L-->DR	DR+	
Rachida	L-DR	L	des rectangles	corrects

Conclusion: Une certaine dissociation aire-longueur s'est opérée pour la plupart des élèves. Les non-réponses le 14/04 l'emportent sur les réponses recourant au périmètre ou à la longueur des côtés, en cas de difficulté. Nous reconnaissons là une évolution directement liée à l'apprentissage. Nous en testons la durabilité deux mois plus tard, grâce aux tests écrits de juin où le pavage est mobilisé comme outil.

III Résultats

1. Les acquis

Le pavage (en particulier le comptage de carreaux) est un outil disponible chez tous les élèves pour comparer des aires de surfaces planes de formes différentes. Nous l'avons constaté au cours des entretiens par deux et aussi dans les résultats obtenus aux tests écrits de fin d'année. En juin 1983, nous avons proposé aux élèves certains des questionnaires utilisés par J. Rogalski (Rogalski, 1983). Il s'agit d'une variante du questionnaire SN, mais sans la phase 3 qui donne des exemples de pavage (textes en annexe).

résultats à ces tests écrits :

Nous avons retenu les réponses à trois questions :

a) Nombre de petites figures dans la grande.

Les figures utilisées sont des carrés, parallélogrammes, triangles équilatéraux ; les rapports sont 2 et 3. Dans le tableau, nous donnons les résultats pour chaque figure avec en indice le rapport correspondant.

Réponses correctes	2	2	2	3	3	3
CM1 27 élèves	26	25	21	24	23	20
CM2 22 élèves	22	21 <i>2</i>	18	22	18	17

Les nombres en italique dans les cases indiquent le nombre d'élèves qui, parmi ceux de la case correspondante, ont donné une réponse correcte accompagnée d'un pavage par des surfaces de même aire que la petite surface donnée mais non superposables. Ainsi, deux élèves parmi les 21 qui ont donné une réponse correcte pour *2* ont dessiné

au lieu de

Remarquons que les parallélogrammes dessinés ont presque la même forme que le petit parallélogramme de départ.

b) Nombre de pots de peinture.

Les figures sont les mêmes que précédemment, avec en plus des triangles quelconques. On indique le nombre de pots de peinture nécessaires pour peindre la petite figure et on demande combien il en faut pour la grande.

Réponses correctes	2	3	2	3	2	3	2	3
CM1 26 élèves	18	14	16	14	19	15	16	14
CM2 22 élèves	19	21	18	19	22	21	16 ₂	16 ₄

c) Question en cm²

La même question était posée à propos de l'aire en cm². Le carré était remplacé par un rectangle. Cette question n'a pas été posée aux élèves de CM1.

Réponses correctes	2	2	3	2	3	2	3
CM2 22 élèves	20	21	19	18	18	15 ₂	15 ₄

Exemples de pavages des triangles quelconques par des surfaces de même aire mais non superposables :

Les réponses que J. Rogalski obtient à ces questions sont très différentes pour le carré (maîtrisé dès le CM1) et pour le triangle : "il faut

une longue évolution pour que les représentations de pavage du triangle soient mobilisables (fin de 5ème). C'est seulement en fin de 4ème que ces représentations sont disponibles pour les 3/4 des élèves." Pour le pavage spontané (question 1), elle trouve 48% (resp. 39%) de réponses correctes pour le triangle équilatéral avec le rapport 2 (resp. rapport 3), toutes classes confondues (de 9 à 14 ans). Nous avons à cette question des réponses comparables à celles des élèves de 4ème (13-14 ans) ; on peut également noter que les résultats corrects sont du même ordre qu'il s'agisse de carrés, de triangles ou de parallélogrammes, qu'il s'agisse du rapport 2 ou du rapport 3. Le "taux de passage" d'une réponse correcte au pavage à une réponse correcte à la peinture (réussite peinture + pavage / réussite pavage) varie de 85 % à 100% au CM2 et de 58% à 90% au CM1 : ces taux sont comparables à ceux obtenus par J. Rogalski deux ans plus tard.

On peut penser que le travail fait dans les séquences didactiques a rendu disponible le pavage de surfaces variées, ce qui fait que les élèves sont capables, deux mois après l'apprentissage, de répondre à un certain nombre de questions classiques concernant les aires.

On a pu constater au cours des entretiens et des épreuves du 14 avril que le découpage - recollement fonctionne pour comparer des surfaces, même s'il entre parfois en compétition avec d'autres conceptions issues d'autres points de vue.

2. Les difficultés qui résistent

Les élèves ont fait certains progrès du point de vue de l'indépendance de l'aire par rapport à la forme, du point de vue de la différenciation aire-périmètre mais nous avons vu que les conceptions erronées peuvent réapparaître jusqu'à la fin de nos séquences dans des situations plus complexes ou quand il s'agit de figures géométriques usuelles. Il semble que dans ce dernier cas on ait davantage de points de vue qui entrent en compétition, ce qui amène les élèves à produire des réponses erronées.

3. Les difficultés non prévues

Il est apparu au cours des entretiens, à la fin des séquences réalisées, que le point de vue "déformation continue" intervient fortement dans les représentations et dans les décisions des élèves, surtout à propos de surfaces usuelles. Ainsi, un parallélogramme est vu comme un rectangle déformé, les longueurs des côtés ne varient pas dans la transformation, l'aire ne varie pas non plus - qu'il s'agisse d'une articulation autour des sommets (longueurs des côtés conservées) ou d'un glissement d'un côté sur son support

(aire conservée). D'ailleurs, n'est-ce pas ce point de vue qui faisait réclamer de la ficelle à un élève de CM2 pour "transformer en rectangle" une surface aux bords arrondis.

4. Nouvelles hypothèses didactiques

Les observations faites nous amènent à ajouter des hypothèses pour la construction de nouvelles séquences didactiques. Nous avons prévu du travail dans le cadre géométrique sans prendre en compte le point de vue dynamique de la déformation.

Nous faisons maintenant l'hypothèse qu'une interaction entre les points de vue statique et dynamique est nécessaire dans la conceptualisation de la grandeur aire et dans sa dissociation de la longueur.

Le découpage - recollement et la déformation amènent à des conclusions contradictoires. Le comptage de carreaux sur papier quadrillé emporte la conviction et permet de trancher.

Nous prévoyons maintenant de renforcer le jeu de cadres papier blanc - papier quadrillé au début du processus d'apprentissage pour établir que, pour deux surfaces dessinées sur papier quadrillé, avoir des aires égales a le même sens, qu'on se réfère au comptage de carreaux, au déplacement ou au découpage - recollement et récolter dans les deux cadres des propriétés établies dans l'un des deux.

Un des objectifs est, en fin de processus, d'utiliser efficacement le quadrillage et ses raffinements successifs afin d'encadrer de plus en plus précisément une surface par des surfaces dont on sait mesurer les aires. Nous faisons l'hypothèse que trois points importants interviennent pour cela :

- la maîtrise du passage du point de vue "papier blanc" au point de vue "papier quadrillé" et réciproquement
- la dialectique statique - dynamique
- la dissociation aire - longueur.

IV Retour sur l'ingénierie didactique

L'analyse du déroulement effectif des séquences nous amène à réorganiser l'ingénierie didactique. Nous allons proposer la recherche de problèmes qui donnent lieu au déroulement de différentes dialectiques mobilisant différents sens de l'aire et dont l'enchaînement devrait permettre l'élaboration du concept d'aire dans son double aspect outil et objet.

1. Jeu de cadres : papier blanc, papier quadrillé

Le travail sur papier quadrillé a pour but de mobiliser une conception de l'aire mesurée par le nombre de carreaux : deux surfaces S_1 et S_2 ont la même aire quand elles sont constituées du même nombre de carreaux, qu'elles soient superposables ou qu'elles ne le soient pas. Si S_1 contient moins de carreaux que S_2 , l'aire de S_1 est plus petite que l'aire de S_2 .

Le travail sur papier blanc a pour but de mobiliser une autre conception de l'aire, indépendante des nombres : deux surfaces S_1 et S_2 ont même aire

- si on peut trouver un déplacement (de l'espace) qui amène S_1 sur S_2 ; dans ce cas elles sont superposables

- si on peut découper l'une en un nombre fini de morceaux et les recoller sans chevauchement de façon à obtenir une surface superposable à l'autre.

Si un déplacement amène S_1 sur une partie de S_2 , alors l'aire de S_1 est plus petite que l'aire de S_2 .

Il est alors nécessaire de proposer une situation dont l'enjeu est de montrer que deux surfaces qui ont la même aire au sens du papier blanc l'ont aussi sur papier quadrillé :

- Etant donnée une surface S dessinée sur papier blanc, les surfaces obtenues en reproduisant S dans des positions quelconques sur un papier quadrillé contiennent le même nombre de carreaux (en particulier même si le bord ne suit pas partout les lignes du quadrillage)

- Etant donnée une surface S dessinée sur papier quadrillé, toute surface obtenue à partir de S par découpage et recollement sans chevauchement contient le même nombre de carreaux que S .

Ces deux critères nous garantissent la conservation du nombre de carreaux, qu'on connaisse ce nombre ou non. Ils fournissent les moyens de déterminer le nombre de carreaux contenus dans une surface en la remplaçant au besoin par une autre en contenant autant et pour laquelle le calcul est plus commode.

L'expression "avoir même aire" n'avait de sens au départ que pour des surfaces dessinées sur papier quadrillé et dont les bords suivent les lignes du quadrillage. Par un jeu de cadres papier blanc - papier quadrillé, on étend le champ des surfaces pour lesquelles l'expression "avoir même aire" a un sens.

Remarque 1

On ne peut faire l'économie du travail sur papier blanc. Pour les élèves privés des procédures sur papier blanc, les comparaisons d'aires de surfaces

dessinées sur papier quadrillé conduisent à un comptage du nombre de carreaux en essayant de rassembler des morceaux de façon parfois très approximative, même dans le cas où les surfaces sont superposables. Le comptage peut ainsi amener des réponses contradictoires au sein de la classe. Les moyens de contrôle relèvent de procédures sur papier blanc.

Remarque2

Ce jeu de cadres papier blanc - papier quadrillé se situerait dans notre progression au début de l'apprentissage, au CM1 par exemple. On pourrait proposer les situations suivantes :

Situations proposées

- Une *première situation* a pour objectif d'introduire le mot "aire" en référence au nombre de carreaux, de comparer les surfaces qui suivent les lignes du quadrillage (avec éventuellement des demi-carreaux). Deux surfaces ont la même aire si elles contiennent le même nombre de carreaux. Une surface a une aire plus grande qu'une autre si elle contient plus de carreaux.

- La *deuxième situation* porte sur un des maillons du jeu de cadres : l'invariance du nombre de carreaux d'une surface lors d'un déplacement.

matériel : chaque élève reçoit une feuille sur laquelle le maître a dessiné un rectangle et des segments ayant pour longueur une des dimensions du rectangle, en diverses positions - suivant les lignes du quadrillage ou en oblique - il reçoit aussi du papier calque.

consigne : construire sur la feuille des rectangles dont l'un des côtés est l'un des segments dessinés et de même aire que le rectangle donné. À chaque segment correspond un rectangle.

Le travail est individuel.

Bilan : En déplaçant un rectangle de n'importe quelle façon, par exemple en le faisant tourner autour d'un point ou en le faisant glisser le long d'une droite, on obtient un rectangle superposable. En particulier, on peut affirmer que les dimensions et le nombre de carreaux à l'intérieur - donc l'aire - sont conservés, sans avoir besoin de connaître les valeurs numériques.

- La *troisième situation* est une reprise de la première avec des surfaces comportant des lignes obliques joignant un noeud du quadrillage à un autre. Les élèves sont amenés à voir des triangles rectangles comme des demi-rectangles et à faire des déplacements de triangles rectangles pour faciliter le comptage de carreaux.

- La *quatrième situation* a pour but de formuler les conditions pour qu'un "découpage-recollement" conserve l'aire, c'est-à-dire le nombre de carreaux d'une surface dessinée sur papier quadrillé.

On donne aux élèves plusieurs exemplaires d'une surface dessinée sur papier quadrillé ; on leur demande d'en garder une intacte et de découper les deux autres en 5 ou 6 morceaux de formes simples en suivant les lignes du quadrillage, puis de recoller les morceaux de

façon à fabriquer deux surfaces différentes de la surface donnée dont l'une ait une aire égale et l'autre une aire plus petite. On demande ensuite de reproduire les surfaces sur papier blanc. Le bilan permet d'énoncer les conditions de recollement qui conservent le nombre de carreaux. On est assuré d'avoir conservé le nombre de carreaux en se basant sur le fait qu'on n'a pas changé les morceaux : si on n'a pas fait chevaucher en recollant, les deux surfaces sont formées des mêmes morceaux. Le nombre de carreaux n'a pas changé dans les morceaux, il n'a pas changé dans la surface totale.

Cinquième situation : Jusqu'à présent les élèves ont travaillé sur papier quadrillé, ils vont maintenant travailler sur papier blanc. Par équipes, à partir de rectangles superposables qu'ils doivent découper en quelques morceaux simples, on leur demande de fabriquer des surfaces de formes différentes en recollant tous les morceaux sans chevauchement et de comparer les surfaces obtenues. On décide que les surfaces obtenues ont même aire puisque le recollement vérifie les conditions déterminées précédemment sur papier quadrillé.

Sixième situation : Enfin on propose aux élèves de découper une surface dessinée sur papier quadrillé et avec des lignes du découpage qui, cette fois, ne suivent pas le quadrillage ; on demande aux élèves de fabriquer avec les morceaux, d'autres surfaces comportant le même nombre de carreaux. Le découpage-recollement est cette fois le moyen de répondre à la question : on n'a pas besoin de compter les carreaux de la nouvelle surface, la réversibilité du découpage assure sa conservation. Remarquons que dans une classe où nous avons proposé ce travail avant la phase sur papier blanc, les élèves ont essayé de compter les carreaux des nouvelles surfaces, en évaluant des morceaux de carreaux.

2. Confrontation longueur - aire

Le sens de l'aire dont on dispose permet-il de résoudre des problèmes impliquant à la fois aire et longueur, en particulier :

- deux surfaces qui ont même aire ont-elles même périmètre ?
- deux surfaces qui ont même périmètre ont-elles même aire ?
- peut-on modifier une surface de façon à diminuer l'aire et augmenter le périmètre ? diminuer le périmètre et augmenter l'aire ?

A ce moment de l'apprentissage, on sait mesurer les longueurs, on ne sait pas mesurer les aires mais on dispose de procédures qualitatives pour les comparer. Ces questions ont pour but de déstabiliser une conception de l'aire liée à la forme, et de préparer le recours pertinent aux nombres pour traiter les problèmes d'aire.

Elles avaient été prévues dans la première analyse où nous avons envisagé les problèmes suivants :

1. commander de la ficelle pour border les surfaces de même aire fabriquées par équipe à partir de rectangles superposables ; comparer ensuite les périmètres de ces surfaces.

2. à partir d'une surface donnée, en fabriquer une autre d'aire plus petite et de périmètre plus grand

3. à partir d'un rectangle, en fabriquer un autre de même aire et de périmètre plus grand (et éventuellement de même aire et de périmètre plus petit).

4. après l'introduction de la mesure des aires et des formules pour le rectangle, recherche de rectangles de périmètre donné et calcul de leur aire.

Les premières séquences permettent une différenciation aire-périmètre dans un contexte découpage-recollement avec des surfaces de forme "quelconque", c'est-à-dire en fait irrégulière. Nous avons aussi prévu de dissocier aire et périmètre à l'intérieur de la forme rectangle, par le découpage-recollement et par la mesure.

Nous avons vu que des difficultés subsistent (épreuve du 17/3, entretiens), en particulier parce que, dans le cas de figures usuelles (rectangle, parallélogramme), les élèves recourent plus facilement à d'autres points de vue comme celui de la déformation continue.

Les séquences prévues initialement pour différencier aire et longueur nous semblent devoir être conservées, mais elles seront complétées, et c'est l'objet du paragraphe suivant, par la prise en compte d'un point de vue dynamique.

3. Dialectique statique - dynamique

Nous avons constaté au cours des entretiens que, pour comparer des aires de surfaces planes, les élèves recourent à des déformations continues des surfaces données et qu'ils ont tendance à amalgamer la conservation des aires et celle des longueurs des côtés dans de telles déformations. Nous proposons d'étudier séparément l'effet des transformations qu'ils envisagent sur les aires et sur les longueurs (côtés et diagonales) des rectangles.

a) Glissement d'un côté sur son support

On déplace CD sur son support (qui est la droite parallèle à AB portant CD). Le rectangle ABCD se transforme en parallélogramme. Comment varient les longueurs des côtés, de chaque diagonale, le périmètre, l'aire du parallélogramme ?

b) Pivotement des côtés autour des sommets

On a un parallélogramme articulé : les côtés sont des barres rigides (de longueur fixe) qu'on peut faire pivoter autour des sommets. Comment varient les longueurs des côtés, des diagonales, le périmètre, l'aire?

Les transformations continues ci-dessus se situent dans un cadre dynamique.

Le point de vue dynamique fait référence à des transformations continues et incite les élèves à considérer que les caractéristiques de la figure sont conservées (en particulier aires et longueurs des côtés dans le cas a) comme dans le cas b)) puisqu'il s'agit de la même figure qu'on déforme : "on penche le rectangle", "on redresse le parallélogramme". Intéressons-nous aux élèves pour lesquels un parallélogramme n'est qu'un rectangle penché et qui proposent de "redresser" le parallélogramme pour obtenir un rectangle de même aire. Ces élèves sont d'autant plus convaincus de leur démarche que le parallélogramme se présente à eux comme un rectangle peu perturbé (côtés peu penchés). Les élèves s'écartent ainsi peu de la situation de départ, ce qui leur garantit une illusion de stabilité.

Pour dépasser ce point de vue, il est nécessaire de dissocier les états de départ et d'arrivée tout en les considérant comme deux états d'une déformation qu'on peut accuser vers des cas limites de façon à en grossir les effets : parallélogramme très allongé dans le cas a), très aplati dans le cas b).

La perception oblige à douter mais non à renoncer immédiatement aux convictions de départ.

Dans le cas b) en poussant la transformation, la perception à elle seule oblige à remettre en question les convictions de départ puisqu'à la limite le parallélogramme aplati a une aire nulle. Cependant la variation de l'aire est perçue dans un premier temps de manière discontinue : d'abord elle ne change pas, ensuite elle devient très petite. Puis, plusieurs étapes intermédiaires étant dessinées, on se convainc plus ou moins que l'aire diminue régulièrement, devient nulle à la limite. Remarquons que nous retrouvons là des observations analogues à celles de Vinh Bang et Lunzer (1965) au cours de l'expérience suivante : un fil de longueur fixe est tendu entre les trois points A, B, M. AB est fixe ; M varie d'une position centrale M_0 à une position limite L.

Les questions posées concernent la conservation de l'aire.

Dans le cas a), on constate que les côtés deviennent de plus en plus longs, mais du coup on se met à douter de la conservation de l'aire.

Des conjectures sont faites, des preuves deviennent nécessaires.

Dans le cas b), on peut recourir au découpage et au recollement pour avoir une preuve :

Le parallélogramme ABC_1D_1 a même aire que le rectangle $ABHK$ et donc une aire plus petite que le rectangle $ABCD$. On remarque de plus que si les longueurs des côtés sont conservées, celles des diagonales, elles ne le sont pas.

Dans le cas a) la perception peut faire douter de la conservation de l'aire ; pour s'en convaincre il faut changer de point de vue et recourir à un découpage - recollement, du moins si CD ne s'est pas trop déplacé :

aire de ADD_1 = aire de BCC_1 donc aire de $ABCD$ = aire de ABC_1D_1

C'est bien un changement de point de vue puisque, si on peut voir le découpage - recollement comme une sorte de transformation, ce n'est pas une déformation continue : on ne regarde que l'état de départ et l'état d'arrivée. C'est en cela que le découpage - recollement est plus "statique".

Dans le cas où D_1 est extérieur au segment DC , on a besoin de recourir à un point de vue tout à fait statique basé sur l'additivité des aires :

On a par exemple :

aire de ABC_1D_1 = aire de $ABCD$ + aire de BCC_1 = aire de ABC_1D_1 + aire de ADD_1

et aire de ADD_1 = aire de BCC_1 donc aire de ABC_1D_1 = aire de $ABCD$.

On pouvait aussi, en essayant de comparer directement $ABCD$ et ABC_1D_1 voir

d'une part que : aire de $ABCD$ = aire de ABI + aire de $AICD$ et

aire de ABC_1D_1 = aire de ABI + aire de BID_1C_1 ,

d'autre part que aire de $AICD$ = aire de ADD_1 - aire de ICD_1 et

aire de BID_1C_1 = aire de BCC_1 - aire de ICD_1

or, aire de ADD_1 = aire de BCC_1 ...

Le démarrage de la deuxième procédure peut paraître plus facile puisqu'il correspond à l'habitude qu'ont les élèves de découper une surface en morceaux. Mais on est ensuite amené, comme dans le premier cas à insérer les surfaces qu'on veut comparer ($AICD$ et BID_1C_1) dans des surfaces plus grandes (ADD_1 et BCC_1), ce qui ne fait pas partie des habitudes. Dans ces conditions, le recours au trapèze est plus économique et on peut l'envisager même quand D_1 est entre C et D .

De toute façon, on doit s'intéresser aux triangles BCC_1 et ADD_1 .

Toutefois, pour se rendre compte de l'égalité de leurs aires, on a besoin de les considérer comme translatés l'un de l'autre et donc d'avoir une vision dynamique de la figure mais en focalisant cette fois son intérêt sur les deux triangles et non plus sur la déformation du rectangle en parallélogramme.

Apparaît alors un nouvel objet d'étude qui est une autre procédure pour comparer : plonger les deux surfaces à comparer dans une troisième et se ramener à la comparaison des compléments. Cette procédure est difficile pour les élèves de l'école élémentaire et elle nécessite apprentissage. Notons que ce recours aux compléments sera nécessaire dans d'autres situations de mesure (par exemple comparaison de volumes pleins). La situation rencontrée ici offre une occasion de l'aborder.

Quant aux variations de longueur des côtés AD et BC , si elles sont peu perceptibles quand D_1 est voisin de D , elles deviennent manifestes quand D_1 s'éloigne de D . Il en est de même pour la diagonale AC . En revanche BD diminue quand D_1 se rapproche de C , passe par un minimum quand D_1 est en C et augmente ensuite.

Le cadre dynamique devrait permettre de pointer les sources de difficulté, de faciliter les dissociations nécessaires : a) glissement, b) articulation.

Le cadre statique est le cadre adapté pour établir des preuves.

Ce faisant, le cadre géométrique s'enrichit d'un théorème : invariance de l'aire par "glissement". Ce théorème justifie la formule de l'aire du parallélogramme : $\text{aire} = \text{base} \times \text{hauteur}$.

Un nouveau problème s'impose pratiquement ici : *l'aire dépend-elle du choix de la base?* non d'après la formule usuelle, oui d'après les conditions de productions que nous avons proposées (qu'il s'agisse de découper et recoller un triangle ou de déformer le parallélogramme par glissement d'un côté).

La réponse à ce problème amène au problème suivant:

On déforme un parallélogramme ABCD en rectangle de deux manières:

1) AB est fixe, CD glisse

2) AD est fixe, BC glisse

Comparer les aires des rectangles ABEF et ADGH.

Pour traiter ce problème, on a besoin de faire jouer un rôle symétrique aux côtés non parallèles du parallélogramme. Le problème ci-dessous peut préparer cette situation.

- On déforme un rectangle ABCD en parallélogramme de deux manières:

1) AB est fixe, CD glisse

2) AD est fixe, BC glisse

Comparer les aires des parallélogrammes ABEF et ADGH.

L'étude des problèmes de déformation ou de découpage et recollement font

partie de la construction du sens de la formule usuelle $S = b \times h$. Mais ils ne peuvent pas être tous traités à l'école élémentaire. La déformation en parallélogramme articulé peut être traitée en CM jusqu'au cas limite d'aplatissement. En revanche, le glissement d'un côté sur son support peut être abordé seulement dans le cas où il s'agit d'une autre manière de voir le découpage et recollement d'un triangle entièrement situé dans le parallélogramme. Ces études suffisent déjà à dissocier les effets de ces deux déformations. C'est ce que nous avons observé lors des entretiens. Les autres cas et notamment le changement de base pourraient être abordés en CM2 mais aussi différés en 6ème si le temps à consacrer aux aires n'est pas suffisant à l'école élémentaire.

Sans l'étude des problèmes de changement de base, on s'appuie implicitement sur le fait qu'une surface a une aire bien déterminée et que des procédés différents de calcul doivent aboutir au même résultat. Or, J. Rogalski a observé que ce n'est pas un acquis pour tous les élèves de 5ème dans le cas du triangle quelconque. La possibilité d'admettre l'unicité de la mesure quel que soit le moyen de calcul, peut justifier qu'on introduise les formules (parallélogramme, triangle) à l'école primaire, vu l'usage social qui en est fait. Toutefois, on voit le décalage qu'il y a entre la formule usuelle présentée dans toute sa généralité "si simple", et le travail qu'il faudrait faire pour espérer asseoir sa validité. On ne peut pas s'étonner des difficultés et des dérapages, par ailleurs couramment observés, chez des élèves de collège, voire de lycée (nombreux encore sont ceux pour lesquels l'aire d'un parallélogramme s'obtient en multipliant les longueurs de deux côtés adjacents).

Remarque

Cette situation, proposée au CM2, a pour objectif de dissocier variation d'aire et variation de longueur des côtés d'une figure dans une déformation continue. A d'autres niveaux (4ème, 3ème), on pourrait aussi exploiter davantage la variation de longueur des diagonales.

4. Jeu de cadres surfaces - aires - nombres

C'est sur ces jeux de cadres qu'était basé notre premier processus d'apprentissage. Nous les reprenons et en résumons ci-dessous les enjeux.

A un moment de l'apprentissage (fin de CM1 ou CM2), on peut se trouver dans la situation suivante :

- dans le cadre géométrique, on sait comparer certaines surfaces par déplacement ou par découpage - recollement.
- dans le cadre numérique, on dispose des nombres entiers et de leurs opérations, on a commencé à étendre le domaine des nombres et on dispose de

quelques nombres fractionnaires ou décimaux mais on n'a pas encore toutes les opérations sur ces nouveaux nombres.

- on sait associer un nombre à certaines surfaces par le comptage de carreaux sur papier quadrillé ; on a admis que le nombre de carreaux était invariant par déplacement de la surface et par découpage et recollement convenable.

L'extension de l'application mesure entre surfaces et nombres va permettre

1. d'étendre l'ensemble des surfaces dont on sait comparer les aires par pavage.

2. d'étendre la multiplication aux nombres fractionnaires et en particulier aux nombres décimaux.

Inversement, l'extension du champ des surfaces dont on sait comparer les aires par découpage-recollement et l'extension des opérations sur les nombres permettent d'étendre l'application-mesure entre surfaces et nombres.

a) pavage

On a un premier moyen pour comparer davantage de surfaces : le pavage. On peut ainsi associer un nombre aux surfaces qu'on sait paver et comparer les nombres pour comparer les surfaces, à condition d'avoir utilisé des éléments de même aire (éventuellement de formes différentes) pour paver les surfaces à comparer. On constitue de la sorte des familles de surfaces comparables, mais il se peut qu'on ne sache pas comparer des surfaces appartenant à des familles différentes.

Au cours du pavage, on peut rencontrer les situations suivantes :

- à une même surface, on a pu associer des nombres différents si elle a été pavée avec des éléments d'aires différentes.

- on a pavé des surfaces avec des surfaces élémentaires d'aires différentes. On ne peut ramener la comparaison des aires à celle des nombres par le pavage que si on a utilisé des éléments de même aire pour paver. On sera dans ce cas si on trouve une surface qui pave les différentes surfaces élémentaires utilisées.

Ces situations contribuent à dissocier l'aire d'une surface du nombre qui la mesure et à mettre l'accent sur le choix nécessaire d'une unité pour construire une application mesure, c'est pourquoi il nous paraît important de les prendre en compte dans l'apprentissage.

A partir d'une activité géométrique, le pavage, et de ce qu'on sait sur les nombres, on étend les connaissances géométriques (davantage de surfaces comparables du point de vue de l'aire) et la relation entre surfaces et nombres (élaboration d'une notion d'application mesure).

Une unité d'aire étant choisie, le pavage permet d'associer un nombre

entier à certaines surfaces. Si on dispose d'autres nombres (petites fractions), on va pouvoir associer un nombre à davantage de surfaces en considérant des subdivisions d'un élément de pavage d'aire 1. Mais il reste des surfaces auxquelles on ne sait pas associer de nombre.

b) extension de la multiplication

Dans le jeu de cadres aires - surfaces - nombres, on va aussi récupérer de l'information nouvelle dans le cadre numérique : on peut donner du sens au produit des fractions et des décimaux en s'appuyant sur les aires de rectangles.

Supposons qu'on soit à un moment de l'apprentissage où

- une unité de longueur (resp. d'aire) étant choisie, on sait utiliser des fractions pour désigner des longueurs (resp. des aires, par mesure directe)
- pour des unités de longueur et d'aire adaptées, on sait que, pour un rectangle de dimensions entières, la mesure de l'aire est le produit des mesures des dimensions.
- on cherche à évaluer l'aire d'un rectangle de dimensions fractionnaires.

Par exemple $(3 + 4/5)$ et $(2 + 2/3)$

Fig 1

Fig 3

Fig 2

Le rectangle R_1 de dimensions $(3, 2)$ a une aire qui mesure 6 car $2 \times 3 = 6$: il contient 6 carrés unité (Fig 1).

Le rectangle de dimensions $(1/5, 1)$ a une aire qui mesure $1/5$ car il se reporte 5 fois dans le carré unité, on en a $4 \times 2 = 8$ dans R_2 (Fig 2).

Le rectangle de dimensions $(1/3, 1)$ a une aire qui mesure $1/3$ car il se reporte 3 fois dans le carré unité, on en a $3 \times 2 = 6$ dans R_3 (Fig 2).

Le rectangle R_4 de dimensions $(4/5, 2/3)$ contient 8 petits rectangles de dimensions $(1/5, 1/3)$; chacun de ces petits rectangles se reporte 15 fois dans le carré unité, et a donc une aire qui mesure $1/15$ (Fig 3). La mesure de

l'aire du rectangle R_4 est donc $8/15$. Ce résultat a été trouvé à partir des dimensions $4/5$ et $2/3$, du pavage et des règles d'écriture des fractions. On convient alors que $(4/5) \times (2/3) = 8/15$.

On va ainsi donner comme sens au produit de deux nombres fractionnaires la mesure de l'aire d'un rectangle de dimensions ces deux nombres.

Le rectangle de dimensions $(3+4/5, 2+2/3)$ a une aire qui mesure

$$6 + (8 \times 1/5) + (6 \times 1/3) + (8 \times 1/15) = 9 + 3/5 + 8/15.$$

Nous aurons donc $(3+4/5) \times (2+2/3) = (3 \times 2) + (3 \times 2/3) + (2 \times 4/5) + (4/5 \times 2/3) = 9 + 3/5 + 8/15$ et aussi $4/5 \times 2 = 8/5$ et $3 \times 2/3 = 6/3$.

Dans les deux derniers cas, ce sens de la multiplication coïncide avec celui de l'addition répétée qu'on avait pu rencontrer auparavant.

D'autres situations permettront de recoller les différents sens de la multiplication qu'on peut rencontrer.

Dans toute la suite du travail sur les aires, le jeu de cadres surfaces - aires - nombres se poursuit, en particulier dans toutes les situations qui concernent les mesures :

- élaboration des formules de calcul d'aire des surfaces usuelles
- proportionnalité de la mesure de l'aire du rectangle à la mesure de chacune des dimensions
- bidimensionalité de l'aire : si on agrandit une surface dans un rapport k , son aire est multipliée par k^2 .

Pour traiter chacun de ces problèmes on s'appuie, par l'intermédiaire de divers découpages de surfaces, de pavage en même temps que d'addition et multiplication de nombres, sur l'interaction entre le cadre géométrique et le cadre numérique, l'aire étant l'invariant qui permet de relier les deux cadres.

Conclusion

Notre objectif était de construire la notion d'aire et une application mesure entre surfaces et nombres, de façon qu'elles prennent sens pour les élèves. Notre analyse a priori nous amenait à faire des choix didactiques basés sur des jeux de cadres surfaces-aires-nombres dans lesquels les cadres différaient par leurs objets. Plus précisément, certaines séquences ont eu pour objet de rendre concevable la comparaison d'aires sans recours à la mesure. D'autres ont eu pour objet la comparaison et le calcul d'aires en recourant à la mesure dans le cas de surfaces pavables avec des éléments "étrangers" (non superposables ou ne provenant pas d'une subdivision de l'un d'eux) et aussi dans le cas de surfaces non pavables avec un élément choisi à l'avance. Ce travail a permis aux élèves d'étendre le champ des surfaces qu'ils savaient mesurer avec une unité donnée, à des surfaces non pavables avec cette unité. En particulier, un acquis de leur apprentissage est qu'il est

possible d'exprimer en cm^2 l'aire d'un triangle, d'un parallélogramme ou d'une autre surface, que le cm^2 est l'aire d'une surface qui peut prendre des formes très diverses.

Autrement dit, une des conséquences de l'apprentissage est la prise de distance par rapport à la conception de l'aire liée à la forme.

Toutefois, cette évolution n'est pas nécessairement un résultat qui intervient tout de suite après l'apprentissage. A ce moment là, au CM1, pour comparer des aires de surfaces usuelles, le découpage et recollement convenable n'a été un outil opératoire que pour la moitié des élèves environ. Dans les deux classes, pour traiter ces questions certains amalgament encore aire et périmètre. D'autres les numérisent en recourant abusivement aux longueurs des côtés. D'autres enfin font intervenir fortement un point de vue "déformation" de surfaces usuelles (ici des parallélogrammes) en surfaces plus familières qu'ils savent traiter (des rectangles). La déformation dans le cas traité pouvait conserver l'aire (glissement d'un côté du parallélogramme sur son support) ou ne pas la conserver (articulation de deux côtés autour des sommets). Elle produisait dans les deux cas une déclaration de conservation de l'aire. Les élèves concernés ont fait évoluer leur point de vue de façon déterminante lors des entretiens en binôme, et ce de façon d'autant plus marquée que leurs conceptions les conduisaient à des affirmations contradictoires.

Ainsi, l'expérience nous a appris que les jeux de cadres prévus étaient insuffisants et qu'il était important d'y ajouter des jeux entre cadres qui diffèrent par la problématique - ici statique, dynamique - comme nous l'avons décrit ci-dessus. Les situations à proposer aux élèves restent à expérimenter et à mettre au point.

Nous pensons qu'après ce travail, on devrait être mieux armé pour identifier aires et nombres avec un moindre risque de dérapage.

On pourrait même atteindre les aires de surfaces pour lesquelles le maillage carré n'est pas nécessairement le meilleur et pour lesquelles la longueur du bord n'est pas nécessairement finie. Par exemple S , limite de la suite S_n :

S_0

S_1

S_2

On fabrique S_{n+1} à partir de S_n en ajoutant un triangle équilatéral construit sur le tiers central de chaque côté.

Références :

R. DOUADY M.J. PERRIN Aires de surfaces planes 1ère partie et 2ème partie "*Petit x*" n° 6 (dec. 84) et "*Petit x*" n° 8 (juin 85) IREM de Grenoble.

R. DOUADY M.J. PERRIN Mesure des longueurs et des aires. Brochure n° 48 (sept. 1983) IREM Université Paris 7.

J. ROGALSKI L'acquisition des notions relatives à la dimensionalité des mesures spatiales (longueur, surface). *Recherches en Didactique des mathématiques* n° 3.3 1983 La Pensée Sauvage

VINH BANG et LUNZER. E. Conservations spatiales *Etudes d'épistémologie génétique* vol 19 Paris PUF 1965

Combien de petites figures dans la grande ?
(entoure la bonne réponse)

(carré)

petits carrés:	2
	3
	4
	5

(parallélogramme)

petits parallélogrammes:	3
	4
	6
	8

petits carrés:	4
	6
	8
	9

(triangle)

petits triangles:	2
	3
	4
	6

petits triangles:	3
	6
	7
	8
	9

petits parallélogrammes:	4	8
	6	9
	7	

Poser les opérations effectuées.

Pour peindre le petit carré, il faut 5 pots de peinture rouge.
Combien de pots pour le grand ?

Pour peindre le petit carré, il faut 6 pots de peinture verte.
Combien de pots pour le grand ?

Pour peindre le petit parallélogramme, il faut 5 pots de peinture jaune.
Combien de pots pour le grand ?

Pour peindre le petit parallélogramme, il faut 4 pots de peinture bleue.
Combien de pots pour le grand ?

Poser les opérations effectuées.

Pour peindre le petit triangle, il faut 1 pot de peinture blanche.
Combien de pots pour le grand?

Pour peindre le petit triangle, il faut 2 pots de peinture marron.
Combien de pots pour le grand?

Pour peindre le petit triangle, il faut 1 pot de peinture orange.
Combien de pots pour le grand?

Pour peindre le petit triangle, il faut 2 pots de peinture grise.
Combien de pots pour le grand?

Poser les opérations effectuées

la surface des petites figures est hachurée et voici leur mesure

la surface du petit rectangle mesure 5 cm^2 .
Combien mesure la surface du grand ?

la surface du petit parallélogramme mesure 5 cm^2 .
Combien mesure la surface du grand ?

la surface du petit parallélogramme mesure 5 cm^2 .
Combien mesure la surface du grand ?

Poser les opérations effectuées -

la surface des petites figures est tachurée et voici leur mesure

la surface du petit triangle mesure 1 cm^2 .
Combien mesure la surface du grand ?

la surface du petit triangle mesure 2 cm^2 .
Combien mesure la surface du grand ?

la surface du petit triangle mesure 1 cm^2 .
Combien mesure la surface du grand ?

la surface du petit triangle mesure 2 cm^2 .
Combien mesure la surface du grand ?

Dessine un rectangle
de même aire

Quel est le carré qui a une aire de 1 cm^2 ?

Combien de
carrés dans
le rectangle ?

On a déchiré un morceau. Combien de carrés
y avait-il dans le rectangle, lorsque 'il était entier ?

L'aire de ce rectangle est
 2 cm^2

Combien mesure la
 surface de ce rectangle ?

Voici un parallélogramme.

Dessine ici une surface qui
 ait une aire deux fois
 plus grande que ce para-
 léllogramme.