

SÉMINAIRE D'ANALYSE FONCTIONNELLE ÉCOLE POLYTECHNIQUE

Errata aux exposés 18 à 23

Séminaire d'analyse fonctionnelle (Polytechnique) (1969-1970), p. 0

http://www.numdam.org/item?id=SAF_1969-1970___A26_0

© Séminaire Maurey-Schwartz
(École Polytechnique), 1969-1970, tous droits réservés.

L'accès aux archives du séminaire d'analyse fonctionnelle implique l'accord avec les conditions générales d'utilisation (<http://www.numdam.org/conditions>). Toute utilisation commerciale ou impression systématique est constitutive d'une infraction pénale. Toute copie ou impression de ce fichier doit contenir la présente mention de copyright.

NUMDAM

Article numérisé dans le cadre du programme
Numérisation de documents anciens mathématiques
<http://www.numdam.org/>

E R R A T A

<u>Pages</u>	<u>Au lieu de :</u>	<u>Lire :</u>
XVIII.4 Ligne 6	P	p
XVIII.8 Ligne 6	partie disquée	corps convexe borné
XVIII.10 Ligne 2	Supprimer $\frac{1}{\sqrt{\frac{x}{2} + 1}}$	
XVIII.13 Ligne 11	$\forall n, \exists E_n \in \mathcal{E}_n$ et $\exists x \in A$ tels que	$\forall n, \forall E_n \in \mathcal{E}_n, \exists x \in A$ tel que
XX.5 Ligne 2 du bas	Ajouter : (Cf. Bonnesen et Fenchel)	
XX.7 Ligne 4 du bas	$\int_{S_k} \mu_{k-1} [E'((x_k, \frac{S_k^{-1}x}{a_{k-1}}))] d x_k$	$\int_{S_k} \mu_{k-1} [E'((x_k, \frac{S_k^{-1}x}{a_{k-1}}))] d x_k$
XXI.1 Ligne 4	probabilité	probabilisé
XXI.1 Ligne 6 du bas	$\sup\{X(x)(\omega) ; x \in S\} = +\infty$	$\sup\{ X(x)(\omega) ; x \in S\} = +\infty$
XXI.5 Ligne 6	X	\tilde{X}
XXI.11 Ligne 2 du bas	$\sum_n \text{card } \mathfrak{M}_n(3\alpha_n) \{s, t\} \in \mathfrak{M}_n(3\alpha_n) P\{\delta(X(s), X(t)) \geq b_n\} < +\infty$	
	lire $\sum_n \text{card } \mathfrak{M}_n(3\alpha_n) \sup_{\{s, t\} \in \mathfrak{M}_n(3\alpha_n)} P\{\delta(X(s), X(t)) \geq b_n\} < +\infty$	

Errata Séminaire L. Schwartz, N^{os} 18 à 23 (suite)

<u>Pages</u>	<u>Au lieu de :</u>	<u>Lire :</u>
XXII.7 Ligne 9 du bas	$(M_n, \frac{1}{2^n})$	la suite $(M_n, \frac{1}{2^n})_n$
XXII.9 Ligne 6	$x_i/\varepsilon \in \mathbb{Z}$	$x_i/\varepsilon \in \mathbb{Z}$
XXII.9 Ligne 3 du bas	$\varepsilon_i^* = 0$	$\varepsilon_i^* = -1$
XXII.12 Ligne 8	$(3\alpha_n, \sqrt{M_o + 1b_n})$	$(3\alpha_n, \sqrt{M_o + 1 b_n})$
XXII.12 Ligne 1 du bas		et $\sum_n \sqrt{\Phi(3\alpha_n)}$ sont
XXII.15 Ligne 6	$\alpha_n = 1/2^{n^k}$	$\alpha_n = 1/2^{2^{2^n}}$
XXII.20 Ligne 3 du bas	α_n -discernables	α_n U-discernables
XXII.23 Ligne 6 du bas	$P\{\omega; \sup_{x \in M_k} f(x)(\omega) \leq 1\}$	$F(1)P\{\omega; \sup_{x \in M_k} f(x)(\omega) \leq 1\}$
XXII.23 Ligne 2 du bas	$\frac{\lambda C}{\alpha_k} \exp[-2\pi C \lambda^2 (\frac{1}{\alpha_k})^2]$	$\frac{\lambda C}{\alpha_k} \exp[-4\pi \lambda^2 C^2 (\frac{1}{\alpha_k})^2]$
XXIII.9 Ligne 6	$a \neq 1$	$a > 1.$
