

SÉMINAIRE DELANGE-PISOT-POITOU. THÉORIE DES NOMBRES

PETER KARL JOSEF DRAXL

Fonctions L et représentation simultanée d'un nombre premier par plusieurs formes quadratiques

Séminaire Delange-Pisot-Poitou. Théorie des nombres, tome 12 (1970-1971), exp. n° 12,
p. 1-3

http://www.numdam.org/item?id=SDPP_1970-1971__12__A7_0

© Séminaire Delange-Pisot-Poitou. Théorie des nombres
(Secrétariat mathématique, Paris), 1970-1971, tous droits réservés.

L'accès aux archives de la collection « Séminaire Delange-Pisot-Poitou. Théorie des nombres » implique l'accord avec les conditions générales d'utilisation (<http://www.numdam.org/conditions>). Toute utilisation commerciale ou impression systématique est constitutive d'une infraction pénale. Toute copie ou impression de ce fichier doit contenir la présente mention de copyright.

NUMDAM

Article numérisé dans le cadre du programme
Numérisation de documents anciens mathématiques
<http://www.numdam.org/>

FONCTIONS L ET REPRÉSENTATION SIMULTANÉE D'UN NOMBRE PREMIER
PAR PLUSIEURS FORMES QUADRATIQUES

par Peter Karl Josef DRAXL

Soit $\underline{\mathbb{Z}}$ l'anneau des entiers rationnels, et soient

$$Q_i = \alpha_i \xi_i^2 + \beta_i \xi_i \eta_i + \gamma_i \eta_i^2 \quad (i = 1, \dots, r)$$

r formes quadratiques binaires entières (c'est-à-dire $\alpha_i, \beta_i, \gamma_i \in \underline{\mathbb{Z}}$ et $(\xi_i, \eta_i) \in \underline{\mathbb{Z}} \oplus \underline{\mathbb{Z}} = R_i$). Soient

$$\delta_i = \beta_i^2 - 4 \alpha_i \gamma_i \quad (i = 1, \dots, r)$$

leurs discriminants, et supposons

$$\delta_i \neq 1, \quad \delta_i \neq \delta_j \quad (\text{modulo les carrés rationnels}) \quad (1 \leq i, j \leq r; i \neq j).$$

Considérons maintenant R_i comme réseau entier dans l'espace vectoriel topologique $E_i = \underline{\mathbb{R}} \otimes_{\underline{\mathbb{Z}}} R_i$ ($\underline{\mathbb{R}}$ = corps des nombres réels), et choisissons, dans chaque E_i , un cône ouvert C_i avec l'origine comme sommet.

DÉFINITION. - Un nombre premier p est dit représenté simultanément par les formes Q_i par rapport aux cônes C_i , si on peut trouver r couples

$$(\xi_i, \eta_i) \in R_i \cap C_i \quad (i = 1, \dots, r),$$

tels qu'on ait $p = |\alpha_i \xi_i^2 + \beta_i \xi_i \eta_i + \gamma_i \eta_i^2|$ ($i = 1, \dots, r$).

On pose maintenant le problème suivant.

PROBLÈME 1. - Quelle est la densité (ou bien au sens de DIRICHLET, ou bien au sens de HADAMARD et de LA VALLÉE-POUSSIN) des nombres premiers p représentés simultanément par les formes Q_i par rapport aux cônes C_i donnés, plus précisément, est-ce que la densité est strictement positive ?

Comme la théorie des formes quadratiques binaires entières est essentiellement l'étude des entiers dans les corps quadratiques (d'après GAUSS), le problème 1 peut être considéré comme problème concernant r corps quadratiques distincts. Le nouveau problème se généralise de la façon suivante.

Soient k_i , r corps de nombres linéairement disjoints (c'est-à-dire r extensions finies du corps $\underline{\mathbb{Q}}$ des rationnels avec $[k:\underline{\mathbb{Q}}] = [k_1:\underline{\mathbb{Q}}] \times \dots \times [k_r:\underline{\mathbb{Q}}]$, où

k est le composé des corps k_i). Appelons

$$\phi_i : k_i \xrightarrow{c} \mathbb{R} \otimes_{\mathbb{Q}} k_i = E_i \quad (i = 1, \dots, r)$$

les plongements habituels. Choisissons, dans chaque E_i , un cône ouvert C_i avec l'origine comme sommet, et choisissons, dans chaque k_i , un rayon \mathcal{O}_i sans conditions par rapport aux places archimédiennes de k_i . Enfin, notons \mathfrak{N}_i la norme des idéaux par rapport à l'extension k_i/\mathbb{Q} ($i = 1, \dots, r$).

PROBLÈME 2. - Soient donnés r idéaux entiers \mathfrak{a}_i dans k_i . Alors, quelle est la densité des nombres premiers p , tels qu'on puisse écrire

$$p = \mathfrak{N}_i(\mathfrak{p}_i) \quad (i = 1, \dots, r)$$

avec des idéaux premiers \mathfrak{p}_i de k_i de la forme

$$\mathfrak{p}_i = \mathfrak{a}_i(\tau_i) \quad ((\tau_i) = \text{idéal principal engendré par } \tau_i \in k_i),$$

où $\tau_i \in \mathcal{O}_i$ et $\phi_i(\tau_i) \in C_i$, en particulier, est-ce que la densité est strictement positive ?

Dans le cas $r = 1$, le problème 2 a été étudié et résolu par E. HECKE (voir [4], p. 215-234 et p. 249-289) en utilisant les fonctions L avec "Größencharakteren". Dans le cas général, le problème 2 a été étudié par A. I. VINOGRADOV (voir [5]) et B. Z. MOROZ (voir la bibliographie dans [1]). Au lieu des fonctions L (au sens de HECKE), VINOGRADOV utilise les produits scalaires de fonctions L ordinaires (voir [5] et [1], Beispiel 2).

Le but de cet exposé était une étude du problème 2, plus profonde que celle faite dans [5], en utilisant les méthodes de [1]. Les détails seront publiés ultérieurement [3]. Un aspect de la discussion peut être trouvé dans mon exposé [2], où je me borne au cas $r = 2$ (ce qui suffit essentiellement).

BIBLIOGRAPHIE.

- [1] DRAXL (P. K. J.). - L-Funktionen algebraischer Tori, J. of Number Theory, t. 3, 1971, p. 444-467.
- [2] DRAXL (P. K. J.). - Remarques sur le groupe de classes du composé des deux corps de nombres linéairement disjoints, Séminaire Delange-Pisot-Poitou : Théorie des nombres, 12e année, 1970/71, n° 24.
- [3] DRAXL (P. K. J.). - Skalarprodukte Heckscher L-Reihen und Primzahlverteilung (en préparation).
- [4] HECKE (E.). - Mathematische Werke. - Göttingen, Vandenhoeck und Ruprecht, 1959.

- [5] VINOGRADOV (A. I.). - On extensions to the left halfplane of the scalar product of Hecke L-series with magnitude characters, Amer. math. Soc. Transl., Series 2, t. 82; 1969, p. 1-8.

(Texte reçu le 26 juin 1971)

Peter Karl Josef DRAXL
Université de Paris-Sud [Paris-XI]
Mathématiques, Bâtiment 425
91 - ORSAY
