SÉMINAIRE DE PROBABILITÉS (STRASBOURG)

JEAN-LIN JOURNÉ

PAUL-ANDRÉ MEYER

Une martingale d'opérateurs bornés, non représentable en intégrale stochastique

Séminaire de probabilités (Strasbourg), tome 20 (1986), p. 313-316

http://www.numdam.org/item?id=SPS_1986__20__313_0

© Springer-Verlag, Berlin Heidelberg New York, 1986, tous droits réservés.

L'accès aux archives du séminaire de probabilités (Strasbourg) (<http://portail.mathdoc.fr/SemProba/>) implique l'accord avec les conditions générales d'utilisation (<http://www.numdam.org/conditions>). Toute utilisation commerciale ou impression systématique est constitutive d'une infraction pénale. Toute copie ou impression de ce fichier doit contenir la présente mention de copyright.

NUMDAM

Article numérisé dans le cadre du programme
Numérisation de documents anciens mathématiques
<http://www.numdam.org/>

UNE MARTINGALE D'OPÉRATEURS BORNÉS, NON
REPRESENTABLE EN INTEGRALE STOCHASTIQUE

par J.L. Journé et P.A. Meyer

Dans la théorie des martingales d'opérateurs sur l'espace du mouvement brownien (ou l'espace de Fock si l'on préfère), décrite dans les exposés IV et V des << éléments de probabilités quantiques >> de ce volume (abrégé en [EPQ] ci-dessous), le mouvement brownien scalaire est remplacé par le trio (a_t^ε) , $\varepsilon = -, \circ, +$ des processus d'annihilation, de jauge (ou de nombre) et de création. Hudson et Parthasarathy ont conjecturé l'existence d'un théorème de représentation des martingales analogue au théorème classique pour les martingales scalaires, et ont établi ce théorème (avec Lindsay) pour le cas particulier des martingales de Hilbert-Schmidt.

Cette note montre que la représentation est impossible en général pour les martingales bornées : le contre-exemple (dû au premier auteur) est ici présenté sous un aspect différent de la rédaction initiale : il apparaît que les martingales représentables possèdent une propriété de variation quadratique plus forte que les martingales bornées générales.

1. Les notations sont celles de [EPQ] : rappelons que le trio (a^-, a°, a^+) est noté $(A, \Lambda, A^\dagger)$ chez Hudson-Parthasarathy, et que les vecteurs cohérents (pour nous $\mathcal{E}(u)$ ou simplement eu : ce sont les exponentielles stochastiques browniennes usuelles) sont notés chez eux $\psi(u)$.

Si u est un élément de $L^2(\mathbb{R}_+)$, u_t désigne $u|_{[0,t]}$, u_t désigne $u|_{[t,\infty[}$, plus rarement u_{st} désigne $u|_{[s,t]}$.

Soit M un opérateur borné ; son espérance conditionnelle M_t à l'instant t est un opérateur borné, qui agit sur les vecteur cohérents par

$$M_t eu = (E_t M eu_t) \cdot \mathcal{E}(u_t)$$

E_t est l'opérateur d'espérance conditionnelle brownien usuel, que l'on applique à la v.a. $M eu_t$, et le point $\cdot$ désigne un produit ordinaire de v.a.. On notera que $M_t eu$ n'est pas $\mathcal{F}_t$ -mesurable : du point de vue probabiliste, l'objet intéressant est le processus adapté $X_t = M_t eu_t$.

Nous désignons par $C^{1/2}$ l'algèbre des fonctions bornées sur $\mathbb{R}_+$, höldériennes d'exposant $1/2$.

Nous commençons par un lemme très simple.

LEMME 1. Pour $u, v \in L^2 \mathcal{N}^\infty$, les fonctions scalaires

$$F(t) = \langle \varepsilon v, M_t \varepsilon u_t \rangle = \langle \varepsilon v_t, M_t \varepsilon u_t \rangle$$

$$G(t) = \langle \varepsilon v, M_t \varepsilon u \rangle$$

appartiennent à $C^{1/2}$.

Dém. On a $\|\varepsilon u_t\|^2 = \exp(\|u_t\|^2)$ borné par $\exp(\|u\|^2)$, et pour $s < t$

$$\|\varepsilon u_t - \varepsilon u_s\|^2 = \|\varepsilon u_s\|^2 \|\varepsilon u_{st} - 1\|^2 = \exp(\|u_s\|^2)(\exp(\|u_{st}\|^2) - 1)$$

Comme u est bornée, le dernier facteur est majoré par $C|t-s|$. Donc la fonction $\varepsilon(u_t)$ appartient à l'espace $C^{1/2}$ (à valeurs hilbertiennes). Il en est de même de $M\varepsilon u_t$, et un raisonnement trivial de bilinéarité montre que $F(t)$ appartient à $C^{1/2}$ (scalaire). Quant à $G(t)$, on l'écrit

$$\langle \varepsilon(v_t) \varepsilon(v_{[t]}), (M_t \varepsilon(u_t)) \varepsilon(u_{[t]}) \rangle = F(t) \langle \varepsilon(v_{[t]}), \varepsilon(u_{[t]}) \rangle$$

Ce dernier facteur vaut $\exp(\int_t^\infty \bar{v}(s)u(s)ds)$: il est lipschitzien borné.

Le lemme 1 entraîne que le processus $X_t = M_t \varepsilon u_t$ est "scalairement à variation quadratique finie". Pour les martingales représentables, on a une propriété plus forte.

LEMME 2. Pour $u \in L^2 \mathcal{N}^\infty$, et si la martingale est représentable, la fonction X_t est à variation quadratique finie (en norme).

Dém. Il suffit de regarder séparément les fonctions

$$X_t^\varepsilon = M_t^\varepsilon \varepsilon u_t, \quad M_t^\varepsilon = \int_0^t H_s^\varepsilon da_s^\varepsilon$$

pour $\varepsilon = -, \circ, +$. Une variante des inégalités (17), (21), (24) de [EPQ], exposé V, nous donne pour $s < t$

$$\|M_t^\varepsilon \varepsilon u - M_s^\varepsilon \varepsilon u\|^2 \leq C(u) \int_s^t \|H_r^\varepsilon \varepsilon u\|^2 dr$$

où $C(u)$ ne dépend que des normes de u dans L^2 et L^∞ . Nous avons ensuite

$$X_t^\varepsilon - X_s^\varepsilon = (M_t^\varepsilon \varepsilon u_t - M_s^\varepsilon \varepsilon u_t) + (M_s^\varepsilon \varepsilon u_t - M_s^\varepsilon \varepsilon u_s)$$

Le premier terme se majore par l'inégalité précédente, en remplaçant u par u_t . Pour majorer le second, on l'écrit $(M_s \varepsilon u_s)(\varepsilon u_{st} - 1)$, dont la norme a pour carré

$$\|M_s \varepsilon u_s\|^2 (\exp(\int_s^t |u_r|^2 dr) - 1)$$

Le premier facteur est borné, le second en $C(t-s)$.

2. Nous allons maintenant construire une martingale bornée et un vecteur $u \in L^2 \mathcal{N}^\infty$ telle que X_t ne soit pas à variation quadratique finie.

Nous prendrons pour M la seconde quantification $\Phi(H)$ d'une contraction H de $L^2(\mathbb{R}_+)$: dans ce cas, $M\varepsilon u_t = \varepsilon H u_t$ et $M_t \varepsilon u_t = X_t$ vaut $\varepsilon((Hu_t)_t)$.

Nous prendrons pour H la restriction à $L^2(\mathbb{R}_+)$ de la transformation

de Hilbert sur $L^2(\mathbb{R})$ (autrement dit, pour $f \in L^2(\mathbb{R}_+)$, nous identifions f à un élément de $L^2(\mathbb{R})$ nul sur $\mathbb{R}_-$, nous prenons sa transformée de Hilbert sur $\mathbb{R}$ et la restreignons à $\mathbb{R}_+$) ; la transformation de Hilbert étant unitaire, H est bien une contraction. Voici Hf lorsque f est une fonction caractéristique d'intervalle $[\lambda, \mu]$

Nous prendrons pour u une fonction de la forme

avec $0 < \dots < a_n < b_n \dots < a_2 < b_2$, , $\lim_n b_n = \lim_n a_n = 0$;

u vaut 1 sur les intervalles $[b_3, a_2]$, $[b_4, a_3]$... $[b_{n+1}, a_n]$... et 0 partout ailleurs. Les longueurs des intervalles sont

$$(1) \quad |a_2 - b_2| = |a_2 - b_3| = 1/2 \log^2 2 \quad |a_n - b_n| = |a_n - b_{n+1}| = 1/n \log^2 n .$$

Ces valeurs importent peu pour l'instant. Nous avons

$$\sum_n \|M_{b_n} u_{b_n} - M_{a_n} u_{a_n}\|^2 = \sum_n \|e((Hu_{b_n})_{b_n}) - e((Hu_{a_n})_{a_n})\|^2$$

Mais en fait $u_{b_n} = u_{a_n}$: on peut donc écrire le terme de droite

$$\|e((Hu_{a_n})_{a_n})\|^2 \|e((Hu_{a_n})_{a_n b_n}) - 1\|^2$$

Le premier facteur est supérieur à 1 : la convergence de la série de gauche (qui a lieu si M est représentable) entraîne donc celle de la série

$$\sum_n \left[\exp \left(\int_{a_n}^{b_n} |Hu_{a_n}(s)|^2 ds \right) - 1 \right]$$

des seconds facteurs, puis celle de la série

$$(2) \quad \sum_n \int_{a_n}^{b_n} |Hu_{a_n}(s)|^2 ds .$$

Lorsque s appartient à l'intervalle $]a_n, b_n[$ (figure ci-dessus), on a

$$Hu_{a_n}(s) = \frac{1}{\pi} \log \frac{s - b_{n+1}}{s - a_n} \frac{s - b_{n+2}}{s - a_{n+1}} \dots \geq \frac{1}{\pi} \log \frac{s - b_{n+1}}{s}$$

Nous sommes donc ramenés à montrer la divergence de

$$\sum_n \int_{a_n}^{b_n} (\log(s - b_{n+1}) - \log s)^2 ds$$

Comme $\log s$ appartient à $L^2([0, b_2])$, on peut négliger ce terme, et

se limiter à établir la divergence de

$$\sum_n \int_{a_n}^{b_n} \log^2(s - b_{n+1}) ds$$

que nous minorons encore par $(b_n - a_n) \log^2(a_n - b_{n+1})$, c'est à dire

$$\sum_n \log^2(n \log^2 n) / n \log^2 n = +\infty .$$

La démonstration est achevée.