
ANNALES DE MATHÉMATIQUES PURES ET APPLIQUÉES.

**Questions résolues. Recherches sur le premier des deux problèmes
de géométrie proposés à la page 36 de ce volume**

Annales de Mathématiques pures et appliquées, tome 8 (1817-1818), p. 368-380

http://www.numdam.org/item?id=AMPA_1817-1818__8__368_1

© Annales de Mathématiques pures et appliquées, 1817-1818, tous droits réservés.

L'accès aux archives de la revue « Annales de Mathématiques pures et appliquées » implique l'accord avec les conditions générales d'utilisation (<http://www.numdam.org/conditions>). Toute utilisation commerciale ou impression systématique est constitutive d'une infraction pénale. Toute copie ou impression de ce fichier doit contenir la présente mention de copyright.

NUMDAM

Article numérisé dans le cadre du programme
Numérisation de documents anciens mathématiques

<http://www.numdam.org/>

QUESTIONS RÉSOLUES.

Recherches sur le premier des deux problèmes de géométrie proposés à la page 36 de ce volume ;

Par un ABONNÉ.



AVANT de nous occuper de la solution de ce problème , nous en généraliserons un peu l'énoncé , en le présentant ainsi qu'il suit :

PROBLÈME. Quelle est la courbe enveloppe de l'espace parcouru par une droite mobile , de grandeur invariable , constamment inscrite à une courbe plane donnée ? Quel est le lieu du sommet de l'angle mobile et variable , circonscrit à la même courbe , dont cette droite est la corde de contact ?

La difficulté du problème réside essentiellement dans sa première partie ; mais , bien qu'elle ne soit au fond qu'une pure difficulté de calcul , elle n'en paraît pas moins d'une nature assez grave ; et c'est peut-être cela seulement qui donne au problème quelque degré d'intérêt ; c'est une sorte d'énigme dont l'énoncé est très-court et très-clair ; mais dont le mot n'en est guère , pour cela , plus facile à découvrir. Nous allons essayer d'en pousser d'abord la solution aussi loin qu'elle puisse aller sans rien statuer sur la nature de la courbe donnée ; nous appliquerons ensuite nos formules générales au pro-

blème particulier qui avait été proposé. Nous nous attacherons principalement à donner à nos calculs et à leurs résultats une symétrie trop souvent négligée, et faute de laquelle le calculateur se décourage aisément, parce que ses formules ne lui offrent aucun moyen de reconnaître les méprises qu'il a pu commettre.

Solution. Supposons que la courbe donnée, rapportée à deux axes rectangulaires quelconques, ait pour équation

$$f(x, y) = Z = 0 ; \quad (1)$$

et soit zc la longueur de la corde mobile donnée.

Faisons, pour abrégier, les coefficients différentiels partiels

$$\left(\frac{dZ}{dx}\right) = X, \quad \left(\frac{dZ}{dy}\right) = Y ; \quad (2)$$

de manière que l'équation différentielle de la courbe soit

$$Xdz + Ydy = 0 . \quad (3)$$

Considérons la corde zc dans une situation déterminée quelconque. Soient alors (x', y') , (x'', y'') ses deux extrémités ; nous aurons

$$(x' - x'')^2 + (y' - y'')^2 = 4c^2 . \quad (I)$$

et, en différentiant,

$$(x' - x'')(dx' - dx'') + (y' - y'')(dy' - dy'') = 0 : \quad (4)$$

De plus, puisque cette corde est constamment inscrite à la courbe (1) ; nous devons avoir

$$f(x', y') = 0, \quad f(x'', y'') = 0 ;$$

c'est-à-dire, pour abrégier,

$$Z'=0 ; \quad (\text{II}) \quad Z''=0 ; \quad (\text{III})$$

et par suite

$$X'dx'+Y'dy'=0 ; \quad X''dx''+Y''dy''=0 . \quad (5)$$

Présentement, l'équation de la corde $2c$, considérée comme droite indéfinie, passant par les deux points (x', y') , (x'', y'') , est

$$(y'-y'')x-(x'-x'')y+(x'y''-y'x'')=0 , \quad (\text{IV})$$

dans laquelle les quatre paramètres x' , y' , x'' , y'' n'équivalent proprement qu'à un seul, puisqu'ils se trouvent liés par les trois relations (I, II, III). La différentielle de cette dernière équation est d'ailleurs, en considérant à la fois x' , y' , x'' , y'' comme variables, et x , y comme constans,

$$(x-x'')dy'-(x-x')dy''=(y-y'')dx'-(y-y')dx'' . \quad (6)$$

Suivant donc la théorie des enveloppes (exposée à la page 361 du III.^{me} volume de ce recueil), l'équation de la courbe demandée sera le résultat de l'élimination de x' , x'' , y' , y'' , dx' , dx'' , dy' , dy'' , entre les quatre équations (I ; II , III , IV) et leurs différentielles ; c'est-à-dire, entre les huit équations (I , II , III , IV , 4 , 5 , 6). A la vérité, elles ne sont qu'en nombre égal à celui des quantités à éliminer ; mais on doit remarquer que les quantités dx' , dy' , dx'' , dy'' , qui n'entrent qu'au premier degré dans les équations qui les renferment, se trouvent en affecter tous les termes ; de sorte que l'élimination de trois quelconques d'entre elles entraîne d'elle-même celle de la quatrième ; on obtiendra donc ainsi une équation finale en x' , y' , x'' , y'' , qui, jointe aux quatre équations (I , II , III , IV), suffira pour éliminer ces quatre coordonnées ; et leur élimination conduira à une équation en x , y qui sera l'équation demandée.

Procédons donc à l'élimination de dx' , dy' , dx'' , dy'' . En substituant, dans les équations (4, 6), les valeurs de dy' , dy'' , tirées des équations (5), elles deviendront

$$Y''\{Y'(x'-x'')-X'(y'-y'')\}dx' = Y'\{Y''(x'-x'')-X''(y'-y'')\}dx'',$$

$$Y''\{X'(x-x'')+Y'(y-y'')\}dx' = Y'\{X''(x-x'')+Y''(y-y'')\}dx'';$$

lesquelles, étant multipliées en croix, donneront, en réduisant,

$$\begin{aligned} & \{Y'(x'-x'')-X'(y'-y'')\}\{X''(x-x'')+Y''(y-y'')\} \\ & = \{Y''(x'-x'')-X''(y'-y'')\}\{X'(x-x'')+Y'(y-y'')\}; \end{aligned} \quad (V)$$

et telle est la dernière des cinq équations du problème, entre lesquelles il faudra éliminer les quatre quantités x' , y' , x'' , y'' , pour parvenir à l'équation de la courbe demandée.

La manière la plus commode d'employer ces équations sera d'éliminer d'abord entre elles y' , y'' ; il est aisé de comprendre que, dans les trois équations résultantes, x' , x'' entreront symétriquement; de sorte qu'en posant $x'+x''=t$, $x'x''=u$, on pourra les faire disparaître, et réduire ainsi le calcul à l'élimination de t , u , entre les trois équations résultantes.

Comme on passe très-facilement de l'ellipse à l'hyperbole et à la parabole, il nous suffira de considérer la première de ces trois courbes. Soit donc son équation

$$b^2x^2+a^2y^2-a^2b^2=Z=0,$$

d'où

$$X=2b^2x, \quad Y=2a^2y;$$

on trouvera, d'après cela, pour les cinq équations du problème,

$$(x' - x'')^2 + (y' - y'')^2 = 4c^2, \quad (\text{I})$$

$$b^2 x'^2 + a^2 y'^2 = a^2 b^2, \quad (\text{II})$$

$$b^2 x''^2 + a^2 y''^2 = a^2 b^2, \quad (\text{III})$$

$$(y' - y'')x - (x' - x'')y + (x'y'' - y'x'') = 0 \quad (\text{IV})$$

$$a^2 b^2 (x'y'' - y'x'') \{ (x' - x'')x + (y' - y'')y \} \quad (\text{V})$$

$$+ (a^2 - b^2)(x' - x'')(y' - y'')(b^2 x'x'' + a^2 y'y'') = 0.$$

L'élimination entre ces équations ne pouvant être que très-laboreuse, nous passerons de suite au cas du cercle, pour lequel on doit avoir $a = b = r$; les équations sont alors

$$(x' - x'')^2 + (y' - y'')^2 = 4c^2, \quad (\text{I})$$

$$x'^2 + y'^2 = r^2, \quad (\text{II}) \quad x''^2 + y''^2 = r^2 \quad (\text{III})$$

$$(y' - y'')x - (x' - x'')y + (x'y'' - y'x'') = 0; \quad (\text{IV})$$

$$(x'y'' - y'x'') \{ (x' - x'')x + (y' - y'')y \} = 0, \quad (\text{V})$$

En égalant le premier facteur de la dernière équation à zéro, on aurait

$$\frac{y'}{x'} = \frac{y''}{x''},$$

équation qui, combinée avec les équations (II, III), donnerait $x'' = \pm x'$, $y'' = \pm y'$; d'où $c = 0$ ou $c = r$; la courbe cherchée serait la courbe donnée elle-même, dans le premier cas, et dans le second, elle se réduirait à un point placé à l'origine: ce ne sont donc ici que des *solutions particulières*, de la nature de celles qui ont été signalées par M. Poncelet, à la page 229 du présent volume.

Rejetant

Rejetant donc ce premier facteur, l'équation (V) deviendra

$$(x' - x'')x + (y' - y'')y = 0 ; \quad (\text{V})$$

cette équation, combinée avec l'équation (IV), donnera

$$y' = \frac{x^2 + y^2 - xx'}{y}, \quad y'' = \frac{x^2 + y^2 - xx''}{y} ;$$

substituant ces valeurs dans les trois premières équations, elles deviendront

$$(x^2 + y^2)(x' - x'')^2 = 4c^2 y^2 ,$$

$$(x^2 + y^2)(x - x')^2 = y^2(r^2 - x^2 - y^2) ;$$

$$(x^2 + y^2)(x - x'')^2 = y^2(r^2 - x^2 - y^2) ;$$

des deux dernières on tire

$$x' = x \pm y \sqrt{\frac{r^2 - x^2 - y^2}{x^2 + y^2}}, \quad x'' = x \mp y \sqrt{\frac{r^2 - x^2 - y^2}{x^2 + y^2}} ;$$

c'est-à-dire que x' , x'' sont racines d'une même équation du second degré. On a, d'après cela,

$$x' - x'' = \pm 2y \sqrt{\frac{r^2 - x^2 - y^2}{x^2 + y^2}} ;$$

et en quarrant

$$(x' - x'')^2 = 4y^2 \cdot \frac{r^2 - x^2 - y^2}{x^2 + y^2} ;$$

mettant cette valeur dans la première équation, elle deviendra

$$x^2 + y^2 = r^2 - c^2 ,$$

qui est, en effet, la véritable solution du problème.

Pour deuxième exemple, prenons l'hyperbole équilatère ayant pour équation

$$2xy - a^2 = Z = 0 ;$$

qui donne

$$X = \left(\frac{dZ}{dx} \right) = 2y , \quad Y = \left(\frac{dZ}{dy} \right) = 2x .$$

Les équations du problème seront

$$(x' - x'')^2 + (y' - y'')^2 = 4c^2 , \quad (\text{I})$$

$$2x'y' = a^2 , \quad (\text{II}) \quad 2x''y'' = a^2 ; \quad (\text{III})$$

$$(y' - y'')x - (x' - x'')y + (x'y'' - y'x'') = 0 , \quad (\text{IV})$$

$$(x'y'' - x''y')[(x' - x'')x + (y' - y'')y] = (x'y'' + x''y')[(x' - x'')^2 - (y' - y'')^2] . \quad (\text{V})$$

Si, au moyen des équations (II , III), on chasse y' , y'' des trois autres, elles deviendront

$$(x' - x'')^2(4x'^2x''^2 + a^4) = 16c^2x'^2x''^2 ; \quad (\text{VI})$$

$$2yx'x'' + a^2x = a^2(x' + x'') , \quad (\text{VII})$$

$$2x'x''(x' + x'')(2xx'x'' - a^2y) = (x'^2 + x''^2)(4x'^2x'' - a^4) . \quad (\text{VIII})$$

Posant alors

$$x' + x'' = t , \quad x'y' = u ,$$

d'où

$$x'^2 + x''^2 = t^2 - 2u , \quad (x' - x'')^2 = t^2 - 4u ,$$

il viendra, en substituant

$$(t^2 - 4u)(4u^2 + a^4) = 16c^2u^2 ,$$

$$2yu + a^2x = a^2t ,$$

$$2tu(2xu - ay) = (t^2 - 2u)(4u^2 - a^4) ;$$

et la question sera réduite à éliminer t et u entre ces trois équations.

Tirant donc de la seconde valeur de t , pour la substituer dans les deux autres, elles deviendront

$$16y^2u^4 + 16a^2(xy - a^2)u^3 + 4a^4(x^2 + y^2 - 4c^2)u^2 + 4a^6(xy - a^2)u + a^8x^2 = 0 ,$$

$$16y^2u^4 + 8a^2(xy - a^2)u^3 - 2a^6(xy - a^2)u - a^8x^2 = 0 ;$$

mettant, pour abrégé, $2u$ pour a^2v , elles se changeront en celles-ci

$$y^2v^4 + 2(xy - a^2)v^3 + (x^2 + y^2 - 4c^2)v^2 + 2(xy - a^2)v + x^2 = 0 ;$$

$$y^2v^4 + (xy - a^2)v^3 - (xy - a^2)v - x^2 = 0 .$$

Faisant encore, pour abrégé,

$$x^2 = g , \quad x^2 + y^2 - 4c^2 = k ,$$

$$y^2 = h , \quad xy - a^2 = f ;$$

elles deviendront

$$hv^4 + 2fv^3 + kv^2 + 2fv + g = 0 ;$$

$$hv^4 + fv^3 - fv - g = 0 ;$$

éliminant v au moyen des multiplications successives, méthode préférable à toutes les autres, comme la plus simple et la plus symétrique, il viendra

$$f^2 \{ (6g - k)(4gh - f^2) - (6h - k)(2gk - 3f^2) \} \{ (6h - k)(4gh - f^2) - (6g - k)(2hk - 3f^2) \} \\ = \{ (4gh - f^2)^2 - (2gk - 3f^2)(2hk - 3f^2) \}^2 ;$$

en remettant pour f , g , h , k , les fonctions de x et y que ces lettres représentent, on obtiendrait l'équation de la courbe cherchée; mais on voit que, sauf les réductions, cette équation serait du 16.^me degré. Il est sans doute fort probable que cette équation se trouverait compliquée de facteurs étrangers; mais on conçoit que ces facteurs ne seraient point aisés à découvrir.

En conséquence, nous nous bornerons au seul cas où l'hyperbole équilatère dégénère en deux droites perpendiculaires l'une à l'autre; on a dans ce cas $a=0$; et les deux équations du 4.^me degré en v prennent cette forme

$$(1+v^2)(yv+x)^2=4c^2v^2,$$

$$(yv^3-x)(yv+x)=0.$$

Si, dans la dernière, on posait $yv+x=0$, la première donnerait $v=0$, d'où résulterait $x=0$, équation de l'axe des x ; il faut donc poser

$$yv^3-x=0, \text{ d'où } v=\sqrt[3]{\frac{x}{y}},$$

valeur qui, substituée dans la première, donne

$$\left(\frac{x}{2c}\right)^{\frac{2}{3}}+\left(\frac{y}{2c}\right)^{\frac{2}{3}}=1.$$

On voit, par la complication de cette équation, quelle aurait dû être celle de l'équation qui aurait répondu au cas général.

Pour dernier exemple, nous prendrons la parabole ayant pour équation

$$y^2-2px=Z=0;$$

nous aurons ainsi

$$X = \left(\frac{dZ}{dx} \right) = -2p, \quad Y = \left(\frac{dZ}{dy} \right) = 2y;$$

en conséquence, les équations du problème seront

$$(x' - x'')^2 + (y' - y'')^2 = 4c^2, \quad (I)$$

$$y'^2 = 2px', \quad (II) \quad y''^2 = 2px'', \quad (III)$$

$$(y' - y'')x - (x' - x'')y + (x'y'' - x''y') = 0, \quad (IV)$$

$$(p^2 - y'y'')(x' - x'')(y' - y'') + p(x' - x'')(x'y' - x''y'') = p(y' - y'')[(x' - x'')x + (y' - y'')y]. \quad (V)$$

Si, au moyen des équations (II, III), on élimine x' et x'' des trois autres, elles deviendront

$$(y' - y'')^2 [4p^2 + (y' + y'')^2] = 16c^2p^2;$$

$$y'y'' - y(y' + y'') + 2px = 0,$$

$$(y' + y'') \{ y'^2 - y'y'' + y''^2 + 2p(p - x) \} = 8p^2y;$$

posant

$$y' + y'' = t, \quad y'y'' = u,$$

d'où

$$(y' - y'')^2 = t^2 - 4u, \quad y'^2 - y'y'' + y''^2 = t^2 - 3u;$$

on aura ainsi, en substituant

$$(t^2 - 4u)(t^2 + 4p^2) = 16c^2p^2;$$

$$u - yt + 2px = 0,$$

$$t[t^2 - 3u + 2p(p - x)] = 8p^2y;$$

mettant dans la première et la troisième la valeur de u tirée de la seconde, il viendra

$$t^4 - 4yt^3 + 4p(2x + p)t^2 - 16p^2yt + 16p^2(2px - c^2) = 0;$$

$$t^3 - 3yt^2 + 2p(2x + p)t - 8p^2y = 0;$$

équations entre lesquelles il n'est plus question que d'éliminer t ; mais il est aisé de voir que l'équation finale pourra monter au 8.^me degré.

Cependant, comme la courbe ne peut être, dans le cas présent, que d'une nature très-simple, on doit croire que cette équation finale contiendra quelque facteur étranger, appartenant à une ou plusieurs solutions particulières du problème; et l'on voit ici l'inconvénient de nos procédés d'élimination qu'a signalé ailleurs M. Poncelet. (Voyez la page 230 de ce volume).

Il ne paraît pas qu'on puisse éluder ces difficultés, tant que l'on conservera le même mode d'opérer; mais on peut tenter d'autres voies pour parvenir au but. Reprenons l'équation de l'ellipse

$$\left(\frac{x}{a}\right)^2 + \left(\frac{y}{b}\right)^2 = 1; \quad (1)$$

soit

$$\frac{x}{A} + \frac{y}{B} = 1, \quad (2)$$

l'équation d'une droite indéterminée; en la combinant avec la première, on trouvera pour les coordonnées de leurs intersections

$$x = aA \cdot \frac{aB^2 \pm b\sqrt{a^2B^2 + b^2A^2 - A^2B^2}}{a^2B^2 + b^2A^2},$$

$$y = bB \cdot \frac{bA^2 \mp a\sqrt{a^2B^2 + b^2A^2 - A^2B^2}}{a^2B^2 + b^2A^2};$$

en exprimant donc que la corde interceptée est égale à $2c$, on aura l'équation de relation

$$a^2b^2(A^2 + B^2)(a^2B^2 + b^2A^2 - A^2B^2) = c^2(a^2B^2 + b^2A^2)^2, \quad (3)$$

au moyen de laquelle l'équation (2) deviendra celle d'une tangente à la courbe cherchée. Mais l'équation d'une tangente à une courbe, en un point (x', y') est, comme l'on sait,

$$(y - y')dx' - (x - x')dy' = 0,$$

ou

$$\frac{y}{y'dx' - x'dy'} - \frac{x}{y'dx' - x'dy'} = 1; \quad (4)$$

en exprimant donc que cette équation est identique avec l'équation (2), il viendra

$$A = - \frac{y'dx' - x'dy'}{dy'} , \quad B = + \frac{y'dx' - x'dy'}{dx'} ;$$

substituant ces valeurs dans l'équation (3), en supprimant les accens devenus désormais inutiles, on aura, pour l'équation différentielle de la courbe cherchée, en supprimant toutefois le facteur $(ydx - xdy)^4$ évidemment superflu,

$$a^2b^2(dx^2 + dy^2)\{(a^2dy^2 + b^2dx^2) - (ydx - xdy)^2\} = c^2(a^2dy^2 + b^2dx^2)^2. \quad (5)$$

Il s'agirait présentement de savoir quel est le plus facile de l'intégration de cette équation ou de l'élimination à laquelle nous avons d'abord réduit le problème.

Mais, de tous les moyens de parvenir au but, le plus brief; s'il n'était en même temps le plus difficile, serait, sans contredit, de deviner, d'après les conditions du problème, la nature de la courbe cherchée, de former une équation hypothétique de cette courbe, dans laquelle on introduirait des coefficients indéterminés, et d'assigner ensuite les valeurs de ces coefficients par la considération de divers cas particuliers.

Dans le cas où, par exemple, au lieu d'une courbe donnée, on a deux droites perpendiculaires entre elles; en considérant, 1.^o que ces deux droites doivent être des diamètres principaux de la courbe cherchée; 2.^o qu'aux valeurs $x=0$, $y=0$ doivent répondre respectivement $y = \pm 2c$, $x = \pm 2c$ ou $\pm \frac{y}{2c} = 1$, $\pm \frac{x}{2c} = 1$; on est conduit à soupçonner que l'équation de cette courbe pourrait bien être de la forme

$$\left(\frac{x^2}{4c^2}\right)^m + \left(\frac{y^2}{4c^2}\right)^m = 1;$$

si l'on remarque ensuite que, pour les valeurs égales de x et de y , on doit avoir $x=y = \frac{c}{\sqrt{2}}$ d'où $\frac{x}{2c} = \frac{y}{2c} = \frac{1}{2\sqrt{2}}$ et $\frac{x^2}{4c^2} = \frac{y^2}{4c^2} = \frac{1}{8}$, on aura

380 QUESTIONS PROPOSÉES.

$$2\left(\frac{1}{8}\right)^m = 1, \text{ ou } \left(\frac{1}{8}\right)^m = \frac{1}{2}, \text{ d'où } m = \frac{1}{3};$$

ce qui donne, comme nous l'avons déjà trouvé,

$$\left(\frac{x}{2c}\right)^{\frac{2}{3}} + \left(\frac{y}{2c}\right)^{\frac{2}{3}} = 1.$$

Voilà ce qu'il s'agirait de faire pour l'ellipse, à moins que quelqu'un n' imagine une voie plus commode encore pour parvenir au but.
