

Addendum au mémoire de Ph. Bourgeois (Déplacement spatial)

Les cahiers de l'analyse des données, tome 4, n° 2 (1979),
p. 218

http://www.numdam.org/item?id=CAD_1979__4_2_218_0

© Les cahiers de l'analyse des données, Dunod, 1979, tous droits réservés.

L'accès aux archives de la revue « Les cahiers de l'analyse des données » implique l'accord avec les conditions générales d'utilisation (<http://www.numdam.org/conditions>). Toute utilisation commerciale ou impression systématique est constitutive d'une infraction pénale. Toute copie ou impression de ce fichier doit contenir la présente mention de copyright.

NUMDAM

Article numérisé dans le cadre du programme
Numérisation de documents anciens mathématiques

<http://www.numdam.org/>

Addendum au mémoire de Ph. Bourgeois : Déplacement Spatial]
(cf Cah. Vol III ; 1978 ; n° 4 pp 440-448)

Dans le mémoire, on détermine une *isométrie* α rendant minimum l'écart entre un nuage M^I et le nuage αN^I déduit par déplacement d'un nuage N^I en correspondance biunivoque avec M^I . Or certaines applications (cf : [Conformation] *, § 1.2) requièrent de rechercher cet optimum en se bornant aux seuls *déplacements*, c'est-à-dire aux isométries de déterminant positif (conservant l'orientation de l'espace ; et reliées continûment à l'identité). Il y a dans [Déplacement Spatial] tous les éléments d'une solution à ce problème.

Reportons-nous aux §§ 4 & 5. Supposons d'abord S_{JJ}^J de rang maximum (Card J). Une isométrie unique α , permet de rendre $S_{JJ}^J(M, \alpha N)$ symétrique positif, et donc de le rendre diagonal positif dans un système d'axes convenable. Si α est direct ($\det(\alpha) > 0$) le problème est résolu. Sinon il faut composer α avec une autre isométrie inverse β , de sorte que $\beta \alpha N^I$ réalise l'optimum relatif aux déplacements ; c'est-à-dire que (cf *loc. cit.* § 4 p 444), que soit *maximum* :

$$ScO(M, \beta \alpha N) = \Sigma \{ S_{jj}^j(M, \alpha N) \mid j \in J \} ;$$

cette quantité ne peut être *stationnaire* que si β est diagonal ; car les valeurs extrémales de β_{jj}^j sont +1 et -1 atteintes seulement pour β diagonal ; β étant inverse, il faut qu'un nombre impair des β_{jj}^j vaille -1 (les autres valant 1). Pour rendre ScO maximum, on prendra un seul β_{jj}^j négatif : celui qui correspond au plus faible $S_{jj}^j = \lambda_{\min}$: et l'optimum s'en trouvera déplacé de $2\lambda_{\min}$. Dans le cas où S_{JJ}^J est dégénéré $\lambda_{\min} = 0$, on peut rendre α direct sans altérer l'optimum.

* article à paraître dans un des prochains cahiers.