

J. MURENT

Solution de la question 137

Nouvelles annales de mathématiques 1^{re} série, tome 6
(1847), p. 99-101

http://www.numdam.org/item?id=NAM_1847_1_6__99_1

© Nouvelles annales de mathématiques, 1847, tous droits réservés.

L'accès aux archives de la revue « Nouvelles annales de mathématiques » implique l'accord avec les conditions générales d'utilisation (<http://www.numdam.org/conditions>). Toute utilisation commerciale ou impression systématique est constitutive d'une infraction pénale. Toute copie ou impression de ce fichier doit contenir la présente mention de copyright.

NUMDAM

Article numérisé dans le cadre du programme
Numérisation de documents anciens mathématiques

<http://www.numdam.org/>

SOLUTION DE LA QUESTION 137 (t. V, p. 672).

PAR M. J. MURENT,
de Clermont-Ferrand.

THÉORÈME. L'enveloppe des bases de tous les triangles rectilignes qui ont un angle commun, et même périmètre, est un cercle.

Solution. Prenons pour axes des coordonnées, les côtés de l'angle fixe θ ; l'équation de la base dans l'une de ses positions sera :

$$ay + bx = ab \quad (1)$$

a et b étant les deux autres côtés du triangle, ou les deux segments interceptés par la base sur les deux côtés de l'angle fixe, à partir du sommet.

Exprimant que le périmètre est constant et égal à $2p$, on aura la relation

$$a + b + \sqrt{a^2 + b^2 - 2ab \cos \theta} = 2p,$$

ou, en chassant le radical et réduisant

$$(1 + \cos \theta) ab - 2p(a + b) + 2p^2 = 0,$$

ou bien encore, en remplaçant ab par sa valeur tirée de l'équation (1)

$$[2p - (1 + \cos \theta)x]b + [2p - (1 + \cos \theta)y]a = 2p^2; \quad (2)$$

pour avoir la troisième équation du problème, il faut, d'après la méthode connue (*Nouvelles Annales*, t. I, p. 282),

égaler les deux valeurs du rapport $\frac{f'_b}{f'_a}$ des dérivées des équations (1) et (2), prises par rapport à b et a . On a ainsi :

$$\frac{x-a}{y-b} = \frac{2p - (1 + \cos \theta)x}{2p - (1 + \cos \theta)y},$$

ou en réduisant

$$[2p - (1 + \cos \theta)x]b - [2p - (1 + \cos \theta)y]a = 2p(y-x); \quad (3)$$

il reste maintenant à éliminer a et b entre les équations (1), (2) et (3), et l'équation finale sera celle du lieu demandé. Or, en observant que les équations (2) et (3) donnent, l'une la somme, l'autre la différence de deux quantités, on a immédiatement

$$b = \frac{p(p+y-x)}{2p - (1 + \cos \theta)x} \quad a = \frac{p(p-y+x)}{2p - (1 + \cos \theta)y},$$

mettant ces deux valeurs dans l'équation (1), on a, toutes réductions faites,

$$y^2 + 2xy \cos \theta + x^2 - 2py - 2px + p^2 = 0;$$

équation qui représente un cercle. En y faisant successivement $x=0$, $y=0$, on obtient deux équations qui ont leurs racines égales à p : donc ce cercle est tangent aux deux côtés de l'angle fixe, en deux points distants du sommet de la quantité p moitié du périmètre. Le centre et le rayon s'obtiendront facilement, soit graphiquement, soit par le calcul.

2. En suivant la même méthode, il est aisé de démontrer cet autre théorème, analogue au précédent. *L'enveloppe des*

bases des triangles qui ont un angle commun et même surface, est une hyperbole ayant pour asymptotes les côtés de l'angle fixe.