

LE BESGUE

Théorème sur cinq nombres consécutifs

Nouvelles annales de mathématiques 1^{re} série, tome 19
(1860), p. 112-115

http://www.numdam.org/item?id=NAM_1860_1_19__112_0

© Nouvelles annales de mathématiques, 1860, tous droits réservés.

L'accès aux archives de la revue « Nouvelles annales de mathématiques » implique l'accord avec les conditions générales d'utilisation (<http://www.numdam.org/conditions>). Toute utilisation commerciale ou impression systématique est constitutive d'une infraction pénale. Toute copie ou impression de ce fichier doit contenir la présente mention de copyright.

NUMDAM

Article numérisé dans le cadre du programme
Numérisation de documents anciens mathématiques

<http://www.numdam.org/>

THÉORÈME SUR CINQ NOMBRES CONSÉCUTIFS

(voir p. 38);

PAR M. LE BESGUE.

THÉORÈME. *Le produit de cinq nombres consécutifs ne saurait être un carré.*

Démonstration. C'est un théorème connu que, si une puissance $n^{\text{ième}}$, savoir

$$A^n = \alpha^n \beta^n \gamma^n \dots (\alpha, \beta, \gamma, \dots, \text{premiers}),$$

est décomposée en facteurs premiers entre eux, chaque facteur sera une puissance $n^{\text{ième}}$.

De là suit que si dans un produit $A.B.C, \dots$, on met en évidence tous les facteurs premiers communs à plusieurs des nombres A, B, C, \dots , ainsi qu'il suit :

$$\begin{aligned} A &= 2^\alpha 3^\beta 5^\gamma \dots A', & B &= 2^{\alpha'} 3^{\beta'} 5^{\gamma'} \dots B', \\ C &= 2^{\alpha''} 3^{\beta''} 5^{\gamma''} \dots C' \dots, \end{aligned}$$

il faudra, 1^o que A', B', C', \dots soient des puissances $n^{\text{ièmes}}$, et 2^o que les sommes $\alpha + \alpha' + \alpha'' \dots, \beta + \beta' + \beta'' \dots, \gamma + \gamma' + \gamma'' \dots$, soient multiples de n .

Ceci posé, pour démontrer le théorème ci-dessus, il suffit de remarquer qu'il ne saurait y avoir d'autres facteurs premiers que 2 et 3 communs à plusieurs des cinq nombres consécutifs.

Voici les six seules hypothèses admissibles :

$$\begin{aligned} (1) \quad & \left\{ \begin{array}{lll} a = 3^\alpha a', & a + 1 = 2^\beta b', & a + 2 = c', \\ & a + 3 = 2^\gamma 3^\delta d', & a + 4 = e'; \end{array} \right. \\ (2) \quad & \left\{ \begin{array}{lll} a = a', & a + 1 = 2^\alpha 3^\beta b', & a + 2 = c', \\ & a + 3 = 2^\gamma d', & a + 4 = 3^\beta e'; \end{array} \right. \end{aligned}$$

$$(3) \begin{cases} a = a', & a + 1 = 2^\alpha b', & a + 2 = 3^\beta c', \\ & a + 3 = 2^\gamma d', & a + 4 = e'; \end{cases}$$

a étant impair.

$$(4) \begin{cases} a = 2^\alpha 3^\beta a', & a + 1 = b', & a + 2 = 2^\gamma c', \\ & a + 3 = 3^\delta d', & a + 4 = 2^\epsilon e'; \end{cases}$$

$$(5) \begin{cases} a = 2^\alpha a', & a + 1 = 3^\beta b', & a + 2 = 2^\gamma c', \\ & a + 3 = d', & a + 4 = 2^\delta 3^\epsilon e'; \end{cases}$$

$$(6) \begin{cases} a = 2^\alpha a', & a + 1 = b', & a + 2 = 2^\beta 3^\gamma c', \\ & a + 3 = d', & a + 4 = 2^\delta e'; \end{cases}$$

a étant pair.

Comme a' , b' , c' , d' , e' doivent être des carrés, l'hypothèse (1) est impossible, parce qu'elle donne

$$e' - c' = 2.$$

L'hypothèse (2) l'est aussi à cause de

$$c' - a' = 2.$$

L'hypothèse (3) l'est également à cause de

$$e' - a' = 4.$$

L'hypothèse (6) est impossible à cause de

$$d' - b' = 2.$$

L'hypothèse (4) est impossible, parce que b' étant un carré impair, a est divisible par 8; de là

$$\gamma = 1, \quad \epsilon = 2 \quad \text{et} \quad 4e' - b' = 3;$$

ce qui ne peut arriver que pour

$$e' = 1, \quad b' = 1;$$

ce qui n'est pas.

Enfin, l'hypothèse (5) donne d' carré impair; par suite a est de forme

$$8k + 6, \text{ donc } a = 1;$$

et comme on a

$$d' - 2a' = 3, \text{ d'où } d' + a' = 3(a' + 1),$$

on aurait une somme de deux carrés divisible par 3, ce qui est impossible; les nombres impairs non divisibles par 3 étant de forme

$$6n \pm 1,$$

ont un carré de forme

$$12n + 1,$$

et la somme de deux tels carrés est de forme

$$12m + 2,$$

non divisible par 3.

Ce même théorème a été démontré ainsi par M. Alvin, élève de l'institution Jauffret.

Lemme. Le produit $a(a+3)$ de deux nombres qui diffèrent de 3 n'est pas un carré.

Corollaire. $(n^2 - 4)(n^2 - 1)$ n'est pas un carré.

Théorème. Le produit

$$n - 2 . n - 1 . n . n + 1 . n + 2 = (n^2 - 4)(n^2 - 1) . n = P,$$

de cinq nombres consécutifs n'est pas un carré, 1° pour n impair; 2° pour n égal au produit d'un nombre impair n' par une puissance paire de 2 ($2^k, k > 0$). Dans ces deux cas, on est conduit à rendre $(n^2 - 4)(n^2 - 1)$ carré. 3°. Le produit P n'est pas un carré si $n = 2^{2(k+1)} n'$ ($k > 0, n'$ impair). Car la plus haute puissance de 2 qui divise P est $2^{2(k+1)+1}$. 4°. Pour n double d'un impair et de forme $8n' + 2$, on prouve par la considération du divi-

seur 3 (qui divise nécessairement un des nombres $n-1$, n , $n+1$), que $8n'+1$ et $8n'+4$ sont carrés conformément au lemme. 5°. Pour $n = 8n'+6$, la même considération du diviseur 3 montre que l'un des deux nombres $8n'+5$, $8n'+7$ ($n-1$, $n+1$) est carré; ce qui est impossible.

Il est donc prouvé que le produit P n'est jamais carré.