

CHARLES KESSLER

ÉMILE LEMOINE

Solution de la question 492

Nouvelles annales de mathématiques 1^{re} série, tome 19
(1860), p. 91-93

http://www.numdam.org/item?id=NAM_1860_1_19__91_1

© Nouvelles annales de mathématiques, 1860, tous droits réservés.

L'accès aux archives de la revue « Nouvelles annales de mathématiques » implique l'accord avec les conditions générales d'utilisation (<http://www.numdam.org/conditions>). Toute utilisation commerciale ou impression systématique est constitutive d'une infraction pénale. Toute copie ou impression de ce fichier doit contenir la présente mention de copyright.

NUMDAM

Article numérisé dans le cadre du programme
Numérisation de documents anciens mathématiques

<http://www.numdam.org/>

SOLUTION DE LA QUESTION 492

(voir t. XVIII, p. 448);

PAR MM. CHARLES KESSLER ET ÉMILE LEMOINE,
Élèves du Prytanée Militaire.

Lemme. Dans un triangle ABC si trois droites partant des sommets AK', BK'', CK''' se coupent au même point O (K' est sur BC, K'' est sur AC, K''' sur AB), on a

$$\frac{OK'}{AK'} + \frac{OK''}{BK''} + \frac{OK'''}{CK'''} = 1.$$

Si O est intérieur à ABC, on aura

$$\frac{OK'}{AK'} + \frac{OK''}{BK''} + \frac{OK'''}{CK'''} = 1;$$

si O est dans la partie de l'angle BAC extérieure à BC, on aura

$$\frac{OK''}{BK''} + \frac{OK'''}{CK'''} - \frac{OK'}{AK'} = 1;$$

si O est dans l'angle opposé au sommet à BAC, on

aura


$$\frac{OK'}{AK'} - \frac{OK''}{BK''} - \frac{OK'''}{CK'''} = 1;$$

et ainsi des autres.

(Ce théorème est proposé en exercice dans la *Géométrie* de Legendre revue par M. Blanchet et résolu dans les problèmes de géométrie élémentaire de M. Catalan.)

Cela posé, la solution de la question 492 n'en est plus qu'un corollaire très-simple.

Nous conservons les notations des *Nouvelles Annales*.



Joignons Ob , Oa , Oc ; joignons

AO qui coupe BC en K' ,
 BO » AC » K'' ,
 CO » AB » K''' .

Les deux triangles semblables $OK'a$, $AK'a'$ nous donnent

$$\frac{OA}{Aa'} = \frac{OK'}{AK'};$$

les deux triangles semblables $OK''b$ et $OK''b$ donnent

$$\frac{Ob}{Bb'} = \frac{OK''}{BK''};$$

les deux triangles semblables $OK'''c$ et $CK'''c'$ donnent

$$\frac{Oc}{Cc'} = \frac{OK'''}{CK'''}.$$

Ajoutant ces trois égalités membre à membre, on a

$$\frac{Oa}{Aa'} + \frac{Ob}{Bb'} + \frac{Oc}{Cc'} = \frac{OK'}{AK'} + \frac{OK''}{BK''} + \frac{OK'''}{CK'''} = 1.$$

C. Q. F. D.

Remarque. On verrait de même que si O était dans l'angle BAC en dehors du triangle ABC, on aurait

$$\frac{Ob}{Bb'} + \frac{Oc}{Cc'} - \frac{Oa}{Aa'} = 1,$$

et que si O était dans l'angle opposé au sommet de A, on aurait

$$\frac{Oa}{Aa'} - \frac{Ob}{Bb'} - \frac{Oc}{Cc'} = 1;$$

et ainsi pour les autres côtés.

Note. M. E. Martin, élève du lycée Louis-le-Grand, et M. Joseph Derbès, élève de l'institution Barbet, ont résolu la question de la même manière.