

Correspondance

Nouvelles annales de mathématiques 2^e série, tome 15 (1876), p. 132-134

http://www.numdam.org/item?id=NAM_1876_2_15__132_1

© Nouvelles annales de mathématiques, 1876, tous droits réservés.

L'accès aux archives de la revue « Nouvelles annales de mathématiques » implique l'accord avec les conditions générales d'utilisation (<http://www.numdam.org/conditions>). Toute utilisation commerciale ou impression systématique est constitutive d'une infraction pénale. Toute copie ou impression de ce fichier doit contenir la présente mention de copyright.

NUMDAM

Article numérisé dans le cadre du programme
Numérisation de documents anciens mathématiques

<http://www.numdam.org/>

CORRESPONDANCE.

1. *Extrait d'une lettre de M. C. Chadu*, professeur au Lycée de Mont-de-Marsan. — Voici quelques remarques sur la question 1143 : *Construire une parabole, connaissant le sommet, une tangente et un point.*

1° Le lieu des foyers des paraboles qui ont un sommet commun et qui sont tangentes à une droite donnée est une parabole; cette parabole a pour sommet le sommet donné, et pour axe la perpendiculaire abaissée du sommet sur la tangente donnée.

2° Le lieu des foyers des paraboles qui ont un sommet commun et un point commun est une cissoïde qui a pour point de rebroussement le sommet donné.

Ces deux lieux se coupent en deux points qui sont les foyers des quatre paraboles satisfaisant à la question.

De ce qui précède, on peut déduire la proposition suivante, qu'il serait intéressant d'établir directement :

« Lorsque le sommet d'une parabole et le point de rebroussement d'une cissoïde se confondent, ces deux courbes se coupent en deux points qui sont les foyers de quatre paraboles passant par un point donné et tangentes à une droite donnée. »

2. *Extrait d'une lettre de M. Desboves.* — Dans les formules proposées à la fin du dernier volume, il y a quelques fautes d'impression.

Ligne 8, page 509, *au lieu de*

$$y_1 = \frac{4Rr''}{r' + r}, \quad z_1 = \frac{4Rr'''}{r' + r},$$

lisez

$$y_1 = \frac{4Rr''}{r' + r''}, \quad z_1 = \frac{4Rr'''}{r' + r''}.$$

Ligne 18, *au lieu de*

$$x_1 \cos \frac{A}{2} = r', \quad \text{lisez} \quad x_1 \cos^2 \frac{A}{2} = r'.$$

Observation. — Outre les six cercles qui font l'objet des deux questions proposées, il y en a six autres, tangents aussi au cercle circonscrit au triangle et inscrits dans les six angles extérieurs $180 - A$, $180 - B$, $180 - C$. Si, par exemple, on considère les deux cercles inscrits dans les deux angles égaux à $180 - A$, et qu'on appelle x_2 et x'_2 les rayons de ces deux cercles, on a

$$x_2 \sin^2 \frac{A}{2} = r'', \quad x'_2 \sin^2 \frac{A}{2} = r'''.$$

Les trois dernières formules de la dernière question peuvent être remplacées par les trois suivantes, qui sont plus simples :

$$r' = \frac{4R + r}{4R + x_1} x_1, \quad r'' = \frac{4R + r}{4R + y_1} y_1, \quad r''' = \frac{4R + r}{4R + z_1} z_1,$$

et l'on peut ajouter à ces formules cette dernière :

$$\frac{1}{r} = \frac{1}{x_1} + \frac{1}{y_1} + \frac{1}{z_1} + \frac{1}{2R}.$$

3. M. Devin, élève en Mathématiques élémentaires au Lycée de Saint-Quentin, démontre très-exactement que, si deux bissectrices des angles d'un triangle sont égales entre elles, le triangle est isocèle. La démonstra-

tion de M. Devin consiste à faire voir qu'on est conduit à une contradiction en admettant que les deux bissectrices sont égales, et les angles divisés inégaux; mais le théorème dont il s'agit ici a déjà été démontré deux fois dans les *Nouvelles Annales*.

Antérieurement, M. Demartres nous a communiqué une démonstration très-simple de cette proposition plus générale, que : au plus grand angle d'un triangle correspond la plus petite bissectrice. Voici la démonstration de M. Demartres :

Soient BF, CD les bissectrices des angles B, C d'un triangle ABC, dans lequel on suppose $B > C$. L'angle BFC, extérieur au triangle ABF, est égal à $\hat{A} + \frac{\hat{B}}{2}$. De même,

$\hat{BDC} = \hat{A} + \frac{\hat{C}}{2}$, d'où $BFC > BDC$. Il en résulte que, si l'on fait passer une circonférence par les trois points B, F, C, le point D sera extérieur au cercle et la droite CD rencontrera la circonférence en un point M, situé entre C, D, de sorte qu'on aura $CM < CD$; mais, à cause de l'inégalité $\frac{C}{2} < \frac{B}{2}$, on a $\text{arc BM} < \text{arc CF}$, d'où $\text{arc BMF} < \text{arc CFM}$; corde $BF < \text{corde CM}$; et *a fortiori* $BF < CD$. Ce qu'il fallait démontrer.

Il résulte évidemment de cette proposition que, si les bissectrices BF, ED sont égales, les angles B et C sont égaux.