

# RENDICONTI *del* SEMINARIO MATEMATICO *della* UNIVERSITÀ DI PADOVA

GIOVANNI ZACHER

## **Sui gruppi finiti per cui il reticolo dei sottogruppi di composizione è distributivo**

*Rendiconti del Seminario Matematico della Università di Padova,*  
tome 27 (1957), p. 75-79

[http://www.numdam.org/item?id=RSMUP\\_1957\\_\\_27\\_\\_75\\_0](http://www.numdam.org/item?id=RSMUP_1957__27__75_0)

© Rendiconti del Seminario Matematico della Università di Padova, 1957, tous droits réservés.

L'accès aux archives de la revue « Rendiconti del Seminario Matematico della Università di Padova » (<http://rendiconti.math.unipd.it/>) implique l'accord avec les conditions générales d'utilisation (<http://www.numdam.org/conditions>). Toute utilisation commerciale ou impression systématique est constitutive d'une infraction pénale. Toute copie ou impression de ce fichier doit contenir la présente mention de copyright.

NUMDAM

*Article numérisé dans le cadre du programme  
Numérisation de documents anciens mathématiques*  
<http://www.numdam.org/>

# SUI GRUPPI FINITI PER CUI IL RETICOLO DEI SOTTOGRUPPI DI COMPOSIZIONE È DISTRIBUTIVO

*Nota (\*) di GIOVANNI ZACHER (a Padova)*

In due Note<sup>1)</sup> recenti Zappa ha caratterizzato i gruppi finiti risolubili, col reticolo dei sottogruppi di composizione distributivo ed i gruppi finiti a sottoreticolo di composizione modulare. In questa io assegno una caratterizzazione dei gruppi finiti (rivolubili o non) col reticolo dei sottogruppi di composizione distributivo, dimostrando il seguente teorema: *Affinchè un gruppo finito  $G$  abbia il reticolo dei sottogruppi di composizione distributivo è necessario e sufficiente che fra i fattoriali delle catene principali di  $G$  siano ciclici quelli che risultino essere anche  $p$ -gruppi.*

1. - Indichiamo con  $G$  un gruppo d'ordine finito e con  $\tilde{L}(G)$  il reticolo dei sottogruppi di composizione<sup>2)</sup> di  $G$ .

Supponiamo che il reticolo  $\tilde{L}(G)$  sia distributivo. Indichiamo con  $N_1, N_2$  due sottogruppi di composizione di  $G$ ,  $N_2$  essendo normale in  $N_1$ , e dimostreremo che in tali ipotesi  $\frac{N_1}{N_2}$  è ciclico, se è un  $p$ -gruppo.

Notiamo anzitutto che il reticolo dei sottogruppi di composizione di  $\frac{N_1}{N_2}$  è distributivo: ciò discende dal fatto che

---

(\*) Pervenuta in Redazione il 26 marzo 1957.

Indirizzo dell'A.: Seminario matematico, Università, Padova.

<sup>1)</sup> Si veggano le Note [3] e [4], i numeri fra parentesi quadre riferendosi alla bibliografia posta in fondo a questo mio lavoro.

<sup>2)</sup> Chiamasi sottogruppo di composizione di un gruppo  $G$ , un gruppo che fa parte di una catena normale di  $G$ .

$\tilde{L}(G)$  è distributivo e che se  $A \supset B$  sono due sottogruppi di  $G$ , con  $A$  sottogruppo di composizione di  $G$ ,  $B$  è anch'esso di composizione per  $G$  se, e solo se, è tale per  $A$ . Ci siamo così ricondotti a provare che se il reticolo  $\tilde{L}(H)$  di un  $p$ -gruppo  $H$  è distributivo,  $H$  è ciclico. E la cosa è immediata: allora infatti è distributivo anche il reticolo dei sottogruppi di composizione di  $\frac{H}{\Phi(H)}$ ,  $\Phi(H)$  essendo il gruppo di Frattini di  $H$ ; ma  $\tilde{L}\left(\frac{H}{\Phi(H)}\right)$  coincide col reticolo dei sottogruppi del gruppo abeliano  $\frac{H}{\Phi(H)}$ ; sicchè  $\frac{H}{\Phi(H)}$ , in quanto abeliano elementare e distributivo è d'ordine  $p$  ed  $H$ , come volevasi, è ciclico in virtù di un noto teorema di Burnside. La necessità della condizione enunciata discende, da quanto precede, come caso particolare.

**2.** - Ci proponiamo di dimostrare che viceversa se i  $p$ -gruppi fattoriali delle catene normali di un gruppo finito  $G$  sono ciclici, il reticolo  $\tilde{L}(G)$  è distributivo.

Ragionando per assurdo, supponiamo che  $\tilde{L}(G)$  non sia distributivo. Allora  $L(G)$ , che è modulare in virtù di un risultato di Zappa <sup>3)</sup>, contiene a norma di un teorema di Birkhoff <sup>4)</sup>, tre elementi distinti  $N_1, N_2, N_3$  che coprono un medesimo elemento  $Y$  e che sono coperti da uno stesso elemento  $Z$ :  $Y$  coincide quindi con ciascuna delle intersezioni  $N_1 \cap N_2, N_1 \cap N_3, N_2 \cap N_3$ , e  $Z$  con ciascuna delle unioni  $N_1 \cup N_2, N_1 \cup N_3, N_2 \cup N_3$ . Allora <sup>5)</sup>  $N_1 \cap N_2$  è un sottogruppo normale (in  $N_1$  ed  $N_2$  e quindi) in  $N_1 \cup N_2$ , ed  $N_1, N_2$  e  $N_3$  sono normali in  $N_1 \cup N_2$ . Pertanto

$$\begin{aligned} \frac{N_1 \cup N_2}{N_1 \cap N_3} &= \frac{N_1}{N_1 \cap N_2} \times \frac{N_2}{N_1 \cap N_2} = \\ &= \frac{N_1}{N_1 \cap N_2} \times \frac{N_3}{N_1 \cap N_2} = \frac{N_2}{N_1 \cap N_2} \times \frac{N_3}{N_1 \cap N_2} \end{aligned}$$

<sup>3)</sup> Vedasi [4].

<sup>4)</sup> Vedasi [1] pag. 134.

<sup>5)</sup> Vedasi [2] pag. 213.

i gruppi  $\frac{N_i}{N_1 \cap N_2}$  ( $i=1, 2, 3$ ) essendo semplici. Epperò  $\frac{N_1 \cup N_2}{N_1 \cap N_2}$  è un  $p$ -gruppo abeliano elementare d'ordine  $p^2$ , il che contraddice l'ipotesi di partenza.

Abbiamo pertanto il teorema: Condizione necessaria e sufficiente perchè il gruppo finito  $G$  abbia il reticolo dei sottogruppi di composizione distributivo è che fra i gruppi fattoriali delle catene normali siano ciclici quelli che risultino essere anche  $p$ -gruppi.

**3.** - Affiniamo ora la condizione sufficiente trovata, in guisa da ottenere completamente il risultato esposto nella prefazione. Supponiamo perciò che per il gruppo finito  $G$  risultino ciclici tutti quei gruppi fattoriali di catene principali che siano dei  $p$ -gruppi. *E per un tal gruppo  $G$  dimostriamo che ogni sottogruppo di composizione, se risolubile, ha ciclici i propri sottogruppi di Sylow ed è normale in  $G$ .*

Infatti se  $H$  è un tal sottogruppo di  $G$ , l'unione,  $T$ , dei coniugati di  $H$  in  $G$  non è soltanto normale in  $G$  ma <sup>6)</sup> è anche risolubile. Inoltre la catena  $G \supseteq T = T^{(0)} \supset T^{(1)} \supset \dots \supset T^{(v)} = 1$  dove  $T^{(i)}$  è il derivato  $i$ -esimo di  $T$ , è una catena principale di  $G$  ed i gruppi fattoriali  $\frac{T^{(i-1)}}{T^{(i)}}$  ( $i=1, 2, \dots, v$ ), abeliani senz'altro, sono anche ciclici in conseguenza dell'ipotesi fatta su  $G$ . Quindi  $T$  è supersolubile, epperò dispersibile <sup>7)</sup>. Di qui e dall'ipotesi fatta su  $G$  segue che i sottogruppi di Sylow sono ciclici.

Ma allora basta ricordare che in  $T$  ogni sottogruppo di composizione è caratteristico in  $T$  per concludere che  $H$  coincide con  $T$ .

Donde il lemma enunciato.

Ed ora siamo appunto in grado di dimostrare che nelle ipotesi attuali sul gruppo  $G$ , il reticolo  $\tilde{L}(G)$  è distributivo.

Allo scopo basterà far vedere (n.º 2) che allora quei gruppi

<sup>6)</sup> Vedasi [2] pag. 218.

<sup>7)</sup> Vedasi ad es. [5].

fattoriali di catene normali, che risultano  $p$ -gruppi, sono ciclici.

Procederemo per induzione rispetto al numero dei divisori primi dell'ordine di  $G$ .

Siano  $N_1, N_2$  due sottogruppi di composizione di  $G$  con  $N_2$  normale in  $N_1$  ed  $\frac{N_1}{N_2}$   $p$ -gruppo. Se  $N_2 = 1$ ,  $N_1$  risulta senz'altro ciclico, per il lemma. Possiamo pertanto supporre  $N_2 \supset N_1$ . Sia  $N$  un sottogruppo di composizione minimo di  $G$  contenuto in  $N_2$ . Se  $N$  è normale in  $G$ , le ipotesi del teorema sono soddisfatte anche per  $\frac{G}{N}$  epperò  $\frac{N_1}{N_2}$  è ciclico in quanto isomorfo al gruppo  $\frac{N_1/N}{N_2/N}$ , ciclico in virtù dell'ipotesi induttiva. Resta dunque il caso che  $N$  non sia normale in  $G$ . Allora, in virtù del lemma,  $N$  è un  $p$ -gruppo semplice e non abeliano. Consideriamo l'unione,  $T$ , dei coniugati di  $N$  in  $G$ . Il gruppo  $T$  è un prodotto diretto di gruppi isomorfi ad  $N$ <sup>8)</sup>. I gruppi  $T \cap N_1, T \cap N_2$  come sottogruppi di composizione di  $T$ , sono quindi prodotti diretti di gruppi isomorfi ad  $N$ . Il gruppo  $\frac{N_1 \cap T}{N_2 \cap T}$  non può quindi essere un  $p$ -gruppo; ma d'altra parte esso è isomorfo ad un sottogruppo di  $\frac{N_1}{N_2}$ , pertanto risulta necessariamente  $N_1 \cap T = N_2 \cap T$ . Da qui segue  $\frac{N_1}{N_2} \cong \frac{TN_1}{TN_2}$ <sup>9)</sup>. D'altra parte  $\frac{G}{T}$  soddisfa anch'esso alle ipotesi del teorema, sicchè, per l'ipotesi alla base del procedimento di induzione, il  $p$ -gruppo  $\frac{TN_1}{TN_2} \cong \frac{TN_1/T}{TN_2/T}$  è ciclico; epperò è tale anche il gruppo  $\frac{N_1}{N_2} \cong \frac{TN_1}{TN_2}$ . E il teorema è completamente dimostrato.

<sup>8)</sup> Vedasi [2] pag. 224.

<sup>9)</sup> Vedasi [6] pag. 71.

BIBLIOGRAFIA

- [1] G. BIRKHOFF: *Lattice Theory*. [American Math. Soc., 1948].
- [2] H. WIELANDT: *Eine Verallgemeinerung der invarianten Untergruppen*. [Math. Zeitschrift, vol. 45, pp. 209-244].
- [3] G. ZAPPA: *Sui gruppi finiti risolubli per cui il reticolo dei sottogruppi di composizione è distributivo*. [Boll. Un. Mat. Ital., serie III, Anno XI].
- [4] G. ZAPPA: *Sui gruppi finiti per cui il reticolo dei sottogruppi di composizione è modulare*. [ibidem, serie III, Anno XI].
- [5] G. ZAPPA: *Sui gruppi supersolubili*. [Rend. Sem. Mat. Univ. Roma, vol. 2].
- [6] W. SPECHT: *Gruppentheorie*. [Springer, Verlag, Berlin, 1956].