

# RENDICONTI *del* SEMINARIO MATEMATICO *della* UNIVERSITÀ DI PADOVA

VINICIO VILLANI

## **Sulla nozione di $q$ -convessità per gli spazi complessi non ridotti**

*Rendiconti del Seminario Matematico della Università di Padova*,  
tome 41 (1968), p. 326-331

[http://www.numdam.org/item?id=RSMUP\\_1968\\_\\_41\\_\\_326\\_0](http://www.numdam.org/item?id=RSMUP_1968__41__326_0)

© Rendiconti del Seminario Matematico della Università di Padova, 1968, tous droits réservés.

L'accès aux archives de la revue « Rendiconti del Seminario Matematico della Università di Padova » (<http://rendiconti.math.unipd.it/>) implique l'accord avec les conditions générales d'utilisation (<http://www.numdam.org/conditions>). Toute utilisation commerciale ou impression systématique est constitutive d'une infraction pénale. Toute copie ou impression de ce fichier doit contenir la présente mention de copyright.

NUMDAM

*Article numérisé dans le cadre du programme  
Numérisation de documents anciens mathématiques*  
<http://www.numdam.org/>

# SULLA NOZIONE DI $q$ -CONVESSITÀ PER GLI SPAZI COMPLESSI NON RIDOTTI

VINICIO VILLANI \*)

## 1. Introduzione.

Sia  $X$  uno spazio complesso (ridotto). Dato un intero positivo  $q$ , si dice che  $X$  è (*fortemente*)  $q$ -convesso se esiste su  $X$  una funzione  $\varphi$  a valori reali, differenziabile di classe  $C^\infty$ , tale che:

(I) per ogni  $c \in \mathbf{R}$ , l'insieme  $B_c = \{p \in X; \varphi(p) < c\}$  è relativamente compatto in  $X$ ;

(II) esiste un compatto  $K \subset X$ , tale che nei punti  $p \in X - K$  la funzione  $\varphi$  è *fortemente  $q$ -plurisubarmonica* (per la definizione di funzione fortemente  $q$ -plurisubarmonica, cfr. ad es. [4], § 4).

Se poi nella definizione precedente è possibile prendere  $K = \emptyset$ , lo spazio  $X$  si dice  $q$ -completo <sup>1)</sup>.

Andreotti e Grauert hanno provato in [1] che:

*Se  $X$  è  $q$ -convesso, sussiste la seguente proprietà:*

(A<sub>q</sub>) *Dato un arbitrario fascio coerente  $\mathcal{F}$  su  $X$ , si ha  $\dim_{\mathbf{C}} H^j(X, \mathcal{F}) < +\infty$ , per ogni intero  $j \geq q$ .*

---

\*) Lavoro eseguito nell'ambito dell'attività dei gruppi di ricerca matematica del Consiglio Nazionale delle Ricerche per l'anno 1967-68.

Indirizzo dell'A.: Istituto di Matematica, Via Alberti, 4 16132 Genova.

<sup>1)</sup> Per omogeneità con la terminologia usata nei lavori citati nella bibliografia, si è mantenuta qui la definizione di spazio  $q$ -convesso e di spazio  $q$ -completo, quale era stata introdotta originariamente in [1]. Nei lavori più recenti, gli stessi spazi sono detti abitualmente  $(q-1)$ -convessi e  $(q-1)$ -completi.

Se  $X$  è  $q$ -completo, sussiste la seguente proprietà:

( $B_q$ ) Dato un arbitrario fascio coerente  $\mathcal{F}$  su  $X$ , si ha  $H^j(X, \mathcal{F}) = 0$ , per ogni intero  $j \geq q$ .

Sia ora  $(X, \mathcal{H})$  uno spazio complesso generale (non necessariamente ridotto); sia  $(X, \mathcal{O})$  il corrispondente spazio complesso ridotto (cfr. ad es. [2]). Per definizione si dirà che  $(X, \mathcal{H})$  è  $q$ -convesso, rispettivamente  $q$ -completo, se  $(X, \mathcal{O})$  è  $q$ -convesso, rispettivamente  $q$ -completo, nel senso detto sopra.

Scopo di questo lavoro è dimostrare che i teoremi di Andreotti e Grauert sussistono più in generale anche per gli spazi complessi non ridotti. Precisamente:

**TEOREMA.** Sia  $(X, \mathcal{H})$  uno spazio complesso generale. Se  $(X, \mathcal{H})$  è  $q$ -convesso, per  $(X, \mathcal{H})$  sussiste la proprietà ( $A_q$ ). Se  $(X, \mathcal{H})$  è  $q$ -completo, per  $(X, \mathcal{H})$  sussiste la proprietà ( $B_q$ ).

Osservazione: Naturalmente i fasci  $\mathcal{F}$  che intervengono nelle proprietà ( $A_q$ ) e ( $B_q$ ) si intendono coerenti rispetto al fascio strutturale  $\mathcal{H}$ , e non necessariamente rispetto al fascio strutturale  $\mathcal{O}$  della corrispondente struttura ridotta di  $X$ .

## 2. Dimostrazione del teorema.

La dimostrazione per il caso  $q$ -completo è un'estensione banale del teorema 3 di [2], § 2; del resto la tesi relativa al caso  $q$ -convesso seguirà come caso particolare della dimostrazione che andiamo a dare per il caso  $q$ -convesso. Ricordiamo preliminarmente che se  $X$  è uno spazio (ridotto)  $q$ -convesso, si ha:

**LEMMA 1** (cfr. [1], Teorema 14). *Esiste un aperto  $B_0$  relativamente compatto in  $X$ , tale che l'omomorfismo naturale*

$$H^j(X, \mathcal{F}) \rightarrow H^j(B_0, \mathcal{F})$$

è bigettivo per ogni fascio coerente  $\mathcal{F}$  su  $X$ , e per ogni  $j \geq q$ .

Tenuto conto di questo lemma, possiamo provare il teorema per il caso  $q$ -convesso, estendendo opportunamente la dimostrazione del già citato teorema 3 di [2], § 2. Seguendo le notazioni di [2], indicheremo con  $\text{red}: \mathcal{H} \rightarrow \mathcal{O}$  l'applicazione naturale del fascio

strutturale di  $(X, \mathcal{H})$  sul fascio strutturale del corrispondente spazio ridotto. Sia  $\mathcal{H}^{(1)}$  il fascio nucleo dell'applicazione  $\text{red}: \mathcal{H} \rightarrow \bar{\mathcal{O}}$ ; quindi  $\mathcal{H}^{(1)}$  è un sottofascio di ideali di  $\mathcal{H}$ . Siano poi  $\mathcal{H}^{(\nu)}$  ( $\nu = 1, 2, \dots$ ) i sottofasci di ideali di  $\mathcal{H}$ , generati dagli elementi della forma  $\vartheta_1 \cdot \dots \cdot \vartheta_\nu$ , con  $\vartheta_1, \dots, \vartheta_\nu \in \mathcal{H}^{(1)}$ . Si ha:

$$\mathcal{H} \stackrel{\text{def.}}{=} \mathcal{H}^{(0)} \supset \mathcal{H}^{(1)} \supset \mathcal{H}^{(2)} \supset \dots$$

Sussiste il

**TEOREMA** (cfr. [2], § 1, Teorema 4). *In corrispondenza ad ogni sottoinsieme relativamente compatto  $B$  di  $X$  esiste un (minimo) intero  $k$ , tale che  $\mathcal{H}^{(k)}|_B = 0$ .*

Sia ora  $\mathcal{F}$  un fascio  $\mathcal{H}$ -coerente arbitrario su  $X$ ; poniamo  $\mathcal{F}^{(\nu)} = \mathcal{F} \cdot \mathcal{H}^{(\nu)}$ ; risulta quindi  $\mathcal{F}^{(0)} = \mathcal{F}$ . Si hanno le successioni esatte (per  $\nu = 0, 1, 2, \dots$ ):

$$(1_\nu) \quad 0 \rightarrow \mathcal{F}^{(\nu+1)} \rightarrow \mathcal{F}^{(\nu)} \rightarrow \mathcal{F}^{(\nu)}/\mathcal{F}^{(\nu+1)} \rightarrow 0.$$

I fasci  $\mathcal{F}^{(\nu)}/\mathcal{F}^{(\nu+1)}$  si possono interpretare come fasci analitici relativamente alla struttura ridotta  $(X, \bar{\mathcal{O}})$  e inoltre dal fatto che  $\mathcal{F}$  era  $\mathcal{H}$ -coerente segue che i fasci  $\mathcal{F}^{(\nu)}/\mathcal{F}^{(\nu+1)}$  sono  $\bar{\mathcal{O}}$ -coerenti.

Si considerino le successioni esatte di coomologia, associate alla successione esatta  $(1_\nu)$ , nelle dimensioni  $j \geq q$ :

$$(2_\nu) \quad H^j(X, \mathcal{F}^{(\nu+1)}) \xrightarrow{\alpha_\nu} H^j(X, \mathcal{F}^{(\nu)}) \xrightarrow{\beta_\nu} H^j(X, \mathcal{F}^{(\nu)}/\mathcal{F}^{(\nu+1)}).$$

Dai risultati di [1], valevoli per la struttura ridotta  $(X, \bar{\mathcal{O}})$ , risulta che gli  $H^j(X, \mathcal{F}^{(\nu)}/\mathcal{F}^{(\nu+1)})$  sono spazi vettoriali di dimensione finita su  $\mathbb{C}$ . Esiste quindi un numero finito di elementi  $\sigma_1^{(\nu)}, \dots, \sigma_{i_\nu}^{(\nu)} \in H^j(X, \mathcal{F}^{(\nu)})$ , le cui immagini nell'applicazione  $\beta_\nu$  generano tutto  $\beta_\nu(H^j(X, \mathcal{F}^{(\nu)}))$ , e pertanto ogni elemento  $\xi_\nu \in H^j(X, \mathcal{F}^{(\nu)})$  si potrà scrivere nella forma

$$(3_\nu) \quad \xi_\nu = \sum c_i^{(\nu)} \sigma_i^{(\nu)} + \xi_{\nu, 0},$$

con  $c_i^{(\nu)} \in \mathbb{C}$ , e con  $\xi_{\nu, 0} \in \text{Ker } \beta_\nu = \text{Im } \alpha_\nu$ .



Infatti per  $\nu \geq k$  la successione (2 <sub>$\nu$</sub> ) diviene semplicemente

$$(5) \quad H^j(X, \mathcal{F}^{(\nu+1)}) \xrightarrow{\alpha_\nu} H^j(X, \mathcal{F}^{(\nu)}) \rightarrow 0,$$

in quanto per costruzione  $\mathcal{F}^{(\nu)}/\mathcal{F}^{(\nu+1)}$  è un fascio  $\mathcal{O}$ -coerente che è nullo su  $B_0$  (per come è stato scelto  $k$ ) e quindi (per il lemma 1):

$$H^j(X, \mathcal{F}^{(\nu)}/\mathcal{F}^{(\nu+1)}) \simeq H^j(B_0, \mathcal{F}^{(\nu)}/\mathcal{F}^{(\nu+1)}) = H^j(B_0, 0) = 0.$$

A questo punto, per provare che  $H^j(X, \mathcal{F}^{(k)}) = 0$ , si può ripetere il ragionamento di Grauert [2], loc. cit., sfruttando le (5). A grandi linee, il ragionamento di Grauert è il seguente: si ricopre  $X$  mediante una successione crescente di aperti relativamente compatti  $B_0 (\subseteq B_1 (\subseteq B_2 (\subseteq \dots$ ; dato un elemento arbitrario  $\xi_k \in H^j(X, \mathcal{F}^{(k)})$ , tale  $\xi_k$  è rappresentabile su un opportuno ricoprimento  $\mathcal{U}$  di  $X$  mediante un cociclo, elemento di  $Z^j(\mathcal{U}, \mathcal{F}^{(k)})$ ; servendosi della surgettività delle (5) si vede che, su un opportuno raffinamento  $\mathcal{V}_1$  di  $\mathcal{U}$  tale cociclo è, a meno di un cobordo  $\delta\eta_1$ , l'immagine di un cociclo, elemento di  $Z^j(\mathcal{V}_1, \mathcal{F}^{(k+1)})$ ; ... Si ottiene così una successione di ricoprimenti  $\mathcal{V}_1, \mathcal{V}_2, \mathcal{V}_3, \dots$ , ognuno raffinamento del precedente, e una successione di cobordi  $\delta\eta_1, \delta\eta_2, \delta\eta_3, \dots$ . I ricoprimenti  $\mathcal{V}_1, \mathcal{V}_2, \mathcal{V}_3, \dots$  si possono scegliere in modo tale che esista un ricoprimento  $\mathcal{V}$ , raffinamento comune di tutti i ricoprimenti  $\mathcal{V}_i$ ; le  $(j-1)$ -cocatene  $\eta_1, \eta_2, \eta_3, \dots$  si possono interpretare come elementi di  $C^{j-1}(\mathcal{V}, \mathcal{F}^{(k)})$ . Ora in corrispondenza a ciascun  $B_i$  esiste un intero  $k_i$ , tale che per  $\nu \geq k_i$  si ha  $\mathcal{F}^{(\nu)}|B_i = 0$  (conseguenza del citato teorema 4 di [2], § 1) e quindi  $\eta_\nu|B_i = 0$  per  $\nu \geq k_i$ . Pertanto è ben definita la  $(j-1)$ -cocatena somma  $\eta = \sum_1^\infty \eta_i \in C^{j-1}(\mathcal{V}, \mathcal{F}^{(k)})$ , e la classe  $\xi_k$  è rappresentata, sul ricoprimento  $\mathcal{V}$ , da  $\delta\eta$ , cioè si tratta della classe nulla. Ciò prova precisamente che  $H^j(X, \mathcal{F}^{(k)}) = 0$ . Abbiamo così provato il teorema, relativamente al caso  $q$ -convesso. Il caso  $q$ -completo si deduce subito da quanto precede, osservando che in quest'ultimo caso le (5) sussistono per ogni  $k$ , e quindi risulta, prendendo  $k = 0$ :

$$H^j(X, \mathcal{F}) = H^j(X, \mathcal{F}^{(0)}) = 0 \quad \text{per ogni } j \geq q.$$

### BIBLIOGRAFIA

- [1] A. ANDREOTTI-H. GRAUERT, *Théorèmes de finitude pour la cohomologie des espaces complexes*. Bull. Soc. Math. de France, **90** (1962), 193-259.
- [2] H. GRAUERT, *Ein Theorem der analytischen Garbentheorie und die Modulräume komplexer Strukturen*. Publications mathématiques de l'Inst. des Hautes Etudes Scient., Paris, N. 5 (1960).
- [3] J. P. SERRE, *Faisceaux algébriques cohérents*. Annals of Math. **61** (1955), 197-278
- [4] V. VILLANI, *Cohomological properties of complex spaces which carry over to normalizations*. Am. Journ. of Math. **88** (1966), 636-645.

Manoscritto pervenuto in redazione il 12 agosto 1968.