

Bulletin

de la SOCIÉTÉ MATHÉMATIQUE DE FRANCE

TISSUS PLATS ET FEUILLETAGES HOMOGÈNES SUR LE PLAN PROJECTIF COMPLEXE

Samir Bedrouni & David Marín

**Tome 146
Fascicule 3**

2018

SOCIÉTÉ MATHÉMATIQUE DE FRANCE

Publié avec le concours du Centre national de la recherche scientifique

pages 479-516

Le *Bulletin de la Société Mathématique de France* est un périodique
trimestriel de la Société Mathématique de France.

Fascicule 3, tome 146, septembre 2018

Comité de rédaction

Christine BACHOC
Yann BUGEAUD
Jean-François DAT
Pascal HUBERT
Laurent MANIVEL

Julien MARCHÉ
Kieran O'GRADY
Emmanuel RUSS
Christophe SABOT

Marc HERZLICH (Dir.)

Diffusion

Maison de la SMF	AMS
Case 916 - Luminy	P.O. Box 6248
13288 Marseille Cedex 9	Providence RI 02940
France	USA
commandes@smf.emath.fr	http://www.ams.org

Tarifs

Vente au numéro : 43 € (\$ 64)

Abonnement électronique : 135 € (\$ 202),

avec supplément papier : Europe 179 €, hors Europe 197 € (\$ 296)

Des conditions spéciales sont accordées aux membres de la SMF.

Secrétariat

Bulletin de la Société Mathématique de France
Société Mathématique de France
Institut Henri Poincaré, 11, rue Pierre et Marie Curie
75231 Paris Cedex 05, France
Tél. : (33) 01 44 27 67 99
bulletin@smf.emath.fr • <http://smf.emath.fr>

© *Société Mathématique de France* 2018

Tous droits réservés (article L 122-4 du Code de la propriété intellectuelle). Toute représentation ou reproduction intégrale ou partielle faite sans le consentement de l'éditeur est illicite. Cette représentation ou reproduction par quelque procédé que ce soit constituerait une contrefaçon sanctionnée par les articles L 335-2 et suivants du CPI.

ISSN 0037-9484 (print) 2102-622X (electronic)

Directeur de la publication : Stéphane SEURET

TISSUS PLATS ET FEUILLETAGES HOMOGÈNES SUR LE PLAN PROJECTIF COMPLEXE

PAR SAMIR BEDROUNI & DAVID MARÍN

RÉSUMÉ. — Le but de ce travail est d'étudier les feuilletages du plan projectif complexe ayant une transformée de Legendre (tissu dual) plate. Nous établissons quelques critères effectifs de la platitude du d -tissu dual d'un feuilletage homogène de degré d et nous décrivons quelques exemples explicites. Ces résultats nous permettent de montrer qu'à automorphisme de $\mathbb{P}_{\mathbb{C}}^2$ près il y a 11 feuilletages homogènes de degré 3 ayant cette propriété. Nous verrons aussi qu'il est possible, sous certaines hypothèses, de ramener l'étude de la platitude du tissu dual d'un feuilletage inhomogène au cadre homogène. Nous obtenons quelques résultats de classification de feuilletages à singularités non-dégénérées et de transformée de Legendre plate.

ABSTRACT (*Flat webs and homogeneous foliations on the complex projective plane*). — The aim of this work is to study the foliations on the complex projective plane with flat Legendre transform (dual web). We establish some effective criteria for the flatness of the dual d -web of a homogeneous foliation of degree d and we describe some explicit examples. These results allow us to show that up to automorphism of $\mathbb{P}_{\mathbb{C}}^2$ there are 11 homogeneous foliations of degree 3 with flat dual web. We will see also that it is possible, under certain assumptions, to bring the study of flatness of the dual web of a general foliation to the homogeneous framework. We get some classification results about foliations with non-degenerate singularities and flat Legendre transform.

Texte reçu le 8 juillet 2016, modifié le 10 mars 2017, accepté le 10 mars 2017.

SAMIR BEDROUNI, Faculté de Mathématiques, USTHB, BP 32, El-Alia, 16111 Bab-Ezzouar, Alger, Algérie • *E-mail* : sbedrouni@usthb.dz

DAVID MARÍN, Departament de Matemàtiques Universitat Autònoma de Barcelona E-08193 Bellaterra (Barcelona) Spain • *E-mail* : davidmp@mat.uab.es

Classification mathématique par sujets (2010). — 14C21, 32S65, 53A60.

Mots clefs. — Tissu, platitude, transformation de Legendre, feuilletage homogène.

Introduction

Un d -tissu (régulier) $\mathcal{W}$ de $(\mathbb{C}^2, 0)$ est la donnée d'une famille $\{\mathcal{F}_1, \mathcal{F}_2, \dots, \mathcal{F}_d\}$ de feuilletages holomorphes réguliers de $(\mathbb{C}^2, 0)$ deux à deux transverses en l'origine. Le premier résultat significatif dans l'étude des tissus a été obtenu par W. Blaschke et J. Dubourdieu autour des années 1920. Ils ont montré ([3]) que tout 3-tissu régulier $\mathcal{W}$ de $(\mathbb{C}^2, 0)$ est conjugué, via un isomorphisme analytique de $(\mathbb{C}^2, 0)$, au 3-tissu trivial défini par $dx \cdot dy \cdot d(x + y)$, et cela sous l'hypothèse d'annulation d'une 2-forme différentielle $K(\mathcal{W})$ connue sous le nom de courbure de Blaschke de $\mathcal{W}$. La courbure d'un d -tissu $\mathcal{W}$ avec $d > 3$ se définit comme la somme des courbures de Blaschke des sous-3-tissus de $\mathcal{W}$. Un tissu de courbure nulle est dit plat. Cette notion est utile pour la classification des tissus de rang maximal; un résultat de N. Mihăileanu montre que la platitude est une condition nécessaire pour la maximalité du rang, voir par exemple [8, 14].

Depuis peu, l'étude des tissus globaux holomorphes définis sur les surfaces complexes a été réactualisée, voir par exemple [6, 12, 9]. Nous nous intéressons dans ce qui suit aux tissus du plan projectif complexe. Un d -tissu (global) sur $\mathbb{P}_{\mathbb{C}}^2$ est donné dans une carte affine (x, y) par une équation différentielle algébrique $F(x, y, y') = 0$, où $F(x, y, p) = \sum_{i=0}^d a_i(x, y)p^{d-i} \in \mathbb{C}[x, y, p]$ est un polynôme réduit à coefficient a_0 non identiquement nul. Au voisinage de tout point $z_0 = (x_0, y_0)$ tel que $a_0(x_0, y_0)\Delta(x_0, y_0) \neq 0$, où $\Delta(x, y)$ est le p -discriminant de F , les courbes intégrales de cette équation définissent un d -tissu régulier de $(\mathbb{C}^2, z_0)$.

La courbure d'un tissu $\mathcal{W}$ sur $\mathbb{P}_{\mathbb{C}}^2$ est une 2-forme méromorphe à pôles le long du discriminant $\Delta(\mathcal{W})$. La platitude d'un tissu $\mathcal{W}$ sur $\mathbb{P}_{\mathbb{C}}^2$ se caractérise par l'holomorphie de sa courbure $K(\mathcal{W})$ le long des points génériques de $\Delta(\mathcal{W})$, voir §1.2.

D. Marín et J. Pereira ont montré, dans [9], comment on peut associer à tout feuilletage $\mathcal{F}$ de degré d sur $\mathbb{P}_{\mathbb{C}}^2$, un d -tissu sur le plan projectif dual $\check{\mathbb{P}}_{\mathbb{C}}^2$, appelé *transformée de Legendre* de $\mathcal{F}$ et noté $\text{Leg}\mathcal{F}$; les feuilles de $\text{Leg}\mathcal{F}$ sont les droites tangentes aux feuilles de $\mathcal{F}$, voir §1.1.

L'ensemble des feuilletages de degré d sur $\mathbb{P}_{\mathbb{C}}^2$, noté $\mathbf{F}(d)$, s'identifie à un ouvert de Zariski dans un espace projectif de dimension $(d+2)^2 - 2$ sur lequel agit le groupe $\text{Aut}(\mathbb{P}_{\mathbb{C}}^2)$. Le sous-ensemble $\mathbf{FP}(d)$ de $\mathbf{F}(d)$ formé des $\mathcal{F} \in \mathbf{F}(d)$ tels que $\text{Leg}\mathcal{F}$ soit plat est un fermé de Zariski de $\mathbf{F}(d)$. La classification des feuilletages $\mathcal{F} \in \mathbf{FP}(d)$ modulo $\text{Aut}(\mathbb{P}_{\mathbb{C}}^2)$ reste entière. Le premier cas non trivial que l'on rencontre est celui où $d = 3$; on dispose actuellement d'une caractérisation géométrique ([2, Théorème 4.5]) des éléments de $\mathbf{FP}(3)$, mais ce résultat reste insuffisant pour avancer dans leur classification. C'est dans cette optique que nous nous proposons d'étudier cette question de platitude au niveau des éléments de $\mathbf{F}(d)$ qui sont *homogènes*, i.e. qui sont invariants par homothétie. En fait nous établirons, pour des feuilletages homogènes $\mathcal{H} \in \mathbf{F}(d)$, quelques critères effectifs de l'holomorphie de la courbure de $\text{Leg}\mathcal{H}$; de plus nous verrons (Proposition 6.4) que l'étude de la platitude de la transformée de

Legendre d'un feuilletage inhomogène se ramène, sous certaines hypothèses, au cadre homogène.

Un feuilletage homogène $\mathcal{H}$ de degré d sur $\mathbb{P}_{\mathbb{C}}^2$ est donné, pour un bon choix de coordonnées affines (x, y) , par une 1-forme homogène $\omega_d = A_d(x, y)dx + B_d(x, y)dy$, où $A_d, B_d \in \mathbb{C}[x, y]_d$ et $\text{pgcd}(A_d, B_d) = 1$.

L'homogénéité de $\mathcal{H}$ implique (voir [9, page 177]) que le discriminant de $\text{Leg}\mathcal{H}$ se décompose en produit de $(d-1)(d+2)$ droites comptées avec multiplicités ; certaines parmi elles sont invariantes par $\text{Leg}\mathcal{H}$ et d'autres non, i.e. sont transverses. De plus la multiplicité de $\Delta(\text{Leg}\mathcal{H})$ le long d'une droite transverse est comprise entre 1 et $d-1$; en degré 3 elle est donc soit minimale (égale à 1) soit maximale (égale à 2).

Le théorème 3.1 affirme que le d -tissu $\text{Leg}\mathcal{H}$ est plat si et seulement si sa courbure est holomorphe sur la partie transverse de $\Delta(\text{Leg}\mathcal{H})$.

Le théorème 3.5 (resp. théorème 3.8) contrôle de façon effective l'holomorphicité de la courbure $K(\text{Leg}\mathcal{H})$ le long d'une droite $\ell \subset \Delta(\text{Leg}\mathcal{H})$ non invariante par $\text{Leg}\mathcal{H}$ de multiplicité minimale 1 (resp. maximale $d-1$).

Ces théorèmes nous permettront de décrire certains feuilletages homogènes appartenant à $\mathbf{FP}(d)$ pour d arbitraire (Propositions 4.1, 4.2 et 4.3).

En combinant les théorèmes 3.1, 3.5 et 3.8 nous obtenons une caractérisation complète de la platitude de la transformée de Legendre d'un feuilletage homogène de degré 3 (Corollaire 3.10). Ce résultat nous permettra de classifier les éléments de $\mathbf{FP}(3)$ qui sont homogènes : *à automorphisme de $\mathbb{P}_{\mathbb{C}}^2$ près, il y a 11 feuilletages homogènes de degré 3 ayant une transformée de Legendre plate, voir théorème 5.1.*

En se basant essentiellement sur cette classification, nous obtenons un résultat (Théorème 6.1) qui sort du cadre homogène : *tout feuilletage $\mathcal{F} \in \mathbf{FP}(3)$ à singularités non-dégénérées (i.e. ayant pour nombre de Milnor 1) est linéairement conjugué au feuilletage de Fermat défini par la 1-forme $(x^3 - x)dy - (y^3 - y)dx$.*

Comme application du théorème 6.1 nous donnons une réponse partielle (Corollaire 6.9) à [9, Problème 9.1].

Remerciements. — Ce travail a été soutenu par le Programme National Exceptionnel du Ministère de l'Enseignement Supérieur et de la Recherche Scientifique d'Algérie, et par les projets MTM2011-26674-C02-01 et MTM2015-66165-P du Ministère d'Économie et Compétitivité de l'Espagne. Le premier auteur remercie le Département de Mathématiques de l'UAB pour son séjour. Il remercie également D. Smaï pour ses précieux conseils.

1. Préliminaires

1.1. Tissus. — Soit $k \geq 1$ un entier. Un k -tissu (*global*) $\mathcal{W}$ sur une surface complexe S est la donnée d'un recouvrement ouvert $(U_i)_{i \in I}$ de S et d'une collection de k -formes symétriques $\omega_i \in \text{Sym}^k \Omega_S^1(U_i)$, à zéros isolés, satisfaisant :

- (a) il existe $g_{ij} \in \mathcal{O}_S^*(U_i \cap U_j)$ tel que ω_i coïncide avec $g_{ij}\omega_j$ sur $U_i \cap U_j$;
- (b) en tout point générique m de U_i , $\omega_i(m)$ se factorise en produit de k formes linéaires deux à deux non colinéaires.

L'ensemble des points de S qui ne vérifient pas la condition (b) est appelé le *discriminant* de $\mathcal{W}$ et est noté $\Delta(\mathcal{W})$. Lorsque $k = 1$ cette condition est toujours vérifiée et on retrouve la définition usuelle d'un feuilletage holomorphe $\mathcal{F}$ sur S . Le cocycle (g_{ij}) définit un fibré en droites N sur S , appelé le *fibré normal* de $\mathcal{W}$, et les ω_i se recollent pour définir une section globale $\omega \in H^0(S, \text{Sym}^k \Omega_S^1 \otimes N)$.

Un k -tissu global $\mathcal{W}$ sur S sera dit *décomposable* s'il existe des tissus globaux $\mathcal{W}_1, \mathcal{W}_2$ sur S n'ayant pas de sous-tissus communs tels que $\mathcal{W}$ soit la superposition de $\mathcal{W}_1$ et $\mathcal{W}_2$; on écrira $\mathcal{W} = \mathcal{W}_1 \boxtimes \mathcal{W}_2$. Dans le cas contraire $\mathcal{W}$ sera dit *irréductible*. On dira que $\mathcal{W}$ est *complètement décomposable* s'il existe des feuilletages globaux $\mathcal{F}_1, \dots, \mathcal{F}_k$ sur S tels que $\mathcal{W} = \mathcal{F}_1 \boxtimes \dots \boxtimes \mathcal{F}_k$. Pour en savoir plus à ce sujet, nous renvoyons à [12].

On se restreindra dans ce travail au cas $S = \mathbb{P}_{\mathbb{C}}^2$. Se donner un k -tissu sur $\mathbb{P}_{\mathbb{C}}^2$ revient à se donner une k -forme symétrique polynomiale

$$\omega = \sum_{i+j=k} a_{ij}(x, y) dx^i dy^j,$$

à zéros isolés et de discriminant non identiquement nul. Ainsi tout k -tissu sur $\mathbb{P}_{\mathbb{C}}^2$ peut se lire dans une carte affine donnée (x, y) de $\mathbb{P}_{\mathbb{C}}^2$ par une équation différentielle polynomiale $F(x, y, y') = 0$ de degré k en y' . Un k -tissu $\mathcal{W}$ sur $\mathbb{P}_{\mathbb{C}}^2$ est dit de *degré* d si le nombre de points où une droite générique de $\mathbb{P}_{\mathbb{C}}^2$ est tangente à une feuille de $\mathcal{W}$ est égal à d ; c'est équivalent de dire que $\mathcal{W}$ est de fibré normal $N = \mathcal{O}_{\mathbb{P}_{\mathbb{C}}^2}(d + 2k)$. Il est bien connu, voir par exemple [12, Proposition 1.4.2], que les tissus de degré 0 sont les tissus algébriques (leurs feuilles sont les droites tangentes à une courbe algébrique réduite).

Les auteurs dans [9] ont associé, à tout k -tissu $\mathcal{W}$ de degré $d \geq 1$ sur $\mathbb{P}_{\mathbb{C}}^2$, un d -tissu de degré k sur le plan projectif dual $\check{\mathbb{P}}_{\mathbb{C}}^2$, appelé *transformée de Legendre* de $\mathcal{W}$ et noté $\text{Leg}\mathcal{W}$; les feuilles de $\text{Leg}\mathcal{W}$ sont les droites tangentes aux feuilles de $\mathcal{W}$. Plus explicitement, soit (x, y) une carte affine de $\mathbb{P}_{\mathbb{C}}^2$ et considérons la carte affine (p, q) de $\check{\mathbb{P}}_{\mathbb{C}}^2$ associée à la droite $\{y = px - q\} \subset \mathbb{P}_{\mathbb{C}}^2$. Soit $F(x, y; p) = 0$, $p = \frac{dy}{dx}$, une équation différentielle implicite décrivant $\mathcal{W}$; alors $\text{Leg}\mathcal{W}$ est donné par l'équation différentielle implicite

$$\check{F}(p, q; x) := F(x, px - q; p) = 0, \quad \text{avec} \quad x = \frac{dq}{dp}.$$

En particulier, si $\mathcal{F}$ est un feuilletage de degré $d \geq 1$ sur $\mathbb{P}_{\mathbb{C}}^2$ défini par une 1-forme $\omega = A(x, y)dx + B(x, y)dy$, où $A, B \in \mathbb{C}[x, y]$, $\text{pgcd}(A, B) = 1$, alors $\text{Leg}\mathcal{F}$ est le d -tissu irréductible de degré 1 de $\check{\mathbb{P}}_{\mathbb{C}}^2$ défini par

$$A(x, px - q) + pB(x, px - q) = 0, \quad \text{avec} \quad x = \frac{dq}{dp}.$$

Inversement, tout d -tissu irréductible de degré 1 sur $\check{\mathbb{P}}_{\mathbb{C}}^2$ est nécessairement la transformée de Legendre d'un certain feuilletage de degré d sur $\mathbb{P}_{\mathbb{C}}^2$ (voir [9]).

1.2. Courbure et platitude. — On rappelle ici la définition de la courbure d'un k -tissu $\mathcal{W}$. On suppose dans un premier temps que $\mathcal{W}$ est un germe de k -tissu de $(\mathbb{C}^2, 0)$ complètement décomposable, $\mathcal{W} = \mathcal{F}_1 \boxtimes \cdots \boxtimes \mathcal{F}_k$. Soit, pour tout $1 \leq i \leq k$, une 1-forme ω_i à singularité isolée en 0 définissant le feuilletage $\mathcal{F}_i$. D'après [13], pour tout triplet (r, s, t) avec $1 \leq r < s < t \leq k$, on définit $\eta_{rst} = \eta(\mathcal{F}_r \boxtimes \mathcal{F}_s \boxtimes \mathcal{F}_t)$ comme l'unique 1-forme méromorphe satisfaisant les égalités suivantes :

$$(1.1) \quad \begin{cases} d(\delta_{st} \omega_r) = \eta_{rst} \wedge \delta_{st} \omega_r \\ d(\delta_{tr} \omega_s) = \eta_{rst} \wedge \delta_{tr} \omega_s \\ d(\delta_{rs} \omega_t) = \eta_{rst} \wedge \delta_{rs} \omega_t \end{cases}$$

où δ_{ij} désigne la fonction définie par $\omega_i \wedge \omega_j = \delta_{ij} dx \wedge dy$. Comme chacune des 1-formes ω_i n'est définie qu'à multiplication près par un inversible de $\mathcal{O}(\mathbb{C}^2, 0)$, il en résulte que chacune des 1-formes η_{rst} est bien déterminée à l'addition près d'une 1-forme holomorphe fermée. Ainsi la 1-forme

$$(1.2) \quad \eta(\mathcal{W}) = \eta(\mathcal{F}_1 \boxtimes \cdots \boxtimes \mathcal{F}_k) = \sum_{1 \leq r < s < t \leq k} \eta_{rst}$$

est bien définie à l'addition près d'une 1-forme holomorphe fermée. La *courbure* du tissu $\mathcal{W} = \mathcal{F}_1 \boxtimes \cdots \boxtimes \mathcal{F}_k$ est par définition la 2-forme

$$K(\mathcal{W}) = K(\mathcal{F}_1 \boxtimes \cdots \boxtimes \mathcal{F}_k) = d\eta(\mathcal{W}).$$

On peut vérifier que $K(\mathcal{W})$ est une 2-forme méromorphe à pôles le long du discriminant $\Delta(\mathcal{W})$ de $\mathcal{W}$, canoniquement associée à $\mathcal{W}$; plus précisément, pour toute application holomorphe dominante φ , on a $K(\varphi^*\mathcal{W}) = \varphi^*K(\mathcal{W})$.

Si maintenant $\mathcal{W}$ est un k -tissu sur une surface complexe S (non forcément complètement décomposable), alors on peut le transformer en un k -tissu complètement décomposable au moyen d'un revêtement galoisien ramifié. L'invariance de la courbure de ce nouveau tissu par l'action du groupe de Galois permet de la redescendre en une 2-forme méromorphe globale sur S , à pôles le long du discriminant de $\mathcal{W}$ (voir [9]).

Un k -tissu $\mathcal{W}$ est dit *plat* si sa courbure $K(\mathcal{W})$ est identiquement nulle.

Signalons qu'un k -tissu $\mathcal{W}$ sur $\mathbb{P}_{\mathbb{C}}^2$ est plat si et seulement si sa courbure est holomorphe le long des points génériques des composantes irréductibles

de $\Delta(\mathcal{W})$. Ceci résulte de la définition de $K(\mathcal{W})$ et du fait qu'il n'existe pas de 2-forme holomorphe sur $\mathbb{P}_{\mathbb{C}}^2$ autre que la 2-forme nulle.

1.3. Singularités et diviseur d'inflexion d'un feuilletage du plan projectif. — Un feuilletage holomorphe $\mathcal{F}$ de degré d sur $\mathbb{P}_{\mathbb{C}}^2$ est défini par une 1-forme du type

$$\omega = a(x, y, z)dx + b(x, y, z)dy + c(x, y, z)dz,$$

où a, b et c sont des polynômes homogènes de degré $d+1$ sans facteur commun satisfaisant la condition d'Euler $i_R\omega = 0$, où $R = x\frac{\partial}{\partial x} + y\frac{\partial}{\partial y} + z\frac{\partial}{\partial z}$ désigne le champ radial et i_R le produit intérieur par R . Le *lieu singulier* $\text{Sing}\mathcal{F}$ de $\mathcal{F}$ est le projectivisé du lieu singulier de ω

$$\text{Sing}\omega = \{(x, y, z) \in \mathbb{C}^3 \mid a(x, y, z) = b(x, y, z) = c(x, y, z) = 0\}.$$

Rappelons quelques notions locales attachées au couple $(\mathcal{F}, s)$, où $s \in \text{Sing}\mathcal{F}$. Le germe de $\mathcal{F}$ en s est défini, à multiplication près par une unité de l'anneau local $\mathcal{O}_s$ en s , par un champ de vecteurs

$$X = A(u, v)\frac{\partial}{\partial u} + B(u, v)\frac{\partial}{\partial v}.$$

La *multiplicité algébrique* $\nu(\mathcal{F}, s)$ de $\mathcal{F}$ en s est donnée par

$$\nu(\mathcal{F}, s) = \min\{\nu(A, s), \nu(B, s)\},$$

où $\nu(g, s)$ désigne la multiplicité algébrique de la fonction g en s . L'*ordre de tangence* entre $\mathcal{F}$ et une droite générique passant par s est l'entier

$$\tau(\mathcal{F}, s) = \min\{k \geq \nu(\mathcal{F}, s) : \det(J_s^k X, R_s) \neq 0\},$$

où $J_s^k X$ est le k -jet de X en s et R_s est le champ radial centré en s . Le *nombre de Milnor* de $\mathcal{F}$ en s est l'entier

$$\mu(\mathcal{F}, s) = \dim_{\mathbb{C}} \mathcal{O}_s / \langle A, B \rangle,$$

où $\langle A, B \rangle$ désigne l'idéal de $\mathcal{O}_s$ engendré par A et B .

La singularité s est dite *radiale d'ordre* $n-1$ si $\nu(\mathcal{F}, s) = 1$ et $\tau(\mathcal{F}, s) = n$.

La singularité s est dite *non-dégénérée* si $\mu(\mathcal{F}, s) = 1$, c'est équivalent de dire que la partie linéaire $J_s^1 X$ de X possède deux valeurs propres λ, μ non nulles. La quantité $\text{BB}(\mathcal{F}, s) = \frac{\lambda}{\mu} + \frac{\mu}{\lambda} + 2$ est appelée l'*invariant de Baum-Bott* de $\mathcal{F}$ en s (voir [1]). D'après [5] il passe par s au moins un germe de courbe $\mathcal{C}$ invariante par $\mathcal{F}$; à isomorphisme local près, on peut se ramener à $s = (0, 0)$, $T_s \mathcal{C} = \{v = 0\}$ et $J_s^1 X = \lambda u \frac{\partial}{\partial u} + (\varepsilon u + \mu v) \frac{\partial}{\partial v}$, où l'on peut prendre $\varepsilon = 0$ si $\lambda \neq \mu$. La quantité $\text{CS}(\mathcal{F}, \mathcal{C}, s) = \frac{\lambda}{\mu}$ est appelée l'*indice de Camacho-Sad* de $\mathcal{F}$ en s par rapport à $\mathcal{C}$.

Rappelons la notion du diviseur d'inflexion de $\mathcal{F}$. Soit $Z = E\frac{\partial}{\partial x} + F\frac{\partial}{\partial y} + G\frac{\partial}{\partial z}$ un champ de vecteurs homogène de degré d sur $\mathbb{C}^3$ non colinéaire au champ radial décrivant $\mathcal{F}$, i.e. tel que $\omega = i_R i_Z dx \wedge dy \wedge dz$. Le *diviseur d'inflexion*

de $\mathcal{F}$, noté $I_{\mathcal{F}}$, est le diviseur défini par l'équation

$$(1.3) \quad \begin{vmatrix} x & E & Z(E) \\ y & F & Z(F) \\ z & G & Z(G) \end{vmatrix} = 0.$$

Ce diviseur a été étudié dans [11] dans un contexte plus général. En particulier, les propriétés suivantes ont été prouvées.

1. Sur $\mathbb{P}_{\mathbb{C}}^2 \setminus \text{Sing}\mathcal{F}$, $I_{\mathcal{F}}$ coïncide avec la courbe décrite par les points d'inflexion des feuilles de $\mathcal{F}$.
2. Si $\mathcal{C}$ est une courbe algébrique irréductible invariante par $\mathcal{F}$, alors $\mathcal{C} \subset I_{\mathcal{F}}$ si et seulement si $\mathcal{C}$ est une droite invariante.
3. $I_{\mathcal{F}}$ peut se décomposer en $I_{\mathcal{F}} = I_{\mathcal{F}}^{\text{inv}} + I_{\mathcal{F}}^{\text{tr}}$, où le support de $I_{\mathcal{F}}^{\text{inv}}$ est constitué de l'ensemble des droites invariantes par $\mathcal{F}$ et où le support de $I_{\mathcal{F}}^{\text{tr}}$ est l'adhérence des points d'inflexion qui sont isolés le long des feuilles de $\mathcal{F}$.
4. Le degré du diviseur $I_{\mathcal{F}}$ est $3d$.

Le feuilletage $\mathcal{F}$ sera dit *convexe* si son diviseur d'inflexion $I_{\mathcal{F}}$ est totalement invariant par $\mathcal{F}$, i.e. si $I_{\mathcal{F}}$ est le produit de droites invariantes.

L'application de Gauss est l'application rationnelle $\mathcal{G}_{\mathcal{F}} : \mathbb{P}_{\mathbb{C}}^2 \dashrightarrow \check{\mathbb{P}}_{\mathbb{C}}^2$ qui à un point régulier m associe la droite tangente $T_m\mathcal{F}$. Si $\mathcal{C} \subset \mathbb{P}_{\mathbb{C}}^2$ est une courbe passant par certains points singuliers de $\mathcal{F}$, on définit $\mathcal{G}_{\mathcal{F}}(\mathcal{C})$ comme étant l'adhérence de $\mathcal{G}_{\mathcal{F}}(\mathcal{C} \setminus \text{Sing}\mathcal{F})$. Il résulte de [2, Lemme 2.2] que

$$(1.4) \quad \Delta(\text{Leg}\mathcal{F}) = \mathcal{G}_{\mathcal{F}}(I_{\mathcal{F}}^{\text{tr}}) \cup \check{\Sigma}_{\mathcal{F}},$$

où $\check{\Sigma}_{\mathcal{F}}$ désigne l'ensemble des droites duales des points de $\Sigma_{\mathcal{F}} := \{s \in \text{Sing}\mathcal{F} : \tau(\mathcal{F}, s) \geq 2\}$.

2. Géométrie des feuilletages homogènes

DÉFINITION 2.1. — Un feuilletage de degré d sur $\mathbb{P}_{\mathbb{C}}^2$ est dit *homogène* s'il existe une carte affine (x, y) de $\mathbb{P}_{\mathbb{C}}^2$ dans laquelle il est invariant sous l'action du groupe des homothéties $(x, y) \mapsto \lambda(x, y)$, $\lambda \in \mathbb{C}^*$.

Un tel feuilletage $\mathcal{H}$ est alors défini par une 1-forme

$$\omega = A(x, y)dx + B(x, y)dy,$$

où A et B sont des polynômes homogènes de degré d sans facteur commun. Cette 1-forme s'écrit en coordonnées homogènes

$$zA(x, y)dx + zB(x, y)dy - (xA(x, y) + yB(x, y))dz.$$

Ainsi le feuilletage $\mathcal{H}$ a au plus $d + 2$ singularités dont l'origine O de la carte affine $z = 1$ est le seul point singulier de $\mathcal{H}$ qui n'est pas situé sur la droite à l'infini $L_{\infty} = (z = 0)$; de plus $\nu(\mathcal{H}, O) = d$.

Dorénavant nous supposons que d est supérieur ou égal à 2. Dans ce cas le point O est la seule singularité de $\mathcal{H}$ de multiplicité algébrique d .

Le champ de vecteurs homogène $-B(x, y)\frac{\partial}{\partial x} + A(x, y)\frac{\partial}{\partial y} + 0\frac{\partial}{\partial z}$ définit aussi le feuilletage $\mathcal{H}$ car est dans le noyau de la 1-forme précédente. Notons $A_x = \frac{\partial A}{\partial x}$, $A_y = \frac{\partial A}{\partial y}$, $B_x = \frac{\partial B}{\partial x}$, $B_y = \frac{\partial B}{\partial y}$; d'après la formule (1.3), le diviseur d'inflexion $I_{\mathcal{H}}$ de $\mathcal{H}$ est donné par

$$\begin{aligned} 0 &= \begin{vmatrix} x-B & BB_x - AB_y \\ y & A & AA_y - BA_x \\ z & 0 & 0 \end{vmatrix} = z \begin{vmatrix} -\frac{1}{d}(xB_x + yB_y) & BB_x - AB_y \\ \frac{1}{d}(xA_x + yA_y) & AA_y - BA_x \end{vmatrix} \\ &= \frac{z}{d}(xA + yB)(A_x B_y - A_y B_x) = \frac{z}{d}C_{\mathcal{H}}D_{\mathcal{H}}, \end{aligned}$$

où $C_{\mathcal{H}} = xA + yB \in \mathbb{C}[x, y]_{d+1}$ désigne le cône tangent de $\mathcal{H}$ en l'origine O et $D_{\mathcal{H}} = A_x B_y - A_y B_x \in \mathbb{C}[x, y]_{2d-2}$.

Il en résulte que :

- (i) le support du diviseur $I_{\mathcal{H}}^{\text{inv}}$ est constitué des droites du cône tangent $C_{\mathcal{H}} = 0$ et de la droite à l'infini L_{∞} ;
- (ii) le diviseur $I_{\mathcal{H}}^{\text{tr}}$ se décompose sous la forme $I_{\mathcal{H}}^{\text{tr}} = \prod_{i=1}^n T_i^{\rho_i-1}$ pour un certain nombre $n \leq \deg D_{\mathcal{H}} = 2d-2$ de droites T_i passant par O , $\rho_i - 1$ étant l'ordre d'inflexion de la droite T_i . Lorsque $\rho_i = 2$ on parle d'une droite d'inflexion simple pour $\mathcal{H}$, lorsque $\rho_i = 3$ d'une droite d'inflexion double, etc.

PROPOSITION 2.2. — *Avec les notations précédentes, pour tout point singulier $s \in \text{Sing}\mathcal{H} \cap L_{\infty}$, nous avons*

1. $\nu(\mathcal{H}, s) = 1$;
2. la droite L_s passant par l'origine O et le point s est invariante par $\mathcal{H}$ et elle apparaît avec multiplicité $\tau(\mathcal{H}, s) - 1$ dans le diviseur $D_{\mathcal{H}} = 0$, i.e.

$$D_{\mathcal{H}} = I_{\mathcal{H}}^{\text{tr}} \prod_{s \in \text{Sing}\mathcal{H} \cap L_{\infty}} L_s^{\tau(\mathcal{H}, s)-1}.$$

Démonstration. — Soit s un point singulier de $\mathcal{H}$ sur $L_{\infty} = (z = 0)$. Sans perte de généralité, nous pouvons supposer que les coordonnées homogènes de s sont de la forme $[x_0 : 1 : 0]$, $x_0 \in \mathbb{C}$. Dans la carte affine $y = 1$, $\mathcal{H}$ est décrit par la 1-forme

$$\theta = zA(x, 1)dx - (xA(x, 1) + B(x, 1))dz;$$

la condition $s \in \text{Sing}\mathcal{H}$ est équivalente à $B(x_0, 1) = -x_0 A(x_0, 1)$. L'égalité $\text{pgcd}(A, B) = 1$ implique alors que $A(x_0, 1) \neq 0$; d'où $\nu(\mathcal{H}, s) = 1$.

Montrons la seconde assertion. Le fait que

$$\theta = A(x, 1)(z d(x - x_0) - (x - x_0)dz) - (x_0 A(x, 1) + B(x, 1))dz$$

entraîne que

$$\tau := \tau(\mathcal{H}, s) = \min\{k \geq 1 : J_{x_0}^k(x_0 A(x, 1) + B(x, 1)) \neq 0\},$$

cela permet d'écrire $x_0 A(x, 1) + B(x, 1) = \sum_{k=\tau}^d c_k(x - x_0)^k$, avec $c_\tau \neq 0$. Par suite

$$B(x, y) = (x - x_0 y)^\tau P(x, y) - x_0 A(x, y),$$

où $P(x, y) = \sum_{k=0}^{d-\tau} c_{k+\tau}(x - x_0 y)^k y^{d-\tau-k}$.

Un calcul élémentaire montre que $D_{\mathcal{H}} = A_x B_y - A_y B_x$ est de la forme $D_{\mathcal{H}} = -(x - x_0 y)^{\tau-1} Q(x, y)$, avec $Q \in \mathbb{C}[x, y]$ et

$$Q(x_0, 1) = \tau P(x_0, 1) (xA_x + yA_y) \Big|_{(x,y)=(x_0,1)}.$$

Comme $P(x_0, 1) = c_\tau$ et $xA_x + yA_y = dA$, $Q(x_0, 1) = \tau c_\tau dA(x_0, 1) \neq 0$. $\square$

DÉFINITION 2.3. — Soit $\mathcal{H}$ un feuilletage homogène de degré d sur $\mathbb{P}_{\mathbb{C}}^2$ ayant un certain nombre $m \leq d + 1$ de singularités radiales s_i d'ordre $\tau_i - 1$, $2 \leq \tau_i \leq d$ pour $i = 1, 2, \dots, m$. Le support du diviseur $I_{\mathcal{H}}^{\text{tr}}$ est constitué d'un certain nombre $n \leq 2d - 2$ de droites d'inflexion transverses T_j d'ordre $\rho_j - 1$, $2 \leq \rho_j \leq d$ pour $j = 1, 2, \dots, n$. On définit le *type du feuilletage* $\mathcal{H}$ par

$$\begin{aligned} \mathcal{T}_{\mathcal{H}} &= \sum_{i=1}^m R_{\tau_i-1} + \sum_{j=1}^n T_{\rho_j-1} \\ &= \sum_{k=1}^{d-1} (r_k \cdot R_k + t_k \cdot T_k) \in \mathbb{Z}[R_1, R_2, \dots, R_{d-1}, T_1, T_2, \dots, T_{d-1}] \end{aligned}$$

et le *degré du type* $\mathcal{T}_{\mathcal{H}}$ par $\deg \mathcal{T}_{\mathcal{H}} = \sum_{k=1}^{d-1} (r_k + t_k) \in \mathbb{N} \setminus \{0, 1\}$; c'est le nombre de droites distinctes qui composent le diviseur $D_{\mathcal{H}}$.

EXEMPLE 2.4. — Considérons le feuilletage homogène $\mathcal{H}$ de degré 5 sur $\mathbb{P}_{\mathbb{C}}^2$ défini par

$$\omega = y^5 dx + 2x^3(3x^2 - 5y^2)dy.$$

Un calcul élémentaire conduit à

$$C_{\mathcal{H}} = xy(6x^4 - 10x^2y^2 + y^4) \text{ et } D_{\mathcal{H}} = 150x^2y^4(x - y)(x + y);$$

on constate que l'ensemble des singularités radiales de $\mathcal{H}$ est constitué des deux points $[0 : 1 : 0]$ et $[1 : 0 : 0]$; leurs ordres de radialité sont égaux respectivement à 2 et 4. De plus le support du diviseur $I_{\mathcal{H}}^{\text{tr}}$ est formé des deux droites d'équations $x - y = 0$ et $x + y = 0$; ce sont des droites d'inflexion transverses simples. Donc le feuilletage $\mathcal{H}$ est du type $\mathcal{T}_{\mathcal{H}} = 1 \cdot R_2 + 1 \cdot R_4 + 2 \cdot T_1$ et le degré de $\mathcal{T}_{\mathcal{H}}$ est $\deg \mathcal{T}_{\mathcal{H}} = 4$.

À tout feuilletage homogène $\mathcal{H}$ de degré d sur $\mathbb{P}_{\mathbb{C}}^2$ on peut associer une application rationnelle $\underline{\mathcal{G}}_{\mathcal{H}} : \mathbb{P}_{\mathbb{C}}^1 \rightarrow \mathbb{P}_{\mathbb{C}}^1$ de la façon suivante : si $\mathcal{H}$ est décrit par $\omega = A(x, y)dx + B(x, y)dy$, A et B désignant des polynômes homogènes de degré d sans facteur commun, on définit $\underline{\mathcal{G}}_{\mathcal{H}}$ par

$$\underline{\mathcal{G}}_{\mathcal{H}}([x : y]) = [-A(x, y) : B(x, y)];$$

il est clair que cette définition ne dépend pas du choix de la 1-forme homogène ω décrivant le feuilletage $\mathcal{H}$.

Dorénavant nous noterons l'application $\underline{\mathcal{G}}_{\mathcal{H}}$ simplement par $\underline{\mathcal{G}}$. Le feuilletage homogène $\mathcal{H}$ ainsi que son tissu dual $\text{Leg}\mathcal{H}$ peuvent être décrits analytiquement en utilisant uniquement l'application $\underline{\mathcal{G}}$. En effet, la pente p de $T_{(x,y)}\mathcal{H}$ est donnée par $\underline{\mathcal{G}}([x : y]) = [p : 1]$ et les pentes x_i ($i = 1, \dots, d$) de $T_{(p,q)}\text{Leg}\mathcal{H}$ sont données par $x_i = \frac{q}{p - p_i(p)}$, avec $\underline{\mathcal{G}}^{-1}([p : 1]) = \{[p_i(p) : 1]\}$.

En carte affine $\mathbb{C} \subset \mathbb{P}_{\mathbb{C}}^1$ cette application s'écrit $\underline{\mathcal{G}} : z \mapsto -\frac{A(1,z)}{B(1,z)}$. On a

$$\underline{\mathcal{G}}(z) - z = -\frac{A(1, z) + zB(1, z)}{B(1, z)} = -\frac{C_{\mathcal{H}}(1, z)}{B(1, z)};$$

de plus, les identités $dA = xA_x + yA_y$ et $dB = xB_x + yB_y$ permettent de réécrire $D_{\mathcal{H}}$ sous la forme $D_{\mathcal{H}} = -\frac{d}{x}(BA_y - AB_y)$ de sorte que

$$\underline{\mathcal{G}}'(z) = -\left(\frac{BA_y - AB_y}{B^2}\right)\Big|_{(x,y)=(1,z)} = \frac{D_{\mathcal{H}}(1, z)}{dB^2(1, z)}.$$

On en déduit immédiatement les propriétés suivantes :

1. les points fixes de $\underline{\mathcal{G}}$ correspondent au cône tangent de $\mathcal{H}$ en l'origine O (i.e. $[a : b] \in \mathbb{P}_{\mathbb{C}}^1$ est fixe par $\underline{\mathcal{G}}$ si et seulement si la droite d'équation $by - ax = 0$ est invariante par $\mathcal{H}$);
2. le point $[a : b] \in \mathbb{P}_{\mathbb{C}}^1$ est critique fixe par $\underline{\mathcal{G}}$ si et seulement si le point $[b : a : 0] \in L_{\infty}$ est singulier radial de $\mathcal{H}$. La multiplicité du point critique $[a : b]$ de $\underline{\mathcal{G}}$ est exactement égale à l'ordre de radialité de la singularité à l'infini;
3. le point $[a : b] \in \mathbb{P}_{\mathbb{C}}^1$ est critique non fixe par $\underline{\mathcal{G}}$ si et seulement si la droite d'équation $by - ax = 0$ est une droite d'inflexion transverse pour $\mathcal{H}$. La multiplicité du point critique $[a : b]$ de $\underline{\mathcal{G}}$ est précisément égale à l'ordre d'inflexion de cette droite.

REMARQUE 2.5. — Pour qu'un feuilletage homogène de degré $d \geq 2$ sur $\mathbb{P}_{\mathbb{C}}^2$ soit convexe de type $(2d-2) \cdot R_1$ il faut que $d \in \{2, 3\}$, car tout feuilletage homogène de degré d sur $\mathbb{P}_{\mathbb{C}}^2$ a au plus $d+1$ points singuliers à l'infini. En fait, même en degré $d \in \{2, 3\}$, le type $(2d-2) \cdot R_1$ ne se produit pas. Ceci découle du fait bien connu qu'une application rationnelle de la sphère de Riemann dans elle-même a au moins un point fixe non critique (voir par exemple [10, Théorème 12.4]).

3. Étude de la platitude du tissu dual d'un feuilletage homogène

La Proposition 3.2 de [2] est un critère de la platitude de la transformée de Legendre d'un feuilletage homogène de degré 3. Notre premier résultat généralise ce critère en degré arbitraire.

THÉOREME 3.1. — *Soit $\mathcal{H}$ un feuilletage homogène de degré $d \geq 3$ sur $\mathbb{P}_{\mathbb{C}}^2$. Alors le d -tissu $\text{Leg}\mathcal{H}$ est plat si et seulement si sa courbure $K(\text{Leg}\mathcal{H})$ est holomorphe sur $\mathcal{G}_{\mathcal{H}}(\text{I}_{\mathcal{H}}^{\text{tr}})$.*

Dans tout ce qui suit, $\mathcal{H}$ désigne un feuilletage homogène de degré $d \geq 3$ sur $\mathbb{P}_{\mathbb{C}}^2$ défini, en carte affine (x, y) , par la 1-forme

$$\omega = A(x, y)dx + B(x, y)dy, \quad A, B \in \mathbb{C}[x, y]_d, \quad \text{pgcd}(A, B) = 1.$$

La démonstration de ce théorème utilise les deux lemmes suivants.

LEMME 3.2. — *Le discriminant de $\text{Leg}\mathcal{H}$ se décompose en*

$$\Delta(\text{Leg}\mathcal{H}) = \mathcal{G}_{\mathcal{H}}(\text{I}_{\mathcal{H}}^{\text{tr}}) \cup \check{\Sigma}_{\mathcal{H}}^{\text{rad}} \cup \check{O},$$

où $\check{\Sigma}_{\mathcal{H}}^{\text{rad}}$ désigne l'ensemble des droites duales des points de $\Sigma_{\mathcal{H}}^{\text{rad}} = \{s \in \text{Sing}\mathcal{H} : \nu(\mathcal{H}, s) = 1, \tau(\mathcal{H}, s) \geq 2\}$.

Démonstration. — La formule (1.4) nous donne $\Delta(\text{Leg}\mathcal{H}) = \mathcal{G}_{\mathcal{H}}(\text{I}_{\mathcal{H}}^{\text{tr}}) \cup \check{\Sigma}_{\mathcal{H}}$, où $\check{\Sigma}_{\mathcal{H}}$ est l'ensemble des droites duales des points de $\Sigma_{\mathcal{H}} = \{s \in \text{Sing}\mathcal{H} : \tau(\mathcal{H}, s) \geq 2\}$. D'après la première assertion de la proposition 2.2, l'origine O est le seul point singulier de $\mathcal{H}$ de multiplicité algébrique supérieure ou égale à 2; par conséquent $\Sigma_{\mathcal{H}} = \Sigma_{\mathcal{H}}^{\text{rad}} \cup \{O\}$. $\square$

LEMME 3.3 ([2], Lemme 3.1). — *Si la courbure de $\text{Leg}\mathcal{H}$ est holomorphe sur $\check{\mathbb{P}}_{\mathbb{C}}^2 \setminus \check{O}$, alors $\text{Leg}\mathcal{H}$ est plat.*

Démonstration. — Soit (a, b) la carte affine de $\check{\mathbb{P}}_{\mathbb{C}}^2$ associée à la droite $\{ax - by + 1 = 0\} \subset \mathbb{P}_{\mathbb{C}}^2$; le d -tissu $\text{Leg}\mathcal{H}$ est donné par la d -forme symétrique $\check{\omega} = bA(db, da) + aB(db, da)$. L'homogénéité de A et B implique alors que toute homothétie $h_{\lambda} : (a, b) \mapsto \lambda(a, b)$ laisse invariant $\text{Leg}\mathcal{H}$; par suite

$$h_{\lambda}^*(K(\text{Leg}\mathcal{H})) = K(\text{Leg}\mathcal{H}).$$

En combinant l'hypothèse de l'holomorphie de la courbure en dehors de $\check{O}$ avec le fait que $\check{O}$ est la droite à l'infini dans la carte (a, b) , on constate que $K(\text{Leg}\mathcal{H}) = P(a, b)da \wedge db$ pour un certain $P \in \mathbb{C}[a, b]$. On déduit de ce qui précède que $\lambda^2 P(\lambda a, \lambda b) = P(a, b)$, d'où l'énoncé. $\square$

Démonstration du théorème 3.1. — L'implication directe est triviale. Montrons la réciproque; supposons que $K(\text{Leg}\mathcal{H})$ soit holomorphe sur $\mathcal{G}_{\mathcal{H}}(\text{I}_{\mathcal{H}}^{\text{tr}})$. D'après les lemmes 3.2 et 3.3, il suffit de prouver que $K(\text{Leg}\mathcal{H})$ est holomorphe le long de $\Xi := \check{\Sigma}_{\mathcal{H}}^{\text{rad}} \setminus \mathcal{G}_{\mathcal{H}}(\text{I}_{\mathcal{H}}^{\text{tr}})$. Supposons donc Ξ non vide; soit s une singularité radiale de $\mathcal{H}$ d'ordre $n - 1$ telle que la droite $\check{s}$ duale de s ne soit

pas contenue dans $\mathcal{G}_{\mathcal{H}}(\mathcal{I}_{\mathcal{H}}^{\text{tr}})$. D'après [9, Proposition 3.3], au voisinage de tout point générique m de $\check{s}$, le tissu $\text{Leg}\mathcal{H}$ peut se décomposer comme le produit $\mathcal{W}_n \boxtimes \mathcal{W}_{d-n}$, où $\mathcal{W}_n$ est un n -tissu irréductible laissant $\check{s}$ invariante et $\mathcal{W}_{d-n}$ est un $(d-n)$ -tissu transverse à $\check{s}$. De plus, la condition $\check{s} \not\subset \mathcal{G}_{\mathcal{H}}(\mathcal{I}_{\mathcal{H}}^{\text{tr}})$ assure que le tissu $\mathcal{W}_{d-n}$ est régulier au voisinage de m . Par conséquent $K(\text{Leg}\mathcal{H})$ est holomorphe au voisinage de m , en vertu de [9, Proposition 2.6]. $\square$

COROLLAIRE 3.4. — *Soit $\mathcal{H}$ un feuilletage homogène convexe de degré d sur le plan projectif. Alors le d -tissu $\text{Leg}\mathcal{H}$ est plat.*

Le théorème suivant est un critère effectif d'holomorphie de la courbure (du tissu dual d'un feuilletage homogène) le long de l'image par l'application de Gauss d'une droite d'inflexion transverse simple, i.e. d'ordre d'inflexion minimal.

THÉOREME 3.5. — *Soit $\mathcal{H}$ un feuilletage homogène de degré $d \geq 3$ sur $\mathbb{P}_{\mathbb{C}}^2$ défini par la 1-forme*

$$\omega = A(x, y)dx + B(x, y)dy, \quad A, B \in \mathbb{C}[x, y]_d, \quad \text{pgcd}(A, B) = 1.$$

Supposons que $\mathcal{H}$ possède une droite d'inflexion $T = (ax + by = 0)$ transverse et simple. Supposons en outre que $[-a : b] \in \mathbb{P}_{\mathbb{C}}^1$ soit le seul point critique de $\underline{\mathcal{G}}$ dans sa fibre $\underline{\mathcal{G}}^{-1}(\underline{\mathcal{G}}([-a : b]))$. Posons $T' = \mathcal{G}_{\mathcal{H}}(T)$ et considérons la courbe $\Gamma_{(a,b)}$ de $\mathbb{P}_{\mathbb{C}}^2$ définie par

$$Q(x, y; a, b) := \begin{vmatrix} \frac{\partial P}{\partial x} & A(b, -a) \\ \frac{\partial P}{\partial y} & B(b, -a) \end{vmatrix} = 0,$$

$$\text{où } P(x, y; a, b) := \frac{1}{(ax + by)^2} \begin{vmatrix} A(x, y) & A(b, -a) \\ B(x, y) & B(b, -a) \end{vmatrix}.$$

Alors la courbure de $\text{Leg}\mathcal{H}$ est holomorphe sur T' si et seulement si $T = \{ax + by = 0\} \subset \Gamma_{(a,b)}$, i.e. si et seulement si $Q(b, -a; a, b) = 0$.

REMARQUE 3.6. — L'hypothèse que $T = (ax + by = 0)$ est une droite d'inflexion pour $\mathcal{H}$ implique que $P \in \mathbb{C}[x, y]_{d-2}$ et donc $Q \in \mathbb{C}[x, y]_{d-3}$. En particulier lorsque $d = 3$ on a

$$Q(b, -a; a, b) = \frac{C_{\mathcal{H}}(B(b, -a), -A(b, -a))}{(C_{\mathcal{H}}(b, -a))^2};$$

en effet si on pose $\tilde{a} = A(b, -a)$, $\tilde{b} = B(b, -a)$ et $P(x, y; a, b) = f(a, b)x + g(a, b)y$ on obtient

$$Q(b, -a; a, b) = f(a, b)\tilde{b} - g(a, b)\tilde{a} = P(\tilde{b}, -\tilde{a}; a, b)$$

$$= \frac{\tilde{b}A(\tilde{b}, -\tilde{a}) - \tilde{a}B(\tilde{b}, -\tilde{a})}{(a\tilde{b} - b\tilde{a})^2} = \frac{C_{\mathcal{H}}(\tilde{b}, -\tilde{a})}{(C_{\mathcal{H}}(b, -a))^2}.$$

Démonstration. — À isomorphisme linéaire près on peut se ramener à $T = (y = rx)$; si (p, q) est la carte affine de $\check{\mathbb{P}}_{\mathbb{C}}^2$ associée à la droite $\{y = px - q\} \subset \mathbb{P}_{\mathbb{C}}^2$, alors $T' = (p = \underline{\mathcal{G}}(r))$ avec $\underline{\mathcal{G}}(z) = -\frac{A(1, z)}{B(1, z)}$. Comme l'indice de ramification de $\underline{\mathcal{G}}$ en $z = r$ est égal à 2 et comme $z = r$ est l'unique point critique dans sa fibre $\underline{\mathcal{G}}^{-1}(\underline{\mathcal{G}}(r))$, cette fibre est formée de $d - 1$ points distincts, soit $\underline{\mathcal{G}}^{-1}(\underline{\mathcal{G}}(r)) = \{r, z_1, z_2, \dots, z_{d-2}\}$. De plus, au voisinage de tout point générique de T' , le tissu dual de $\mathcal{H}$ se décompose en $\text{Leg}\mathcal{H} = \mathcal{W}_2 \boxtimes \mathcal{W}_{d-2}$ avec

$$\mathcal{W}_2|_{T'} = (dq - x_0(q)dp)^2 \text{ et } \mathcal{W}_{d-2}|_{T'} = \prod_{i=1}^{d-2} (dq - x_i(q)dp),$$

où $x_0(q) = \frac{q}{\underline{\mathcal{G}}(r) - r}$ et $x_i(q) = \frac{q}{\underline{\mathcal{G}}(r) - z_i}$, $i = 1, 2, \dots, d - 2$. D'après [9, Théorème 1], $K(\text{Leg}\mathcal{H})$ est holomorphe le long de T' si et seulement si T' est invariante par le barycentre de $\mathcal{W}_{d-2}$ par rapport à $\mathcal{W}_2$. Or la restriction de $\beta_{\mathcal{W}_2}(\mathcal{W}_{d-2})$ à T' est donnée par $dq - \beta(q)dp = 0$ avec

$$\beta = x_0 + \frac{1}{\frac{1}{d-2} \sum_{i=1}^{d-2} \frac{1}{x_i - x_0}}.$$

Ainsi la courbure de $\text{Leg}\mathcal{H}$ est holomorphe sur T' si et seulement si $\beta = \infty$, i.e. si et seulement si $\sum_{i=1}^{d-2} \frac{1}{x_i - x_0} = 0$, car $x_0 \neq \infty$ ($z = r$ est non fixe par $\underline{\mathcal{G}}$). Cette dernière condition se réécrit

$$(3.1) \quad 0 = \sum_{i=1}^{d-2} \frac{\underline{\mathcal{G}}(r) - z_i}{r - z_i} = d - 2 + (\underline{\mathcal{G}}(r) - r) \sum_{i=1}^{d-2} \frac{1}{r - z_i}.$$

D'autre part les z_i sont exactement les racines du polynôme

$$F(z) := \frac{P(1, z; -r, 1)}{B(1, r)} = \frac{A(1, z) + \underline{\mathcal{G}}(r)B(1, z)}{(z - r)^2}$$

et donc

$$\sum_{i=1}^{d-2} \frac{1}{r - z_i} = \sum_{i=1}^{d-2} \left(\frac{1}{F(r)} \prod_{\substack{j=1 \\ j \neq i}}^{d-2} (r - z_j) \right) = \frac{1}{F(r)} \sum_{i=1}^{d-2} \prod_{\substack{j=1 \\ j \neq i}}^{d-2} (r - z_j) = \frac{F'(r)}{F(r)}.$$

Ainsi l'équation (3.1) est équivalente à $(\underline{\mathcal{G}}(r) - r)F'(r) + (d - 2)F(r) = 0$, i.e. à

$$(3.2) \quad (d - 2)P(1, r; -r, 1) + (\underline{\mathcal{G}}(r) - r) \frac{\partial P}{\partial y} \Big|_{(x, y) = (1, r)} = 0;$$

comme $P \in \mathbb{C}[x, y]_{d-2}$ on peut réécrire (3.2) sous la forme

$$\left((d - 2)P(x, y; -r, 1) - y \frac{\partial P}{\partial y} + x \underline{\mathcal{G}}(r) \frac{\partial P}{\partial y} \right) \Big|_{y=rx} = 0;$$

celle-ci peut à son tour s'écrire

$$\left(\frac{\partial P}{\partial x} + \underline{g}(r) \frac{\partial P}{\partial y} \right) \Big|_{y=rx} = 0,$$

en vertu de l'identité d'Euler. Il en résulte que $K(\text{Leg}\mathcal{H})$ est holomorphe le long de T' si et seulement si

$$\left(B(1, r) \frac{\partial P}{\partial x} - A(1, r) \frac{\partial P}{\partial y} \right) \Big|_{y=rx} = 0. \quad \square$$

REMARQUE 3.7. — En degré 3 l'équation (3.1) s'écrit $\frac{\underline{g}(r)-z_1}{r-z_1} = 0$; ainsi la courbure du 3-tissu $\text{Leg}\mathcal{H}$ est holomorphe sur $T' = (p = \underline{g}(r))$ si et seulement si $\underline{g}(r) = z_1$, i.e. si et seulement si $\underline{g}(\underline{g}(r)) = \underline{g}(r)$.

Le théorème suivant est un critère effectif d'holomorphie de la courbure (du tissu dual d'un feuilletage homogène) le long de l'image par l'application de Gauss d'une droite d'inflexion transverse d'ordre maximal.

THÉORÈME 3.8. — *Soit $\mathcal{H}$ un feuilletage homogène de degré $d \geq 3$ sur $\mathbb{P}_{\mathbb{C}}^2$ défini par la 1-forme*

$$\omega = A(x, y)dx + B(x, y)dy, \quad A, B \in \mathbb{C}[x, y]_d, \quad \text{pgcd}(A, B) = 1.$$

Supposons que $\mathcal{H}$ possède une droite d'inflexion transverse T d'ordre maximal $d-1$ et posons $T' = \mathcal{G}_{\mathcal{H}}(T)$. Alors la courbure de $\text{Leg}\mathcal{H}$ est holomorphe le long de T' si et seulement si la 2-forme $d\omega$ s'annule sur la droite T .

La démonstration de ce théorème utilise le lemme technique suivant, qui nous sera aussi utile ultérieurement.

LEMME 3.9. — *Soit $f : \mathbb{P}_{\mathbb{C}}^1 \rightarrow \mathbb{P}_{\mathbb{C}}^1$ une application rationnelle de degré d ; $f(z) = \frac{a(z)}{b(z)}$ avec a et b des polynômes sans facteur commun et $\max(\deg a, \deg b) = d$. Soit $z_0 \in \mathbb{C}$ tel que $f(z_0) \neq \infty$. Alors, z_0 est un point critique de f de multiplicité $m-1$ si et seulement s'il existe un polynôme $c \in \mathbb{C}[z]$ de degré $\leq d-m$ vérifiant $c(z_0) \neq 0$ et tel que $a(z) = f(z_0)b(z) + c(z)(z-z_0)^m$.*

Démonstration. — D'après la formule de Taylor, l'assertion $z = z_0$ est un point critique de f de multiplicité $m-1$ se traduit par $f(z) = f(z_0) + h(z)(z-z_0)^m$, avec $h(z_0) \neq 0$. Par suite

$$a(z) - f(z_0)b(z) = c(z)(z-z_0)^m$$

avec $c(z) := h(z)b(z)$, $c(z_0) \neq 0$; comme le membre de gauche est un polynôme en z de degré $\leq d$ celui de droite aussi. On constate alors que la fonction $c(z)$ est polynomiale en z de degré $\leq d-m$, d'où l'énoncé. $\square$

Démonstration du théorème 3.8. — On peut se ramener à $T = (y = rx)$; si (p, q) est la carte affine de $\check{\mathbb{P}}_{\mathbb{C}}^2$ associée à la droite $\{y = px - q\} \subset \mathbb{P}_{\mathbb{C}}^2$, alors $T' = (p = \underline{g}(r))$ avec $\underline{g}(z) = -\frac{A(1,z)}{B(1,z)}$. De plus, le d -tissu $\text{Leg}\mathcal{H}$ est décrit par $\prod_{i=1}^d \tilde{\omega}_i$, où $\tilde{\omega}_i = \frac{dq}{q} - \lambda_i(p)dp$, $\lambda_i(p) = \frac{1}{p - p_i(p)}$ et $\{p_i(p)\} = \underline{g}^{-1}(p)$.

En appliquant les formules (1.1) et (1.2) à $\text{Leg}\mathcal{H} = \mathcal{W}(\tilde{\omega}_1, \tilde{\omega}_2, \dots, \tilde{\omega}_d)$ on constate que $\eta(\text{Leg}\mathcal{H})$ s'écrit sous la forme

$$\eta(\text{Leg}\mathcal{H}) = \alpha(p)dp + \frac{dq}{q} \sum_{1 \leq i < j < k \leq d} \beta_{ijk}(p),$$

avec

$$\beta_{ijk}(p) = \frac{-\lambda'_i}{(\lambda_i - \lambda_j)(\lambda_i - \lambda_k)} + \frac{-\lambda'_j}{(\lambda_j - \lambda_i)(\lambda_j - \lambda_k)} + \frac{-\lambda'_k}{(\lambda_k - \lambda_i)(\lambda_k - \lambda_j)}.$$

Comme le point $z = r$ est critique non fixe pour $\underline{g}$ de multiplicité $d-1$, il existe un isomorphisme analytique $\varphi : (\mathbb{C}, 0) \rightarrow (\mathbb{C}, 0)$ tel qu'au voisinage de T' on ait

$$\lambda_i(p) = \frac{1}{\underline{g}(r) - r} + \varphi \left(\zeta^i (p - \underline{g}(r))^{\frac{1}{d}} \right),$$

où ζ est une racine primitive d -ième de 1. Notons que

$$\lambda'_i(p) = \frac{1}{d} (p - \underline{g}(r))^{\frac{1-d}{d}} \left[\zeta^i \varphi'(0) + \zeta^{2i} \varphi''(0) (p - \underline{g}(r))^{\frac{1}{d}} + o \left((p - \underline{g}(r))^{\frac{1}{d}} \right) \right],$$

et

$$\lambda_i(p) - \lambda_j(p) = (p - \underline{g}(r))^{\frac{1}{d}} \varphi'(0) (\zeta^i - \zeta^j) + o \left((p - \underline{g}(r))^{\frac{1}{d}} \right).$$

Il s'en suit que

$$\beta_{ijk}(p) = (p - \underline{g}(r))^{-1-\frac{1}{d}} \tilde{\beta}_{ijk} \left((p - \underline{g}(r))^{\frac{1}{d}} \right), \quad \text{avec} \quad \tilde{\beta}_{ijk}(z) \in \mathbb{C}\{z\}.$$

En fait, si $\langle i', j', k' \rangle$ désigne trois permutations circulaires de i, j et k , on a

$$\tilde{\beta}_{ijk}(0) = -\frac{1}{d\varphi'(0)} \underbrace{\sum_{\langle i', j', k' \rangle} \frac{\zeta^{i'}}{(\zeta^{i'} - \zeta^{j'}) (\zeta^{i'} - \zeta^{k'})}}_0 = 0,$$

et

$$\tilde{\beta}'_{ijk}(0) = \frac{\varphi''(0)}{2d\varphi'(0)^2} \underbrace{\sum_{\langle i', j', k' \rangle} \frac{\zeta^{i'} (\zeta^{j'} + \zeta^{k'})}{(\zeta^{i'} - \zeta^{j'}) (\zeta^{i'} - \zeta^{k'})}}_{-1} = -\frac{\varphi''(0)}{2d\varphi'(0)^2}.$$

En posant $\beta(z) := \sum_{1 \leq i < j < k \leq d} \beta_{ijk}(z)$ et $\tilde{\beta}(z) := \sum_{1 \leq i < j < k \leq d} \tilde{\beta}_{ijk}(z)$, on obtient que

$$\beta(p) = (p - \underline{g}(r))^{-1-\frac{1}{d}} \tilde{\beta} \left((p - \underline{g}(r))^{\frac{1}{d}} \right).$$

Comme $K(\text{Leg}\mathcal{H}) = d\eta(\text{Leg}\mathcal{H}) = \frac{\beta'(p)}{q} dp \wedge dq$ et comme $\beta(p) \in \mathbb{C}\{p - \underline{\mathcal{G}}(r)\} \left[\frac{1}{p - \underline{\mathcal{G}}(r)} \right]$, on déduit que $K(\text{Leg}\mathcal{H})$ est holomorphe le long de $T' = (p = \underline{\mathcal{G}}(r))$ si et seulement si $\tilde{\beta}(z) \in z\mathbb{C}\{z^d\}$ satisfait la condition

$$0 = \tilde{\beta}'(0) = \sum_{1 \leq i < j < k \leq d} \tilde{\beta}'_{ijk}(0) = -\binom{d}{3} \frac{\varphi''(0)}{2d\varphi'(0)^2},$$

i.e. si et seulement si $\varphi''(0) = 0$.

D'après le lemme 3.9, le fait que $z = r$ est un point critique (non fixe) de $\underline{\mathcal{G}}$ de multiplicité $d - 1$ se traduit par $-A(1, z) = \underline{\mathcal{G}}(r)B(1, z) + c(z - r)^d$, pour un certain $c \in \mathbb{C}^*$. Par suite

$$\begin{aligned} A(x, y) &= -\underline{\mathcal{G}}(r)B(x, y) - c(y - rx)^d \\ \text{et} \quad B(x, y) &= b_0x^d + \sum_{i=1}^d b_i(y - rx)^i x^{d-i}. \end{aligned}$$

Puisque $b_0 = B(1, r) \neq 0$, on peut supposer sans perte de généralité que $b_0 = 1$. Ainsi

$$d\omega \Big|_{y=rx} = (d + b_1(\underline{\mathcal{G}}(r) - r))x^{d-1}dx \wedge dy.$$

D'autre part, $\underline{\mathcal{G}}(z) = \underline{\mathcal{G}}(r) + \frac{c(z-r)^d}{1+b_1(z-r)+\dots}$ et, pour tout $p \in \mathbb{P}_{\mathbb{C}}^1$ suffisamment voisin de $\underline{\mathcal{G}}(r)$, l'équation $\underline{\mathcal{G}}(z) = p$ est équivalente à

$$(p - \underline{\mathcal{G}}(r))^{\frac{1}{d}} = \frac{c^{\frac{1}{d}}(z - r)}{\sqrt[d]{1 + b_1(z - r) + \dots}} = c^{\frac{1}{d}}(z - r) \left[1 - \frac{1}{d}b_1(z - r) + \dots \right].$$

Par suite les $p_i(p) \in \underline{\mathcal{G}}^{-1}(p)$ s'écrivent

$$p_i(p) = r + \frac{1}{c^{\frac{1}{d}}}\zeta^i(p - \underline{\mathcal{G}}(r))^{\frac{1}{d}} + \frac{b_1}{dc^{\frac{2}{d}}}\zeta^{2i}(p - \underline{\mathcal{G}}(r))^{\frac{2}{d}} + \dots$$

et donc

$$\begin{aligned} p - p_i(p) &= (\underline{\mathcal{G}}(r) - r) - \frac{1}{c^{\frac{1}{d}}}\zeta^i(p - \underline{\mathcal{G}}(r))^{\frac{1}{d}} \\ &\quad - \frac{b_1}{dc^{\frac{2}{d}}}\zeta^{2i}(p - \underline{\mathcal{G}}(r))^{\frac{2}{d}} + \dots + (p - \underline{\mathcal{G}}(r)) + \dots. \end{aligned}$$

Par conséquent

$$\lambda_i(p) = \frac{1}{p - p_i(p)} = \frac{1}{\underline{\mathcal{G}}(r) - r} + \varphi'(0)\zeta^i(p - \underline{\mathcal{G}}(r))^{\frac{1}{d}} + \frac{\varphi''(0)}{2}\zeta^{2i}(p - \underline{\mathcal{G}}(r))^{\frac{2}{d}} + \dots,$$

avec

$$\varphi'(0) = \frac{1}{c^{\frac{1}{d}}(\underline{\mathcal{G}}(r) - r)^2} \neq 0 \text{ et } \varphi''(0) = \frac{2}{dc^{\frac{2}{d}}(\underline{\mathcal{G}}(r) - r)^3} [d + b_1(\underline{\mathcal{G}}(r) - r)],$$

ce qui termine la démonstration. $\square$

Comme conséquence immédiate des théorèmes 3.1, 3.5, 3.8 et de la remarque 3.6 nous obtenons la caractérisation suivante de la platitude de la transformée de Legendre d'un feuilletage homogène de degré 3 sur le plan projectif.

COROLLAIRE 3.10. — *Soit $\mathcal{H}$ un feuilletage homogène de degré 3 sur $\mathbb{P}_{\mathbb{C}}^2$ défini par la 1-forme*

$$\omega = A(x, y)dx + B(x, y)dy, \quad A, B \in \mathbb{C}[x, y]_3, \quad \text{pgcd}(A, B) = 1.$$

Alors, le 3-tissu $\text{Leg}\mathcal{H}$ est plat si et seulement si les deux conditions suivantes sont satisfaites :

- (1) *pour toute droite d'inflexion de $\mathcal{H}$ transverse et simple $T_1 = (ax + by = 0)$, la droite d'équation $A(b, -a)x + B(b, -a)y = 0$ est invariante par $\mathcal{H}$;*
- (2) *pour toute droite d'inflexion de $\mathcal{H}$ transverse et double T_2 , la 2-forme $d\omega$ s'annule sur T_2 .*

En particulier, si le feuilletage $\mathcal{H}$ est convexe alors $\text{Leg}\mathcal{H}$ est plat.

4. Platitude et feuilletages homogènes de type

$$\mathbb{Z}[\mathbf{R}_1, \mathbf{R}_2, \dots, \mathbf{R}_{d-1}, \mathbf{T}_1, \mathbf{T}_{d-1}]$$

Nous nous proposons dans ce paragraphe de décrire certains feuilletages homogènes de degré $d \geq 3$ sur $\mathbb{P}_{\mathbb{C}}^2$, de type $\mathbb{Z}[\mathbf{R}_1, \mathbf{R}_2, \dots, \mathbf{R}_{d-1}, \mathbf{T}_1, \mathbf{T}_{d-1}]$ et dont le d -tissu dual est plat. Nous considérons ici un feuilletage homogène $\mathcal{H}$ de degré $d \geq 3$ sur $\mathbb{P}_{\mathbb{C}}^2$ défini, en carte affine (x, y) , par

$$\omega = A(x, y)dx + B(x, y)dy, \quad A, B \in \mathbb{C}[x, y]_d, \quad \text{pgcd}(A, B) = 1.$$

L'application rationnelle $\mathcal{G} : \mathbb{P}_{\mathbb{C}}^1 \rightarrow \mathbb{P}_{\mathbb{C}}^1$, $\mathcal{G}(z) = -\frac{A(1, z)}{B(1, z)}$, nous sera très utile pour établir les énoncés qui suivent.

PROPOSITION 4.1. — *Si $\deg \mathcal{T}_{\mathcal{H}} = 2$, alors le d -tissu $\text{Leg}\mathcal{H}$ est plat si et seulement si $\mathcal{H}$ est linéairement conjugué à l'un des deux feuilletages $\mathcal{H}_1^d$ et $\mathcal{H}_2^d$ décrits respectivement par les 1-formes*

1. $\omega_1^d = y^d dx - x^d dy$;
2. $\omega_2^d = x^d dx - y^d dy$.

Démonstration. — L'égalité $\deg \mathcal{T}_{\mathcal{H}} = 2$ est réalisée si et seulement si nous sommes dans l'une des situations suivantes

- (i) $\mathcal{T}_{\mathcal{H}} = 2 \cdot \mathbf{R}_{d-1}$;
- (ii) $\mathcal{T}_{\mathcal{H}} = 2 \cdot \mathbf{T}_{d-1}$;
- (iii) $\mathcal{T}_{\mathcal{H}} = 1 \cdot \mathbf{R}_{d-1} + 1 \cdot \mathbf{T}_{d-1}$.

Commençons par étudier l'éventualité (i). Nous pouvons supposer à conjugaison près que les deux singularités radiales de $\mathcal{H}$ sont $[0 : 1 : 0]$ et $[1 : 0 : 0]$, ce qui revient à supposer que les points $\infty = [1 : 0]$, $[0 : 1] \in \mathbb{P}_{\mathbb{C}}^1$ sont critiques fixes

de $\underline{\mathcal{G}}$, de même multiplicité $d - 1$. Cela se traduit par le fait que $A(x, y) = ay^d$ et $B(x, y) = bx^d$, avec $ab \neq 0$, en vertu du lemme 3.9. Par suite $\omega = ay^d dx - (-b)x^d dy$ et nous pouvons évidemment normaliser les coefficients a et $-b$ à 1. Ainsi $\mathcal{H}$ est conjugué au feuilletage $\mathcal{H}_1^d$ décrit par $\omega_1^d = y^d dx - x^d dy$; le d -tissu $\text{Leg}\mathcal{H}_1^d$ est plat car $\mathcal{H}_1^d$ est convexe.

Intéressons-nous à la possibilité (ii). À isomorphisme linéaire près nous pouvons nous ramener à la situation suivante :

- les points $[0 : 1], [1 : 1] \in \mathbb{P}_{\mathbb{C}}^1$ sont critiques non fixes de $\underline{\mathcal{G}}$, de même multiplicité $d - 1$;
- $\underline{\mathcal{G}}(0)$ et $\underline{\mathcal{G}}(1) \neq \infty$.

Toujours d'après le lemme 3.9, il existe des constantes $\alpha, \beta \in \mathbb{C}^*$ telles que

$$-A(1, z) = \underline{\mathcal{G}}(0)B(1, z) + \alpha z^d = \underline{\mathcal{G}}(1)B(1, z) + \beta(z - 1)^d$$

avec $\underline{\mathcal{G}}(0) \neq 0$, $\underline{\mathcal{G}}(1) \neq 1$ et $\underline{\mathcal{G}}(0) \neq \underline{\mathcal{G}}(1)$. L'homogénéité de A et B entraîne alors que

$$\omega = (\underline{\mathcal{G}}(0)s(y - x)^d - g(1)ry^d) dx + (ry^d - s(y - x)^d) dy$$

avec $r = \frac{\alpha}{\underline{\mathcal{G}}(1) - \underline{\mathcal{G}}(0)} \neq 0$ et $s = \frac{\beta}{\underline{\mathcal{G}}(1) - \underline{\mathcal{G}}(0)} \neq 0$. D'après les théorèmes 3.1 et 3.8, le d -tissu $\text{Leg}\mathcal{H}$ est plat si et seulement si $d\omega$ s'annule sur les deux droites $y(y - x) = 0$. Un calcul immédiat montre que

$$d\omega \Big|_{y=0} = -sd(\underline{\mathcal{G}}(0) - 1)x^{d-1}dx \wedge dy \quad \text{et} \quad d\omega \Big|_{y=x} = rd\underline{\mathcal{G}}(1)x^{d-1}dx \wedge dy.$$

Ainsi $\text{Leg}\mathcal{H}$ est plat si et seulement si $\underline{\mathcal{G}}(0) = 1$ et $\underline{\mathcal{G}}(1) = 0$, auquel cas

$$\omega = s(y - x)^d dx + (ry^d - s(y - x)^d) dy;$$

quitte à remplacer ω par $\varphi^*\omega$, où $\varphi(x, y) = \left(s^{\frac{-1}{d+1}}x - r^{\frac{-1}{d+1}}y, -r^{\frac{-1}{d+1}}y\right)$, on se ramène à

$$\omega = \omega_2^d = x^d dx - y^d dy.$$

Considérons pour finir l'éventualité (iii). Nous pouvons supposer que la singularité radiale de $\mathcal{H}$ est le point $[0 : 1 : 0]$ et que la droite d'inflexion transverse de $\mathcal{H}$ est la droite $(y = 0)$; $\underline{\mathcal{G}}(0) \neq \underline{\mathcal{G}}(\infty) = \infty$ car $\underline{\mathcal{G}}^{-1}(\underline{\mathcal{G}}(0)) = \{0\}$. Un raisonnement analogue à celui du cas précédent conduit à

$$\omega = -(\underline{\mathcal{G}}(0)\beta x^d + \alpha y^d) dx + \beta x^d dy, \quad \text{avec} \quad \alpha\beta\underline{\mathcal{G}}(0) \neq 0.$$

La courbure du tissu associé à cette 1-forme ne peut pas être holomorphe sur $\mathcal{G}_{\mathcal{H}}(\{y = 0\})$ car

$$d\omega \Big|_{y=0} = d\beta x^{d-1}dx \wedge dy \neq 0;$$

il en résulte que $\text{Leg}\mathcal{H}$ ne peut pas être plat lorsque $\mathcal{T}_{\mathcal{H}} = 1 \cdot \mathbf{R}_{d-1} + 1 \cdot \mathbf{T}_{d-1}$. $\square$

PROPOSITION 4.2. — Soit ν un entier compris entre 1 et $d-2$. Si le feuilletage $\mathcal{H}$ est de type

$$\mathcal{T}_{\mathcal{H}} = 1 \cdot R_{\nu} + 1 \cdot R_{d-\nu-1} + 1 \cdot R_{d-1}, \quad \text{resp. } \mathcal{T}_{\mathcal{H}} = 1 \cdot R_{\nu} + 1 \cdot R_{d-\nu-1} + 1 \cdot T_{d-1},$$

alors le d -tissu $\text{Leg}\mathcal{H}$ est plat si et seulement si $\mathcal{H}$ est linéairement conjugué au feuilletage $\mathcal{H}_3^{d,\nu}$, resp. $\mathcal{H}_4^{d,\nu}$ donné par

$$\begin{aligned} \omega_3^{d,\nu} &= \sum_{i=\nu+1}^d \binom{d}{i} x^{d-i} y^i dx - \sum_{i=0}^{\nu} \binom{d}{i} x^{d-i} y^i dy, \\ \text{resp. } \omega_4^{d,\nu} &= (d-\nu-1) \sum_{i=\nu+1}^d \binom{d}{i} x^{d-i} y^i dx + \nu \sum_{i=0}^{\nu} \binom{d}{i} x^{d-i} y^i dy. \end{aligned}$$

Démonstration. — Dans les deux cas, nous pouvons supposer à conjugaison linéaire près que les points $[0 : 1]$, $[1 : 0]$, $[-1 : 1] \in \mathbb{P}_{\mathbb{C}}^1$ sont critiques de $\underline{\mathcal{G}}$, de multiplicité ν , $d-\nu-1$, $d-1$ respectivement. Les points $[0 : 1]$ et $[1 : 0]$ sont évidemment fixes par $\underline{\mathcal{G}}$; le feuilletage $\mathcal{H}$ est de type $\mathcal{T}_{\mathcal{H}} = 1 \cdot R_{\nu} + 1 \cdot R_{d-\nu-1} + 1 \cdot R_{d-1}$ (resp. $\mathcal{T}_{\mathcal{H}} = 1 \cdot R_{\nu} + 1 \cdot R_{d-\nu-1} + 1 \cdot T_{d-1}$) si et seulement si le point $[-1 : 1]$ est fixe (resp. non fixe) par $\underline{\mathcal{G}}$. Puisque $\underline{\mathcal{G}}^{-1}(\underline{\mathcal{G}}(-1)) = \{-1\}$ nous avons $\underline{\mathcal{G}}(-1) \neq \underline{\mathcal{G}}(\infty) = \infty$. Donc, d'après le lemme 3.9, il existe une constante $\alpha \in \mathbb{C}^*$ et un polynôme homogène $B_{\nu} \in \mathbb{C}[x, y]_{\nu}$ tels que

$$\begin{aligned} -A(x, y) &= \underline{\mathcal{G}}(-1)B(x, y) + \alpha(y+x)^d, \\ B(x, y) &= x^{d-\nu}B_{\nu}(x, y) \end{aligned}$$

et $y^{\nu+1}$ divise $A(x, y)$. Il en résulte que

$$\begin{aligned} -A(x, y) &= \underline{\mathcal{G}}(-1)x^{d-\nu}B_{\nu}(x, y) + \alpha \sum_{i=0}^d \binom{d}{i} x^{d-i} y^i \\ &= \underline{\mathcal{G}}(-1)x^{d-\nu}B_{\nu}(x, y) + \alpha \sum_{i=0}^{\nu} \binom{d}{i} x^{d-i} y^i + \alpha \sum_{i=\nu+1}^d \binom{d}{i} x^{d-i} y^i; \end{aligned}$$

par suite $A(x, y)$ est divisible par $y^{\nu+1}$ si et seulement si

$$-A(x, y) = \alpha \sum_{i=\nu+1}^d \binom{d}{i} x^{d-i} y^i \text{ et } \underline{\mathcal{G}}(-1)x^{d-\nu}B_{\nu}(x, y) + \alpha \sum_{i=0}^{\nu} \binom{d}{i} x^{d-i} y^i = 0.$$

Quitte à remplacer $\omega = A(x, y)dx + B(x, y)dy$ par $-\frac{1}{\alpha}\omega$ on se ramène à

$$\omega = \sum_{i=\nu+1}^d \binom{d}{i} x^{d-i} y^i dx + \frac{1}{\underline{\mathcal{G}}(-1)} \sum_{i=0}^{\nu} \binom{d}{i} x^{d-i} y^i dy, \quad \underline{\mathcal{G}}(-1) \neq \underline{\mathcal{G}}(0) = 0.$$

- Si $\underline{\mathcal{G}}(-1) = -1$ nous obtenons le feuilletage $\mathcal{H}_3^{d,\nu}$ décrit par

$$\omega_3^{d,\nu} = \sum_{i=\nu+1}^d \binom{d}{i} x^{d-i} y^i dx - \sum_{i=0}^{\nu} \binom{d}{i} x^{d-i} y^i dy;$$

la transformée de Legendre $\text{Leg}\mathcal{H}_3^{d,\nu}$ est plate car $\mathcal{H}_3^{d,\nu}$ est convexe.

- Si $\underline{\mathcal{G}}(-1) \neq -1$ alors, d'après les théorèmes 3.1 et 3.8, le d -tissu $\text{Leg}\mathcal{H}$ est plat si et seulement si

$$0 \equiv d\omega \Big|_{y=-x} = \binom{d}{\nu+1} \frac{(-1)^{\nu+1}(\nu+1)}{(d-1)\underline{\mathcal{G}}(-1)} [\underline{\mathcal{G}}(-1)\nu - d + \nu + 1] x^{d-1} dx \wedge dy,$$

i.e. si et seulement si $\underline{\mathcal{G}}(-1) = \frac{d-\nu-1}{\nu}$, auquel cas

$$\begin{aligned} (d-\nu-1)\omega &= \omega_4^{d,\nu} \\ &= (d-\nu-1) \sum_{i=\nu+1}^d \binom{d}{i} x^{d-i} y^i dx + \nu \sum_{i=0}^{\nu} \binom{d}{i} x^{d-i} y^i dy. \quad \square \end{aligned}$$

PROPOSITION 4.3. — *Si le feuilletage $\mathcal{H}$ est de type*

$$\mathcal{T}_{\mathcal{H}} = 1 \cdot \mathbf{R}_{d-2} + 1 \cdot \mathbf{T}_1 + 1 \cdot \mathbf{R}_{d-1}, \quad \text{resp. } \mathcal{T}_{\mathcal{H}} = 1 \cdot \mathbf{R}_{d-2} + 1 \cdot \mathbf{T}_1 + 1 \cdot \mathbf{T}_{d-1},$$

alors le d -tissu $\text{Leg}\mathcal{H}$ est plat si et seulement si $\mathcal{H}$ est linéairement conjugué au feuilletage $\mathcal{H}_5^d$, resp. $\mathcal{H}_6^d$ décrit par

$$\text{resp. } \omega_5^d = 2y^d dx + x^{d-1}(yd - (d-1)x)dy,$$

$$\text{resp. } \omega_6^d = ((d-1)^2 x^d - d(d-1)x^{d-1}y + (d+1)y^d) dx + x^{d-1}(yd - (d-1)x) dy.$$

Démonstration. — Nous allons traiter ces deux types simultanément. À isomorphisme linéaire près, nous pouvons nous ramener à la situation suivante : les points $[1 : 0]$, $[1 : 1]$, $[0 : 1] \in \mathbb{P}_{\mathbb{C}}^1$ sont critiques de $\underline{\mathcal{G}}$, de multiplicité $d-2$, 1 , $d-1$ respectivement. Le point $[1 : 0]$ (resp. $[1 : 1]$) est fixe (resp. non fixe) par $\underline{\mathcal{G}}$; le feuilletage $\mathcal{H}$ est de type $\mathcal{T}_{\mathcal{H}} = 1 \cdot \mathbf{R}_{d-2} + 1 \cdot \mathbf{T}_1 + 1 \cdot \mathbf{R}_{d-1}$ (resp. $\mathcal{T}_{\mathcal{H}} = 1 \cdot \mathbf{R}_{d-2} + 1 \cdot \mathbf{T}_1 + 1 \cdot \mathbf{T}_{d-1}$) si et seulement si le point $[0 : 1]$ est fixe (resp. non fixe) par $\underline{\mathcal{G}}$. Puisque $\underline{\mathcal{G}}^{-1}(\underline{\mathcal{G}}(0)) = \{0\}$ nous avons $\underline{\mathcal{G}}(0) \neq \underline{\mathcal{G}}(1)$ et $\underline{\mathcal{G}}(0) \neq \underline{\mathcal{G}}(\infty) = \infty$; de plus $\underline{\mathcal{G}}(1) \neq \underline{\mathcal{G}}(\infty) = \infty$ car $\underline{\mathcal{G}}^{-1}(\underline{\mathcal{G}}(\infty)) = \{\infty, z_0\}$ pour un certain point $z_0 \neq \infty$, non critique de $\underline{\mathcal{G}}$. Par suite, d'après le lemme 3.9, il existe une constante $\alpha \in \mathbb{C}^*$ telle que

$$-A(x, y) = \underline{\mathcal{G}}(0)B(x, y) + \alpha y^d \text{ et } B(x, y) = \frac{\alpha}{s} x^{d-1} (yd - (d-1)x),$$

avec $s = \underline{\mathcal{G}}(1) - \underline{\mathcal{G}}(0) \neq 0$. Quitte à multiplier $\omega = A(x, y)dx + B(x, y)dy$ par $\frac{s}{\alpha}$ on se ramène à

$$\omega = -(\underline{\mathcal{G}}(0)x^{d-1}(yd - (d-1)x) + sy^d) dx + x^{d-1}(yd - (d-1)x) dy.$$

D'après ce qui précède le point $[1 : 1]$ est le seul point critique de $\underline{\mathcal{G}}$ dans sa fibre $\underline{\mathcal{G}}^{-1}(\underline{\mathcal{G}}(1))$. Donc, d'après le théorème 3.5, la courbure de $\text{Leg}\mathcal{H}$ est holomorphe sur $\mathcal{G}_{\mathcal{H}}(\{y = x\})$ si et seulement si

$$0 = Q(1, 1; -1, 1) = -\frac{1}{6}sd(d-1)(d-2)(\underline{\mathcal{G}}(0) + s + 2),$$

i.e. si et seulement si $s = -\underline{\mathcal{G}}(0) - 2$.

- Si $\underline{\mathcal{G}}(0) = 0$ alors la condition $s = -\underline{\mathcal{G}}(0) - 2 = -2$ est suffisante pour que $\text{Leg}\mathcal{H}$ soit plat, en vertu du théorème 3.1, et dans ce cas

$$\omega = \omega_5^d = 2y^d dx + x^{d-1}(yd - (d-1)x)dy.$$

- Si $\underline{\mathcal{G}}(0) \neq 0$ alors, d'après les théorèmes 3.1 et 3.8, $\text{Leg}\mathcal{H}$ est plat si et seulement si

$$s = -\underline{\mathcal{G}}(0) - 2 \quad \text{et} \quad 0 \equiv d\omega \Big|_{y=0} = d(\underline{\mathcal{G}}(0) - d + 1)x^{d-1}dx \wedge dy,$$

i.e. si et seulement si $\underline{\mathcal{G}}(0) = d - 1$ et $s = -d - 1$, auquel cas

$$\omega = \omega_6^d = ((d-1)^2 x^d - d(d-1)x^{d-1}y + (d+1)y^d)dx + x^{d-1}(yd - (d-1)x)dy.$$

□

5. Classification des feuilletages homogènes de degré trois à transformée de Legendre plate

Dans ce paragraphe nous allons classifier, à automorphisme de $\mathbb{P}_{\mathbb{C}}^2$ près, les feuilletages homogènes de degré 3 sur le plan projectif dont le 3-tissu dual est plat. Plus précisément nous allons démontrer l'énoncé suivant.

THÉOREME 5.1. — *Soit $\mathcal{H}$ un feuilletage homogène de degré 3 sur le plan projectif $\mathbb{P}_{\mathbb{C}}^2$. Alors le 3-tissu dual $\text{Leg}\mathcal{H}$ de $\mathcal{H}$ est plat si et seulement si $\mathcal{H}$ est linéairement conjugué à l'un des onze feuilletages $\mathcal{H}_1, \dots, \mathcal{H}_{11}$ décrits respectivement en carte affine par les 1-formes*

1. $\omega_1 = y^3 dx - x^3 dy$;
2. $\omega_2 = x^3 dx - y^3 dy$;
3. $\omega_3 = y^2(3x + y)dx - x^2(x + 3y)dy$;
4. $\omega_4 = y^2(3x + y)dx + x^2(x + 3y)dy$;
5. $\omega_5 = 2y^3 dx + x^2(3y - 2x)dy$;
6. $\omega_6 = (4x^3 - 6x^2y + 4y^3)dx + x^2(3y - 2x)dy$;
7. $\omega_7 = y^3 dx + x(3y^2 - x^2)dy$;
8. $\omega_8 = x(x^2 - 3y^2)dx - 4y^3 dy$;
9. $\omega_9 = y^2((-3 + i\sqrt{3})x + 2y)dx + x^2((1 + i\sqrt{3})x - 2i\sqrt{3}y)dy$;
10. $\omega_{10} = (3x + \sqrt{3}y)y^2 dx + (3y - \sqrt{3}x)x^2 dy$;
11. $\omega_{11} = (3x^3 + 3\sqrt{3}x^2y + 3xy^2 + \sqrt{3}y^3)dx + (\sqrt{3}x^3 + 3x^2y + 3\sqrt{3}xy^2 + 3y^3)dy$.

Considérons un feuilletage homogène $\mathcal{H}$ de degré 3 sur $\mathbb{P}_{\mathbb{C}}^2$ défini, en carte affine (x, y) , par

$$\omega = A(x, y)dx + B(x, y)dy,$$

où A et B désignent des polynômes homogènes de degré 3 sans composante commune ; la classification menant au théorème 5.1 est établie au cas par cas suivant que $\deg \mathcal{T}_{\mathcal{H}} = 2, 3$ ou 4, i.e. suivant la nature du support du diviseur $D_{\mathcal{H}}$ qui peut être deux droites, trois droites ou quatre droites. Pour ce faire commençons par établir les deux lemmes suivants.

LEMME 5.2. — *Si $\mathcal{T}_{\mathcal{H}} = 2 \cdot T_1 + 1 \cdot R_2$, resp. $\mathcal{T}_{\mathcal{H}} = 2 \cdot T_1 + 1 \cdot T_2$, alors, à conjugaison linéaire près, la 1-forme ω décrivant $\mathcal{H}$ est du type*

$$\begin{aligned} \omega &= y^3 dx + (\beta x^3 - 3\beta xy^2 + \alpha y^3) dy, & \beta((2\beta - 1)^2 - \alpha^2) &\neq 0, \\ \text{resp. } \omega &= (x^3 - 3xy^2 + \alpha y^3) dx + (\delta x^3 - 3\delta xy^2 + \beta y^3) dy, \\ &(\beta - \alpha\delta)((\beta - 2)^2 - (\alpha - 2\delta)^2) &\neq 0. \end{aligned}$$

Démonstration. — À isomorphisme près nous pouvons nous ramener à $D_{\mathcal{H}} = cy^2(y - x)(y + x)$ pour un certain $c \in \mathbb{C}^*$. Le produit $C_{\mathcal{H}}(1, 1)C_{\mathcal{H}}(1, -1)$ est évidemment non nul ; $\mathcal{H}$ est de type $\mathcal{T}_{\mathcal{H}} = 2 \cdot T_1 + 1 \cdot R_2$ (resp. $\mathcal{T}_{\mathcal{H}} = 2 \cdot T_1 + 1 \cdot T_2$) si et seulement si $C_{\mathcal{H}}(1, 0) = 0$ (resp. $C_{\mathcal{H}}(1, 0) \neq 0$). Écrivons les coefficients A et B de ω sous la forme

$A(x, y) = a_0x^3 + a_1x^2y + a_2xy^2 + a_3y^3$ et $B(x, y) = b_0x^3 + b_1x^2y + b_2xy^2 + b_3y^3$; nous avons donc

$$C_{\mathcal{H}} = a_0x^4 + (a_1 + b_0)x^3y + (a_2 + b_1)x^2y^2 + (a_3 + b_2)xy^3 + b_3y^4$$

et

$$\begin{aligned} D_{\mathcal{H}} &= (a_0b_1 - a_1b_0)x^4 + 2(a_0b_2 - a_2b_0)x^3y + (3a_0b_3 + a_1b_2 - a_2b_1 - 3a_3b_0)x^2y^2 \\ &\quad + 2(a_1b_3 - a_3b_1)xy^3 + (a_2b_3 - a_3b_2)y^4. \end{aligned}$$

Ainsi $C_{\mathcal{H}}(1, 0) = a_0$ et

$$(5.1) \quad D_{\mathcal{H}} = cy^2(y - x)(y + x) \quad \Leftrightarrow \quad \begin{cases} a_0b_1 = a_1b_0 \\ a_0b_2 = a_2b_0 \\ a_1b_3 = a_3b_1 \\ a_2b_3 - a_3b_2 = c \\ 3a_0b_3 + a_1b_2 - a_2b_1 - 3a_3b_0 = -c. \end{cases}$$

• Si $a_0 \neq 0$ alors le système (5.1) est équivalent à

$$a_1 = 0, \quad a_2 = -3a_0, \quad b_1 = 0, \quad b_2 = -3b_0, \quad c = -3(a_0b_3 - a_3b_0).$$

Posons $a_3 = a_0\alpha$, $b_0 = a_0\delta$, $b_3 = a_0\beta$; alors, quitte à diviser ω par a_0 , cette forme s'écrit

$$\omega = (x^3 - 3xy^2 + \alpha y^3) dx + (\delta x^3 - 3\delta xy^2 + \beta y^3) dy;$$

un calcul direct montre que la condition $cC_{\mathcal{H}}(1, 1)C_{\mathcal{H}}(1, -1) \neq 0$ est vérifiée si et seulement si $(\beta - \alpha\delta)((\beta - 2)^2 - (\alpha - 2\delta)^2) \neq 0$.

- Si $a_0 = 0$ alors le système (5.1) conduit à

$$a_1 = a_2 = b_1 = 0, \quad b_2 = -3b_0, \quad c = 3a_3b_0 \neq 0.$$

Écrivons $b_0 = a_3\beta$ et $b_3 = a_3\alpha$; alors, quitte à remplacer ω par $\frac{1}{a_3}\omega$, on se ramène à

$$\omega = y^3 dx + (\beta x^3 - 3\beta xy^2 + \alpha y^3) dy,$$

et la non nullité du produit $cC_{\mathcal{H}}(1, 1)C_{\mathcal{H}}(1, -1)$ est équivalente à $\beta((2\beta - 1)^2 - \alpha^2) \neq 0$. $\square$

LEMME 5.3. — *Si le diviseur $D_{\mathcal{H}}$ est réduit, i.e. si $\deg \mathcal{T}_{\mathcal{H}} = 4$, alors ω est, à conjugaison linéaire près, de l'une des formes suivantes*

1. $y^2((2r+3)x - (r+2)y)dx - x^2(x+ry)dy$,
où $r(r+1)(r+2)(r+3)(2r+3) \neq 0$;
2. $sy^2((2r+3)x - (r+2)y)dx - x^2(x+ry)dy$,
où $rs(s-1)(r+1)(r+2)(r+3)(2r+3)(s(2r+3)^2 - r^2) \neq 0$;
3. $ty^2((2r+3)x - (r+2)y)dx - x^2(x+ry)d(sy-x)$,
où $rst(r+1)(r+2)(r+3)(2r+3)(s-t-1)(tu^3 - r^2su - r^2v) \neq 0$,
 $u = 2r+3$ et $v = r(r+2)$;
4. $uy^2((2r+3)x - (r+2)y)d(y-sx) - x^2(x+ry)d(ty-x)$,
où $ur(r+1)(r+2)(r+3)(2r+3)(st-1)(su+t-u-1)(uv^4 + suwv^3 + r^2twv + r^2w^2) \neq 0$,
 $v = 2r+3$ et $w = r(r+2)$.

Ces quatre modèles sont respectivement de types $3 \cdot R_1 + 1 \cdot T_1$, $2 \cdot R_1 + 2 \cdot T_1$, $1 \cdot R_1 + 3 \cdot T_1$, $4 \cdot T_1$.

Démonstration. — D'après la remarque 2.5 le feuilletage $\mathcal{H}$ ne peut être de type $4 \cdot R_1$; nous sommes donc dans l'une des situations suivantes

- (i) $\mathcal{T}_{\mathcal{H}} = 3 \cdot R_1 + 1 \cdot T_1$;
- (ii) $\mathcal{T}_{\mathcal{H}} = 2 \cdot R_1 + 2 \cdot T_1$;
- (iii) $\mathcal{T}_{\mathcal{H}} = 1 \cdot R_1 + 3 \cdot T_1$;
- (iv) $\mathcal{T}_{\mathcal{H}} = 4 \cdot T_1$.

À conjugaison linéaire près nous pouvons nous ramener à $D_{\mathcal{H}} = cxy(y-x)(y-\alpha x)$ pour certains $c, \alpha \in \mathbb{C}^*$, $\alpha \neq 1$. Dans la dernière éventualité nous avons

$$C_{\mathcal{H}}(0, 1)C_{\mathcal{H}}(1, 0)C_{\mathcal{H}}(1, 1)C_{\mathcal{H}}(1, \alpha) \neq 0$$

et dans les cas (i), resp. (ii), resp. (iii) nous pouvons supposer que

$$\begin{cases} C_{\mathcal{H}}(0, 1) = 0 \\ C_{\mathcal{H}}(1, 0) = 0 \\ C_{\mathcal{H}}(1, 1) = 0 \\ C_{\mathcal{H}}(1, \alpha) \neq 0 \end{cases} \text{ resp. } \begin{cases} C_{\mathcal{H}}(0, 1) = 0 \\ C_{\mathcal{H}}(1, 0) = 0 \\ C_{\mathcal{H}}(1, 1) \neq 0 \\ C_{\mathcal{H}}(1, \alpha) \neq 0 \end{cases} \text{ resp. } \begin{cases} C_{\mathcal{H}}(0, 1) = 0 \\ C_{\mathcal{H}}(1, 0) \neq 0 \\ C_{\mathcal{H}}(1, 1) \neq 0 \\ C_{\mathcal{H}}(1, \alpha) \neq 0 \end{cases}$$

Comme dans le lemme précédent, en écrivant

$$A(x, y) = a_0x^3 + a_1x^2y + a_2xy^2 + a_3y^3 \text{ et } B(x, y) = b_0x^3 + b_1x^2y + b_2xy^2 + b_3y^3$$

nous obtenons que

(5.2)

$$D_{\mathcal{H}} = cxy(y-x)(y-\alpha x) \Leftrightarrow \begin{cases} a_0b_1 = a_1b_0 \\ a_2b_3 = a_3b_2 \\ 2(a_1b_3 - a_3b_1) = c \\ 2(a_0b_2 - a_2b_0) = c\alpha \\ 3a_0b_3 + a_1b_2 - a_2b_1 - 3a_3b_0 = -c(\alpha + 1). \end{cases}$$

Envisageons l'éventualité (iv). Comme $c \neq 0$, $a_0 = C_{\mathcal{H}}(1, 0) \neq 0$ et $b_3 = C_{\mathcal{H}}(0, 1) \neq 0$, le système (5.2) est équivalent à

$$\begin{cases} b_1 = \frac{a_1b_0}{a_0} \\ a_2 = \frac{a_3b_2}{b_3} \\ c = \frac{2a_1(a_0b_3 - a_3b_0)}{a_0} \\ a_0b_2 - \alpha a_1b_3 = 0 \\ (3a_0 + 2\alpha a_1 + 2a_1)b_3 + a_1b_2 = 0 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} b_1 = \frac{a_1b_0}{a_0} \\ a_2 = \frac{a_3a_1\alpha}{a_0} \\ c = \frac{2a_1(a_0b_3 - a_3b_0)}{a_0} \\ b_2 = \frac{a_1b_3\alpha}{a_0} \\ a_1(a_1 + 2a_0)\alpha + a_0(2a_1 + 3a_0) = 0. \end{cases}$$

Donc $a_1 \neq 0$ et puisque $\alpha \neq 0$, le produit $(a_1 + 2a_0)(2a_1 + 3a_0)$ est non nul. Il s'en suit que

$$\begin{aligned} a_2 &= -\frac{a_3(2a_1 + 3a_0)}{a_1 + 2a_0}, & b_1 &= \frac{a_1b_0}{a_0}, & b_2 &= -\frac{b_3(2a_1 + 3a_0)}{a_1 + 2a_0}, \\ \alpha &= -\frac{a_0(2a_1 + 3a_0)}{a_1(a_1 + 2a_0)}, & c &= \frac{2a_1(a_0b_3 - a_3b_0)}{a_0}. \end{aligned}$$

Posons $r = \frac{a_1}{a_0}$, $s = -\frac{a_3}{b_3}$, $t = -\frac{b_0}{a_0}$, $u = -\frac{b_3}{a_1 + 2a_0}$; alors

$$\begin{aligned} b_0 &= -ta_0, & b_1 &= -rta_0, & b_2 &= (2r + 3)ua_0, & b_3 &= -u(r + 2)a_0, \\ a_1 &= ra_0, & a_2 &= -su(2r + 3)a_0, & a_3 &= su(r + 2)a_0, \\ \alpha &= -\frac{2r + 3}{r(r + 2)}, & c &= 2r(r + 2)u(st - 1)a_0^2. \end{aligned}$$

Quitte à remplacer ω par $\frac{1}{a_0}\omega$, le coefficient a_0 vaut 1 et ω s'écrit

$$\begin{aligned} \omega &= (x^3 + rx^2y - su(2r + 3)xy^2 + su(r + 2)y^3) dx \\ &\quad + (-tx^3 - rtx^2y + u(2r + 3)xy^2 - u(r + 2)y^3) dy \\ &= uy^2((2r + 3)x - (r + 2)y) d(y - sx) - x^2(x + ry) d(ty - x); \end{aligned}$$

un calcul direct montre que la condition

$$c\alpha(\alpha - 1)C_{\mathcal{H}}(0, 1)C_{\mathcal{H}}(1, 0)C_{\mathcal{H}}(1, 1)C_{\mathcal{H}}(1, \alpha) \neq 0$$

est équivalente à

$$ur(r+1)(r+2)(r+3)(2r+3)(st-1) \\ \times (su+t-u-1)(uv^4+suwv^3+r^2twv+r^2w^2) \neq 0,$$

avec $v = 2r + 3$ et $w = r(r + 2)$.

Maintenant nous étudions la possibilité (iii). Dans ce cas nous avons $b_3 = C_{\mathcal{H}}(0, 1) = 0$ et $a_0 = C_{\mathcal{H}}(1, 0) \neq 0$; le système (5.2) conduit à

$$a_2 = -\frac{a_3(2a_1 + 3a_0)}{a_1 + 2a_0}, \quad b_1 = \frac{a_1b_0}{a_0}, \quad b_2 = 0, \quad \alpha = -\frac{a_0(2a_1 + 3a_0)}{a_1(a_1 + 2a_0)}, \quad c = -\frac{2a_1a_3b_0}{a_0}.$$

En posant $r = \frac{a_1}{a_0}$, $s = -\frac{b_0}{a_0}$ et $t = -\frac{a_3}{a_1 + 2a_0}$, nous obtenons que

$$b_0 = -sa_0, \quad b_1 = -rsa_0, \quad b_2 = b_3 = 0, \quad c = -2rst(r+2)a_0^2, \\ a_1 = ra_0, \quad a_2 = t(2r+3)a_0, \quad a_3 = -t(r+2)a_0, \quad \alpha = -\frac{2r+3}{r(r+2)}.$$

Quitte à diviser ω par a_0 on se ramène à

$$\omega = (x^3 + rx^2y + t(2r+3)xy^2 - t(r+2)y^3) dx - sx^2(x+ry)dy \\ = ty^2((2r+3)x - (r+2)y) dx - x^2(x+ry)d(sy-x),$$

et la non nullité du produit $c\alpha(\alpha-1)C_{\mathcal{H}}(1, 0)C_{\mathcal{H}}(1, 1)C_{\mathcal{H}}(1, \alpha)$ se traduit par

$$rst(r+1)(r+2)(r+3)(2r+3)(s-t-1)(tu^3-r^2su-r^2v) \neq 0,$$

avec $u = 2r + 3$ et $v = r(r + 2)$. Les deux premiers cas se traitent de façon analogue. $\square$

Démonstration du théorème 5.1. — Nous allons considérer trois cas.

Premier cas : $\deg \mathcal{T}_{\mathcal{H}} = 2$. — Dans ce cas le 3-tissu $\text{Leg} \mathcal{H}$ est plat si et seulement si la 1-forme ω définissant $\mathcal{H}$ est linéairement conjuguée à l'une des deux 1-formes

$$\omega_1 = y^3 dx - x^3 dy \quad \text{et} \quad \omega_2 = x^3 dx - y^3 dy.$$

C'est une application directe de la proposition 4.1 pour $d = 3$.

Second cas : $\deg \mathcal{T}_{\mathcal{H}} = 3$

- Si $\mathcal{T}_{\mathcal{H}} = 2 \cdot R_1 + 1 \cdot R_2$, resp. $\mathcal{T}_{\mathcal{H}} = 2 \cdot R_1 + 1 \cdot T_2$, alors, d'après la proposition 4.2, $\text{Leg}\mathcal{H}$ est plat si et seulement si ω est conjuguée à

$$\begin{aligned}\omega_3^{3,1} &= \sum_{i=2}^3 \binom{3}{i} x^{3-i} y^i dx - \sum_{i=0}^1 \binom{3}{i} x^{3-i} y^i dy \\ &= y^2(3x + y)dx - x^2(x + 3y)dy = \omega_3, \\ \text{resp. } \omega_4^{3,1} &= \sum_{i=2}^3 \binom{3}{i} x^{3-i} y^i dx + \sum_{i=0}^1 \binom{3}{i} x^{3-i} y^i dy \\ &= y^2(3x + y)dx + x^2(x + 3y)dy = \omega_4.\end{aligned}$$

- Si $\mathcal{T}_{\mathcal{H}} = 1 \cdot R_1 + 1 \cdot T_1 + 1 \cdot R_2$, resp. $\mathcal{T}_{\mathcal{H}} = 1 \cdot R_1 + 1 \cdot T_1 + 1 \cdot T_2$, alors, d'après la proposition 4.3, $\text{Leg}\mathcal{H}$ est plat si et seulement si ω est conjuguée à

$$\omega_5^3 = 2y^3 dx + x^2(3y - 2x)dy = \omega_5,$$

$$\text{resp. } \omega_6^3 = (4x^3 - 6x^2y + 4y^3)dx + x^2(3y - 2x)dy = \omega_6.$$

- Si $\mathcal{T}_{\mathcal{H}} = 2 \cdot T_1 + 1 \cdot R_2$, alors, d'après le lemme 5.2, la 1-forme ω est du type

$$\omega = y^3 dx + (\beta x^3 - 3\beta xy^2 + \alpha y^3) dy, \quad \beta((2\beta - 1)^2 - \alpha^2) \neq 0,$$

et dans ce cas nous avons $I_{\mathcal{H}}^{\text{tr}} = (y - x)(y + x)$. D'après le corollaire 3.10, le 3-tissu $\text{Leg}\mathcal{H}$ est plat si et seulement si

$$0 = Q(1, 1; -1, 1) = (2\beta + 2 - \alpha)\beta \text{ et } 0 = Q(1, -1; 1, 1) = -(2\beta + 2 + \alpha)\beta,$$

i.e. si et seulement si $\alpha = 0$ et $\beta = -1$, auquel cas $\omega = \omega_7 = y^3 dx + x(3y^2 - x^2)dy$.

- Dans ce deuxième cas, il ne nous reste plus qu'à traiter l'éventualité $\mathcal{T}_{\mathcal{H}} = 2 \cdot T_1 + 1 \cdot T_2$. Toujours d'après le lemme 5.2, ω est, à conjugaison près, de la forme

$$\omega = (x^3 - 3xy^2 + \alpha y^3) dx + (\delta x^3 - 3\delta xy^2 + \beta y^3) dy,$$

$(\beta - \alpha\delta)((\beta - 2)^2 - (\alpha - 2\delta)^2) \neq 0$, comme $I_{\mathcal{H}}^{\text{tr}} = y^2(y - x)(y + x)$ le 3-tissu $\text{Leg}\mathcal{H}$ est plat si et seulement si

$$\begin{cases} 0 \equiv d\omega \Big|_{y=0} = 3\delta x^2 dx \wedge dy \\ 0 = Q(1, 1; -1, 1) = (4 + \beta - 2\alpha - 2\delta)(\beta - \alpha\delta) \\ 0 = Q(1, -1; 1, 1) = (4 + \beta + 2\alpha + 2\delta)(\beta - \alpha\delta), \end{cases}$$

en vertu du corollaire 3.10. Il s'en suit que $\text{Leg}\mathcal{H}$ est plat si et seulement si $\alpha = \delta = 0$ et $\beta = -4$, auquel cas $\omega = \omega_8 = x(x^2 - 3y^2)dx - 4y^3 dy$.

Troisième cas : $\deg \mathcal{T}_{\mathcal{H}} = 4$. — Pour examiner la platitude dans ce dernier cas, nous allons appliquer le corollaire 3.10 aux différents modèles du lemme 5.3.

- Si $\mathcal{T}_{\mathcal{H}} = 3 \cdot R_1 + 1 \cdot T_1$, alors ω est du type

$$\omega = y^2 ((2r+3)x - (r+2)y) dx - x^2(x+ry)dy$$

avec $r(r+1)(r+2)(r+3)(2r+3) \neq 0$. Nous avons $I_{\mathcal{H}}^{\text{tr}} = sx + ty$ où $s = 2r+3$ et $t = r(r+2)$; par suite le 3-tissu $\text{Leg}\mathcal{H}$ est plat si et seulement si

$$0 = Q(t, -s; s, t) = r(r+1)^2(r+2)^2(r+3)(2r+3) [r^2 + 3r + 3],$$

i.e. si et seulement si $r = -\frac{3}{2} \pm i\frac{\sqrt{3}}{2}$. Dans les deux cas la 1-forme ω est linéairement conjuguée à

$$\omega_9 = y^2 \left((-3 + i\sqrt{3})x + 2y \right) dx + x^2 \left((1 + i\sqrt{3})x - 2i\sqrt{3}y \right) dy;$$

en effet si $r = -\frac{3}{2} - i\frac{\sqrt{3}}{2}$, resp. $r = -\frac{3}{2} + i\frac{\sqrt{3}}{2}$, alors

$$\omega_9 = -(1+i\sqrt{3})\omega, \quad \text{resp. } \omega_9 = -2\varphi^*\omega, \quad \text{où } \varphi(x, y) = (y, x).$$

- Si $\mathcal{T}_{\mathcal{H}} = 2 \cdot R_1 + 2 \cdot T_1$, alors ω est de la forme

$$\omega = sy^2 ((2r+3)x - (r+2)y) dx - x^2(x+ry)dy$$

avec $rs(s-1)(r+1)(r+2)(r+3)(2r+3)(s(2r+3)^2 - r^2) \neq 0$. Posons $t = 2r+3$ et $u = r(r+2)$; nous avons $I_{\mathcal{H}}^{\text{tr}} = (y-x)(tx+uy)$. Donc $\text{Leg}\mathcal{H}$ est plat si et seulement si

$$\begin{cases} 0 = Q(1, 1; -1, 1) = -s(r+1)^2 [s(r+2) + 1] \\ 0 = Q(u, -t; t, u) = rs(r+1)^2(r+2)^2(2r+3) [s(2r+3)^2 + (r+2)r^2], \end{cases}$$

i.e. si et seulement si $r = \pm\sqrt{3}$ et $s = -2+r$, car $rs(r+1)(r+2)(2r+3) \neq 0$. Dans les deux cas ω est linéairement conjuguée à

$$\omega_{10} = (3x + \sqrt{3}y)y^2 dx + (3y - \sqrt{3}x)x^2 dy;$$

en effet si $(r, s) = (-\sqrt{3}, -2 - \sqrt{3})$, resp. $(r, s) = (\sqrt{3}, -2 + \sqrt{3})$, alors

$$\omega_{10} = \sqrt{3}\omega, \quad \text{resp. } \omega_{10} = -\sqrt{3}\varphi^*\omega, \quad \text{où } \varphi(x, y) = (x, -y).$$

- Si $\mathcal{T}_{\mathcal{H}} = 1 \cdot R_1 + 3 \cdot T_1$, alors ω est du type

$$\omega = ty^2 ((2r+3)x - (r+2)y) dx - x^2(x+ry)d(sy-x)$$

avec $rst(r+1)(r+2)(r+3)(2r+3)(s-t-1)(tu^3 - r^2su - r^2v) \neq 0$, $u = 2r+3$ et $v = r(r+2)$. Puisque $I_{\mathcal{H}}^{\text{tr}} = y(y-x)(ux+vy)$ la courbure de $\text{Leg}\mathcal{H}$ est holomorphe le long de $\mathcal{G}_{\mathcal{H}}(\{y(y-x)=0\})$ si et seulement si

$$\begin{cases} 0 = Q(1, 0; 0, 1) = st [(2r+3)s - (r+2)] \\ 0 = Q(1, 1; -1, 1) = -st(r+1)^2 [(r+2)(t+1) + s], \end{cases}$$

i.e. si et seulement si $s = \frac{r+2}{2r+3}$ et $t = -\frac{2(r+2)}{2r+3}$, auquel cas $K(\text{Leg}\mathcal{H})$ ne peut être holomorphe sur $\mathcal{G}_{\mathcal{H}}(\{ux + vy = 0\})$ car

$$Q(v, -u; u, v) = 12r(r+1)^3(r+2)^5(r+3)(2r+3)^{-2} \neq 0.$$

Par conséquent la transformée de Legendre $\text{Leg}\mathcal{H}$ de $\mathcal{H}$ ne peut être plate lorsque $\mathcal{T}_{\mathcal{H}} = 1 \cdot R_1 + 3 \cdot T_1$.

- Si $\mathcal{T}_{\mathcal{H}} = 4 \cdot T_1$, alors ω est de la forme

$$\omega = uy^2((2r+3)x - (r+2)y)dy - x^2(x + ry)dy,$$

où $ur(r+1)(r+2)(r+3)(2r+3)(st-1)(su+t-u-1)(uv^4+suwv^3+r^2twv+r^2w^2) \neq 0$, $v = 2r+3$ et $w = r(r+2)$. Comme $I_{\mathcal{H}}^{\text{tr}} = xy(y-x)(vx+wy)$ la courbure de $\text{Leg}\mathcal{H}$ est holomorphe le long de $\mathcal{G}_{\mathcal{H}}(\{xy(y-x) = 0\})$ si et seulement si

$$\begin{cases} 0 = Q(0, -1; 1, 0) = -u^2(r+2)^2(st-1)[rs+1] \\ 0 = Q(1, 0; 0, 1) = -u(st-1)[(2r+3)t-r-2] \\ 0 = Q(1, 1; -1, 1) = -u(r+1)^2(st-1)[(rs+2s+1)u-t-r-2], \end{cases}$$

i.e. si et seulement si $s = -\frac{1}{r}$, $t = \frac{r+2}{2r+3}$ et $u = -\frac{r(r+2)^2}{2r+3}$, auquel cas

$$Q(w, -v; v, w) = 16r(r+1)^5(r+2)^5(r+3)(2r+3)^{-2}[r^2+3r+3].$$

Par suite $\text{Leg}\mathcal{H}$ est plat si et seulement si nous sommes dans l'un des deux cas suivants

$$\begin{aligned} \text{(i)} \quad & r = -\frac{3}{2} + i\frac{\sqrt{3}}{2}, \quad s = \frac{1}{2} + i\frac{\sqrt{3}}{6}, \quad t = \frac{1}{2} - i\frac{\sqrt{3}}{6}, \quad u = 1; \\ \text{(ii)} \quad & r = -\frac{3}{2} - i\frac{\sqrt{3}}{2}, \quad s = \frac{1}{2} - i\frac{\sqrt{3}}{6}, \quad t = \frac{1}{2} + i\frac{\sqrt{3}}{6}, \quad u = 1. \end{aligned}$$

Dans les deux cas la 1-forme ω est linéairement conjuguée à

$$\omega_{11} = (3x^3 + 3\sqrt{3}x^2y + 3xy^2 + \sqrt{3}y^3)dx + (\sqrt{3}x^3 + 3x^2y + 3\sqrt{3}xy^2 + 3y^3)dy;$$

en effet dans les cas (i), resp. (ii) nous avons

$$\omega_{11} = 3\varphi_1^*\omega, \text{ où } \varphi_1 = (x, e^{-5i\pi/6}y), \text{ resp. } \omega_{11} = 3\varphi_2^*\omega, \text{ où } \varphi_2 = (x, e^{5i\pi/6}y).$$

□

Une particularité remarquable de la classification obtenue est que toutes les singularités des feuilletages $\mathcal{H}_i$, $i = 1, \dots, 11$, sur la droite à l'infini sont non-dégénérées. Nous aurons besoin dans le prochain paragraphe des valeurs des indices $\text{CS}(\mathcal{H}_i, L_{\infty}, s)$, $s \in \text{Sing}\mathcal{H}_i \cap L_{\infty}$. Pour cela, nous avons calculé, pour chaque $i = 1, \dots, 11$, le polynôme suivant (dit *polynôme de Camacho-Sad du feuilletage homogène* $\mathcal{H}_i$)

$$\text{CS}_{\mathcal{H}_i}(\lambda) = \prod_{s \in \text{Sing}\mathcal{H}_i \cap L_{\infty}} (\lambda - \text{CS}(\mathcal{H}_i, L_{\infty}, s)).$$

Le tableau suivant résume les types et les polynômes de Camacho-Sad des feuilletages $\mathcal{H}_i$, $i = 1, \dots, 11$.

i	$\mathcal{T}_{\mathcal{H}_i}$	$\text{CS}_{\mathcal{H}_i}(\lambda)$
1	$2 \cdot R_2$	$(\lambda - 1)^2(\lambda + \frac{1}{2})^2$
2	$2 \cdot T_2$	$(\lambda - \frac{1}{4})^4$
3	$2 \cdot R_1 + 1 \cdot R_2$	$(\lambda - 1)^3(\lambda + 2)$
4	$2 \cdot R_1 + 1 \cdot T_2$	$(\lambda - 1)^2(\lambda + \frac{1}{2})^2$
5	$1 \cdot R_1 + 1 \cdot T_1 + 1 \cdot R_2$	$(\lambda - 1)^2(\lambda + \frac{1}{5})(\lambda + \frac{4}{5})$
6	$1 \cdot R_1 + 1 \cdot T_1 + 1 \cdot T_2$	$(\lambda - 1)(\lambda + \frac{2}{7})(\lambda - \frac{1}{7})^2$
7	$2 \cdot T_1 + 1 \cdot R_2$	$(\lambda - 1)(\lambda - \frac{1}{4})(\lambda + \frac{1}{8})^2$
8	$2 \cdot T_1 + 1 \cdot T_2$	$(\lambda - \frac{1}{10})^2(\lambda - \frac{2}{5})^2$
9	$3 \cdot R_1 + 1 \cdot T_1$	$(\lambda - 1)^3(\lambda + 2)$
10	$2 \cdot R_1 + 2 \cdot T_1$	$(\lambda - 1)^2(\lambda + \frac{1}{2})^2$
11	$4 \cdot T_1$	$(\lambda - \frac{1}{4})^4$

TABLE 5.1. Types et polynômes de Camacho-Sad des feuilletages homogènes donnés par le théorème 5.1

6. Feuilletages à singularités non-dégénérées et de transformée de Legendre plate

L'ensemble $\mathbf{F}(d)$ des feuilletages de degré d sur $\mathbb{P}_{\mathbb{C}}^2$ est un ouvert de Zariski dans l'espace projectif $\mathbb{P}^{(d+2)^2-2}$. Le groupe des automorphismes de $\mathbb{P}_{\mathbb{C}}^2$ agit sur $\mathbf{F}(d)$; l'orbite d'un élément $\mathcal{F} \in \mathbf{F}(d)$ sous l'action de $\text{Aut}(\mathbb{P}_{\mathbb{C}}^2) = \text{PGL}_3(\mathbb{C})$ est notée $\mathcal{O}(\mathcal{F})$, voir [7]. Le sous-ensemble $\mathbf{FP}(d)$ de $\mathbf{F}(d)$ formé des $\mathcal{F} \in \mathbf{F}(d)$ tels que $\text{Leg}\mathcal{F}$ soit plat est un fermé de Zariski de $\mathbf{F}(d)$. Signalons aussi que si $\mathcal{F} \in \mathbf{FP}(d)$ alors l'adhérence $\overline{\mathcal{O}(\mathcal{F})}$ (dans $\mathbf{F}(d)$) de $\mathcal{O}(\mathcal{F})$ est contenue dans $\mathbf{FP}(d)$.

Parmi les éléments de $\mathbf{FP}(d)$ n'ayant que des singularités non-dégénérées, il y a le feuilletage de Fermat $\mathcal{F}^d$ de degré d défini en carte affine par la 1-forme

$$\omega_{\mathcal{F}^d}^d = (x^d - x)dy - (y^d - y)dx;$$

en effet, d'une part $\text{Leg}\mathcal{F}^d$ est plat car il est algébrisable d'après [9, Proposition 5.2]; d'autre part, un calcul élémentaire montre que toutes les singularités du feuilletage $\mathcal{F}^d$ sont non-dégénérées. Nous savons aussi d'après [9, Théorème 3] que $\overline{\mathcal{O}(\mathcal{F}^d)}$ est une composante irréductible de $\mathbf{FP}(d)$ pour $d \neq 4$.

Le théorème suivant est le résultat principal de ce paragraphe.

THÉOREME 6.1. — *Soit $\mathcal{F}$ un feuilletage de degré 3 sur $\mathbb{P}_{\mathbb{C}}^2$. Supposons que toutes ses singularités soient non-dégénérées et que son 3-tissu dual $\text{Leg}\mathcal{F}$ soit*

plat. Alors $\mathcal{F}$ est linéairement conjugué au feuilletage de Fermat $\mathcal{F}^3$ défini par la 1-forme $\omega_F^3 = (x^3 - x)dy - (y^3 - y)dx$.

REMARQUE 6.2. — L'ensemble $\mathbf{FP}(4)$ contient des feuilletages à singularités non-dégénérées et qui ne sont pas conjugués au feuilletage $\mathcal{F}^4$, e.g. la famille $(\mathcal{F}_\lambda^4)_{\lambda \in \mathbb{C}}$ de feuilletages définis par

$$\omega_F^4 + \lambda((x^3 - 1)y^2 dy - (y^3 - 1)x^2 dx).$$

En effet, d'après [9, Théorème 8.1], pour tout λ fixé dans $\mathbb{C}$, $\mathcal{F}_\lambda^4 \in \mathbf{FP}(4)$; de plus un calcul facile montre que $\mathcal{F}_\lambda^4$ est à singularités non-dégénérées. Mais, si λ est non nul alors $\mathcal{F}_\lambda^4$ n'est pas conjugué à $\mathcal{F}^4$ car $\mathcal{F}_\lambda^4$ n'est pas convexe.

La démonstration du théorème 6.1 repose sur le théorème 5.1 de classification des feuilletages homogènes appartenant à $\mathbf{FP}(3)$, et sur les trois résultats qui suivent, dont les deux premiers sont valables en degré quelconque.

Notons d'abord que le feuilletage $\mathcal{F}^d$ possède trois singularités radiales d'ordre maximal $d - 1$, non alignées. L'énoncé suivant montre que cette propriété caractérise l'orbite $\mathcal{O}(\mathcal{F}^d)$.

PROPOSITION 6.3. — Soit $\mathcal{F}$ un feuilletage de degré d sur $\mathbb{P}_{\mathbb{C}}^2$ ayant trois singularités radiales d'ordre maximal $d - 1$, non alignées. Alors $\mathcal{F}$ est linéairement conjugué au feuilletage de Fermat $\mathcal{F}^d$.

Démonstration. — Par hypothèse $\mathcal{F}$ possède trois points singuliers $m_j, j = 1, 2, 3$, non alignés vérifiant $\nu(\mathcal{F}, m_j) = 1$ et $\tau(\mathcal{F}, m_j) = d$. D'après [4, Proposition 2, page 23], les égalités $\tau(\mathcal{F}, m_j) = \tau(\mathcal{F}, m_l) = d$ avec $l \neq j$ impliquent que la droite $(m_j m_l)$ est invariante par $\mathcal{F}$. Choisissons des coordonnées homogènes $[x : y : z] \in \mathbb{P}_{\mathbb{C}}^2$ telles que $m_1 = [0 : 0 : 1]$, $m_2 = [0 : 1 : 0]$ et $m_3 = [1 : 0 : 0]$. Les égalités $\nu(\mathcal{F}, m_1) = 1$ et $\tau(\mathcal{F}, m_1) = d$, combinées avec le fait que $(m_2 m_3) = (z = 0)$ est $\mathcal{F}$ -invariante, assurent que toute 1-forme ω décrivant $\mathcal{F}$ dans la carte affine $z = 1$ est du type

$$\omega = (xdy - ydx)(\gamma + C_1(x, y) + \cdots + C_{d-2}(x, y)) + A_d(x, y)dx + B_d(x, y)dy$$

avec $\gamma \neq 0$, $A_d, B_d \in \mathbb{C}[x, y]_d$, $C_k \in \mathbb{C}[x, y]_k$ pour $k = 1, \dots, d - 2$.

Dans la carte affine $y = 1$ le feuilletage $\mathcal{F}$ est donné par

$$\begin{aligned} \theta = & -(\gamma z^d + C_1(x, 1)z^{d-1} + \cdots + C_{d-2}(x, 1)z^2)dx \\ & + A_d(x, 1)(zdx - xdz) - B_d(x, 1)dz; \end{aligned}$$

nous avons $\theta \wedge (zdx - xdz) = zQ(x, z)dx \wedge dz$, avec

$$Q(x, z) = x[\gamma z^{d-1} + C_1(x, 1)z^{d-2} + \cdots + C_{d-2}(x, 1)z] + B_d(x, 1).$$

L'égalité $\tau(\mathcal{F}, m_2) = d$ entraîne alors que le polynôme $Q \in \mathbb{C}[x, z]$ est homogène de degré d , ce qui permet d'écrire $B_d(x, y) = \beta x^d$ et $C_k(x, y) = \delta_k x^k$, β ,

$\delta_k \in \mathbb{C}$. Par suite nous avons $J_{(0,0)}^1 \theta = A_d(0,1)(zdx - xdz)$; alors l'égalité $\nu(\mathcal{F}, m_2) = 1$ assure que $A_d(0,1) \neq 0$.

De la même manière, en se plaçant dans la carte affine $x = 1$ et en écrivant explicitement les égalités $\tau(\mathcal{F}, m_3) = d$ et $\nu(\mathcal{F}, m_3) = 1$, nous obtenons que $B_d(1,0) \neq 0$, $A_d(x,y) = \alpha y^d$ et $C_k(x,y) = \varepsilon_k y^k$, $\alpha, \varepsilon_k \in \mathbb{C}$. Donc $\alpha\beta \neq 0$, les C_k sont tous nuls et ω est du type

$$\omega = \gamma(xdy - ydx) + \alpha y^d dx + \beta x^d dy.$$

Écrivons $\alpha = \gamma\mu^{1-d}$ et $\beta = -\gamma\lambda^{1-d}$. Quitte à remplacer ω par $\varphi^*\omega$, où $\varphi(x,y) = (\lambda x, \mu y)$, le feuilletage $\mathcal{F}$ est défini, dans les coordonnées affines (x,y) , par la 1-forme

$$\omega_F^d = (x^d - x)dy - (y^d - y)dx. \quad \square$$

Le résultat suivant permet de ramener l'étude de la platitude au cadre homogène :

PROPOSITION 6.4. — *Soit $\mathcal{F}$ un feuilletage de degré $d \geq 1$ sur $\mathbb{P}_{\mathbb{C}}^2$ ayant une droite invariante L . Supposons que toutes les singularités de $\mathcal{F}$ sur L soient non-dégénérées. Il existe un feuilletage homogène $\mathcal{H}$ de degré d sur $\mathbb{P}_{\mathbb{C}}^2$ ayant les propriétés suivantes*

- $\mathcal{H} \in \overline{\mathcal{O}(\mathcal{F})}$;
- L est invariante par $\mathcal{H}$;
- $\text{Sing}\mathcal{H} \cap L = \text{Sing}\mathcal{F} \cap L$;
- $\forall s \in \text{Sing}\mathcal{H} \cap L$, $\mu(\mathcal{H}, s) = 1$ et $\text{CS}(\mathcal{H}, L, s) = \text{CS}(\mathcal{F}, L, s)$.

Si de plus $\text{Leg}\mathcal{F}$ est plat, alors $\text{Leg}\mathcal{H}$ l'est aussi.

Démonstration. — Choisissons des coordonnées homogènes $[x : y : z] \in \mathbb{P}_{\mathbb{C}}^2$ telles que $L = (z = 0)$; comme L est $\mathcal{F}$ -invariante, $\mathcal{F}$ est défini dans la carte affine $z = 1$ par une 1-forme ω du type

$$\omega = \sum_{i=0}^d (A_i(x,y)dx + B_i(x,y)dy),$$

où les A_i, B_i sont des polynômes homogènes de degré i .

Montrons par l'absurde que $\text{pgcd}(A_d, B_d) = 1$; supposons donc que $\text{pgcd}(A_d, B_d) \neq 1$. Quitte à conjuguer ω par une transformation linéaire de $\mathbb{C}^2 = (z = 1)$, nous pouvons nous ramener à

$$A_d(x,y) = x\tilde{A}_{d-1}(x,y) \text{ et } B_d(x,y) = x\tilde{B}_{d-1}(x,y)$$

pour certains $\tilde{A}_{d-1}, \tilde{B}_{d-1}$ dans $\mathbb{C}[x, y]_{d-1}$; alors $s_0 = [0 : 1 : 0] \in L$ est un point singulier de $\mathcal{F}$. Dans la carte affine $y = 1$, le feuilletage $\mathcal{F}$ est donné par

$$\begin{aligned}\theta &= \sum_{i=0}^d z^{d-i} [A_i(x, 1)(zdx - xdz) - B_i(x, 1)dz] \\ &= [A_d(x, 1) + zA_{d-1}(x, 1) + \cdots](zdx - xdz) \\ &\quad - [B_d(x, 1) + zB_{d-1}(x, 1) + \cdots]dz.\end{aligned}$$

Le 1-jet de θ au point singulier $s_0 = (0, 0)$ s'écrit $-[\tilde{B}_{d-1}(0, 1)x + B_{d-1}(0, 1)z]dz$; ce qui implique que $\mu(\mathcal{F}, s_0) > 1$: contradiction avec l'hypothèse que toute singularité de $\mathcal{F}$ située sur L est non-dégénérée.

Il s'en suit que la 1-forme $\omega_d = A_d(x, y)dx + B_d(x, y)dy$ définit bien un feuilletage homogène de degré d sur $\mathbb{P}_{\mathbb{C}}^2$, que nous notons $\mathcal{H}$. Il est évident que L est $\mathcal{H}$ -invariante et que $\text{Sing}\mathcal{F} \cap L = \text{Sing}\mathcal{H} \cap L$. Considérons la famille d'homothéties $\varphi = \varphi_\varepsilon = (\frac{x}{\varepsilon}, \frac{y}{\varepsilon})$. Nous avons

$$\varepsilon^{d+1}\varphi^*\omega = \sum_{i=0}^d (\varepsilon^{d-i}A_i(x, y)dx + \varepsilon^{d-i}B_i(x, y)dy)$$

qui tend vers ω_d lorsque ε tend vers 0; il en résulte que $\mathcal{H} \in \overline{\mathcal{O}(\mathcal{F})}$.

Montrons que $\mathcal{H}$ vérifie la quatrième propriété de l'énoncé. Soit $s \in \text{Sing}\mathcal{H} \cap L$. Quitte à conjuguer ω par un isomorphisme linéaire de $\mathbb{C}^2 = (z = 0)$, nous pouvons supposer que $s = [0 : 1 : 0]$; il existe donc un polynôme $\hat{B}_{d-1} \in \mathbb{C}[x, y]_{d-1}$ tel que $B_d(x, y) = x\hat{B}_{d-1}(x, y)$. Le feuilletage $\mathcal{H}$ est décrit dans la carte affine $y = 1$ par

$$\theta_d = A_d(x, 1)(zdx - xdz) - B_d(x, 1)dz.$$

Posons $\lambda = A_d(0, 1)$ et $\nu = A_d(0, 1) + \hat{B}_{d-1}(0, 1)$. Le 1-jet de θ_d en $s = (0, 0)$ s'écrit $J_{(0,0)}^1\theta_d = \lambda zdx - \nu xdz$, et celui de θ est donné par $J_{(0,0)}^1\theta = \lambda zdx - \nu xdz - zB_{d-1}(0, 1)dz$. L'hypothèse $\mu(\mathcal{F}, s) = 1$ signifie que $\lambda\nu$ est non nul. Par suite $\mu(\mathcal{H}, s) = 1$ et $\text{CS}(\mathcal{H}, L, s) = \text{CS}(\mathcal{F}, L, s) = \frac{\lambda}{\nu}$.

L'implication $K(\text{Leg}\mathcal{F}) \equiv 0 \implies K(\text{Leg}\mathcal{H}) \equiv 0$ découle du fait que $\mathcal{H} \in \overline{\mathcal{O}(\mathcal{F})}$. $\square$

Nous illustrons le résultat précédent en l'appliquant au feuilletage $\mathcal{F}^d$.

EXEMPLE 6.5. — Le feuilletage de Fermat $\mathcal{F}^d$ est donné en coordonnées homogènes par la 1-forme

$$x^d(ydz - zd y) + y^d(zdx - xdz) + z^d(xdy - ydx).$$

Il possède les $3d$ droites invariantes suivantes :

- (a) $x = 0, y = 0, z = 0$;
- (b) $y = \zeta x, y = \zeta^2 x, x = \zeta z$ avec $\zeta^{d-1} = 1$.

Les droites de la famille (a) (resp. (b)) donnent lieu à 3 (resp. $3d-3$) feuilletages homogènes appartenant à $\mathcal{O}(\mathcal{F}^d) \subset \mathbf{FP}(d)$ et de type $2 \cdot R_{d-1}$ (resp. $1 \cdot R_{d-1} + (d-1) \cdot R_1$). Ceux qui sont de type $2 \cdot R_{d-1}$ sont tous conjugués à $\mathcal{H}_1^d$, d'après la proposition 4.1, et ceux qui sont de type $1 \cdot R_{d-1} + (d-1) \cdot R_1$ sont tous conjugués au feuilletage défini par

$$(y^{d-1} - dx^{d-1})ydx + (d-1)x^d dy.$$

Pour $d = 3$ ce dernier feuilletage est conjugué au feuilletage $\mathcal{H}_3^{d,1}$ donné par la proposition 4.2, mais ce n'est plus le cas pour $d \geq 4$.

REMARQUE 6.6. — Si $\mathcal{F}$ est un feuilletage de degré d sur $\mathbb{P}_{\mathbb{C}}^2$ et si m est un point singulier de $\mathcal{F}$, nous avons l'encadrement $\sigma(\mathcal{F}, m) \leq \tau(\mathcal{F}, m) + 1 \leq d + 1$, où $\sigma(\mathcal{F}, m)$ désigne le nombre de droites (distinctes) invariantes par $\mathcal{F}$ et qui passent par m .

Le lemme technique suivant joue un rôle clé dans la démonstration du théorème 6.1.

LEMME 6.7. — *Soit $\mathcal{F}$ un feuilletage de degré 3 sur $\mathbb{P}_{\mathbb{C}}^2$. Si le 3-tissu $\text{Leg}\mathcal{F}$ est plat et si $\mathcal{F}$ possède une singularité m non-dégénérée vérifiant $\text{BB}(\mathcal{F}, m) \notin \{4, \frac{16}{3}\}$, alors par le point m passent exactement deux droites invariantes par $\mathcal{F}$, i.e. $\sigma(\mathcal{F}, m) = 2$.*

Démonstration. — Les deux conditions $\mu(\mathcal{F}, m) = 1$ et $\text{BB}(\mathcal{F}, m) \neq 4$ assurent l'existence d'une carte affine (x, y) de $\mathbb{P}_{\mathbb{C}}^2$ dans laquelle $m = (0, 0)$ et $\mathcal{F}$ est défini par une 1-forme du type $\theta_1 + \theta_2 + \theta_3 + \theta_4$, où

$$\begin{aligned} \theta_1 &= \lambda y dx + \mu x dy, \\ \theta_2 &= \left(\sum_{i=0}^2 \alpha_i x^{2-i} y^i \right) dx + \left(\sum_{i=0}^2 \beta_i x^{2-i} y^i \right) dy, \\ \theta_3 &= \left(\sum_{i=0}^3 a_i x^{3-i} y^i \right) dx + \left(\sum_{i=0}^3 b_i x^{3-i} y^i \right) dy, \\ \theta_4 &= \left(\sum_{i=0}^3 c_i x^{3-i} y^i \right) (x dy - y dx), \end{aligned}$$

avec $\lambda\mu(\lambda+\mu) \neq 0$; comme $\text{BB}(\mathcal{F}, m) \neq \frac{16}{3}$ nous avons $\lambda\mu(\lambda+\mu)(\lambda+3\mu)(3\lambda+\mu) \neq 0$.

Commençons par montrer que $\alpha_0 = 0$. Supposons par l'absurde que $\alpha_0 \neq 0$. Soit (p, q) la carte affine de $\mathbb{P}_{\mathbb{C}}^2$ associée à la droite $\{px - qy = 1\} \subset \mathbb{P}_{\mathbb{C}}^2$; le

3-tissu $\text{Leg}\mathcal{F}$ est donné par la 3-forme symétrique

$$\begin{aligned}\tilde{\omega} = & [(\beta_2 p + \alpha_2 q - \lambda q^2) dp^2 + (\beta_1 p + \alpha_1 q + \lambda p q - \mu p q) dp dq \\ & + (\beta_0 p + \alpha_0 q + \mu p^2) dq^2] (pdq - qdp) \\ & + q(a_3 dp^3 + a_2 dp^2 dq + a_1 dp dq^2 + a_0 dq^3) \\ & + p(b_3 dp^3 + b_2 dp^2 dq + b_1 dp dq^2 + b_0 dq^3) \\ & + c_3 dp^3 + c_2 dp^2 dq + c_1 dp dq^2 + c_0 dq^3.\end{aligned}$$

Considérons la famille d'automorphismes $\varphi = \varphi_\varepsilon = (\alpha_0 \varepsilon^{-1} p, \alpha_0 \varepsilon^{-2} q)$. Nous constatons que

$$\tilde{\omega}_0 := \lim_{\varepsilon \rightarrow 0} \varepsilon^9 \alpha_0^{-6} \varphi^* \tilde{\omega} = (pdq - qdp)(-\lambda q^2 dp^2 + pq(\lambda - \mu) dp dq + (\mu p^2 + q) dq^2).$$

Puisque μ est non nul $\tilde{\omega}_0$ définit un 3-tissu $\mathcal{W}_0$, qui appartient évidemment à $\overline{\mathcal{O}(\text{Leg}\mathcal{F})}$. L'image réciproque de $\mathcal{W}_0$ par l'application rationnelle $\psi(p, q) = (\lambda(p + q), -\lambda(\lambda + \mu)^2 pq)$ s'écrit $\psi^* \mathcal{W}_0 = \mathcal{F}_1 \boxtimes \mathcal{F}_2 \boxtimes \mathcal{F}_3$, où

$$\begin{aligned}\mathcal{F}_1 : & q^2 dp + p^2 dq = 0, \\ \mathcal{F}_2 : & \mu q^2 dp + p(\lambda q + \mu q - \lambda p) dq = 0, \\ \mathcal{F}_3 : & \mu p^2 dq + q(\lambda p + \mu p - \lambda q) dp = 0.\end{aligned}$$

Un calcul direct, utilisant la formule (1.1), conduit à

$$\begin{aligned}\eta(\psi^* \mathcal{W}_0) = & \frac{5(\lambda + \mu)p^2 - (8\lambda + 7\mu)pq + (3\lambda + 4\mu)q^2}{(\lambda + \mu)p(p - q)^2} dp \\ & + \frac{5(\lambda + \mu)q^2 - (8\lambda + 7\mu)pq + (3\lambda + 4\mu)p^2}{(\lambda + \mu)q(p - q)^2} dq\end{aligned}$$

de sorte que

$$K(\psi^* \mathcal{W}_0) = d\eta(\psi^* \mathcal{W}_0) = -\frac{4\mu(p + q)}{(\lambda + \mu)(p - q)^3} dp \wedge dq \neq 0;$$

comme $\text{Leg}\mathcal{F}$ est plat par hypothèse, il en est de même pour $\mathcal{W}_0$; par suite $K(\psi^* \mathcal{W}_0) = \psi^* K(\mathcal{W}_0) = 0$, ce qui est absurde. D'où l'égalité $\alpha_0 = 0$.

Montrons maintenant que $a_0 = 0$. Raisonnons encore par l'absurde en supposant $a_0 \neq 0$. Le feuilletage $\mathcal{F}$ est décrit dans la carte affine (x, y) par $\theta = \theta_1 + \theta_2 + \theta_3 + \theta_4$ avec $\alpha_0 = 0$. En faisant agir la transformation linéaire diagonale $(\varepsilon x, \alpha_0 \varepsilon^3 y)$ sur θ puis en passant à la limite lorsque $\varepsilon \rightarrow 0$ nous obtenons

$$\theta_0 = \lambda y dx + \mu x dy + x^3 dx$$

qui définit un feuilletage de degré trois $\mathcal{F}_0 \in \overline{\mathcal{O}(\mathcal{F})}$. Notons $I_0 = I_{\mathcal{F}_0}^{\text{tr}}$, $\mathcal{G}_0 = \mathcal{G}_{\mathcal{F}_0}$ et $I_0^\perp = \overline{\mathcal{G}_0^{-1}(\mathcal{G}_0(I_0))} \setminus I_0$, où l'adhérence est prise au sens ordinaire. Un calcul

élémentaire montre que

$$\mathcal{G}_0(x, y) = \left(\frac{x^3 + \lambda y}{x(x^3 + \lambda y + \mu y)}, -\frac{\mu}{x^3 + \lambda y + \mu y} \right),$$

$$I_0 = \{(x, y) \in \mathbb{C}^2 : (\lambda - 2\mu)x^3 + \lambda(\lambda + \mu)y = 0\} \subset \mathbb{P}_{\mathbb{C}}^2$$

et que la courbe $I_0^\perp$ a pour équation affine $f(x, y) = y - \nu x^3 = 0$, où $\nu = -\frac{4\lambda + \mu}{4\lambda(\lambda + \mu)}$. Comme $\text{Leg}\mathcal{F}$ est plat, $\text{Leg}\mathcal{F}_0$ l'est aussi. Or, d'après [2, Corollaire 4.6], le 3-tissu $\text{Leg}\mathcal{F}_0$ est plat si et seulement si $I_0^\perp$ est invariante par $\mathcal{F}_0$, i.e. si et seulement si

$$0 \equiv df \wedge \theta_0 \Big|_{y=\nu x^3} = 3(3\lambda + \mu)\mu x^3 dx \wedge dy;$$

d'où $\mu(3\lambda + \mu) = 0$: contradiction. Donc $a_0 = \alpha_0 = 0$, ce qui signifie que la droite $(y = 0)$ est $\mathcal{F}$ -invariante.

Ce qui précède montre également que l'invariance de la droite $(y = 0)$ par $\mathcal{F}$ découle uniquement du fait que $\lambda\mu(\lambda + \mu)(3\lambda + \mu) \neq 0$ et de l'hypothèse que $\text{Leg}\mathcal{F}$ est plat. Ainsi en permutant les coordonnées x et y , la condition $\lambda\mu(\lambda + \mu)(\lambda + 3\mu) \neq 0$ permet de déduire que $\beta_2 = b_3 = 0$, i.e. que la droite $(x = 0)$ est aussi invariante par $\mathcal{F}$.

La singularité m de $\mathcal{F}$ n'est pas radiale car $\text{BB}(\mathcal{F}, m) \neq 4$; de plus $\nu(\mathcal{F}, m) = 1$ car $\mu(\mathcal{F}, m) = 1$. Il s'en suit que $\tau(\mathcal{F}, m) = 1$; d'après la remarque 6.6, nous avons $\sigma(\mathcal{F}, m) \leq \tau(\mathcal{F}, m) + 1 = 2$, d'où l'énoncé. $\square$

Avant de commencer la démonstration du théorème 6.1, rappelons (voir [4]) que si $\mathcal{F}$ est un feuilletage de degré d sur $\mathbb{P}_{\mathbb{C}}^2$ alors

$$(6.1) \quad \sum_{s \in \text{Sing}\mathcal{F}} \mu(\mathcal{F}, s) = d^2 + d + 1 \quad \text{et} \quad \sum_{s \in \text{Sing}\mathcal{F}} \text{BB}(\mathcal{F}, s) = (d + 2)^2.$$

Démonstration du théorème 6.1. — Écrivons $\text{Sing}\mathcal{F} = \Sigma^0 \cup \Sigma^1 \cup \Sigma^2$ avec

$$\Sigma^0 = \{s \in \text{Sing}\mathcal{F} : \text{BB}(\mathcal{F}, s) = \frac{16}{3}\},$$

$$\Sigma^1 = \{s \in \text{Sing}\mathcal{F} : \text{BB}(\mathcal{F}, s) = 4\},$$

$$\Sigma^2 = \text{Sing}\mathcal{F} \setminus (\Sigma^0 \cup \Sigma^1)$$

et notons $\kappa_i = \#\Sigma^i$, $i = 0, 1, 2$. Par hypothèse, $\mathcal{F}$ est de degré 3 et toutes ses singularités ont leur nombre de Milnor 1. Les formules (6.1) impliquent alors que

$$(6.2) \quad \#\text{Sing}\mathcal{F} = \kappa_0 + \kappa_1 + \kappa_2 = 13 \quad \text{et} \quad \frac{16}{3}\kappa_0 + 4\kappa_1 + \sum_{s \in \Sigma^2} \text{BB}(\mathcal{F}, s) = 25;$$

il en résulte que Σ^2 est non vide. Soit m un point de Σ^2 ; d'après le lemme 6.7 il passe par m exactement deux droites $\ell_m^{(1)}$ et $\ell_m^{(2)}$ invariantes par $\mathcal{F}$. Alors, pour $i = 1, 2$, la proposition 6.4 assure l'existence d'un feuilletage homogène

$\mathcal{H}_m^{(i)}$ de degré 3 sur $\mathbb{P}_{\mathbb{C}}^2$ appartenant à $\overline{\mathcal{O}(\mathcal{F})}$ et tel que la droite $\ell_m^{(i)}$ soit $\mathcal{H}_m^{(i)}$ -invariante. Comme $\text{Leg}\mathcal{F}$ est plat par hypothèse, il en est de même pour $\text{Leg}\mathcal{H}_m^{(1)}$ et $\text{Leg}\mathcal{H}_m^{(2)}$. Donc chacun des $\mathcal{H}_m^{(i)}$ est linéairement conjugué à l'un des onze feuilletages homogènes donnés par le théorème 5.1. Pour $i = 1, 2$, la proposition 6.4 assure aussi que

$$(a) \text{Sing}\mathcal{F} \cap \ell_m^{(i)} = \text{Sing}\mathcal{H}_m^{(i)} \cap \ell_m^{(i)};$$

$$(b) \forall s \in \text{Sing}\mathcal{H}_m^{(i)} \cap \ell_m^{(i)}, \mu(\mathcal{H}_m^{(i)}, s) = 1 \text{ et } \text{CS}(\mathcal{H}_m^{(i)}, \ell_m^{(i)}, s) = \text{CS}(\mathcal{F}, \ell_m^{(i)}, s).$$

Puisque $\text{CS}(\mathcal{F}, \ell_m^{(1)}, m)\text{CS}(\mathcal{F}, \ell_m^{(2)}, m) = 1$, nous avons

$$\text{CS}(\mathcal{H}_m^{(1)}, \ell_m^{(1)}, m)\text{CS}(\mathcal{H}_m^{(2)}, \ell_m^{(2)}, m) = 1.$$

Cette égalité et la Table 5.1 impliquent

$$\{\text{CS}(\mathcal{H}_m^{(1)}, \ell_m^{(1)}, m), \text{CS}(\mathcal{H}_m^{(2)}, \ell_m^{(2)}, m)\} = \{-2, -\frac{1}{2}\};$$

d'où $\text{BB}(\mathcal{F}, m) = -\frac{1}{2}$. Le point $m \in \Sigma^2$ étant arbitraire, Σ^2 est formé des $s \in \text{Sing}\mathcal{F}$ tels que $\text{BB}(\mathcal{F}, s) = -\frac{1}{2}$. Par suite le système (6.2) se réécrit $\kappa_0 + \kappa_1 + \kappa_2 = 13$ et $\frac{16}{3}\kappa_0 + 4\kappa_1 - \frac{1}{2}\kappa_2 = 25$ dont l'unique solution est $(\kappa_0, \kappa_1, \kappa_2) = (0, 7, 6)$, c'est-à-dire que $\text{Sing}\mathcal{F} = \Sigma^1 \cup \Sigma^2$, $\#\Sigma^1 = 7$ et $\#\Sigma^2 = 6$.

Pour fixer les idées, nous supposons que $\text{CS}(\mathcal{H}_m^{(1)}, \ell_m^{(1)}, m) = -2$ pour n'importe quel choix de $m \in \Sigma_2$; donc $\text{CS}(\mathcal{H}_m^{(2)}, \ell_m^{(2)}, m) = -\frac{1}{2}$. Dans ce cas, l'inspection de la Table 5.1 ainsi que les relations (a) et (b) conduisent à

$$\#(\Sigma^1 \cap \ell_m^{(1)}) = 3, \quad \#(\Sigma^1 \cap \ell_m^{(2)}) = 2, \quad \Sigma^2 \cap \ell_m^{(1)} = \{m\}, \quad \Sigma^2 \cap \ell_m^{(2)} = \{m, m'\}$$

pour un certain point $m' \in \Sigma^2 \setminus \{m\}$ vérifiant $\text{CS}(\mathcal{F}, \ell_m^{(2)}, m') = -\frac{1}{2}$. Ce point m' satisfait à son tour l'égalité $\Sigma^2 \cap \ell_{m'}^{(1)} = \{m'\}$. Nous constatons que $\ell_{m'}^{(2)} = \ell_m^{(2)}$, $\ell_{m'}^{(1)} \neq \ell_m^{(1)}$, $\ell_{m'}^{(1)} \neq \ell_m^{(2)}$ et que ces trois droites distinctes satisfont $\Sigma^2 \cap (\ell_m^{(1)} \cup \ell_m^{(2)} \cup \ell_{m'}^{(1)}) = \{m, m'\}$. Comme $\#\Sigma^2 = 6 = 2 \cdot 3$, $\mathcal{F}$ possède $3 \cdot 3 = 9$ droites invariantes.

Posons $\Sigma^1 \cap \ell_m^{(2)} = \{m_1, m_2\}$. Notons $\mathcal{D}_1, \mathcal{D}_2, \dots, \mathcal{D}_6$ les six droites $\mathcal{F}$ -invariantes qui restent; par construction chacune d'elles doit couper $\ell_m^{(1)}$ et $\ell_m^{(2)}$ en des points de Σ^1 . Par ailleurs, d'après la remarque 6.6, pour tout $s \in \text{Sing}\mathcal{F}$ nous avons $\sigma(\mathcal{F}, s) \leq \tau(\mathcal{F}, s) + 1 \leq 4$. Donc par chacun des points m_1 et m_2 passent exactement trois droites de la famille $\{\mathcal{D}_1, \mathcal{D}_2, \dots, \mathcal{D}_6\}$. Puisque $\#(\Sigma^1 \cap \ell_m^{(1)}) = 3$, $\Sigma^1 \cap \ell_m^{(1)}$ contient au moins un point, noté m_3 , par lequel passent précisément trois droites de la famille $\{\ell_{m'}^{(1)}, \mathcal{D}_1, \mathcal{D}_2, \dots, \mathcal{D}_6\}$. Ainsi, pour $j = 1, 2, 3$ nous avons $\sigma(\mathcal{F}, m_j) = 4$, ce qui implique que $\tau(\mathcal{F}, m_j) = 3$. L'hypothèse sur les singularités de $\mathcal{F}$ assure que $\nu(\mathcal{F}, m_j) = 1$ pour $j = 1, 2, 3$. Il s'en suit que les singularités m_1, m_2 et m_3 sont radiales d'ordre 2 de $\mathcal{F}$.

Par construction ces trois points ne sont pas alignés. Nous concluons en appliquant la proposition 6.3. $\square$

Dans [9] les auteurs ont étudié les feuilletages de $\mathbf{F}(d)$ qui sont convexes à diviseur d'inflexion réduit ; ils ont montré que l'ensemble formé de tels feuilletages est contenu dans $\mathbf{FP}(d)$, voir [9, Théorème 2]. Ces feuilletages sont à singularités non-dégénérées comme le montre l'énoncé suivant qui est une légère généralisation de [9, Lemme 4.1].

LEMME 6.8. — *Tout feuilletage convexe sur $\mathbb{P}_{\mathbb{C}}^2$ à diviseur d'inflexion réduit est à singularités non-dégénérées.*

Démonstration. — Soit $\mathcal{F}$ un tel feuilletage et $s \in \text{Sing}\mathcal{F}$ de multiplicité algébrique ν . Fixons une carte affine (x, y) telle que $s = (0, 0)$; le germe $\mathcal{F}$ en s est défini par un champ de vecteurs X du type $X = X_{\nu} + X_{\nu+1} + \dots$, où les X_i sont homogènes de degré i . Le diviseur d'inflexion $I_{\mathcal{F}}$ de $\mathcal{F}$ est donné par l'équation

$$0 = \begin{vmatrix} X(x) & X(y) \\ X^2(x) & X^2(y) \end{vmatrix} = P_{3\nu-1}(x, y) + \dots,$$

où $P_{3\nu-1}(x, y) = X_{\nu}(x)X_{\nu}^2(y) - X_{\nu}(y)X_{\nu}^2(x)$ est un polynôme homogène (éventuellement nul) de degré $3\nu - 1$. Montrons d'abord que $\nu = 1$. Les droites invariantes de $\mathcal{F}$ passant par l'origine sont contenues dans le cône tangent $yX_{\nu}(x) - xX_{\nu}(y)$ de X_{ν} qui est un polynôme homogène de degré $\nu + 1$. L'hypothèse sur $\mathcal{F}$ implique alors que $\nu = 1$. Il s'en suit aussi que le polynôme $P_{3\nu-1}$ n'est pas identiquement nul ; par suite la partie linéaire X_1 de X est saturée, ce qui implique que la singularité s est non-dégénérée. $\square$

À notre connaissance les seuls feuilletages convexes à diviseur d'inflexion réduit connus dans la littérature sont ceux qui sont présentés dans [9, Table 1.1] : le feuilletage $\mathcal{F}^d$ en tout degré et les trois feuilletages donnés par les 1-formes

$$\begin{aligned} & (2x^3 - y^3 - 1)ydx + (2y^3 - x^3 - 1)xdy, \\ & (y^2 - 1)(y^2 - (\sqrt{5} - 2)^2)(y + \sqrt{5}x)dx - (x^2 - 1)(x^2 - (\sqrt{5} - 2)^2)(x + \sqrt{5}y)dy, \\ & (y^3 - 1)(y^3 + 7x^3 + 1)ydx - (x^3 - 1)(x^3 + 7y^3 + 1)xdy, \end{aligned}$$

qui sont de degré 4, 5 et 7 respectivement. Dans [9, Problème 9.1] les auteurs posent la question suivante : y a-t-il d'autres feuilletages convexes à diviseur d'inflexion réduit ? En combinant le théorème 6.1 avec le lemme 6.8 nous donnons une réponse négative en degré trois à ce problème.

COROLLAIRE 6.9. — *Tout feuilletage convexe de degré 3 sur $\mathbb{P}_{\mathbb{C}}^2$ à diviseur d'inflexion réduit est linéairement conjugué au feuilletage de Fermat $\mathcal{F}^3$.*

BIBLIOGRAPHIE

- [1] P. BAUM & R. BOTT – “Singularities of holomorphic foliations”, *J. Differential Geometry* 7 (1972), p. 279–342.

- [2] A. BELTRÁN, M. FALLA LUZA & D. MARÍN – “Flat 3-webs of degree one on the projective plane”, *Ann. Fac. Sci. Toulouse Math.* **23** (2014), p. 779–796.
- [3] W. BLASCHKE & J. DUBOURDIEU – “Invarianten von Kurvengeweben”, *Abh. Math. Sem. Univ. Hamburg* **6** (1928), p. 198–215.
- [4] M. BRUNELLA – *Birational geometry of foliations*, IMPA Monographs, vol. 1, Springer, 2015.
- [5] C. CAMACHO & P. SAD – “Invariant varieties through singularities of holomorphic vector fields”, *Ann. of Math.* **115** (1982), p. 579–595.
- [6] V. CAVALIER & D. LEHMANN – “Introduction à l’étude globale des tissus sur une surface holomorphe”, *Ann. Inst. Fourier* **57** (2007), p. 1095–1133.
- [7] D. CERVEAU, J. DÉSERTE, D. GARBA BELKO & R. MEZIANI – “Géométrie classique de certains feuilletages de degré deux”, *Bull. Braz. Math. Soc. (N.S.)* **41** (2010), p. 161–198.
- [8] A. HÉNAUT – “Planar web geometry through abelian relations and singularities”, in *Inspired by S. S. Chern*, Nankai Tracts Math., vol. 11, World Sci. Publ., 2006, p. 269–295.
- [9] D. MARÍN & J. V. PEREIRA – “Rigid flat webs on the projective plane”, *Asian J. Math.* **17** (2013), p. 163–191.
- [10] J. MILNOR – *Dynamics in one complex variable*, Friedr. Vieweg & Sohn, 1999.
- [11] J. V. PEREIRA – “Vector fields, invariant varieties and linear systems”, *Ann. Inst. Fourier (Grenoble)* **51** (2001), p. 1385–1405.
- [12] J. V. PEREIRA & L. PIRIO – *An invitation to web geometry*, Publicações Matemáticas do IMPA., Instituto Nacional de Matemática Pura e Aplicada (IMPA), 2009.
- [13] ———, “The classification of exceptional CDQL webs on compact complex surfaces”, *Int. Math. Res. Not.* **2010** (2010), p. 2169–2282.
- [14] O. RIPOLL – “Properties of the connection associated with planar webs and applications”, prépublication arXiv:math/0702321, 3000effacer.