

JOURNAL
DE
MATHÉMATIQUES
PURES ET APPLIQUÉES

FONDÉ EN 1836 ET PUBLIÉ JUSQU'EN 1874

PAR JOSEPH LIOUVILLE

J. LIOUVILLE

Sur l'intégrale $\int_0^\infty e^{-x} x^n dx$

Journal de mathématiques pures et appliquées 1^{re} série, tome 11 (1846), p. 464-465.

http://www.numdam.org/item?id=JMPA_1846_1_11_464_0



NUMDAM

Article numérisé dans le cadre du programme
Gallica de la Bibliothèque nationale de France
<http://gallica.bnf.fr/>

et catalogué par Mathdoc
dans le cadre du pôle associé BnF/Mathdoc
<http://www.numdam.org/journals/JMPA>

SUR L'INTÉGRALE

$$\int_0^\infty e^{-x} x^n dx;$$

PAR J. LIOUVILLE.

Le produit $e^{-x} x^n$ s'évanouit aux deux limites 0 et ∞ , il n'a d'ailleurs qu'un seul maximum qui répond à $x = n$; on peut donc poser

$$e^{-x} x^n = e^{-n} n^n e^{-t^2},$$

en faisant varier t de $-\infty$ à $+\infty$, et l'on a

$$\int_0^\infty e^{-x} x^n dx = e^{-n} n^n \int_{-\infty}^{+\infty} e^{-t^2} \frac{dx}{dt} dt.$$

En prenant les logarithmes des deux membres, la relation entre x et t se met sous la forme

$$x - n \log x = n - n \log n + t^2.$$

Soit $x = n + u$; elle deviendra

$$u - n \log(n + u) = t^2 - n \log n.$$

Mais, en désignant par θ une quantité essentiellement comprise entre 0 et 1, on a, d'après la formule de Taylor,

$$\log(n + u) = \log n + \frac{u}{n} - \frac{u^2}{2(n + \theta u)^2}.$$

Il en résulte

$$\frac{nu^2}{2(n + \theta u)^2} = t^2,$$

d'où

$$u = \frac{nt\sqrt{2}}{\sqrt{n - \theta t\sqrt{2}}}.$$

Mais de l'équation

$$x - n \log x = n - n \log n + t^2,$$

on déduit

$$\frac{dx}{dt} = \frac{2xt}{x-n} = 2t + \frac{2nt}{u}.$$

Donc, en mettant pour u sa valeur, on a

$$\frac{dx}{dt} = \sqrt{2n} + 2(1-\theta)t;$$

par suite, et à cause de $\int_{-\infty}^{+\infty} e^{-t^2} dt = \sqrt{\pi}$,

$$\int_0^\infty e^{-x} x^n dx = e^{-n} n^n \sqrt{2n\pi} \left[1 + \frac{2}{\sqrt{2n\pi}} \int_{-\infty}^{+\infty} e^{-t^2} (1-\theta) t dt \right].$$

Or la valeur numérique de l'intégrale

$$\int_{-\infty}^{+\infty} e^{-t^2} (1-\theta) t dt,$$

où le facteur $1-\theta$ est positif et < 1 , est évidemment inférieure à celle de

$$\int_0^\infty e^{-t^2} t dt = \frac{1}{2}.$$

Donc pour $n = \infty$ son quotient par $\sqrt{2n\pi}$ se réduit à zéro. De là une démonstration rigoureuse et assez simple de cette proposition connue, que le rapport des deux quantités

$$\int_0^\infty e^{-x} x^n dx, \quad e^{-n} n^n \sqrt{2n\pi},$$

a pour limite l'unité lorsque n grandit indéfiniment.

